

プログラムの設計論 第1回

2611/93 中井 平蔵

頂点 w に対する

$$\begin{cases} [w, x, 1] \geq \mathcal{N}_1, [w, z, 6] \geq \mathcal{N}_1 \\ [w, x, 1] \geq \mathcal{N}_2, [w, z, 6] \geq \mathcal{N}_2 \end{cases}$$

頂点 z に対する




$$\begin{cases} [z, w, 1] \geq \mathcal{N}_1, [z, w, 6] \geq \mathcal{N}_1 \\ [z, w, 1] \geq \mathcal{N}_2, [z, w, 6] \geq \mathcal{N}_2 \end{cases}$$

頂点 w に対する、隣接頂点の順序 $v_1 = x, v_2 = z$ による
 頂点 x に対する、隣接頂点の順序 $v_1 = z, v_2 = w$ による

頂点 x に対する

$$\begin{cases} [x, y, 1] \geq \mathcal{N}_1, [x, w, 6] \geq \mathcal{N}_1 \\ [x, y, 1] \geq \mathcal{N}_2, [x, w, 6] \geq \mathcal{N}_2 \end{cases}$$

頂点 y に対する

$$\begin{cases} [y, x, 1] \geq \mathcal{N}_1, [y, x, 6] \geq \mathcal{N}_1 \\ [y, x, 1] \geq \mathcal{N}_2, [y, x, 6] \geq \mathcal{N}_2 \end{cases}$$


サイズ2の頂点被覆は存在するか? $\rightarrow$ Yes
 $\downarrow$
 HC できる $\rightarrow$ Yes