

养猫知识与猫病

高得仪 编著
张纯恒 审校
时玉声




北京农业大学出版社

统一书号: 16446·7

定 价: 0.85 元

知识
普及
PDG



养猫人必知猫病



高得仁 编著
张纯恒
时玉声 审校

养猫人必知
PDG

责任编辑：沈凤鸣

封面字：于立彦

养猫知识与猫病

高得仪 张纯恒 编著

时玉声 审校

北京农业大学出版社出版
(北京市海淀区圆明园西路)
北京新华书店发行所发行
北京市大兴县印刷厂印刷

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：3.8 字数：78千字

印数：1—70000

统一书号：16446·7 定价：0.85元

前 言

这本小册子是为猫的爱好者、养猫专业户和基层畜牧兽医人员编写的。小册子中对猫的解剖生理特点、生活习性、饲养管理、繁殖生育和疾病等方面作了比较详尽的介绍。附录二还就猫传染给人的疾病作了一般说明。读了这本小册子，能使养猫者学到养猫知识，增强把猫养好的信心，通过实践更可增加养猫者的经验，促进养猫事业的发展。

我们对城乡养猫和大群养猫经验不足，诚恳希望读者结合自己的实际情况对书中内容灵活掌握，参考使用。由于我们的水平有限，资料不足，遗漏或不妥之处，敬请广大读者多提宝贵意见，以便今后修订。

这本小册子在编写过程中，承蒙时玉声教授精心审改，以及刘军同志出力帮助，在此表示感谢。



目 录

一、概述	(1)
二、猫的解剖和生理特点	(10)
(一) 猫的解剖特点	(10)
(二) 猫的生理特点	(12)
(三) 猫的感觉器官	(13)
三、猫的自然习性	(15)
四、猫的选择和扑捉	(18)
(一) 猫的选择	(18)
(二) 猫的扑捉	(19)
五、猫的饲养管理	(19)
(一) 猫舍和猫的室内训练	(19)
(二) 猫的营养需要和饲喂	(22)
(三) 猫的梳理、洗澡、换毛和随人旅行	(37)
(四) 健康猫和病猫的一般鉴别	(39)
(五) 猫的护理和包扎	(40)
(六) 猫的给药	(41)
六、猫的繁殖	(42)
(一) 猫的生育控制	(42)
(二) 猫的性行为	(43)
(三) 孕猫的护理	(44)
(四) 妊娠猫的产前准备和生产	(45)
(五) 猫的哺乳和孤儿猫的哺育	(46)

七、猫病防治	(47)
(一) 病毒性疾病和细菌性疾病.....	(48)
(二) 体内寄生虫病.....	(57)
(三) 体外寄生虫病.....	(65)
(四) 消化系统疾病.....	(67)
(五) 呼吸系统疾病.....	(78)
(六) 泌尿系统疾病.....	(83)
(七) 生殖系统疾病.....	(86)
(八) 脑和神经疾病.....	(90)
(九) 代谢疾病.....	(92)
(十) 骨骼疾病.....	(94)
(十一) 中毒疾病.....	(98)
(十二) 皮肤疾病.....	(99)
(十三) 眼的疾病.....	(102)
(十四) 耳的疾病.....	(105)
(十五) 疔.....	(107)
(十六) 肿瘤.....	(108)
(十七) 意外事故、急救及其他.....	(109)
附录一 健康猫常用生理数字	(113)
附录二 猫传染给人的疾病	(113)

一、概 述

近几年来，我国城乡养猫的人越来越多，有的地方还出现了养猫专业户、扑鼠猫养殖公司等，有人由于养猫走上了致富之路。我国养猫历史悠久，远在西周诗篇《韩奕》中就出现了“猫”的记载，后来在《诗经》、《礼记》里也有有关“猫”的记述。1986年2月5日《北京晚报》第二版刊登了广化的文章，题目是“十二生肖里为什么没有猫”？他认为西周初年就有的十二生肖中没有猫，说明西周以前的猫并非是受人喜欢的家猫，而是体大性猛的野山猫。但是也有人认为我国古代把野山猫驯化饲养成家猫的时间不会晚于西汉。到底是什么时间？至今尚无比较明确的记述和考证。不过到了唐朝家庭养猫已是很普通的事了。

世界上养猫最早的算是古埃及了，远在公元前2600年就有了猫的记载，但是没有说明是家养猫还是野猫。公元前1900年，在一个古墓中挖出17具猫骨骼和几个小奶罐，由此证明了猫与人类的密切关系。公元前1600年左右的许多图画中，把猫都画成了家畜。公元一世纪欧洲才出现家养猫。家养猫传到北美洲那是十七世纪的事了。

远古人类养猫为了灭鼠捉鸟，但在很长一段时期内，由于猫没有直接的经济意义和社会意义，因此猫的品种改良工作进展不大。现在分布在世界各地的猫，它们的体长和体重差别很小。十九世纪末，科学家把猫广泛用于医学等方面的研究，猫的身价逐步提高，现在猫在某些实验上具有其他实

验动物难以取代的特殊位置，因此不少科学家开始进行猫的纯化培养，有的国家还育成了无特定病原体的猫，这类猫是现代某些科研项目所不可缺少的。当前我国城乡兴起了养猫热，随着人们生活水平的不断提高和城市退休人员的增多，以养猫为老年人嗜好的也越来越多的。养猫确实能使老年人或病人消除寂寞增添乐趣，有益于健康长寿和疾病的恢复。美国费城曾经作过一次调查，在一年时间里，没养猫的病人死亡率为28.2%，而养猫的病人死亡率只有5.6%。当然养猫还可灭鼠，这是众所周知的。

我国南方某些地区，其中特别是广东，人们喜欢用猫肉烹制佳肴。猫肉的确肉嫩鲜美，别有风味。广东名菜“龙虎斗”就是用猫肉和蛇肉作原料烧成的。现在国内外不少人喜欢用猫皮制成裘服，其中尤以狸花猫的毛皮作为上选。由于养猫好处多，近几年我国养猫事业得到很快的发展，如江苏省如东县，几乎家家养猫，全县估计养猫总数不少于40万只。

猫属于哺乳纲、食肉目、猫科、猫属，与猫同科的还有狮、虎、豹等野生动物。不论哪一品种的家猫都是数千年来人们从野猫逐步驯化而来的。远在唐朝我国便有了海州猫、射阳猫、简州猫等品种的记载。有关目前国内猫的品种问题，有待今后调查。我国人民喜欢以猫的毛色给猫取名，如黑猫、



图1 波斯猫




图2 喜玛拉雅猫

白猫、花猫、虎皮猫、狸花猫等。国外一般把猫分成长毛猫和短毛猫，长毛猫以波斯猫为代表，这类猫还有喜玛拉雅猫、巴曼猫、巴里猫、缅甸古恩猫、安哥拉猫等(图1—5)；短毛猫以泰国猫(暹罗猫)为代表，此外还有美国 and 欧洲短毛猫、日本猫、阿比西尼亚猫、巴米




图3 巴曼猫




图4 缅因古恩猫



图5 安哥拉猫

子猫、哈瓦那棕猫、埃及猫、曼岛无尾猫、苏格兰垂耳猫、
东方短毛猫、莱克斯猫等(图6—17)。



图6 泰国猫



图7 欧洲短毛猫



图8 美国短毛猫




图9 日本猫




图10 阿比西尼亚猫




图11 巴米子猫



图12 哈瓦那棕猫




图13 埃及猫



图14 曼岛无尾猫

知识
7
PDG




图15 苏格兰垂耳猫



图16 东方短毛猫




图17 莱克斯猫

近五十年来，由于猫的用途越来越广，许多国家的科学家在猫的育种方面做了不少的工作，增加了猫的新品种。

在此值得提出的，某些猫的疾病可以传染给人，称为人畜共患疾病，其中包括病毒性疾病、细菌性疾病、真菌性疾病及寄生虫病等（见附录二）。为了保护养猫者不受侵害，

除了本人应具备一些养猫知识之外，还要通过各种途径采取各种相应的有效措施，按时做好猫病的防疫、驱虫等一系列防治工作。发现猫有异常情况，应及时请兽医诊治。



二、猫的解剖和生理特点

(一) 猫的解剖特点

猫有良好的骨骼运动系统，因此猫的运动轻松自如，灵活多变。它的后肢跳跃能力可达两米以上，它的前肢可以扫向任何方向，头可向左右敏捷地旋转180度。脊柱同老虎的一样，比任何家畜都灵活。猫的尾巴能象蛇一样的运动。

猫全身的肌肉数目同人类差不多，有500多块，但多数肌肉与人类相比显得更有力量，其中特别是后肢和颈部的肌肉，因此猫能够有力地、迅速地、闪电式地扑向猎物(图18)。




图18 猫的肌肉

猫的骨骼与人相似。全身骨骼(包括子骨和人字骨)共有230—247块，随着年龄的增长某些骨块会融合到一起。其中头骨、脊椎骨51节(颈椎7、胸椎13、腰椎7、骶椎3、尾椎21)、肋骨13对(真肋9对、假肋4对)、胸骨和四肢骨，另外公猫还有一块内脏骨(阴茎骨)(图19)。成年猫共有




图19 猫的骨骼

1.上颌骨；2.额骨；3.寰椎；4.颈椎；5.胸椎；6.腰椎；7.骶椎；8.尾椎；9.髌骨；10.股骨；11.腓骨；12.趾骨；13.跖骨；14.跗骨；15.胫骨；16.膝盖骨；17.浮肋；18.真肋；19.假肋；20.剑突；21.胸骨；22.桡骨；23.尺骨；24.掌骨；25.指骨；26.腕骨；27.肱骨；28.胸骨柄；29.肩胛骨；30.枢椎；31.舌形骨；32.下颌骨

牙齿30个，上颌16个，下颌14个，齿式为 $\frac{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1}{3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} \cdot$

猫的胸腔较小，因此它的心脏、肺脏也较小，由于这个缘故，猫不及犬能耐疲劳。每当剧烈运动之后，需要一段较长时间让它恢复体力。

猫的腹腔相当宽敞，它和大多数肉食兽一样，具有一次可以吞食大量食物的原始本性。

(二) 猫的生理特点

猫具有发育完好的大脑和强健灵活的肌肉，这使猫能以迅雷不及掩耳之快扑捉猎物，从而保证了它的繁衍和生存。

猫靠脚行走，每只脚下有一大的肉垫，每一脚趾下又有一个小的趾垫，前脚有五趾，后脚有四趾。脚底和趾下的柔软肉垫起着绝好的缓冲作用，使猫悄悄蹑足前进袭击猎物。趾端

毛中稳藏着一个角质的利爪，爪呈三角沟形，只在扑捉猎物时才伸露出来，这样可以牢牢地抓着猎物

(图20)。猫使用前爪的方式，与人们用手相似——拿举食物、试验温度、拍打物体等。猫的后肢特别强健，当它跳跃或奔跑时，后肢显示了惊人的力量。猫的利爪用途很大，与其他动物或同类搏斗时，常用伸出的利爪作为“武器”，遇到无力反击的强敌时，可用利爪攀登树木、木柱或其他物体，迅速逃遁。



图20 猫爪

出生后3—4月龄的幼猫，利爪还不能缩回或不能完全缩回，暹罗猫的小猫更是这样。室内饲养的猫，主人要定期给它修剪爪尖，否则会把家中的人抓伤，或将床单、被褥及沙发等抓破。

猫的尾巴也象其他动物一样，起着平衡体态的作用。除此之外。猫的情绪可从猫尾的动作暗示出来。尾尖抽动，表示遇到新的情况或是兴奋；整个尾巴猛烈地抽打，常意味着生气，温和地搏动尾巴，常是高兴的象征；尾巴猛然呈现痉挛性

活动，多半表示愤怒或受惊。

猫的触须（俗称猫胡子）富有感觉性能，在黑暗中它可以弥补猫视力的不足，几乎起到替代眼睛的作用。夜里某个物体与猫还有一定距离，它就能感知物体的存在。许多人认为猫须是通过空气中轻微压力的变化来识别或感知物体的。猫的眉毛也有类似作用。猫前肢腕关节的背面都有一簇具有触觉作用的触毛。事实上猫全身的触觉都很敏感，其中特别是耳后部和脊背两侧的柔毛。

猫的背毛因季节而异，冬季被毛稠密光泽，这与猫的皮下腺分泌有关。猫的皮下腺不是汗腺，猫仅有的汗腺在趾垫之间。

健猫很爱清洁，因此它的体表各部没有难闻的气味，去势后的猫更是这样。猫经常用自己的粗糙舌面舔试被毛，从而被毛光泽漂亮，招人喜爱。舌面上的乳突非常有力，颇似锉齿，可把骨头的表面锉平。但是这些向后倾斜的乳突对猫也有不力之处，即凡是进入口腔的东西（包括食物）只可咽下不能返逆，由此常会错咽某些尖锐物体，造成胃肠内部的创伤，例如钢针、发卡、鸡骨、鱼刺等。猫饮水或其他饮料时，舌弯曲为汤匙状将水啖入口内。

（三）猫的感觉器官

1. 耳

猫的听觉非常灵敏，它的听力超过人们的两倍以上。猫的两只耳朵动作灵活，好象雷达一样，时时全神贯注地搜寻周围的声音。猫耳的功能是惊人的，它能区别距离15—21米的相似声音。

猫的内耳结构与人相似，但是它的平衡机能比人强的

多，猫不管是坐汽车、火车或乘飞机、轮船，很少见到由于晕车、晕船而发生恶心呕吐的。蓝眼睛的白猫，生下来几乎都是聋子，但是它们的平衡机能极少受到影响。

2. 眼

猫具有一双视力敏锐的大眼睛，它的视力比人强的多。猫视物时瞬间就可对好焦点，调整瞳孔，同时可以判断出物距。猫也是通过瞳孔的变化来调节射入眼睛的光量，不同于人的是它们的瞳孔扩大与缩小的调节速度是非常快的。猫的视觉变化范围相当大，这可能是生物进化的结果。猫多半是在夜间扑捉猎物，所以人们把猫说成是“黑夜的主人”。在解剖上，猫眼球的上半球内具有一个反射细胞三角层，用来反射光线，使光线通过眼球达到视网膜的细胞上，因此猫有了一双“夜眼”。当然，猫在躲避危险或探寻猎物方面，它的视觉远不如嗅觉。

猫的两只眼睛完全长在头的前方，这样两只眼睛既有共同的视野也有每只眼睛的单独视野。每只眼睛的视野或视角都有200度以上，所以猫的视野要比人大得多。

猫虽然没有色盲，但是猫分辨不同颜色的能力是不及人类的。如果把猫头抬高并稍歪向一侧，随后用手掰开上侧眼的内眼角，可以看到猫的第三眼睑（也叫瞬膜）。在许多情况下，第三眼睑起到了保护眼睛的作用。例如猫与敌方搏斗、觅食穿过杂草丛或遇到强烈的光线，第三眼睑的保护作用非常明显。猫的第三眼睑在临床诊断方面也有一定意义，当猫严重感染内、外寄生虫病时，第三眼睑颜色苍白，而且明显外露。当猫扑食大量蝗虫后，也会见到同样的综合症。有些品种的猫，即使处于健康状态，它的第三眼睑总是明显

可见的。

3. 鼻

猫的嗅觉非常灵敏，这对猫来说是非常重要的。猫嗅觉灵敏的原始机能不是用来追猎，这一点同犬是不一样的。但是猫的嗅觉在猫的生命中，仍然起着重要作用，如猫凭嗅觉可以判断食物的存放方位。我们会经常见到猫得到食物后，先要进行一番嗅闻，区别食物的性质，然后才开始采食。猫的这种嗅觉灵敏的天性，从刚出生的仔猫也会得到证明，它们刚刚生下之后，眼睛还没有睁开，这时完全依靠嗅觉很自然地找到母猫的乳头。

未去势的成年公猫或在发情季节的成年母猫，从它们的身体上常散发出一种特殊的气味，不论去势的猫还是未去势的猫对这些气味最感兴趣，彼此喜欢相互“研究”。去势后的公猫或母猫缺乏性别的气味，这或许就是去势猫常常受到同类攻击的原因。除此之外，猫对某些带有香味的花草或化妆品的香水也有兴趣。

4. 口腔

猫的舌面有分辨味道的味蕾，软腭及口腔壁上也有味觉小体，但是猫的味觉总的来说是不够完善的。虽然如此，猫还是能够选择适合自己口味的食物。

三、猫的自然习性

猫天性聪明，认家的本能特别突出。有人报道主人将猫丢失在离家大约70公里的地方，16小时后猫又重新回到家。美国曾有这样一个真实故事，一个猫经陆地旅行3200公里，竟然找到了它从未见过的主人新居，这次它的旅行长达五个月之久，实在令人惊奇！

猫的情绪的好坏，养猫主人只要稍加注意就会得出判断。它高兴时就与主人或小物体嬉闹，它不高兴时便昂头挺颈，粗毛直立，胡须颤动，并发出“夫夫”的叫声。

猫一般喜欢温暖，去势后的猫在这方面更是明显，寒冷季节应注意猫的保暖问题。

许多迹象表明猫对某些危难的发生富有预感性，如地震、火灾及其他自然灾害等。有人推测猫可能具有人类所没有的第六感觉器官。

猫是动物中最聪明的一种，它的警惕性很高，平时对轻微的声音或潜在的危險都保持着警惕性。它总是想方设法把自己置于有利的位置，一旦掌握了主动权，它便以迅雷不及掩耳之势闪电般的猛扑过去，伸出利爪，向猎物或“敌人”进攻。

猫也是一种最有耐心的动物，为了扑捉猎物（主要是鼠类或鸟类），它经常蹲伏暗处，半眯着眼一动不动地静等猎物的到来。

猫有时将肚皮紧贴着地面疾驰，活象猎人追猎模样，很是有趣。

猫的占有性很强，护食。它常在自己活动区域的周围用尿作暗号，凡是误入或有意侵入这一范围的同类，将会受到回击。

猫生气或受惊时，具有一种行为模式，即粗毛逆立，张牙舞爪，竖起它那粗大的尾巴左右摆动。

猫与犬是不太友好的，一旦相遇，特别是陌生的犬，它便把腰弓起盯着对方，并发出嘶嘶或呼噜呼噜的叫声。当犬逼近它时，附近如有树木或木桩等物，它立即攀登，走为上

策。否则，它便伸出趾端的利爪，闪电般的向犬扑去，它的胆量真是令人吃惊。有人曾经亲眼见到这样一个场面。三条狗围着一只猫吠叫，双方相持不下，最后还是狗不得不灰溜溜地悄然离去。

猫做错了事，如将床单、被褥、沙发等抓破，或将室内的花木咬烂，主人训斥它时，很象小孩子受到责备那样，低头垂尾或躲藏暗处。在暗处它还不时的用眼盯着主人，既好气又好玩。

猫酷爱清洁前文已经提及，或许就凭这一点，猫便成为人们的理想伴侣动物。猫不愿吃残羹剩饭，甚至完全拒食。因此要求饲养者随时将残食弃掉，并将食盆洗刷干净。



四、猫的选择和扑捉

(一) 猫的选择

总的来说，猫比其他任何伴侣动物都好管理。短毛猫被毛洁净、体格健壮、性情活泼、独立性强，只要对它适当饲养管理，就会很容易的把它养好，除了平时注意它的习惯和性格之外，按时喂食、洗澡、梳理被毛、定期防疫注射也是不容忽视的。

猫的主人假如住在农村，农村养猫大多都是为了扑鼠保粮，应该选择善于扑鼠的猫种，如四川简州猫。城市居民养猫，除了让它扑鼠之外，多半作为伴侣动物，其中特别是离休、退休的老年人更是为了这个目的，有的老者甚至爱猫成癖，终日与猫相依为命。身边有只温顺的猫其乐无穷。双职工家里养猫，最好养上两只，上班时间家中无人，两只猫儿相互嬉戏玩耍，以免寂寞无聊。

如果你是一位容易激动的人，那你最好选择一只性情温顺的银白色母猫。

如果你的住处时常更换，那么你最好选择一只暹罗猫，这种猫的特点是容易适应新的环境，特别是外界环境的变化。

如果不想让你的伴侣猫咪繁殖后代，等它长到6个月龄应该及时请兽医作去势术。不然的话，一旦雄猫长到性成熟期，它会放出一种令人难闻的气味，这时纵然再作去势术，那股遗留在你的住所及其周围的特殊气味，长期不得消除。母猫也是这样，应在6个月龄前给它去势。否则，到了性成熟期它会同公猫接触，妊娠产仔。去势后的猫要适当减少每天的饲喂食量，以免发生肥胖症。

（二）猫的扑捉

扑捉猫时，最常使用的办法是一只手抓着猫的颈背部皮肤，另一只手托起猫的腰荐部或臀部，使猫的大部分体重落在托臀部的手上，这样做既安全又方便。

（图21）

扑捉新来的猫或野性大的猫，最好是两个人互相配合，即一个人首先抓住猫的颈背部皮肤，另一个人用双手分别控制住猫的前肢和后肢，以免把人抓伤。



图21 捉猫方法

当然，与主人已成伴侣的猫，把它抱在怀里就行了，似乎不存在扑捉问题。


五、猫的饲养管理

（一）猫舍和猫的室内训练

1. 猫舍

猫，不论养在室内还是室外，猫舍的基本要求应做到温暖、舒适、清洁和便于猫的自由出入。猫舍内的设施和用具如下：

(1) 猫窝：过去大多采用木制的小箱作为猫窝，箱内铺上废报纸或柔软的垫草，现今有人改用四周有边的塑料盘子，塑料制品便于彻底清洗消毒。不管是小木箱或是塑料盘，其中的铺垫物应经常更换，并将被弄脏的铺垫物烧掉。稍加训练，新来的猫就会很快的适应它的新窝。



(2) 食盆和饮水盆：食盆和饮水盆质地要结实，盆底要重，盆的边缘要厚（图22）。否则，当猫站在图22 猫的食盆或饮水盆盆缘上吃食或饮水时会把食盆或饮水盆蹬翻，弄脏地面，所以说用普通的盘子作为食盆或饮水盆是不合适的。有些猫吃食时，有把食物弄到食盆外面的不良习惯，因此食盆下最好垫上废报纸，保持地面的清洁。

(3) 便盆：用小塑料盆作便盆既方便又好清洗，盆内铺上炉灰、锯末或锯末与沙土的混合物，这些松散物便于猫便溺后用它的爪子掩埋。铺垫物最好每天更换一次，清洗便盆时避免使用刺激性强或带有特殊气味的洗涤剂，否则，下次猫就不喜欢使用它来便溺。此外，有些肥皂和消毒剂对猫是有害的。

(4) 旅行箱：带猫外出或去兽医院给猫看病，事先准备一只特制的旅行箱是很有必要的，国外有专门为猫制造的旅行箱，目前国内尚无此等产品。可以参照本书的图样自己制作。旅行箱的常用尺寸为：长415毫米、宽305毫米、高305毫米（图23）。临时急用可以找个大小合适的纸箱，但要打上几个小的换气孔。用篮子之类的工具装猫是不好的，这样猫在路上常会跑掉。用手提包带猫，猫不舒服，最好不用。




图23 旅行箱

2. 猫的室内训练

新进家门的小猫，首先不要惊吓它，更不要让小孩随意玩耍它，定时定量的给它一些喜欢吃的美味食物，轻轻地抚摸它的被毛，逐渐的和它建立感情。开始训练的第一件事是让它到指定的地点去大小便，猫是最喜干净的，它所使用的便盆只要经常保持清洁卫生，它会很容易的养成这种良好习惯。

(图24) 假如给它准备的便盆未能经常清洗，便溺过的铺垫



图24 训练猫定处大小便

物也不及时更换，甚至放置便盆的地面污秽，气味难闻，这时它会自寻干洁的地方便溺，日子久了，会养成随地大小便的恶习。遇到这种情况，解决的办法是用肥皂水和硬毛刷彻底清洗便盆及地面，去掉原来的臭味，然后反复地、耐心地引导小猫到指定的便盆处便溺。头几次引导不成功也不要粗暴地责打它。据报道有的猫主人能把猫训练成自己去卫生间大小便的习惯，请你不妨耐心地试一下。小猫适应新环境后的第一个征象，就是它开始舔刷自己的被毛。

（二）猫的营养需要和饲喂

养好猫的关键是必须满足它的营养需要，这是众所周知的。猫是肉食性动物，以吃肉为主。它的祖先——野猫生活在大自然中，靠猎物的生肉、骨骼以及野菜、青草等为生（图25）。野猫的营养需要原则，可为饲养家猫提供参考。

野猫的营养需要原则，可为饲养家猫提供参考。

营养良好的猫，对一些病毒性疾病、细菌性疾病、寄生虫性疾病的抵抗力强，容易产生抗体获得免疫力。

反之，营养不良的猫在各个生长或繁殖阶段都会表现不良的



图25 猫吃青草

后果。例如母猫在妊娠前及妊娠期的营养状况会直接影响胎儿的发育、体质及产后的成活率。刚出生的仔猫一般体重不应低于100克，否则就表明母猫营养不良。哺乳期母猫营养物质供应水平对仔猫的生长发育影响更大。4周龄的幼猫除哺乳外，还应适当补给固体食物，7周龄断奶后的小猫生长加快，这时应该特别注意饲喂食物的质量。幼猫生长到10—12周龄，这是个关键时刻，因为这时来自母体的后天获得性抗体几已殆尽，一旦营养措施有失，幼猫容易感染疾病，特别是消化系统和呼吸系统疾病。

一只营养良好的发育正常的公猫，36周龄左右已达性成熟期，否则，性成熟期将会向后推延。一般母猫性成熟约为42周龄，但严重营养不良时，到时不发情，轻度营养缺乏时，虽能发情受精，到了妊娠后期将会流产，流产的胎儿常被母猫吃掉。有的纵然勉强达到产仔期，生下来的仔猫个小、体弱、数少，成活率低。有的则屡配不妊。

猫所需要的营养物质如下：

1. 水

猫是一种比较能够耐渴的哺乳动物，平时的饮水量也不太多。有人把猫关在笼子里3—6周，不给任何饮食，体重虽然逐日下降，但能照样活着。猫的耐渴力是多么惊人！

猫的饮水量与食物中的含水量密切相关。按一般规律来说，猫的年龄越大，每公斤体重需要的水分越少。平时给猫准备一些清洁饮水是有益的，特别是哺乳期的母猫。

猫的肾脏近曲小管对水分的重吸收作用比较强，这许是它能耐渴的一种原因。

猫生了某些疾病有时不愿饮水或想饮水而不能饮

水，这就需要通过口腔或静脉输液供给水分，幼猫每天应给60—80毫升/公斤体重，成年猫应给40—60毫升水分。

猫，特别是老年猫如果异乎寻常的贪饮，可能肾脏或内分泌有问题，如慢性肾炎、尿崩病、糖尿病等。

2. 能量

猫所需要的能量主要来源于食物中的蛋白质、脂肪和碳水化合物。不同年龄和不同生理情况下的猫，对能量的需要量也有所不同，这可根据猫的年龄和体重计算出来。详见表1和表2。

表1 猫每天需要的能量和食物量

年龄	体重(千克)	每天需要能量 (千卡/千克)	每天需要食物(克)
刚出生	0.12	380	30
5周	0.5	250	85
10周	1.0	200	140
20周	2.0	130	175
30周	3.0	100	200
成年(公)	4.5	80	240
妊娠	3.5	100	240
泌乳	2.5	250	415
去势(公)	4.0	80	200
去势(母)	2.5	80	140

表2 猫的理想营养成分

年龄	水 (%)	蛋白质 (%)	脂肪 (%)	糖类 (%)	灰分 (%)	钙 (%)	热能 (千卡/100克)
刚出生	72	9.5	6.8	10	0.75	0.035	142
仔猫和成年猫	70	14	10	5	1.0	0.6	150

表1中猫的每天食物需要量是根据能量需要计算出来的。但实际上猫吃进的量往往比它需要的量要多,因此有些家养猫身体超重。哺乳四个以上仔猫的母猫应适当增加食物量,否则母猫将不能维持它所应有的体重,甚至变得毛焦体瘦。

3. 蛋白质

猫需要高能量和高蛋白的食物,如果给猫含有高蛋白质和脂肪的食饵,如肌肉、肝脏、肾脏或其他动物脏器组织,它就会健壮的成长起来,其中新鲜的食物,更可增进猫的胃口。假如长期给以单调的食品,会使猫的食欲逐渐减退,甚至厌食,最后导致贫血、消瘦。只要条件许可,应该经常调换富有蛋白质的食物。

为猫提供优质蛋白质的食物,最理想的是各种瘦肉、生肉、半熟肉、熟肉等。当然,鱼肉、牛奶、鸡蛋也是补充高蛋白质的佳品,据说沙丁鱼还有轻泻通便作用。

肝脏富有营养,含有大量的维生素A,但猫吃其他动物的肝脏,每周次数不可过多,每次给量不可太大,否则,对猫也有不利之处。猫吃生肝有轻泻作用,猫吃熟肝有时便秘。

猫吃了其他动物的脾脏,也会使它大便变软,有轻泻通便作用,因此,给猫吃脾脏每周不要超过两次。

动物的肺脏营养丰富，常把肺脏切成小块喂猫。

饲喂成年猫的干物质里，蛋白质的成分不应低于21%，幼猫不应低于33%。日常猫食中含有70%左右的水分，这时，成年猫的蛋白质不应低于6%，幼猫的蛋白质不应低于10%。另有一种简易计算法，即成年猫每公斤体重每日应供给3克蛋白质。

猫奶的平均成分为蛋白质9.5%、脂肪4.8%、乳糖4.9%、灰分0.8%、水分80%。实际上奶里的蛋白质占干物质的50%左右。牛奶中的蛋白质含量不及猫奶的高，假如用牛奶喂养幼猫，还须额外增补蛋白质，使其蛋白质的含量近似猫奶的含量，否则，时间长了会导致幼猫蛋白质和能量的缺乏，临床表现为瘦弱、厌食，甚至最后衰竭死亡。

给猫提供的蛋白质，除了注意蛋白质的量外，更应该考虑蛋白质的品质，如结组织缔也含有蛋白质，但这种蛋白质却很少能被猫消化利用。

用牛奶代替猫奶，其中还需加入适量的维生素A、D或鱼肝油。

4. 脂肪

猫能吃含有大量脂肪的食物。有时猫食中的脂肪占其中干物质的64%，也不会引起任何血管的异常。我们都知道食物内的脂肪是一种高热能的主要来源，每克脂肪可以产生9大卡热，脂肪的产热量比碳水化合物、蛋白质高2.25倍，同时脂肪对脂溶性维生素的吸收利用起主要作用。一般脂肪占食物干物质的15—40%较为合适。长期给猫吃红金枪鱼，能导致脂肪在肩胛周围和腹腔内沉积变黄，这种变化医学上称为脂肪组织炎或黄色脂肪病，最好的预防办法是增加食物里维生素E的含量。对于猫的必需脂肪酸目前了解的还不太多。

一般地说1%的亚油酸或花生四烯酸完全可以防止必需脂肪酸的缺乏,

5. 碳水化合物

含碳水化合物较多的食物不是猫所必需的,但是猫可以消化煮熟的淀粉。如馒头、大米饭、熟土豆都可以喂猫。猫对于蔗糖、乳糖不太适应,有的猫吃了牛奶后发生胀肚或腹泻,这与牛奶中的乳糖有关,有的猫对牛奶过敏,也会引起稀。防止的办法是停喂牛奶或牛奶制品。对于能吃牛奶而无副作用的猫,喝奶之后一定要给清水让它自饮。喂给碳水化合物食物的同时,食内加点毛鱼、猪肝等物,可以增加食物的美味与适口性。

6. 维生素

维生素是各种动物的必需营养物质,这是人所共知的,但值得注意的是猫所需要的维生素既不同于草食兽,也不同于其他肉食兽。猫对各种维生素的需要量见表3。

表3 猫的各种维生素的需要量

维生素	单位	日需要量	说 明
维生素A	微克或国际单位	500—700或1500—2100	自体不能将胡萝卜素转化为维生素A
维生素D	国际单位	50~100	自体的皮肤内可以合成
必需的脂肪酸	——	占总脂肪酸的1%	猫能耐受大量的饱和脂肪酸的食入
维生素K	——	很少	自体肠道内可以合成
维生素E	毫克	0.4~4.0	有调节多不饱和脂肪酸成分的作用
维生素B ₁	毫克	0.2~1.0	泌乳、高烧时需要量增多
维生素B ₂	毫克	0.15~0.2	泌乳、高脂肪食物、高烧时需要量增多

接 (表3)

烟酸 (V.B ₅)	毫克	2.60~4.0	泌乳、高烧时需要量增多, 自体不能合成
维生素B ₆	毫克	0.20~0.3	泌乳、高烧时需要量增多
泛酸 (V.B ₃)	毫克	0.25~1.0	
生物素	毫克	0.1	
胆碱	毫克	100	
肌醇	毫克	10.0	食物中必须供应
维生素B ₁₂	微克	3.0	钴不缺乏时, 自体肠道内可以合成
叶酸	毫克	0.1	食物中必须供应
维生素C		少量	能在代谢中合成

(1)维生素A: β -胡萝卜素在猫的体内不能转化为维生素A, 所以猫的维生素A只能由食物中供给, 这一点和人是不同的。各种动物的肝脏含有大量的维生素A, 除肝脏之外, 其他食物中维生素A含量较少, 因此, 一旦对猫饲养不善, 容易导致维生素A缺乏症。病的早期主人很难发觉, 兽医院单靠临床检查也不易确诊。所以平日的合理饲养是重要的。有人将动物的肝脏煮熟, 剁成肝末晾干储存, 每次在猫食里拌入少量, 既增加了营养, 又调理了猫食的适口性, 经济实惠, 一举两得。

刚出生的仔猫, 每克湿肝内含维生素A18国际单位, 如果每天在食物中加入维生素A1900国际单位, 9周后肝脏含106国际单位, 4个半月后为540国际单位, 一年后为2400国际单位。

母猫在正常的妊娠期和产后的哺乳期，体内的维生素A消耗较大，肝脏维生素A的含量有时可比原来的含量减少50%左右。

成年猫或正在生长的猫，每天应供给维生素A1500—2100国际单位，当然，妊娠期和哺乳期的猫供给量更要多些。

健康猫血液中维生素A的正常含量为210国际单位/100毫升。血液中的含量基本上是稳定的。假如维生素A供应不足，这时在猫的体内首先动员肝、肾中储存的维生素A，直到消耗殆尽时，血液中的含量水平方会下降。血液中维生素A降到90国际单位/100毫升时，是个警戒线，表明猫的食物内严重的缺乏维生素A。

为了促进维生素A的消化吸收，猫食内要加入适量含脂肪的食物。给猫一次肌肉注射维生素A210000国际单位，可以供应4—6月的需要数量。

猫的肾脏脂肪里维生素A储量仅次于肝脏，每克肾脏含有维生素A为120—150国际单位，但尿中从来不见维生素A的排出。

猫呼吸道感染疾病，可使肝脏内储存的维生素A大量消耗而减少，为了促进疾病的早日痊愈，除主治药物之外，应适量肌肉注射维生素A。

猫的慢性维生素A缺乏症，一般表现为厌食、消瘦、毛焦、怕光羞明，易患角膜炎、结膜炎。生殖力下降，公猫睾丸萎缩，精液中精子少或无精子。母猫，重者不发情，轻者妊娠期中流产，即使生下仔猫，猫崽弱小，成活力低，有的发生畸形，容易感受呼吸道疾病，母猫产后常见胎衣不下。补充维生素A的办法是：每周在猫食内加添维生素A 1—2

次，每次4500—6300国际单位。

补给维生素A不是越多越好，大幅度超量供给，可导致维生素A中毒，中毒后的具体症状为四肢骨和颈骨发生外生骨疣，长骨比正常的短，骨质疏松。

(2)维生素B₁：维生素B₁是水溶性维生素，酵母、瘦猪肉、粗糙大米、粗的面粉中含量较多。幼猫和成年猫每天维生素B₁的正常需要量为0.4毫克。猫在妊娠后期、哺乳期或因病高烧时，对维生素B₁的需要量增大。

猫的维生素B₁缺乏症，见于平时猫食品种类过于单调。

猫维生素B₁缺乏症的早期表现为：食欲不振、呕吐、体重减轻、脱水。严重缺乏的临床症状为：多发性神经炎，心脏机能障碍，惊厥（由于脊髓出血），月经失调，麻痹、虚脱等，其中典型的症状是多发性神经炎。

维生素B₁缺乏症的唯一治疗措施是及时注射该种药物，一般在注射后12小时左右症状大多消失，严重的晚期病例，疗效较差。当然，根本的办法还是改善猫食的全价营养。

(3)维生素B₂（核黄素）：维生素B₂是各种动物细胞氧化过程所必需的物质。它存在于青绿植物、动物蛋白中。猫吃青绿蔬菜是很少的，对猫来说，各种瘦肉、奶类是维生素B₂极好的来源。

猫维生素B₂缺乏的主要表现为生长缓慢、消瘦、毛焦、脱毛。6—9个月后，有的发生眼睛白内障、小红细胞增多症。严重的可导致死亡。

猫每天需要维生素B₂0.15—0.2毫克。母猫在哺乳期需要量增多。

猫的维生素B₂缺乏症，只要认清了症状及时注射维生素

B₂，症状会得到消除，疗效可靠。

(4) 维生素B₆：维生素B₆参与氨基酸的代谢。青绿植物、瘦肉和肝脏中含量较多。猫缺乏维生素B₆的主要症状为：食欲下降、生长迟慢、消瘦、兴奋、惊厥。血液检验可见小红细胞低血红蛋白性贫血。有的尿中的草酸钙结晶在尿道内沉积，阻塞尿路，导致排尿困难，其中特别是公猫较为多发。

一只成年猫，每天需要维生素B₆0.2—0.3毫克。

(5) 烟酸：烟酸对营养代谢有着重要的生理作用。它广泛存在植物、瘦肉和肝脏中。猫自身不能合成烟酸，必需从食物中获得。一只成年猫每天需要烟酸2.6—4.0毫克。只要平日猫食不过于单调，不会发生烟酸缺乏症。缺乏时的主要表现为：生长迟缓，口腔溃疡，流涎，呼出气有臭味，腹泻，消瘦，皮肤粗糙。幼猫可在生后3周左右死亡。

猫在生长发育期、妊娠期、哺乳期，喂饲生肉、生奶比熟肉、熟奶好，它可得到更多的烟酸。

(6) 泛酸：泛酸是猫必需的营养物质，它广泛存在于动植物，每只成年猫日需要量为0.25—1.0毫克。家养猫很少见到缺乏症。据研究报道缺乏时的主要表现是消瘦。

(7) 叶酸：叶酸存在于肝脏和绿色蔬菜中。因其来源丰富，家养猫一般不会发生缺乏症。一只成年猫日需要量为1.0毫克。有人研究，幼猫断奶之后，人工饲喂不含叶酸的食物，经过9周即见生长停滞，血清及红细胞内的叶酸含量下降，并出现巨红细胞性贫血。据实验报道，母猫在产前3周，补给叶酸，叶酸可以通过胎盘输送给胎儿。

(8) 维生素C：猫本身能够合成维生素C，平时不需要由食物中提供。只有当猫患病期间，血液中的维生素C有所下

降，可适量经口补给。

(9) 维生素D：维生素D对幼猫十分重要。一只猫的日需要量为80国际单位。维生素D不足可以发生佝偻病，另外，佝偻病与钙的供给量也有关系。维生素D给的过量也不好，这一点猫主人多不太注意，过了量可以导致慢性中毒，中毒后表现骨骼中钙的沉积不均，肺、肾、心和血管里会出现钙化灶，危害较大。

(10) 维生素E：维生素E广泛分布于动植物组织中，它具有抗氧化作用，可保护维生素A和不饱和脂肪酸不受氧化。除了抗不育的活性外，对维持肌肉及外周血管的结构与功能也有重要作用。一只成年猫日需要量为0.4—4.0毫克。猫缺乏维生素E，突出的症状是厌食，不爱活动。由于肌肉萎缩及营养性退化，患猫常蹲坐。死后剖检，可见体内脂肪变黄，称作黄脂症。长期喂饲金枪鱼可诱发本病。

除了上述诸多维生素之外，如维生素B₁₂、生物素、肌醇及胆碱等，也是猫所需要的，但在这些方面目前研究的很少。

室内饲养的猫，食物可以加入一些切碎的蔬菜。也可在室内种植一盆青草供猫随意采食。猫很爱吃水竹(台湾竹)，水竹生长繁茂，容易培养，不妨养几盆。猫吃青绿植物后又复吐出可视作正常现象。

7. 矿物质

猫必需的矿物质有：钙、磷、钠、氯、钾、镁、铁、铜、碘、锰、锌和钴等。为了叙述方便，把矿物质分为三类，即电解质、机体结构成分元素和微量元素。猫对各种矿物质的日需要量见表4。

表4 猫每天需要的各种矿物质质量

名 称	单 位	数 量	说 明
钠	毫克	20~30	最小需要量
氯化钠	毫克	1000~1500	常盐需要量
钾	毫克	80~200	肉和鱼含有一定数量
钙	毫克	200~400	幼猫生长期和母猫哺乳期为400
磷	毫克	150~400	钙、磷之比应为0.9~1.0
镁	毫克	80~110	食物中大量存在
铁	毫克	5	从肉食中的血红蛋白可以得到一定数量
碘	微克	100~400	肉中缺乏
锰	微克	200	} 要适当补充, 防止缺乏
锌	微克	250~300	
钴	微克	100~200	

(1)电解质: 动物机体主要的阳离子是钠(主要在体液里)、钾(主要在细胞里), 还有与细胞结构和机能有关的钙、镁。与此相对的阴离子是氯、碳酸盐、重碳酸盐、磷和有机阴离子。各种离子、细胞膜的电动势及血液、体液的渗透压等在正常情况下基本上都是恒定的, 这对动物机体内环境的稳定是十分重要的, 肾脏是个具有调节钠、钾、氯、碳酸盐和磷的器官, 可以随时把进入体内的多余离子, 由尿液排

出体外。小肠对钙、镁的吸收数量，也是根据体内的需要，加上甲状旁腺激素的作用予以调节。

健康猫饲喂日常各种食物，电解质不会缺乏。只有在猫生病发生厌食、呕吐、腹泻和肠道阻塞等时，电解质的平衡受到破坏而导致紊乱。这时可根据血液化学检验结果，口服或静注某些含电解质的溶液，如生理盐水、复方氯化钠溶液、复方氯化钾溶液等。为了让猫多喝水，可在猫食里加入1—2%氯化钠溶液，量不能太多，否则，猫将拒食。摄入体内多余的镁常以磷酸铵镁结晶的形式由尿液排出体外，但尿中过量的磷酸铵镁结晶沉积，可导致尿道阻塞，造成膀胱积尿，其中公猫比母猫多发。所以不宜用过多的鱼骨喂猫。

(2) 机体结构成分元素：

钙和磷是形成骨骼的主要元素。此外还有镁、氟、锶和钴。钙、磷有时需要另外补给，而其余几种元素，平日食物中的含量完全够用。

生长期的幼猫，钙、磷最合适的比例为1：0.9—1.1。假如钙、磷比例为3：1，将会引起佝偻病，反之，钙、磷比例为0.5：1，将会导致骨质疏松症。由此可见钙、磷比例对骨质的正常形成是何等重要。

除了考虑钙、磷比例，还要注意供给钙盐的用量，一只成年猫每天不应少于200毫克，哺乳期的母猫每天不应少于400毫克。哺乳期的母猫如果钙盐供应不足，将会影响幼猫骨骼的正常发育。

生肉或熟肉含钙质很少，同时其中钙、磷比例为0.05，所以用不带骨的肉喂猫需额外补钙，平日最好喂带骨肉。

猫的正常血清钙为11毫克%。当血液中钙、磷含量降低

时,甲状旁腺激素立即起着调节作用,把骨骼中的钙、磷动员到血液中去。这个矛盾如果不能及时解决,慢慢地可以造成骨质病。成年猫的骨骼已经发育完好,对食物中的钙只能吸收利用30%。正在生长发育的幼猫、哺乳期的母猫和缺钙的猫,对食物中的钙可以吸收利用达80%以上。当食物中钙含量不足时,猫对钙的吸收利用、贮存的能力常因猫种不同而有差异。此外,这与甲状腺和甲状旁腺的机能和遗传因素也有关系。维生素A、D和C以及适量的氨基酸都有利于钙、磷在骨骼中的沉积和骨骼的形成。

猫缺钙的常见原因是猫主人喜欢用不带骨骼的肉、鱼喂猫。起初猫的外观几乎不见异常,2—6周以后幼猫变得不爱活动,经常采取躺卧的体态,更不喜欢人们捉弄,给它玩耍物体,也不愿戏嬉。随后可见四肢跛行或轻瘫,严重者可以发生后肢瘫痪。X光照片检查,显示全身骨骼结构疏松,长骨骨髓腔扩大,骨骼的骨小梁稀疏、粗糙。肩胛骨弯曲外展,形成畸形的翼状肩胛。盆腔变形容容易引起经常性便秘,妊娠后有时难产。运动当中或稍稍受到外力作用常会发生骨折。

治疗猫的缺钙症可以口服碳酸钙,每天1—2克,或口服葡萄糖酸钙,每天3克。为了服药方便,可把药物调在猫食内,饲喂2—3周后就能收到疗效。有的猫种如暹罗猫,对钙的吸收利用能力较差,容易患钙缺乏症。

一般的家养猫,由于猫主人对它的爱护,猫食中高动物蛋白性食品较多,所以缺磷的问题极为少见,值得注意的是钙、磷比例失调。为了保持钙、磷比例0.9—1.1,每给100克肉,其中应加入碳酸钙0.5克。每100毫升牛奶中,应加入碳酸钙0.15克。

为了满足猫对钙、磷的需要，经常让它啃食些生骨头是个简单易行的好办法。

哺乳期的母猫，每天应补给碳酸钙至少0.4克。

(3)微量元素：猫的食物中含量在十万分之一以下的元素，称为微量元素。微量元素数量虽然很小，但它所具有的生理功能却很大，不容忽视，否则，容易导致微量元素缺乏症。

1)铁和铜：成年猫可以吸收利用肉中的铁、铜，一般不会缺乏。应该注意的是以牛奶为食物的正在生长发育的幼猫，如果铁、铜不予额外补充，容易发生贫血症。猫每天平均需要铁5毫克、铜0.2毫克。与此同时，也要防止过量补给，过了量可以引起中毒。

2)碘：碘是组成甲状腺素的必需成分。假如猫的食物中缺碘，30周后甲状腺机能下降，甲状腺体渐渐缩小。猫缺乏碘的主要表现是：生长缓慢，被毛稀疏，皮肤增厚变硬，头部水肿，头形变大，行动迟顿，表情呆板，性机能下降，不易受孕，有的难产，胎儿有腭裂。幼猫喂饲含碘低的肉类改喂含碘丰富的鱼类，时间长了可使甲状腺增大，甲状腺机能亢进，患猫容易兴奋，好动不好静，但在短时间活动之后，顿时又表现疲劳、气喘，体温略有升高（因代谢旺盛）。

正在生长发育的幼猫（体重1公斤左右）日需碘量为100—400微克，哺乳期的母猫需要量更要多些。

其他微量元素如锰、锌和钴等目前了解的还不多，但有一点可以肯定，这些元素猫是需要的。

8. 食物中的添加剂和污染

猫的食物常常有意或无意的受到污染，如猫饲喂含汞

的鱼（因鱼生长的水中有汞污染），或食物被杀虫药、杀真菌药、灭鼠药污染，就会造成猫的中毒。我国农家的猫吃了被灭鼠药毒死或将死的老鼠招致中毒死亡的屡见不鲜。猫对某些药物的敏感性比人和犬都高。肉中含有催肥的雌性激素，即使是小剂量也能使猫发生中毒。猫对食物中所含小剂量的抗生素如青霉素、金霉素等，虽然具有一定的耐受力，但是这类抗生素可以改变猫消化道内原有的相互制约的正常菌系，由于菌系的紊乱，使猫失去了原来对某些病原微生物、致病真菌的抵抗力，容易感染可以不感染的疾病。氯霉素对猫具有一定的毒性。

含氯碳氢化合物和含苯或甲苯基的物质，可使猫产生损伤。抗氧化剂2,9—二叔丁基对甲酚会引起猫肝脏的肿大。苯甲酸虽然对人的食物有防腐作用，但可导致猫的急性或蓄积性中毒，中毒后表现感觉过敏，攻击他物，惊厥，最后死亡。

9. 影响猫吃食的因素

猫喜欢在安静环境中吃食，一般一天吃1—2次。生长发育期的幼猫或哺乳期的母猫，一天需要吃食数次，以满足它们的营养需求。猫的食欲常受周围环境的影响，如光、声音、食具是否清洁、旁侧是否有人或其他动物。猫对食物的选择主要取决于食物的气味、浓度、味道。当然，猫的习惯也有关系。猫爱吃半湿的食物。猫对不喜欢吃的食物，纵然腹内饥饿也拒而不食。如果对往日爱吃的东西不感兴趣，稍啖而止，那可能是有病了，应及时请兽医诊治。

（三）猫的梳理、洗澡、换毛和随人旅行

（1）梳理

正如前文所述，健康猫是酷爱清洁的。猫的舌面粗糙，好似一把毛刷或梳子，经常地用它来梳理被毛。舔不到的部位如头部、肩部和颈背部等，是靠爪子来梳理的。

健康的短毛猫一般不需要人们为它梳理，除非猫的被毛受到了污染。为了防止自然脱落的猫毛到处散落，养在室内的猫，每天最好给它梳理一次，同时可以增加人与猫之间的感情。

对于长毛猫，猫主人每天至少要给它梳理一次，否则，被毛容易擀毡。擀毡之后，被毛杂乱无章，有损于猫的全貌。分开擀一起的毛是要花费很大力气的，有时甚至花上几个小时都难奏效。从小开始给它梳理被毛的幼猫，容易形成习惯，而且喜欢这种对它的爱护。

梳理的工具选用金属梳子或尼龙梳子都行，此等梳子坚固耐用容易清洗。兼有密齿和疏齿的更好。

给猫梳理被毛的同时，顺便检查一下猫的耳朵、脚趾和爪子，如果见到耳内有污垢、脚趾之间有毛毡或爪子过长等情况，应及时给以清拭、修检、锉平。

(2)洗澡

定期给猫洗澡，既可以洗掉皮毛上污物，又可以除去一些外寄生虫。从小猫开始就培养它洗澡的习惯，否则，猫到了成年再给它洗澡确是一件难事，最好两个人相互配合进行这项工作。

给猫洗澡应该注意：一是水温不能太低或太高，以不烫手为宜；二是所用的肥皂刺激性不能太大，以免刺激皮肤；三是洗澡之后要立即用干毛巾擦干被毛，不要感冒，气温偏低时，应该盖上专用的毛巾被或其他保暖用品。

(3)换毛：一般家养的成年猫，全年都在换毛，但以夏、秋两季比较明显。幼猫长到一年之后，不论什么季节都要换毛。换毛时期，加强被毛的梳理和落毛的处理，防止污染室内环境。

(4)随人旅行：猫不太适应乘坐车、船或飞机等交通工具，原则上应尽量避免带猫旅行。幼猫的适应更差。如果旅行时非要带猫，那么必须选择一个大小合适而且通风良好的厚纸纸箱，当然，用特制的旅行箱更为理想。箱内一定需要铺上废旧报纸，并在箱的一角放个浅而小的纸盒，撒上锯末或沙土，便于猫在旅途中便溺。容易兴奋或神经质的猫，最好给予适量的镇静药。

(四) 健康猫和病猫的一般鉴别

为了使您的猫保持健康，需要具备一些基本的健康猫和病猫的鉴别知识，经常观察它的日常生活习性，及早发觉异常情况，做到有病早治。最常见到的异常情况为：

1.食欲：猫对日常的食物或味道很好的食物不感兴趣，食量减少或完全拒食。

2.呕吐：猫是比较容易呕吐的动物。如果吃了青草、蝗虫之类的东西发生呕吐，这不要紧，不一定是病。假如发生持续性呕吐，应该予以重视。

3.腹泻：猫发生腹泻是有病的征象，尤其是接二连三的拉稀，应该采取措施，特别是没有注射过猫泛白细胞减少症（猫传染性肠炎、猫瘟热）疫苗的猫。尽快请兽医诊治。

4.喷嚏或流泪：喷嚏、流泪是感冒或流行性感冒的主要征象，如果及时就医，一般疗效良好。

5.饮水障碍：猫见到水盆或主动走向水盆很想喝水，但

欲饮不能，进入口腔的水又复滴出，这十之八九是咽部有病，如扁桃体炎、咽炎等。

6.摇头、抓耳：这是耳病的特有症状，耳内可能有寄生虫，请兽医详检。

7.流涎：口腔内有病，如口炎、舌炎、口粘膜溃疡及牙病等，流涎是特征性征象。同时可以闻到口臭。

8.频作排尿或排粪姿势：患猫频频到便盆处做出便溺的动作，异常的是却不见排出的大小便，或仅见痕迹性粪尿。频尿者可能膀胱或尿道有问题，频便者可能肠道有问题。请及时带猫去兽医院就诊。

9.抓挠皮肤：患猫神志不安，频频抓挠自身的皮肤、被毛。出现这种异常情况，可能猫体有跳蚤、虱子寄生，或感染疥癣、真菌性皮肤病，或者激素性湿疹，这要请兽医做进一步的鉴别诊断。与此同时，猫身上可能存在秃毛斑。

总之，猫出现上述种种情况或其他反常状态，经过若干时间仍不见好转的，应及时到兽医院就诊，不可犹豫延迟。

（五）猫的护理和包扎

猫得了病，习惯躲藏在幽静而暗淡的地方休息，它能忍受极大的困苦。但猫主人遇到这种情况，还是一心一意的对猫经心护理，希望病猫早日康复。

对于病猫，首先应该限制它的活动，选择一个安静舒适的地方，让它充分休息。不想吃食的也要供给清洁饮水或等渗的葡萄糖盐水。这样做有时会收到良好效果。每天给患猫梳理一次被毛，但每次时间不要过长。鼻孔或眼睑附有干痂及分泌物时，可用淡盐水（一汤匙食盐加水500毫升）浸湿棉球予以清拭，拭后片刻涂些护肤膏，减少分泌物对皮肤的

刺激，并可保持皮肤滋润。

病情严重的或不能站立的猫，经常帮它更换伏卧姿势，免生褥疮。被粪尿污染的臂部、后肢，随时用温水洗净并擦干。勤于撤换铺垫物。

猫的一般外伤，涂些抗生素或磺胺制剂就行了，不一定进行包孔。如果发生骨折，最好请兽医予以包扎或打石膏绷带。

(六) 猫的给药

最简单的给药方法是将药剂混在水里或牛奶里，让猫自己饮用。这适用于无臭、无味、无色而且剂量不大的药物。

假如猫病较重不能自饮或加入药物后拒绝饮用，这时可将药剂溶于少量水中，用金属或玻璃注射器投服(图26)。操作术式是让猫站在桌上，一手抓住猫的颈部，使猫头后仰，一手持注射器并将注射器的前端衔接针头的部分插入口角内，然后慢慢地把药液推进口腔。如果它不下咽，可轻轻



图26 用注射器投服药液

地掐几下鼻子，促进咽下，但要细心操作。太闹的猫要请他人帮助保定。万勿鲁莽，以防误咽。这种投药方式适用于剂量小而作用大的药物。

投服小的片剂或丸剂的方式最为常用。投药时让助手一只手抓住猫的颈部，另一只手牢固地握住猫的两个前肢。投药人的左手握住猫的上颌，右手的拇指、食指和中指抓住猫的下颌，左右手合作将猫口腔掰开，随即把药片或药丸迅速投入舌面的后部，强使口腔闭合，药片或药丸即可咽下（图27）。这种投药法成功率很高。较大的药片或药丸事先最好把它掰成几瓣。

皮下注射、肌肉注射和静脉输液，应由兽医来做，特别是静脉给药，更应慎重。

猫对碘敏感，消毒不用碘酊。



图27 投服药片

六、猫的繁殖

（一）猫的生育控制

1. 去势

不论是公猫还是母猫，控制生育的最好办法是去势。给猫去势的年龄问题其说不一，一般认为6个月龄较为合适，因为这时猫已经到了性成熟阶段，而且身体也较强壮了，可以耐受麻醉药的麻醉。

去势时国外有人喜欢使用氟烷吸入麻醉。我们习惯使用氯胺酮麻醉，每公斤体重8—15毫克，肌肉注射。

公猫去势比较容易，只要做到无菌操作手术，术部用些抗生素药物，一般不会发生感染或其他并发症。

母猫去势，手术要求较高，术部切口不可过大，严防腹腔感染，有的单独摘除卵巢，有的连同输卵管及子宫一起摘除。

2. 避孕药

国外有人给猫用避孕药控制生育，但是很不理想，一是麻烦，二是长期使用有时会引起子宫感染，至今未能广泛被猫主接受。

（二）猫的性行为

通常公猫5—10个月龄逐渐性已成熟，个别公猫还要向后延迟2个月左右。如果这时不给它去势，它的性行为几乎可以保持终生，但8岁之后就算到了老年期。

母猫也于同样月龄达到性成熟，公、母猫的最佳开始繁殖年龄应在一岁左右，此时公、母猫生长发育基本完成，身体健壮。我国华北地区除了夏季“三伏”之外，母猫全年均可发情交配，但是春、秋两季配种最好。母猫的性周期为15—28天。温暖地带的猫发情次数会多些。发情继续时间约3—7天，一个性周期的求偶期大约连续2—3天。交配后24小

时才排卵。8岁以上的母猫已进入老年期，不再适于繁殖。

母猫发情后会有明显的表现，如性情变得特别温顺，喜欢在主人的两腿之间摩蹭，有时高举尾巴，发出鸣叫等。以此企图引起公猫的注意事项。

家养的母猫，主人如想得到有名品种的后代，可以选好公猫，在发情季节令其交配。

公猫阳痿十之八九是因维生素A缺乏所致，也可能是环境的影响。调治的方法是在猫食中每天加入鱼肝油2—3滴。

（三）妊娠猫的护理

猫的妊娠期一般为63天(60—68天)。妊娠初期不需要补充特殊食物和护理。随着胎儿在母体内的逐渐长大，妊娠母猫的食量也逐渐增加，活动量明显减少，行动稳重。妊后一个月左右，轻压妊猫的后腹部，即可触摸到胎儿的活动。所以妊娠一个月后应该给猫补充富有蛋白质的食物，如瘦肉、鱼肉等。食物中的碳水化合物，如淀粉、糖类等要相应的减少，以免母猫产前过于肥胖，容易造成难产。产前一个月或20天适当给些青绿蔬菜，食物中补充一些钙剂，如碳磷钙或葡萄糖酸钙等，每天0.1—0.3克。猫窝要放在干燥、温暖、有阳光及适量通风的地方。猫妊娠期不要驱赶或使它受惊。发育良好的健康猫，一般不会发生难产。一旦出现难产迹象，应及时到兽医院就诊，不可延误。

有时母猫会出现假妊娠现象。母猫的腹围逐渐增大，从乳房中可以挤出乳汁，同时母猫也有筑窝行为。但前后经过60多天后，不见产生仔猫，体况反而慢慢恢复正常了。出现假妊娠可能由于母猫体内雌性激素的作用，遇到这种情况，也要请兽医诊治。乳房内长期积存乳汁，容易诱发乳房炎，

应清拭乳头，挤出积乳。

（四）妊娠猫的产前准备和生产

大自然赋予各种动物繁衍后代的能力，猫也是这样，所以一般不需要为妊娠猫的分娩做过多的准备工作。大多数临近分娩的母猫都会找一个隐蔽的地方产仔，避开人们或其他外界的干扰。

室内饲养的猫临近产期时，猫主人应注意观察猫选好的产仔地方，然后提供给它足够的铺垫物，如废旧报纸等，并帮助它做成温暖舒适的“产房”。

室外放养的猫，它也会在屋内或屋子附近找到一处温暖背静的角落做“产房”。

临近产期的妊娠猫除找窝做“产房”外，性情变得更加慈爱，乳头肿大，乳头基部皮肤膨胀发亮，并能从乳头内挤出清亮或呈乳白色的初乳，阴唇红肿。

分娩后的24小时内，猫愿意呆在它的“产房”内，在这期间人们不要去打扰它。猫的分娩一般都是比较顺利的，但好心的猫主人看到母猫努责半个小时或一小时后，仍不见仔猫产出时，便有些着急，甚至惊慌失措，总想助它一臂之力，希望仔猫尽快产出，这是违反自然规律的，弄的不好反帮倒忙，一般耐心等待四、五小时，就会见到产下的正常仔猫。

产前用温热的淡盐水将母猫的乳头洗净、擦干，保证仔猫的哺乳卫生。许多猫主人的经验，照顾仔猫的其他工作，最好留给猫妈妈去做。

母猫分娩时常常是仔猫的头部先产出，产出的仔猫被裹在胎衣囊里，随后母猫将胎衣囊撕开，咬断脐带，吃掉胎

衣，并以舌舔干仔猫身上的胎水。这里要提醒人们，母猫在分娩过程中，千万别干扰它，否则，将会导致分娩的延迟或引起其他问题。

母猫自努责开始，经过24小时仍不见仔猫产出时，可请兽医检查是否发生难产。对于臀部和尾巴首先产出的仔猫，要人们为它助产一下。

猫的子宫收缩能力之强是惊人的，有的分娩后过了数日，又见产出一只死胎。一般很少做剖腹产。有名的品种，如果发生难产，为了获得活的胎儿，可以考虑剖腹产。剖腹产并不复杂，成功率很高。

仔猫的性别鉴定，不是人们想象的那样困难。鉴别的要点是肛门与尿道之间的距离大小，二者距离较远的是公猫，二者距离较近的是母猫。然后如将鉴别的结果相互对比一下，结论就更清楚了。

（五）猫的哺乳和孤儿猫的哺育

1. 猫的哺乳

初生仔猫全身披毛，双目闭合，一般要在九天前后才睁开眼睛。这段时间全靠嗅觉、触须来辨认猫妈妈和自己的兄弟姐妹。母猫每胎产仔3—5只，最多可达6只，最少1—2只。一胎之中必有体弱的仔猫，主人要帮帮忙使它吃上母乳。尤其是头三天的初乳不能短缺。

小猫出生后第二周开始长出牙齿，第三周便能吃点固体食物，随后逐渐与母猫吃食同样的食物。一般到了第六周便可断奶。

如果由于某种原因小猫必需提前断奶，在三周龄时应补充牛奶，牛奶里还要适量的加些维生素A、D或鱼肝油。从

第四周龄开始可以增加一些馒头、米饭和碎肉末或煮熟的鸡蛋。每天喂食5—6次，但每次数量不要太多，如果见有剩食，那是给的多了，下次要减少些。不要让猫养成剩食的习惯。两个月龄之后，每天可改喂三次或二次。到了十个月龄，每天只喂1—2次就行了。

母猫产后的乳热症，多在产后3—8周发生。发病的原因与缺钙或哺乳的仔猫太多有关。本症的表现 为母猫运步不稳，走路蹒跚，身体颤抖，呼吸困难，严重的四肢无力，甚至躺卧昏迷，体温可达43℃。发现上述情况，应停止仔猫继续哺乳，速请兽医诊治。急救办法是静脉输注钙制剂，如葡萄糖酸钙注射液等。

2. 孤儿猫的哺育

由于种种原因仔猫出生不久就失去了母亲，要想把几个“孤儿”养活长大，那可不是一件容易事。最理想的是代它们找个“妈妈”，这个“妈妈”当然仍是猫好，但狗也可以，国外已有多起泌乳狗养活小猫的报道。如果找不到合适的“妈妈”，那只有采取人工饲喂法了。众所周知，刚刚生下24小时内的仔猫对环境温度的要求高于一切，最合适的温度应是32℃（可用温箱、红外线灯或其他恒温装置），以后的两周可降为27℃左右，两周过后再降为21℃上下即可。

七、猫病防治

猫的寿命一般为8—12年，个别的可达30年之久。但在我国有的猫只活2—3年，究其原因，主要是未能掌握猫的患病征象及其规律，患病的猫又不能得到及时治疗。另外，猫患病也有一定的季节性，如冬季、早春和晚秋易患感冒、肺炎等，夏季食物容易腐败变质，猫食后常患胃肠炎。因此，

我们如能及时采取防治措施，便可有效的减少猫的死亡，延长猫的寿命。再者，目前我国小动物医院太少，猫病就诊不便，往往贻误病情。小动物专用诊疗设备以及药品、疫苗等也有待解决。

（一）病毒性疾病和细菌性疾病

1. 猫泛白细胞减少症

本病也叫猫传染性肠炎或猫瘟热，是一种高度接触性传染性病毒性疾病。死亡率高，对养猫危害颇大。自然接触感染的潜伏期为4—10天，各种年龄的猫都可感染，但以一岁之内的小猫较为多见。

〔病原〕

是一种脱氧核糖核酸病毒，能引起白细胞数目的减少，从而降低了机体的抵抗力。这种病毒可以耐受多种化学药品的作用，但用0.2%福尔马林能够灭活。自然传染主要由于直接接触或间接接触。病毒可通过猫的粪便、尿液、唾液和呕吐物散播，污染食具、笼子、铺垫物和周围环境而使其他猫受到传染。康复猫在一定时间内（几周至一年）粪、尿中还带毒排毒。病猫急性期，跳蚤、吸血昆虫可成为传播媒介。本病在全世界广泛存在，国内也有不少报道。

〔症状〕

病猫表现倦怠，缺乏食欲，发热，复相热型，即第一次发热在几小时内升至40℃以上，持续约24小时，随后降至常温或接近常温，但再经36—48小时后体温重新升高，这时临床表现加重，精神萎靡，被毛粗乱。头和前爪贴靠腹部，对主人及外界环境淡漠。通常在第二次体温高烧后不久即会死亡，也可能在第二次体温平息后得以康复。

呕吐是本病常见的症状，呕吐物呈黄色并混有泡沫。水样腹泻，粪中带血。由于脱水体重下降。病程稍长的可见贫血，眼结膜苍白。眼、鼻有多量脓性分泌物。

妊娠猫可能流产、早产或产出死胎。出生后存活的仔猫小脑发育不全，长到2—3月龄，步态蹒跚。或蹲伏在食盆、水盆的旁侧发呆。

具有诊断意义的组织病变为：

(1) 小肠粘膜及肠腺上皮细胞的坏死；

(2) 肠淋巴滤泡、淋巴结及脾脏滤泡内的网状内皮细胞增生及淋巴细胞数量的减少。

(3) 骨髓细胞的破坏及丧失。

肉眼可见腹腔内出现纤维素性假膜。

血液检查，白细胞总数明显减少，有的每立方毫米只有1000左右。

〔防制〕

治疗本病目前国内外尚无有效的药物。为了防止继发感染及脱水，输液中可加广谱抗生素。

注射疫苗是预防本病的最好办法。目前国外已广泛采用来源于组织培养的灭活疫苗或减毒活疫苗（表5）。免疫程序是从9—10周龄时开始免疫接种。如果小猫第一次接种时年龄已达12周龄，不再需要第二次接种。如果用的是灭活疫苗，第二次接种应在第一次接种后两周进行，为了达到更为保险的预防效果，需要在16周龄时进行第三次接种。妊娠猫不宜使用活疫苗。成年后最好每两年注射一次疫苗。

表5 目前国外常用的疫苗

疫苗名	型	再接种时间 (年)
FEV	福尔马林失活的	1
Feloine	失活的	1
Fiovax	无毒组织培养	2
LeukogenTc	改良活减毒的	2~3
Katavaep	活减毒的	2~3
pavaccine	减毒组织培养	2~3
panavac	失活的	1
Ulovax	水貂组织, 杀死的病毒	1

注: 疫苗注射量见有关说明书

2. 猫流行性感冒

〔病原〕

由病毒所致。目前已分离出两种病毒, 一种是猫鼻气管炎病毒, 一种是猫萆状病毒(以前称作细小核糖核酸病毒)。有人认为是由疱疹病毒引起的。头一种病毒致病力较强, 猫的临床表现较重, 但从临床方面这两种病毒难以鉴别。

〔症状〕

本病可见于各种年龄的猫, 其中以正在发育生长期的小猫较为多发。初期征候为: 结膜炎, 鼻炎, 眼睛流泪, 双目半闭, 流鼻涕, 喷嚏, 咳嗽, 流涎。病的初期体温正常, 随后渐渐上升40℃左右, 精神不振, 食欲减少。

由于猫的年龄、免疫性、受害组织、继发感染及治疗情况等的不同，病程的长短各异。如不及时诊治，结膜发生水肿，继发感染，眼睛可能受到损害。鼻炎一旦加重，鼻流脓涕，嗅觉不灵，导致食欲不振甚至绝食。有时炎症延及鼻窦引起鼻窦炎，颇难医治。体质虚弱的猫有时继发肺炎。

〔治疗〕

目前尚无特效药物，可用抗生素控制继发感染，也可给以对症疗法。抗生素以青霉素、四环素为首选。对口腔溃疡和病程较长的病猫，应给予维生素A制剂，口服或肌肉注射。治疗结膜炎可使用眼药水或眼药膏，但不能使用含有皮质类固醇的眼膏。由于拒食、拒饮呈现脱水的，可静脉输注等渗葡萄糖盐水，每天50—100毫升，直到开始正常进食为止。给以适口性强的食物，如鱼、肝和瘦肉等。室温保持在21℃上下最为合适。

〔预后〕

抓紧时间早期治疗，同时加强护理，控制各种继发证，一周左右即可痊愈。否则，病程可达3周。幼猫，小猫或有些名贵品种抗病力较差，护理更加重要。

〔预防〕

最好的办法是按时注射疫苗。目前国外有两种疫苗。一种是注射的，先后注射两次，数周就可得到免疫力，但不能用于妊娠猫。另一种是滴入鼻腔或结膜囊的，48小时后就可产生免疫力。两种疫苗每年都要强化一次。有人主张注射三联疫苗，即猫鼻气管炎病毒疫苗、猫萆状病毒疫苗和猫泛白细胞减少症疫苗三者的混合疫苗。

3. 猫传染性腹膜炎

〔病原〕

病原与猫白血病的病毒相似。该病是一种传染性浆液性纤维蛋白性腹膜炎，世界各地均有发生，我国似尚无报道。

〔症状〕

本病是一种发展缓慢的慢性病。多发生于三岁以下的猫，尤其是公猫，有时也见于三岁以上的猫。

病初常有低热（39.4—39.5℃），食欲不振，精神欠佳。体温逐渐恢复正常，但健康状况却见下降，比较明显的是腹围慢慢增大，腹部触压缺乏疼痛反应，这是本病的特征。随后体况日趋不佳，表现体弱、贫血。病程可持续数月，病猫濒死期可视粘膜黄染。血液、腹腔液中的蛋白总量增加，这是由于其中的 γ -球蛋白增多所致。

〔治疗〕

目前尚无特效疗法。绝大多数的病猫以死亡而告终。为了防止病的传播，应尽早请兽医行安死术（给以大剂量安眠药，使不治之症在睡眠中无痛苦的死去）。

4. 狂犬病

〔病原〕

狂犬病是由狂犬病病毒引起的，该病毒属于核糖核酸型的弹性病毒，它可使所有的各种温血动物感染（包括蝙蝠），是一种危害性很大的人畜共患疾病。

〔传播方式〕

病毒在动物体内主要存在于中枢神经组织、唾液腺和唾液中。本病的传播方式是被患有该病的病兽咬伤而受感染。另外，猫的皮肤、粘膜损伤处，一旦沾染病兽的带毒唾液也能得病。

〔症状〕

根据发病过程，本病可分为三期，即潜伏期(沉郁期)、发病期(兴奋期或狂暴期)及麻痹期(死亡期)。潜伏期的长短很不规律，少者10天左右，多者半年甚至更长。

潜伏期，病猫喜暗处躲藏，精神呆板，双目凝视，口流唾涎，听到声响，表示惊恐甚至立即跃起，有时主人对它的爱护抚摸也会成为刺激。

发病期，病猫易怒，常主动地攻击人或其他动物，遇到同类相互撕咬。

麻痹期，病猫极度消瘦，运步失调，后肢或前后四肢呈现麻痹，随后不久衰竭死亡。

〔防治〕

迄今为止本病尚无有效疗法。为了确保人畜安全，一旦确诊，应及时扑杀。关键是定期防疫，注射疫苗，特别是本地区近期发生过该病，必须立即采取预防措施。

5. 伪狂犬病

〔病原〕

这是由疱疹病毒引起的一种传染病。老鼠是带毒者，猫扑食了带毒的老鼠而被感染。有的喂饲该病病猪的生肉内脏也可导致，死亡率高。

〔症状〕

某些症状与狂犬病相似，但两者最大的差异之处是本病痒觉强烈，身体各处都可表现痒感，病猫常用其爪或牙搔抓、啃咬，难以自控，抓伤、啃伤皮肤，血迹斑斑，仍奇痒不止。病猫痒的如同疯狂一样，主人用力制止亦无效果。体温明显升高。当病毒侵入及延髓后，病猫吞咽困难，口流清

涎，呼吸吃力，心律不齐，最后痉挛死亡。本病病程极短。

〔防制〕

直至现今世界各国尚无有效疗法。定期注射疫苗具有重要意义。当然，灭鼠工作不能忽视，一旦确诊，应就地扑杀。

6. 白血病

〔病原〕

这是一种由病毒所致的传染性疾病。也称作淋巴肉瘤综合症、病毒性传染性白血病及白细胞癌等。有的是带毒者，而无任何可见的临床症状。母猫带毒时可以传给刚生下来的仔猫。有的科学家认为此病可传染给人。西方国家常有此病。

〔症状〕

病猫逐渐消瘦，最引人注目的全身淋巴结肿大变硬。到了晚期，病猫完全丧失食欲，拒食甚至拒饮。血常规检查，白细胞总数明显增多，淋巴细胞的比例上升。

〔治疗〕

本病尚无有效疗法。一旦确诊，应请兽医作安死术。儿童和孕期妇女不要接触病猫。

7. 巴氏杆菌病

〔病原〕

这是一种由多杀性巴氏杆菌所致的传染病。猫的来源常是吃了患有巴氏杆菌病的鼠类或鸟类。

〔症状〕

主要表现是急性胃肠炎。病猫食欲减退或废绝，口渴，体温高达40℃以上，有的呕吐，有的腹泻，呼吸迫促。濒死前体温下降至37.5℃以下，发抖，瘫痪，有的“抽风”。发病慢的表现腹泻与便秘交替发生，病程长的可达5天左右。

根据本病的临床症状和病理剖检变化，兽医可以作出确实诊断。必要时还可进行细菌性检查。

〔治疗〕

早期用广谱抗生素或磺胺制剂治疗，疗效较好。

四环素 口服，每天每公斤体重55—110毫克，2—3次分服，连服4—5天。

磺胺二甲嘧啶 口服，每天每公斤体重150—300毫克，3次分服，连服3—5天，首次剂量应加倍。

8. 沙门氏杆菌病（副伤寒）

〔病原〕

猫有三种致病性的沙门氏杆菌，即肠炎沙门氏杆菌、鼠伤寒沙门氏杆菌及猪霍乱沙门氏杆菌。当猫吃了这些杆菌感染的鼠类或带菌的食物，可能受到传染，尤其是幼猫。

〔症状〕

类似于巴氏杆菌病。体温升高，食欲不振，下痢，类便恶臭，呼吸困难，有时咳嗽。

〔治疗〕

可选用下列几种药物：

(1) 氯霉素 口服，每天每公斤体重55—165毫克，4次分服，连用2—4天。

(2) 土霉素 肌注，每天每公斤体重7—22毫克，每天一次，效果良好。

(3) 卡那霉素 肌注，每天每公斤体重10毫克，每天一次，效果良好。

磺胺二甲嘧啶 口服，剂量见巴氏杆菌病。

痢特灵等呋喃类药物也有疗效。

9. 肉毒梭菌中毒

肉毒梭菌在适合条件下，于食物中很快繁殖，并产生毒素。猫一旦吃了这种食物便会发生中毒。经常外出的猫，常因吃了腐败变质的动物尸骨、死鼠等而引起中毒。发病后死亡率高。所幸猫的平素食物供应良好，即使外出也不喜欢吃食外界丢弃的腐败变质物品。中毒后病猫呈现运动中枢神经和延脑麻痹，运步困难，甚至卧地不起。

早期发现，及时用多价抗毒素治疗，可以收到一定疗效。关键所在是将猫食供应清洁卫生，夏季对鱼、肉类的保存要严加管理。

10. 猫的血巴尔通氏体病

本病也叫猫的传染性贫血。

〔病原〕

为感染猫的一种血巴尔通氏体，它寄附在猫的红细胞上，因此血浆中找不到这种病原，许多猫自身带有病原，但不表现任何临床症状，只有当猫体由于种种原因使机体抵抗力降低后才会显示症状。这种病原体极小，必需通过电镜放大18500倍左右方可检视。红细胞受其寄附后，寄附处的胞膜下陷，继之胞体变形而破裂，造成患猫贫血。病原体呈球形，多分散存在。传播途径尚不清楚，可能与猫在相互格斗中将同类抓伤，吃到污染其爪的残血有关。病原体不耐干燥，对一般消毒杀菌剂抵抗力弱。世界各地的猫都有此病。

〔症状〕

潜伏期长，急性发作时体温上升到40—40.6℃，甚至高达41℃。食欲废绝，随即出现巨红细胞性溶血性贫血、黄疸。确诊需要通过电镜对血片的检视。一般生物显微镜无能

为力。

〔治疗〕

首选药物是四环素，为了防止复发，3个月后再按原方注射一次。另外，可补及铁剂和维生素B₁₂，促进红细胞的恢复。

11. 破伤风

猫极少发生破伤风。破伤风是由破伤风梭状芽胞杆菌引起的，能在猫体的刺伤深处生长、繁殖，同时在生长繁殖过程中产生毒素，毒素沿神经干侵害脊髓，从而引起一系列神经症状。

〔症状〕

患猫的第三眼睑明显外露，几乎将眼球掩盖，常常因此症状引起猫主的注目。继之步态强拘，四肢及背部肌肉强直，听到一般声响也会显示惊恐不安。牙关紧闭，食欲及下咽困难。

〔治疗〕

肌注高价破伤风抗毒素，并配合抗生素和镇静剂的治疗。腹腔注入等渗葡萄糖氯化钠溶液，保持机体低限水分和热能的供给，牙关尚未完全紧闭者，痊愈的可能性较大。

（二）体内寄生虫病

猫的多数体内寄生虫寄生在胃肠道，也有寄生在肺、肝等脏器的。最常见的体内寄生虫有线虫和绦虫。

1. 蛔虫病

〔病原体〕

蛔虫病是猫最常见的内寄生虫病，虫体寄生在猫的小肠。感染猫的蛔虫有三种，即猫弓蛔虫、狮弓蛔虫和犬弓蛔虫。

蛔虫在肠道内产卵，卵随粪便排到体外，当外界的温度、湿度合适时，卵内孵出幼虫，这种卵具有感染力。

如果猫吃进了含有感染性幼虫的卵，幼虫在猫的胃内孵化出来，随后幼虫钻入胃壁，进入血管，通过门脉循环到达肝脏，再通过静脉回流至右心，又转到肺毛细血管层，步入肺泡腔，而后幼虫沿细支气管上行，到达气管。幼虫随咳嗽通过咽喉部被吞入食管，重新回到胃内，并在胃内继续发育，然后移至小肠，在小肠内发育成成虫。

狮弓蛔虫则终生在肠管内发育，不在有关脏器中移行。含有感染性幼虫的虫卵被猫吞食后，在小肠内孵化出幼虫，幼虫钻入小肠壁，经过一定发育时期幼虫又回到肠腔，并逐渐成为成虫。如果感染严重，有的幼虫也能移行到其他脏器，如肝、肺等。

鼠可作为蛔虫的传递宿主，鼠吃了感染性虫卵，孵出的幼虫移行到鼠体内各种组织，并在组织中被形成的包囊包起。一旦这种老鼠被猫扑食，破囊而出的幼虫会在猫的肠管内发育成熟。

〔症状〕

每当大量蛔虫感染后才有临床症状。严重感染的年轻猫，明显的症状是胃肠机能的紊乱，腹泻，呕吐，胀肚。当幼虫在猫体内的有关脏器移行阶段，病猫精神不振，不爱嬉戏，眼睛膜色淡，轻度贫血。

〔诊断〕

取病猫新鲜粪便送检，可以检出蛔虫卵。有时病猫可将蛔虫吐出。成虫浅黄色，长3—18厘米。严重感染时，吐出的虫体常常成团。

〔治疗〕

可选用下列驱虫药物：

(1)驱蛔灵 为首选药物。口服，每次每公斤体重100毫克。

(2)海群生（枸橼酸乙胺嗪）口服，每次每公斤体重55毫克，也可将药剂混入猫食内。服药前应绝食18—24小时。有人报道11只猫的驱虫率为98%。本药的缺点是有时会引起猫的呕吐。

(3)噻唑青胺 口服或混饲，每次每公斤体重10毫克，每天一次，连用4—7天。有时有呕吐、腹泻等反应。

(4)丙硫苯咪唑 口服，每次每公斤体重50毫克。本品毒性很小。

(5)枸橼酸哌嗪 口服，每次每公斤体重100毫克。驱虫率高，安全性大。

迄今为止，尚未发现能驱杀移行期和包囊期的幼虫的药物。

〔防制〕

防止蛔虫感染的关键是坚持搞好平日的清洁卫生，及时清除粪便，切断与中间宿主的接触。后一点家养猫可以做到，对放养猫却有困难。目前几乎所有的消毒药都不能杀死蛔虫卵，沸水或苏打水可将虫卵杀灭。

2. 钩虫病

〔病原体〕

感染猫的钩虫有狭首钩虫、管状钩虫、巴西钩虫和犬钩虫等。临床上多是巴西钩虫和管状钩虫的感染。本病多发生于热带地区，传染性很强。

钩虫寄生在小肠，虫卵随粪便排出体外，在温度、湿度合适的环境中孵化出幼虫，七天后变成有感染性幼虫。这些感染性幼虫可穿透猫的皮肤或被猫食入而感染。老鼠可能是钩虫的传递宿主。

钻入皮肤的幼虫，进入血管或淋巴管，到达右心，再经肺、咽喉、食管而入小肠，并在此发育成成虫。被吃进去的幼虫，经肠管壁入血管，再经心、肺、胃，大多数幼虫进入胃腺窝或肠绒毛腺窝内，存留一段时间后仍回到肠腔，并在此发育成熟。

〔症状〕

患猫逐渐瘦弱，被毛粗乱，结膜色淡，贫血，血检红细胞数降低。严重感染时，粪便变黑，如柏油状，并带有腐臭气味。

如果幼虫大量经皮肤侵入，病猫皮肤发炎、奇痒，使病情更加复杂。

检查粪便虫卵，很快会得出确切诊断。

〔治疗〕

选择下列药物驱虫：

(1) 甲苯 口服或混饲，每公斤体重0.22毫升，据报道驱钩虫特效。

(2) 二苯酚 皮下注射，每公斤体重9.9毫克。

(3) 丙硫苯咪唑 口服，每公斤体重55毫克，连服3天。

〔防制〕

因钩虫的幼虫不耐阳光的照射，不耐干燥，所以猫舍应经常打扫，猫舍能搬动的用具，移到户外曝晒，并定期送检粪便，检查虫卵，及时给母猫驱虫，以防污染环境，使小猫

受到感染。

本病可以感染给人和其他动物。喂饲实验用猫的单位，工作人员应穿工作服、带手套，加强保健。

3. 肺线虫病

〔病原体〕

肺线虫即奥妙猫圆线虫，临床上发病较少。

〔症状〕

病猫常常咳嗽，打喷嚏。随着时间的施长，病情逐渐加重，有的甚至酿成肺炎、胸膜炎。

〔治疗〕

可内服左咪唑，每公斤体重10毫克，每天3次，连服1—5天。丙硫苯咪唑的用量比治钩虫要加大些，疗程也要加长。两者的疗效都不太理想。

4. 麦地那龙线虫病

本病是一种人猫共患的寄生虫病，近年来我国部分地区有所发生。

〔症状〕

病猫被毛粗乱无光，精神沉郁，饮食欲减少，逐渐瘦弱，易受惊吓，有时频频鸣叫，但体温正常。前肢肘突后部的肋区和两侧股骨前缘皮下，可以摸到直径约2毫米如尼龙线样的长柱体，呈卷曲状，手感滑动。

〔治疗〕

可用外科手术取出虫体，术后的第一天，病猫可能出现肌肉震颤现象，并喜静卧一旁，不思饮食。第二天后，上述症状逐渐消失。第六天后，基本康复。

如果猫体上数处感染虫体，可分次取出，保持刀口的清

洁，不必打针吃药。

6. 绦虫病

〔病原体〕

绦虫病是猫常见的寄生虫病。感染猫的绦虫种类很多，其中最常见的为犬复孔绦虫和猫泡尾绦虫。阔节双槽头绦虫偶尔可见。

犬复孔绦虫需要中间宿主，人与猫共患。猫泡尾绦虫的中间宿主是蚤、鼠和家兔，因此放养猫比家养猫的感染机会多。阔节双槽头绦虫的中间宿主是鱼和多种低脊椎动物，可以传播给人。

猫吃了中间宿主而被感染。绦虫寄生在肠管内，以其头部吸附在肠壁。

〔症状〕

严重感染时会引起猫的慢性肠炎，腹泻，呕吐。吃食不算少但体况日趋下降。自猫体排出的绦虫活孕节附在肛门周围，刺激肛门，肛门疼痛发炎。

简单易行的诊断方法是在病猫的肛门周围、粪便中或铺垫物中发现绦虫的孕节。节片呈白色，最小的大如米粒，最大的联结节片长达9毫米左右（图28）。




图28 绦虫

〔治疗〕

可选用下列药物，

(1) 氯硝柳胺 (贝螺杀、灭绦灵) 口服，每公斤体重154—200毫克，一次服用。服药前绝食12小时。此药具有高效杀虫作用。

(2) 氯硝柳胺吡嗪 口服，每公斤体重125毫克。

(3) 丙硫苯咪唑 口服，每公斤体重55毫克，具有高效杀虫作用。

(4) 盐酸丁萘脒 口服，每公斤体重25—50毫克，一次服用。服药前绝食12小时，服药后3小时方可喂食。这是一种广谱抗绦虫药。

(5) 硫双二氯酚 (别丁) 口服，每公斤体重100毫克，隔天一次，共服10—15次。此药性缓和，但不能杀死头节，今已少用。

(6) 吡喹酮 口服或皮下注射，每公斤体重2.5—5毫克。

〔防制〕

避免猫与中间宿主接触。放养猫可根据检查结果定期驱虫。喂给猫的鱼要煮熟。

7. 肝片吸虫病

〔病原体〕

猫吃了含有吸虫幼虫的鱼肉或螺类而感染，主要寄生在肝脏的胆管内。

〔症状〕

可视粘膜苍白，贫血，消瘦，精神不振，食欲下降，被毛粗乱无光，容易脱落，下痢与便秘交替发生，严重感染时可导致死亡。

尸体剖检，肝脏明显肿大，胆管内有虫体寄生。

〔防治〕

(1) 硫双二氯酚片 口服，每公斤体重50—100毫克。

(2) 六氯乙烷(吸虫灵) 口服，每公斤体重100—200毫克。

猫禁食生鱼或没有熟煮的鱼(尤其是淡水鱼)。

8. 弓形体病

这是一种人、猫和其他哺乳动物共患的原虫病。该病广泛分布于世界各地。孕妇感染后常发生流产。

〔病原体〕

为刚第弓形体原虫，猫科动物为原虫的有性发育期宿主，也是本病的终末宿主。

〔症状〕

多数病例属于亚临床型。幼猫易感，临床症状比较明显。临床显性感染，病初体温上升到 $40.6—42.2^{\circ}\text{C}$ ，稽留不退，精神萎靡，食欲减退或废绝，消瘦，咳嗽，肠炎，黄疸，呼吸困难，并有神经症状，步态不稳(图29)，体表淋巴结肿大，早产或流产。幼猫除上述症状外，容易引起肺炎。

尸体剖检可见胃肠溃疡、肝肿大、心肌炎、肌炎、肺炎、脑膜炎、淋巴结肿大以及具有特征性脑脊髓炎。

〔治疗〕

任选下列药物：

(1) 甲氧苄胺嘧啶 口服，每公斤体重140毫克。



图29 患猫步态不稳

(2)磺胺嘧啶注射液 肌注或静注,每公斤体重70毫克,每天两次连注3天。

(3)青霉素 肌注,每公斤体重10000—20000单位,每天两次,连注3天。主要目的是为了预防细菌性并发症。

平时注意猫食的清洁卫生,最好不给猫吃生肉,除非是经过食品卫生检查的合格肉。

(三) 体外寄生虫病

1. 蚤

猫身上可有三种蚤寄生,即猫蚤、狗蚤和人蚤。

〔症状〕

不同品种猫的皮肤对蚤唾液的敏感性有所差异,因此,被蚤叮咬后有的反应大,有的反应小。一般来说,被蚤叮咬之处都有痒感,可见猫用爪搔抓、或用牙啃,抖动皮肤。蚤隐在毛丛,不易捉拿,但蚤粪呈黑褐色颗粒,附在猫的皮肤,这种颗粒越多,表明蚤也越多。有时猫的皮肤上出现过敏性湿疹区,该区被毛稀少,红肿发炎。蚤在猫身上可存活两年之久。另外,蚤还是猫绦虫的中间宿主。

〔治疗〕

可用鱼藤、百虫灵或除虫菊酚杀灭猫蚤。药粉一定要撒在毛根部。除了杀灭猫身上的跳蚤外,猫舍、猫窝等处也要经常喷洒一些有机磷杀虫剂。猫窝的铺垫物要每天更换,并把换下的铺垫物烧掉。对放养猫要加强猫体的灭蚤工作。

2. 虱

健壮猫的身上极少寄生虱子。体弱多病的小猫或不健康的成年猫时有寄生。猫虱有两种,一种是咬虱,另一种是吸血虱。虱多寄生在猫的头部和前肢内侧。

〔症状〕

主要症状是瘙痒，但痒感程度不像蚤寄生那样明显。猫的体况常常受到影响。猫体上的虱子容易发现。它在猫的毛干上产卵。

〔治疗〕

与灭蚤相同。

3. 蜱

寄生于猫的是蓖子蜱硬，它常寄生于猫窝及猫窝附近的一些缝隙内。寄生于猫体上的多在头部和腿部。蜱以吸血为主，对皮肤有轻微的刺激。

〔防治〕

每隔两周左右向猫体上撒布一次杀虫剂，药物种类与用法与灭猫蚤相同。

4 螨

猫身上有五种螨寄生，分述于下。

(1) 耳痒螨

这是猫耳疥癣的病原体（该病在耳病项内详述）。这种螨猫与狗相互感染，所以杀灭此螨时必须双管齐下，既治猫又治犬。环卫也要搞好。

(2) 猫痂螨

螨在猫的头、颈部皮肤打洞钻进皮肤，其中多数是从猫耳基部皮肤进入的。如不及时发现、治疗，将会逐渐蔓延全身。感染了螨的皮肤发生强烈瘙痒。由于猫的抓痒、蹭痒，可以造成局部皮肤损伤、被毛脱落、感染化脓等继发证，使病性复杂化。

治疗可用1%敌百虫水溶液涂擦，天气暖和季节，可用0.5%敌百虫水溶液温浴，浴后擦干，防止感冒。每两周进

行一次，直到痊愈为止。

(3) 秋螨

这种螨常在7—9月份侵害猫体，并有一定的区域性。

此螨多在猫的脚趾之间和腹部寄生，有时也见于猫的头部和腹股沟的短毛处。它以带钩的小犬齿打洞钻入皮肤摄食，患区皮肤瘙痒，引起猫的抓、舔，皮肤损伤后的分泌物结痂，复盖伤损。

治疗可用1%敌百虫水溶液涂擦患部，同时配合口服类固醇药物疗效更好。

(4) 姬螯螨属的两种螨

这两种螨常寄生于兔体，猫接触患有螨病的兔可受到感染。该等螨并不钻入皮肤，而是生活在猫的被毛毛根。

螨寄生处可见大量的皮屑，肉眼仔细观察，在皮屑之间会发现移动的螨。假如把皮屑刮到黑色的纸上，用一般阅读放大镜看得更加清楚，

可用鱼藤或除虫菊酯制剂涂拭患部，敌百虫制剂效果也好。

(四) 消化系统疾病

1. 口腔恶臭

本病比较少见，主要发生于老龄猫。

〔病因〕

口腔发炎，多是口腔有病或某些营养物质缺乏，如龋齿、齿槽炎、牙髓炎、口腔溃疡、消化机能紊乱及维生素B缺乏等。

〔治疗〕

首先检查口腔，找出病因，针对病因予以治疗。

2. 口腔损伤

猫的舌面具有向后倾斜的乳突（图30），混在猫食中的某些尖锐物体，一旦进入口腔，很难把它吐出，因此，有时引起口腔损伤。本病发生率小猫多于成年猫。

〔症状〕

最明显的症状是猫的食欲突然废绝，口流涎液。打开口腔，借助光源检视，损伤处发炎红肿，甚至溃疡（图31），有时可找到扎在口膜或舌面上的尖锐异物。



图30 舌乳突



图31 舌面溃疡

〔治疗〕

找到异物，用器械取出，如鱼刺、碎骨、金属异物等。用0.1%高锰酸钾溶液或3%硼酸溶液清洗口腔，肌肉注射青霉素。给以牛奶、肉汤等流体食物。

3. 溃疡性舌炎

由猫鼻气管炎病毒或猫萆状病毒引起的一种疾病。

〔症状〕

病猫拒食，精神不振，流涎，口角常有带泡沫状唾液。猫不时摇头，总想把口角的唾液甩掉。

口腔和舌边缘存在损害，损伤处呈现红色。病猫有渴感，但想饮而不能饮，病情如不好转，可以引起机体脱水。

〔治疗〕

目前尚无特效疗法。注射抗生素为了控制继发性感染，促进尽早康复。患病期间病猫与健猫要隔离喂养。脱水严重或数日不食的应及时输液，通过输液供给水分和必要的营养物质。

4. 舌下囊肿

实际上是猫的舌下腺肿胀，由于口腔的感染导致腺体导管发生阻塞。

〔治疗〕

事先进行全身麻醉，将舌下腺摘除。也可向舌下腺内注入抗生素。

5. 齿垢

猫长到3岁以后可在牙齿上形成齿垢。齿垢的形成可能与猫唾液的酸碱度有关，也可能存在一些其他诱因。一般来说，大多数健康猫直到老年仍然保持洁净，无齿垢形成。

为了防止齿垢的发生,每年可请兽医检查一次,如有齿垢应及时除掉,否则,天长日久可诱发齙齿炎、齿槽炎及齙齿。

6. 齙齿

本病在猫比较少见。齙齿是由于牙珐琅质分解的结果,机体缺钙可能是发生齙齿的主要原因,患牙出现黑色斑点。继而变为小的齿洞。有时会影响采食,或不敢用力撕啃肉骨。可适当补充钙质,暂时改喂软熟食。

7. 牙周病

〔病因〕

牙周病以牙周炎为多见。猫吃软熟食物,咀嚼次数减少,容易形成牙石。如果牙石不断的聚积增大,可使牙龈萎缩,齿根逐渐外露,牙齿松动,加上细菌乘机侵入,便将造成牙周炎。

〔症状〕

起初患猫不愿吃坚硬食物,随后食量逐渐减少,严重时几乎完全拒食。触压牙龈有疼痛,有时可以从牙龈患处压出脓汁和血液。口腔发臭。

〔治疗〕

全身麻醉,清洗口腔,剔除牙石,拔掉松动的坏牙,牙龈患部涂抹口腔防腐剂。如果坏牙较多,最好分次拔除,以防引起休克等不良后果。

8. 咽炎

〔病因〕

咽炎是指咽部或咽喉部的炎症,常继发于流行性感冒,如不及时治疗,可能导致咽部溃疡。另外,牙龈炎、齿槽炎及尖锐异物损伤等也可引起咽炎。

〔症状〕

病猫仍有食欲、欲饮，但吞咽困难，所以欲吃难咽，欲饮不能。常把吃进的食物复而吐出。不时作出吞咽假动作，精神显示痛苦。口咽检查，咽及咽周围明显红肿，甚或有小的溃疡。

〔治疗〕

口咽有尖锐异物的应及时取出，必要时全身麻醉。清拭口咽，肌注抗生素消炎。供给流体食物。脱水严重的应静脉输注等渗葡萄糖盐水及维生素等。

9. 咽喉异物

咽喉异物最常见的是缝衣针（图32）。小猫喜欢玩线或小的带子等物，在戏嬉中一旦将带有缝针的线吞入口内，针会刺入咽喉部。其次是鱼骨、鱼刺。



图32 咽喉异物针和线

病猫突出的症状是流涎，时时作出假的吞咽动作，有时咳嗽。主人用手触压它的咽喉，病猫立即表示拒绝、躲闪。

急去兽医院就诊，X光透视或拍片子，确定异物所在部位，全身麻醉，取出异物。

10. 食管阻塞

猫急食时咽下的碎骨块或在戏耍时误食的塑料小玩具等，有时造成食管阻塞。小猫有一种先天性缺陷，叫永久性右主动脉弓畸形，也可引起本病。病猫的明显症状是吃食后不久复而吐出，但有食欲，总想吃食。

一旦怀疑此病时，速去兽医院就诊，X光拍片确诊后，全身麻醉，手术，取出阻塞物。先天性永久性右主动脉弓畸形，压迫食管影响食物通过或通过不畅的应行矫正术。

11. 胃炎

〔病因〕

猫有舔拭被毛的习惯，被毛进入胃内不能消化，天长日久，积毛慢慢形成毛球，毛球由小变大，刺激胃粘膜，引起胃粘膜的轻度炎症。此外，某些食物中毒或过食美味食物也可诱发本病。

〔症状〕

病猫频发呕吐，是本病的突出症状。有时腹痛，痛时可见腹部上吊。喜蹲伏在阴冷处。呕吐后常大量饮水，体温一般在正常范围。

〔治疗〕

小的毛球病猫可自行吐出，有的猫大约两周左右吐出一次毛球。如果毛球太大，可考虑手术将毛球取出。

由于某些毒物所致的，经调查研究，给以特效或对症疗

法。

由于过食引起的，可绝食1-2天，或只供流体食物，常是不药而愈。必要时给些健胃药。

12. 胃内毛球

多见于长毛猫，当它用舌梳理自己的被毛时，吞咽了脱落的毛，在胃内慢慢形成毛球。

患猫虽有食欲，但食量逐日下降，体况不佳，不愿戏耍。体外触诊在肋弓处有时可触到胃内有一球状物。X光拍片可获确诊。

小的毛球，患猫有时可自行呕吐。毛球如果较大，既吐不出来又排不出去，或将肠管阻塞，这时应请兽医诊治，必要时可进行手术。

经常为猫梳理被毛，对预防本病有其重要作用。

13. 幽门狭窄

胃与十二指肠的通道口叫做幽门。正常的幽门括约肌有一定的伸缩性，幽门开张食物由胃排入肠管。当幽门括约肌肥大或先天性幽门狭窄，影响胃内容物排出，即会造成本病。

患猫有食欲，有饥饿感，但吃食后不久复而几乎全部呕出。由于缺乏营养，体况很快下降，甚至变得消瘦。

应用钡餐—X光造影术进行诊断。确诊后可行幽门环形肌切除手术，效果很好。

14. 肠炎

〔病因〕

肠炎是肠粘膜的炎症。引起发炎的原因是多方面的。其中有感染性的，如细菌、病毒、寄生虫等；也有一般性的，如毒物、真菌毒素、腐败变质食物等。

〔症状〕

病猫精神沉郁，大多表示拒食，结膜充血，口腔干燥，喜欢饮水（拒饮者提示病情严重）。腹部深部触诊显示有痛感，甚至发出鸣叫。频发腹泻，粪便粥样或水样，其中混有不消化的食物、粘液、血液等，气味腥臭。由于细菌所致者，体温上升，血检白细胞总数增多。感染病毒者，除体温上升外，病的初、中期血液中白细胞总数多趋下降。一般原因引起者，体温微升，血检白细胞总数及其分类变化不太明显。

〔治疗〕

由感染引起的，可选用下列药物：

(1)土霉素 口服，每天每公斤体重55—110毫克，4次分服。肌注，每天每公斤体重6.6~22毫克。对急性病例，应先肌注，待病情好转后再改口服。

(2)琥磺噻唑 口服，每天每公斤体重175毫克，两次分服。连服2~4天。

(3)痢特灵 口服，每次20~40毫克，一天两次，连服3天。

(4)等张葡萄糖氯化钠溶液 静脉输入，用于严重脱水者。也可将土霉素注射液加入输液中给予。

由一般原因引起的，首先绝食1~2天，给以健胃剂，体弱的绝食期间，可静注葡萄糖溶液。

15. 肠内异物

肠管内的异物有毛球、针线、碎骨头、儿童玩具及塑料制品等。由于异物的刺激，可导致肠炎、腹膜炎及肠管阻塞。

〔症状〕

最引人注目的症状是患猫进食1~2小时后发生呕吐，呕

吐有时持续数天。粪便很少或不排粪便。表情痛苦，全身情况不佳。腹膜一旦发炎，呈现急性腹痛。

〔治疗〕

通过X光拍片可取得确切诊断。应尽早手术，取出异物，以免导致难于医治的腹膜炎。手术时要切除比有病变略长的肠段，这样做可以提高手术成功率，并可缩短疗程。

手术后的头3天 饲喂流体食物，继之再给一周容易消化的食物。本病只要及时治疗，成功率是很高的。

16. 肠弛缓

本病主要发生在老龄猫，由于老龄的关系。结肠后段和直肠肠壁的生理机能下降，蠕动性及收缩力减弱。

〔症状〕

病初大便不太畅通，继之频发便秘，排粪次数及排粪量减少，食欲不佳。硬结的粪便一旦在肠管内发生梗阻，患猫症状立即加剧，如腹痛、呕吐、努责及完全拒食等。频频到放置便盆处作出排便的姿势，企图排出干硬的粪便，但每次都是“虚恭”。腹部触诊可摸到较硬的粪块。

〔治疗〕

先经X光拍片诊断，一旦确诊，立即手术，取出结粪，切除有病变的肠段，疗效最佳。否则，口服液体石蜡油及温肥皂水灌肠等医疗措施，往往是不成功的。

〔预防〕

对平日粪便不太畅通的老龄猫，食物中加些富有粗纤维的东西，或在食后投服半匙液体石蜡油，有着促进通便的预防效果。

17. 便秘

便秘是室内养猫常见的一种疾病。这与老龄猫、肥胖猫的缺乏运动以及平日饲喂食物的搭配不当有关。

患猫虽有便意，但每次排出的粪便量少、干硬，有的数日不见排便。结粪多在大肠后段，体外腹部触诊，有经验的兽医或猫主人可以摸到较硬的粪块。

发现猫的便秘后，可向肛门内注入液体石蜡或一些无刺激性油类，每次5毫升左右，同时可在猫的腹部进行温和的按摩，常于片刻之间排出结粪。这种处理如果无效，应去兽医院就诊。

适当加强猫的运动，猫食加些油类或定期投喂半汤匙液体石蜡油等，有着防病的意义。

18. 腹泻

腹泻是常见的一种猫的轻微疾病。大多由于饮食失调所致。体温正常，仍有食欲，粪便稀软，但无难闻的腥臭气味。只要停食24小时，猫食中拌入矽炭银1片(或空腹投服)，很快得到痊愈。假如经过48小时腹泻仍不停止或病情有所加重，应尽快到兽医院诊治。去时用不透水的纸盒或洁净的玻璃瓶带上病猫的新鲜粪便，供作兽医院化验。

19. 肠套叠

肠套叠是由于不太清楚的原因导致肠管的正常蠕动发生紊乱，有的肠段强力收缩，有的肠段松弛无力，致使肠管套入其他邻近肠管，影响或阻断套叠肠管的血液循环，一旦延迟时间，便会造成肠管组织坏死，后果不堪设想。肠套叠常是肠炎或肠内寄生虫病的继发证。

〔症状〕

病猫突然发生腹痛，肚腹向上抽吊、紧缩，呻吟，表情

痛苦，有时作出被动性的蹲伏姿势，呕吐，粪便极少，粪中混有粘液和血液，粘液有时呈胶冻样。腹部触诊疼痛，并可触及香肠样套叠肠段。全身体况渐趋恶化，结膜发绀，心跳增数，血液循环障碍，最后可导致休克。

〔治疗〕

经有经验兽医的确诊之后，立即全身麻醉，手术开腹，整复或切除坏死的肠段。

20. 肛门腺阻塞

猫的肛门两侧稍下的地方有两个小腺体，叫做肛门腺。肛门腺将分泌物通过小管排入肛门，在排便时起着润滑作用。由于种种原因，造成肛门腺导管的阻塞，使腺体分泌物在腺体内积聚。

〔症状〕

病猫不时蹲伏，用舌舔拭肛门腺体，精神受到烦扰。腺体感染细菌可形成脓肿。

〔治疗〕

请兽医作肛门腺检查。检查时手术者戴上消毒的指套，助手清洗肛门后，一个手指插入直肠，其他手指予以配合，检查肛门腺体有无肿胀或脓肿。正常肛门腺的分泌物为清亮微黄的液体，每次压出量只有一滴。肛门腺阻塞时，分泌量增多，呈淡棕色，并混有白色脓汁。肛门腺脓肿，应手术切开排脓，术前局部麻醉。

21. 肝炎

肝脏是机体的营养“工厂”，肝脏负担着糖、蛋白质、脂肪和某些维生素的代谢任务，自消化道吸收的各种营养物质需经肝脏的加工处理，然后输送到机体各个部分。肝脏在

血红蛋白代谢中也起着重要作用，血液中的胆红素是血红蛋白的代谢产物，当肝脏有疾患时，肝脏转化和排泄胆红素的能力降低，血液中胆红素的浓度升高，患猫会出现黄疸。肝脏又是机体解毒的一个重要器官，肝脏有病，使机体解毒能力下降，由此可继发某些有关的疾病。

〔病因〕

引起肝炎的病因是多方面的，如细菌、病毒、毒物等。

〔症状〕

病猫精神沉郁，可视粘膜黄染，其中以结膜、巩膜最为明显。食欲极差，腹泻与便秘交替发生。偶有神经症状，如肌肉震颤，精神兴奋等。如果转为慢性肝炎，腹围增大，内有腹水，触诊有波动感。

为了进一步认识肝炎的性质，需由兽医院化验室作血、尿、粪有关肝功能的检验项目，通过鉴别、分析，得以确诊。

〔治疗〕

针对病因给予对症疗法。同时给予葡萄糖、类固醇等药物。猫食中尽量减少含脂肪的食物。对于治疗无望的慢性肝炎，征得猫的主人同意，可行安死术。

22. 直肠脱

直肠脱主要发生于频频腹泻的小猫，由于排粪时用力努责，致使直肠脱出。脱出的直肠呈红色，指头大小。

直肠垂出后，立即请兽医治疗。全身麻醉，整复脱出的直肠，暂时缝合肛门括约肌。防止患猫发生休克，急救之后，针对病因，根治腹泻症。

（五）呼吸系统疾病

1. 鼻卡他

鼻卡他是鼻粘膜的表层炎症，比较常见。

〔病因〕

常因流感病毒损害了鼻粘膜，从而葡萄球菌、链球菌等致病菌乘机而入，继发感染，导致鼻卡他。

〔症状〕

患猫不时的打喷嚏，鼻有浆液性或粘性、脓性分泌物。食欲不佳，体温一般都在正常范围。

〔治疗〕

首先让猫好好休息，并加强饮食等方面的护理。一般不需药物治疗。当出现脓性鼻涕或体温偏高的，早期使用长效或广谱抗生素也有必要。

2. 鼻窦炎

鼻窦的炎症大多是由鼻腔的疾病蔓延所致。本病的早期症状不太明显，容易被主人忽略。但其病情发展很快，先从单侧鼻孔流出灰白色脓性鼻涕（图33），随后呼吸音增粗，突然打喷嚏，分泌物时多时少。压迫窦部的皮肤和骨骼，患猫显示不安，似有疼痛。X光拍片有助于诊断。

使用长效或广谱抗生素治疗无效的，可作外科圆锯术，术前要全身麻醉。

3. 喉炎

〔病因〕

通常继发于呼吸道病毒的感染，感染后使喉部粘膜受到损害，细菌趁机侵入并生长繁殖。

〔症状〕

患猫有食欲，但突出的、引人注目的是吞咽困难。叫声异常。触压喉头诱发出连续性咳嗽。体温有的升高达40℃，

有的趋于正常。



图33 鼻涕

〔治疗〕

注射长效或广谱抗生素，同时配合可的松类药物，连用5天。不要经口腔投药，以防误咽。

4. 过敏性喉炎

〔病因〕

多因黄蜂刺螫或昆虫叮咬所致。

〔症状〕

喉部肿胀（水肿），呼吸迫促或困难。

〔治疗〕

注射抗组织胺及类固醇等药物。呼吸高度困难而有窒息危险者，应立即进行气管切开术。术前要全麻或局麻。

5. 喉部肿瘤

有时见于老龄猫。

〔症状〕

猫的叫声失于正常，呼吸伴有鼾声，呼出气带有臭味。强行打开口腔，患猫显示疼痛。

本病很难医治，预后不良，征得主人的同意，尽早给以安死术，减少患猫的苦痛。

6. 支气管炎

〔病因〕

先是受到病毒的感染，支气管粘膜及其防御机能遭到损害，其他有关细菌继发感染所致。

〔症状〕

咳嗽，鼻有分泌物，先是浆液性逐渐变为粘液性或脓性，支气管内有渗出物，肺部体表听诊可闻干性罗音或湿性罗音。体温正常或上升到 $40-40.6^{\circ}\text{C}$ 。呼吸稍显困难。

〔治疗〕

选用广谱抗生素，肌注或口服，疗效良好。也可同时配合可的松类药物。

7. 肺炎

〔病因〕

肺炎主要是细支气管和肺泡的炎症。致病细菌由支气管侵入肺泡，肺泡内产生炎性渗出物，渗出物中含有血浆及红、白细胞等，一旦渗出物充满肺泡，肺泡失去气体交换机能，造成机体缺氧，危害性很大。另外，某些病毒、寄生虫也可诱发肺炎。

〔症状〕

呼吸困难，体温上升（ 40.6°C 左右）及全身违和是本病

的主要症状。有时发出弱咳。肺部X光拍片，有助于确诊。血检，白细胞总数上升的居多，有的下降。

〔治疗〕

患猫应该养在安静、温暖、空气新鲜及有散射阳光的处所。给以牛奶、肉汤等流体食物。及时注射或口服广谱抗生素。由寄生虫所致者，按寄生虫病处理。

8. 胸膜炎

〔病因〕

通常伴发或继发于肺炎。细菌或病毒侵入胸腔，引起胸膜发炎，继之产生大量炎性渗出液，压迫肺叶，影响呼吸。胸膜炎是一种严重疾病。

〔症状〕

呼吸困难，胸壁触诊敏感是本病的主要症状。患猫不愿俯卧，因俯卧渗出物挤压肺脏，呼吸换气更加不畅。触压胸侧显示疼痛不安，如果用力按压可导致休克死亡。如将猫背翻转朝下，呼吸立即出现高度困难。心音微弱，体温升高到41℃以上。胸腔穿刺，大量胸水呈黄色或棕红色，容易凝固。胸部X光拍片或超声波检查有助于确诊。血检，白细胞总数常明显增多。

〔治疗〕

胸水过多影响呼吸时，用专用套管针抽取胸水，抽前最好将猫麻醉。同时注射广谱抗生素。本病一般难于治愈。

9. 胸腔积水

胸积水常继发于肺间淋巴腺癌（淋巴肉瘤）或充血性心力衰竭。

患猫呼吸困难，头颈前伸用力吸气。口膜及眼结膜发

紺。胸腔穿刺阳性，胸水多呈浆液性。继发于心力衰竭者，胸水则为非炎性漏出液。

本病不易治愈，可向猫的主人建议，给予患猫安死术。

10. 气胸

继发于胸壁透创，如汽枪伤、机械创伤等。胸腔中积有多量气体。

发病后立即呈现急性进行性的呼吸困难。应立即送兽医院急救。首先对猫全身麻醉，清理并缝合伤口，然后以无菌操作抽出胸腔的积气。肌注长效或广谱抗生素，加强一系列护理措施，如无复杂而严重的感染，可望康复。

（六）泌尿系统疾病

1. 膀胱炎

通常是由细菌感染所引起的，母猫比公猫多发。膀胱炎也是膀胱结石或膀胱积砂的一种症状。

〔症状〕

频尿是本病的突出症状，排尿次数增多，但每次尿量却很少。细心的主人容易发现这种异常表现。尿检，尿的酸碱度（PH）上升，尿中混有红细胞（显微镜检视），从尿中可以培养出致病菌。患猫喜欢饮水。运步有些强拘。如不及时治疗，体温可比常温升高0.5—1.5℃。

〔治疗〕

设备条件较好的兽医院，对于细菌性膀胱炎最好预作细菌药敏试验，从中筛选行之有效的抗生素治疗，直到痊愈为止。一般的兽医院可给患猫口服氨苄青霉素，每次每公斤体重10—15毫克，每6小时一次，也可肌注四环素，每天每公

斤体重11—22毫克，分作两次。如久治不愈，是否存在膀胱结石，应作进一步检查。

2. 膀胱结石

一般多发生于母猫。目前病因尚不太清楚，可能与饮水和食物中的碱性物质有关。

临床症状与膀胱炎极为相似，但尿中的红细胞含量更多，有时肉眼观察便可看到其中的小凝血块，尿液微红，放置片刻，尿瓶底部有沉积的红细胞痕迹。

X光拍片有助于诊断。一旦确诊，应全身麻醉，切开膀胱，取出结石。

如果条件许可，可对结石进行化学成分分析，根据所含成分，在饮食方面采取预防措施。

3. 膀胱积砂

〔病因〕

目前尚不太明了。饲喂干食物的易患本病。尿中的鸟粪石(6—磷酸氨镁)析出后形成细砂样晶体，这些晶体能阻塞尿道。公猫的尿道有个特点，即它在耻骨弓部位突然变细，内径由3毫米变为1.5毫米左右，尿中的超常晶体或小的结石可在此处形成阻塞。

〔症状〕

患猫食欲废绝，反复试图排尿，类似便秘时的排便动作。公猫想要排尿时往往改变了平日的姿势。目的是为了加大腹压，并焦急地窥视腹侧。患猫不时地舔拭包皮区。腹部触诊可以摸到坚实膨大的膀胱。不完全阻塞的病例，可见少量血尿。病情严重的反复想要排尿，结果常是无尿排出。病的后期出现呕吐，最后继发尿毒症死亡。

〔治疗〕

最好的疗法是将患猫全身麻醉，切开膀胱，清除其中的所有积砂。如果积砂严重阻塞尿道，治疗效果不太理想。如果术前膀胱积尿过多，最好先用细小针头将膀胱积尿缓缓吸出较为妥当。术后配合抗生素治疗。

〔预防〕

平时充分供给饮水，猫食最好是半干半湿，保持尿液的适当比重，以免鸟粪石结晶的形成。据有关材料报道，猫的尿道阻塞，由鸟粪石结晶所致者占99%。鸟粪石的主要成分是磷酸氢镁，所以平日少给含镁较高的食物，其中如牛肉、鳕鱼、青鱼、鲱鱼（罐头）、沙丁鱼等。多喂些含镁少的食物，如牛奶、鸡蛋、胡萝卜及午餐肉等。

4. 膀胱麻痹

〔病因〕

本病常常继发于膀胱结石或膀胱积砂。由于膀胱内的沙、石，排尿不畅，膀胱积尿扩张，慢慢导致膀胱肌肉弛缓，收缩无力，影响了正常的排尿机能。

〔症状〕

本病引人注目的临床症状是尿液淋漓。淋漓是膀胱积尿、排尿不畅与排尿失禁的综合表现。在膀胱体表投影的腹部叩诊，可闻膀胱积有尿液的胀满声音。

〔治疗〕

膀胱积尿过多而不能自排，应行膀胱穿刺术（针头尽量要细一点），抽出积尿，以防膀胱破裂，这一急救措施不容忽视。注射抗生素或对泌尿系统疾病有特效的磺胺药物，如磺胺二甲异嘧啶、磺胺乙氧嘧啶等，预防继发感染。

给患猫温和的按摩腹后部，促进膀胱肌肉逐渐恢复收缩力，以利排尿，可以试用，有益无害。

每天用无刺激的肥皂水或硼酸溶液等清拭患猫的尿道口及其周围，保持局部卫生。

5. 肾炎

肾脏是动物机体的一个重要器官。通过它可将血液中代谢废物排出体外。肾炎是肾小球的炎症。猫的急性肾炎较少，多发的是老龄猫的慢性间质性肾炎。

〔病因〕

细菌感染是其主要原因，淋巴肉瘤也可引起肾炎。老龄猫的慢性间质性肾炎的发病机理值得研究。

〔症状〕

患猫食欲不振，体况日渐下降，甚至骨瘦如柴。口腔常有溃疡，口腔气味恶臭。但饮欲旺盛，总喜欢水。腹部触诊具有诊断意义，患猫的肾脏增大或萎缩，肾的表面呈结节状。尿检，尿中出现肾上皮细胞、红细胞及白细胞等，尿的比重增高或降低，尿中蛋白质阳性反应。

〔治疗〕

病初可试用广谱抗生素口服。病情恶化而医治无效的老齡患猫，征得主人的同意，可行安死术。

（七）生殖系统疾病

公猫的生殖系统，除了肿瘤之外，很少发生疾病。母猫的生殖系统疾病有子宫疾病、阴道疾病和乳房疾病等。

1. 子宫炎

〔病因〕

本病主要见于经产的母猫。多是由于死胎或产后胎衣不

下引起的。

〔症状〕

产后从阴道排出恶臭的分泌物。患猫食欲不振或废绝，精神不安，对生下的仔猫淡漠，甚至置之不理。泌乳极少，体温升高到 40.6°C 或以上。口渴，好饮。

〔治疗〕

及时确诊，肌注抗生素效果良好。

2. 子宫蓄脓

〔病因〕

主要见于流产后子宫受到致病微生物的感染。未经产的成年母猫也可发生。去势摘除子宫的母猫不患此病。

〔症状〕

口渴，饮欲增强，有时呕吐。子宫积液，腹部膨大，腹部深部触诊，可以触到胀大的子宫。阴门附有脓性分泌物。正常妊娠则缺乏口渴、呕吐等异常症状。腹膜炎则腹腔穿刺阳性。三者应注意鉴别诊断。

〔治疗〕

早期应用抗生素治疗效果良好。一般本病多在中、后期出现口渴及过度饮水时才被主人发觉，药物治疗往往收效甚微。最好是请兽医作子宫和卵巢摘除术。

3. 子宫脱

子宫脱只见于产后的母猫。一侧或两侧的子宫角都会脱出。

发生子宫脱后，将患猫放在有柔软洁净铺垫物的筐内或纸箱内，寒冷季节注意保温，急送兽医院予以整复。如果不想再让它生育，可行外科手术，将子宫、卵巢和输卵管一起切

除。

4. 阴道炎

由于发情季节交配造成的阴道粘膜损伤。

患猫频作排尿姿势，从阴道内排出混有血液的粘液或脓汁，并不时地舔拭它的阴门。

局部或全身应用抗生素，如果治疗及时，预后良好。

5. 阴门炎

病因、症状及治疗与阴道炎相似。

6. 乳腺炎

引起乳房炎的常见原因有三：一是母猫乳汁不足仔猫过度吮吸受到细菌感染；二是仔猫死亡或丢失，乳汁停滞在乳房内；三是乳房损伤继发感染。

〔症状〕

急性乳房炎，乳房及乳头红肿、疼痛，体温升高到40.6℃左右，乳区发热，患猫拒绝触压。母猫不让仔猫哺乳。

慢性乳房炎，常是1—2个乳头发炎，乳汁呈水样，内有小的凝乳块。

〔治疗〕

母猫肌注广谱抗生素，仔猫由人工哺乳，如果仔猫已经吃食，可以考虑提前断奶。

7. 产后出血

产后出点血是正常现象。如果出血量较多或出血时间较长多属病态。

〔症状〕

少量继续出血，产道可能存在小的损伤，患猫照常给仔猫哺乳，其他几乎不见异常，经检查，损伤多在阴道或外阴。

多量出血，可能产道发生严重损伤或子宫收缩缓慢，患猫全身无力，眼结膜颜色较淡，应急去兽医院诊治。

〔治疗〕

产道小的损伤，按照外伤常规处理，常能自愈。对于严重的损伤给以止血剂、抗生素及促进子宫收缩剂等。确诊为子宫破裂时，应立即手术，开腹缝合或切除子宫。

8. 乳热症

本病见于哺乳期，患猫在此期间血钙含量有所降低，有时下降较多。但有的产猫外观瘦弱，产仔也不算少，哺乳期间不一定发生此病。除了与血钙下降有关之外，是否还存在其他诱发因素，目前尚不清楚，值得进一步探讨。另外一个问题也是个谜，即首次哺乳期发生过本病，以后产仔哺乳还会复发。

〔症状〕

各个患猫的临床症状不尽一致，但一般可见共济失调、肌肉抽动、四肢痉挛。产猫被移动时痉挛加剧，甚至惊厥。

〔治疗〕

严重病例，20%葡萄糖酸钙溶液5—10毫升皮下或静脉缓缓注射，为了急救最好采取静脉输入途径。如果惊厥症状仍未完全消除，间隔一段时间，可重复注射，直至痊愈为止。如果所生的小猫已到或临近断奶时间，可以断奶改为人工饲喂。每日三次，喂后放回母猫身边，这样可以缓解患猫的症状。另外，每天可在母猫食物中加碳酸钙或乳酸钙1克，继续保持血钙的生理水平。有条件的兽医院，在给患猫输注钙剂之前，最好测定一次血钙含量数值，愈后再复测一次，从中总结经验，进一步探讨发病机理。

〔预防〕

母猫妊娠后期，主人对猫食中钙质含量应予以注意，对钙质供给不足者，要科学的增补钙剂，钙、磷比例应是1:1，钙量过多并非好事，甚至适得其反。

（八）脑和神经疾病

1. 热射病和日射病

〔病因〕

炎热季节，头部受到日光直射过久，可导致脑及脑膜充血和脑实质的急性病变，造成中枢神经系统机能障碍，叫做日射病。猫较长时间处于潮湿闷热的环境之中，新陈代谢旺盛，产热多，散热少，造成体内积热，致使中枢神经系统机能紊乱，叫做热射病。

一般家中养猫很少发现本病。供作实验研究或其他用途的养猫，炎热酷暑天气被关在闷热通风不良的兽笼里，加上供水不足等因素，或在运送途中曝晒时间过久，容易致发本病。

〔症状〕

患猫体温明显上升，有人报道严重者可比正常体温高出5℃。呼吸困难，精神恍惚。有的甚至虚脱。

〔治疗〕

首先将患猫移至通风背阴处所，用冷水擦试猫体，促进散发体内积热，或用冰棒或冰袋置于头部片刻，缓解脑及脑膜的充血状态。上述措施如不收效，应立即转送兽医院急救。

2. 脑出血

一般见于老龄猫的动脉硬化，偶发生于意外事故。

〔病因〕

患猫凝视,转圈,颇似中耳炎的症状。不同的是本病常伴有一侧性不全麻痹,步态蹒跚。

〔治疗〕

精心护理,让患猫安静、舒适的休息,减少脑的出血。只要出血不太严重,可望逐渐恢复。

3. 脑膜炎

脑膜是指脑组织和脊髓外面的几层膜,脑膜炎即是这几层膜的炎症。患本病猫会有生命危险。

〔病因〕

伤口感染或脓肿扩散的细菌侵入脑膜所致。

〔症状〕

体温升高可达 41.7°C 左右,患猫口渴,运步共济失调,行走蹒跚,甚或突然摔倒在地。如不及时诊治,可出现顽强而难于控制的全身痉挛。

〔治疗〕

病的早期给以较大剂量的广谱抗生素,一般疗效良好,不会造成后遗症。一旦全身出现痉挛,预后多不良。医治无效者可考虑施以安死术。

4. 面神经麻痹

面神经通过两耳的后方分支于面部两侧。

〔病因〕

造成面神经麻痹的原因有二:一是颅腔内脑肿瘤压迫面神经;二是由于外力、外伤或脓肿损害了面神经,从而致发本症。一般多见于后者。

〔症状〕

临床上多是一侧性面神经麻痹，麻痹侧面部肌肉松弛，唇扭向健侧，吃食不便，从患侧口角流涎。

〔治疗〕

由于外伤、脓肿引起的，待原发病痊愈，面神经的机能也随即恢复。由于脑肿瘤所致者，一般疗法无效，进行颅脑手术切除肿瘤似不必要。建议给患猫行安死术。

5. 桡神经麻痹

〔病因〕

桡神经通过肩外肌肉（主要是肱三头肌），控制有关某些肌肉的伸展。由于机械性打击、压迫或其他意外事故致使该神经损伤、麻痹。

〔症状〕

患肢肘关节以下的关节屈曲，该肢无力提举，影响向前迈步。

〔治疗〕

细心护理，局部按摩，每天2—3次，每次10—15分钟。局部涂擦樟脑酒精并口服维生素B。为了预防有关肌肉萎缩，可用低脉冲电疗、感应电疗、红外线疗法、TDP疗法以及肌注氢溴酸加兰他敏等。针灸有良好效果。每天让患猫适当活动，促进痊愈。

（九）代谢疾病

1. 糖尿病

主要发生在去势的老龄猫。

〔病因〕

胰脏分泌胰岛素不足，致使糖代谢失调，血糖升高，尿

糖检查成为阳性。大剂量长时间使用可的松之类药物也可导致胰岛素分泌减少。

〔症状〕

患猫饮欲增强，尿量增多，尿比重增大。体况日逐下降，变得消瘦无力。病期一旦施久，晶状体上会出现白内障，影响猫的视力。血糖明显升高，血糖量超出糖的肾阈，尿中排出葡萄糖，尿糖检查阳性。

〔治疗〕

确诊之后，患猫如系名贵品种，主人爱不释手，可以每天皮下注射精蛋白锌胰岛素5—15单位，猫食勿需改变。病猫的抵抗力与免疫力下降，容易受到致病性细菌感染，不论继发什么疾病，都要及时予以诊治。无价值的猫，征得主人的同意，可考虑淘汰。

2. 尿崩病

〔病因〕

由于脑垂体发生问题，抗利尿素分泌减少，降低了肾小管对原尿的浓缩机能，机体经常失水过多，造成脱水。

〔症状〕

由于患猫失水过多，自感口渴，嗜好大量饮水。尿量增多，排尿次数频繁，但尿比重明显下降，这是本病的特有症状。对病猫不允许进行尿液浓缩试验，以免造成更加严重的脱水，有害无益。

〔治疗〕

可肌注鞣酸加压素（尿崩停），每次1—5国际单位，每3天一次。

3. 脂肪组织炎（黄脂症）

喂鱼类食物太多，如毛鱼、鱼罐头、金枪鱼等，其中特别是后者，更易致发本病。鱼类过多，使食物之间的相互营养比例失调，维生素E不足或缺乏。

〔症状〕

皮下脂肪（尤其是腹部脂肪）呈现黄色或橙黄色，患猫精神不振，不愿活动，常蹲伏于僻静处。本病外观好似急性肝炎的黄疸期，但经一系列的肝功能检查，其值基本正常。以此可以相互鉴别。当然，有经验的兽医容易得出诊断。

〔治疗〕

肌注维生素E和维生素B，同时口服维生素E胶丸。

（十）骨骼疾病

1. 幼猫的骨营养不良

见于6—8周龄的小猫。

〔病因〕

主要原因是猫食中钙质供给不足，导致钙、磷比例的失调，不合正常比例的钙、磷不能很好的构成骨骼的正常结构。本书在猫的营养需要和饲喂项内曾经提及，钙、磷比例最好是1：0.9—1.1。有人研究报道，如果小猫只喂给剁碎的牛肉或羊的心脏，不到两个月小猫就会发生本病。众所周知，瘦肉里的钙含量是不太多的。

〔症状〕

患猫最容易引人注目的现象是不愿活动，更不愿玩耍戏嬉。继之一肢或数肢弯曲变形（图34），运步行走时显示疼痛，容易发生柳枝样骨折。病猫痊愈后，由于骨盆变形，分娩时可能难产，同时也是造成慢性便秘的一种原因。

〔治疗和预防〕

牛奶中钙质含量较多，正在生长发育的小猫喂些牛奶是必要的。但是牛奶中的蛋白质数量不能满足猫体的正常需要，因此给些肉类加以弥补。经常喂给牛奶或奶酪的小猫，一般不会发生本病。

2. 维生素A慢性中毒引起的骨营养不良



图34 肢弯曲变形

〔病因〕

往往由于猫主人只知维生素A对猫有好处，平日超量供给，结果事与愿违。

〔症状〕

成年患猫关节周围可以触到或看出增生性外生骨疣，其中尤以颈椎和前肢关节容易发生，但其他关节也有程度不同的该种病变。严重者病变关节强直，不能打弯，走路艰难。

〔治疗〕

按照营养标准（见本书有关项目）及时地科学地减去超量的维生素A，平日给猫喂肝也不要过多。已经形成外生性骨疣者难医。

3. 遗传性四肢骨营养不良

本病近年有所报道，多见于耳为卷皱型的猫，并由母猫

传给仔猫。患猫的尾骨、趾跖骨和腕掌骨显示骨质营养不良，10周龄后通过X光检查可以确诊。目前本病尚无任何疗法。建议尽早淘汰。

4. 骨折

猫的骨折是常见病。由于目前X光诊断和外科矫形术在兽医临床上的广泛应用，骨折治愈率很高，其治疗方法与人医相似。

(1) 骨盆骨折

常由于车祸或外力撞击等事故所致。骨折的头几天给以镇痛药，开始治疗的第一个月应适当限制患猫的活动。一般预后良好。

(2) 猫爪骨折

偶发于猫的相互格斗。进行局麻或全麻，切除折断的猫爪，稍加外科处理，不日即可痊愈。

(3) 颌骨骨折

颌骨骨折比较多见，常因砸伤或汽枪击伤所致。可用金属丝将骨的断端固定，加强局部卫生和饮食护理，一般效果良好。



图35 截肢猫

(4) 长骨骨折

〔病因〕

机械损伤或汽枪击伤是本病的常见原因。

〔症状〕

不完全性骨裂或柳枝样骨折，骨折部肿胀，患肢数天不敢着地，此时加强综合性护理，尽量减少患猫的活动，经过若干时间，可以不治逐渐自愈。

完全骨折的典型症状为：患肢不敢负重，骨折端悬垂摆动，骨折处肿痛，步态异常，活动时发出轻微的骨断端摩擦音。骨折端整复后患肢变得略短。

〔治疗〕

先用X光拍片查明骨折及其周围损伤情况，经过外科整复手术，一般可以愈合。遗憾的是患猫不与兽医人员相互合作，有时会使石膏绷带陷于失败。也可考虑应用内固定法，效果良好。

(5) 切除术

切除术是将一条腿或尾巴等部分或全部截除的手术。实验证明截肢后的猫仍能很好的生活，因为猫有着极强的适应能力（图35）。

截肢主要用于一些不可逆的或将危及患猫生命的疾病。如骨癌、恶性骨髓炎、粉碎性骨折和严重感染等。术前应进行全身麻醉。

5. 骨髓炎

骨髓炎多继发于骨的严重损伤或骨瘤。一旦临床获得确诊，尽早应用较大剂量的广谱抗生素，可以收到一定疗效。否则，应建议行截肢术。

（十一）中毒疾病

1. 磷化锌中毒

〔病因〕

磷化锌为无机磷制剂，是一种曾经广泛应用广大农村的杀鼠药。猫常因误食被该药毒死或即将死亡的老鼠而招致中毒。

〔症状〕

中毒后发病极快，病初的症状是反复发生呕吐，其他症状还有食欲废绝、嗜眠、呼吸迫促、腹痛、肌肉颤抖等。呕吐物中有时混有暗色液血。最后共济失调、全身无力、卧倒、缺氧死亡。死前体温可降到 35°C 以下。从发病到死亡为6—24小时。能拖延3天不死的则有恢复的希望。

〔治疗〕

目前尚无特效解毒法。病初可选用2~3%碳酸氢钠溶液、0.2~0.5%硫酸铜溶液或0.2~0.5%高锰酸钾溶液洗胃，阻滞磷化锌的吸收、延缓磷化锌的分解或与磷化锌结合成无毒的化合物。投服硫酸钠导泻。为了保护肝脏可静注高渗葡萄糖溶液。禁用蓖麻油作为泻剂。

2. 食盐中毒

〔病因〕

本病比较少见。多因猫主人没有经验，喂给猫的残羹中含盐量过大，同时猫正饥饿不择而食，引起中毒。不可用咸鱼、咸肉喂猫。

〔症状〕

患猫极度口渴，爱饮清水，食欲废绝，有时呕吐。严重者可倒地昏迷，缺乏反应。如不及时抢救，可导致死亡。

〔治疗〕

可用清水洗胃。肌注强心剂，保护心脏功能。腹腔内注入5 %葡萄糖溶液，促进体内多余的氯化钠由尿中排出体外。神志恢复后，经常给些清水，但一次不可过饮，缓缓补充体内水分。出现痉挛症状者，应给以镇静剂。

（十二）皮肤疾病

1. 皮肤真菌病

〔病因〕

感染猫的真菌有两种，即犬小孢子菌和须毛癣菌，98 %是犬小孢子菌。它们主要侵害猫的皮肤、毛发和猫爪。健康成年猫身上带有此等真菌，但无任何临床症状。

〔症状〕

猫癣多见于营养不良的小猫或体弱多病的成年猫。猫的头前部、耳部、趾和腿部容易发生。急性感染可见患处皮肤有分泌物，随着病的演变逐渐变成有刺激性的干燥圆形斑疹（钱癣）。如不及时治疗，病区向四周扩散，侵害表皮、真皮、毛发、毛囊，形成秃毛区，甚至引起皮肤的过敏反应。

〔诊断〕

刮取患部皮屑（刮至表面即将出血为止），制作抹片镜检，查看有无真菌孢子，最好同时再做真菌培养。如果首次检查未能见到真菌孢子，可在患部皮肤予以紫外线照射，借以促进真菌的增殖，几天后再刮皮屑进行镜检。

〔治疗〕

目前尚无特别满意的疗法。一般可服灰黄霉素，每公斤体重50毫克，每日2~3次分服，至少服用3~4周。其他还有克霉唑软膏、复方苯甲酸软膏、硫黄软膏、2% 硝酸咪康唑亲

水软膏及癣净等。治疗期间每天在猫食中加植品油4 毫升左右,促进口服药品的吸收。局部也配合皮质类固醇治疗。

治疗期间,与猫体接触过的铺垫物等每天都要清理更换并将其烧掉。不怕火的用具可用喷灯消毒。

猫癣极易传染给人,这一点请有关人员注意。

2. 秃毛症

〔病因〕

主要由于血液中激素平衡的失调所致(图36),多见于去势的猫。有的可能与遗传因素有关。




图36 秃毛

〔症状〕

被毛的脱落往往先从臂部、头部和大腿内侧开始,如不及时查明病因予以治疗,脱毛区会自腹部向周围蔓延。

先天性秃毛症,脱毛的区域将会涉及全身,未秃的部位被毛稀少,随着年龄的增长,全身被毛将会完全脱光,同时

皮肤出现皱褶。

〔治疗〕

后天性者可用激素调理，先天性者目前尚无办法。有遗传性的猫最好淘汰。

3. 湿疹

湿疹是个广义的皮肤疾病概念。由于致病的原因不同，湿疹的类型也各有差异，做出正确的鉴别诊断往往是不容易的。

(1) 蚤湿疹

因蚤的严重寄生所致。

患处皮肤复盖着褐色物，由于患猫的不断舔咬，病区湿润发炎，同时在猫体可以找到跳蚤和黑色颗粒状的蚤粪。

只要设法消除蚤的寄生，皮肤湿疹就会很快痊愈。灭蚤可用0.5~1%精制敌百虫水溶液喷洒或药浴，两周后再重一次。如果天气温暖或是盛夏，药浴最为理想。敌百虫高效、安全、对人毒性也不大。猫窝的铺垫物勤于更换，旧的焚弃，切断蚤的繁殖环节。居室的清洁卫生也很重要。

(2) 其他寄生虫性湿疹

虱和姬螯螨的寄生也可引起湿疹，但危害性较蚤为小。大量的皮屑、头垢是本病的临床特征。可用敌百虫消除寄生。

(3) 过敏性湿疹

〔病因〕

病因复杂，可能与营养物质失调有关，本身的因素也不容易忽视。有时见于以鱼为食的猫，因此有人叫它“鱼性湿疹”。但是偏食鱼类可能不是直接的激发因素，机体激素平

衡失调和维生素B缺乏也与本病有关。

〔症状〕

患猫的体、背两侧有小的结痂区，该区被猫舔咬导致损伤发炎，上附分泌物，如不及时治疗，结痂病损可逐渐延至全身。

〔治疗〕

有人用雌性激素和维生素B混合注射，同时口服甲状腺浸出物药片，疗效良好。注射长效可的松可缓解痒感。最根本的是调整猫的食谱，尽量做到饲喂科学化。

4. 疣

疣是指皮肤上的良性增生物，有时叫做乳头状瘤。是由病毒引起的。

疣可能是单个的，也可能是成群的。多发生在头部、眼周、嘴部、耳部、颈部和肩部，偶见于腹部。

一般不需治疗，长到某些时候可以自落。假如影响到眼、嘴的正常视、食，可请兽医切除。

（十三）眼的疾病

1. 结膜炎

眼结膜是指衬在眼睑里面的睑结膜和复盖于巩膜前部的球结膜，睑结膜与球结膜之间的裂隙叫做结膜囊。

〔病因〕

室外放养猫在穿过丛生的花木间隙时，花粉、尘埃等异物误入眼内，刺激结膜引起炎症，继之细菌趁机生长繁殖，会使病情加重。

结膜炎也是猫流感的一个症状。

〔症状〕

结膜潮红，眼角可见粘性或脓性分泌物。一般外因所致者无全身症状。流感病毒引起的，体温明显升高，全身违和。

〔治疗〕

眼内误入异物，可用微温的生理盐水或淡盐水反复冲洗，直至将异物清除为止。随后上抗生素眼膏或点抗生素眼药水。1~2天可愈。

由流感病毒引起的，按“流感”进行全面疗法。

2. 角膜炎

角膜是复盖在眼球中央表面的一层透明的角质膜，好似球面玻璃。角膜上皮在角膜外周移行为眼球结膜的上皮。

〔病因〕

致发角膜炎的原因约有三点：一是继发于细菌性结膜炎；二是外力、异物将角膜损伤；三是维生素A缺乏。一旦角膜表层细胞受到损伤，可导致角膜溃疡等系列病变。

〔症状〕

角膜混浊，结膜充血，眼角有浆性、粘性或脓性分泌物，病猫的上、下眼睑被粘性、脓性分泌物粘合一起。严重外力致伤，可使角膜缺损。

〔治疗〕

首先用微温生理盐水冲洗患眼，并拭去眼周分泌物，滴入抗生素眼药水，每天3次。避光，安静休息。角膜溃疡或缺损处有时会形成疤痕，只要瞳孔未被遮蔽，问题影响不大。

3. 青光眼

由于眼房角阻塞，眼房液排出受阻致使眼内压增高，可发生于单眼或双眼。

〔病因〕

角膜是靠淋巴液来滋养的,但淋巴液回流一旦受阻,眼内积液,眼压升高,形成本病。其实有原发性的,也有继发性的。

〔症状〕

患眼不见炎症病状,眼内压增高,眼球增大,视力逐渐下降。病初角膜透明,后则变为混浊。瞳孔散大,瞳孔失去对光反应功能。

〔治疗〕

目前尚无比较满意的疗法。病的早期不易被人发现,往往失去了治疗机会。病的中、后期可请兽医做眼科手术,摘除晶状体或整个眼球。如果是单眼患病,可以考虑手术。

4. 眼睑内翻

造成眼睑内翻的原因,一是由于先天性的小眼睛;二是眼睑被同类在格斗中抓伤、结疤,眼睑收缩向内翻入。

内翻眼睑摩擦眼球,可引起角膜炎、角膜混浊及角膜溃疡等,患猫羞明、流泪,显示痛苦。

请兽医做校正内翻眼睑手术。一次不行,可再做一次。同时给以对症疗法,如滴抗生素眼药水等,防止继续受到细菌感染。

5. 白内障

晶状体混浊叫做白内障,本病猫少发,也有先天性白内障。

〔病因〕

病因是多方面的。

(1) 先天性的:由于晶状体及其囊在母体内发育异常,出生后即见本病。

(2) 外伤性的：由于机械损伤，使晶状体的营养发生障碍。

(3) 症候性的：多继发于睫状体炎和视网膜炎。

(4) 糖尿病性的：糖尿病的后期可导致发生本病。

(5) 老龄性的：这一类型的猫多见。

(6) 年幼性的：幼猫的代谢障碍，如维生素缺乏症、佝偻病等。

〔症状〕

晶状体混浊，瞳孔变色，视力减退，甚或失明。

〔治疗〕

病的早期，分析发病原因，给以有针对性控制疗法。晶状体一旦发生混浊，预后不良。最后可考虑做晶状体摘除术。

(十四) 耳的疾病

1. 外耳道炎

常由耳痒螨所致。

患猫时时扇动耳朵，或以其爪搔抓耳部，摇摆头颈，对着物体擦耳，神情不安。通过外耳道检视，可见外耳道内附有深褐或黑色渗出物（图37），刮取耳垢抹片镜检，如系耳痒螨所致，镜下可见虫体。

先用2%硼酸水溶液清拭耳垢及渗出物，然后用棉球蘸取1%敌百虫水溶液涂抹患处，5~7天再处理一次，观察疗效，必要时还可作第三次处理，直至痊愈为止。

2. 中耳和内耳感染

多继发于外耳道的细菌感染。洗澡不慎污水进入耳内也可诱发本病。



图37 外耳道炎

患猫举止不安，或摆头，或将头颈歪向一侧，步态蹒跚，甚至反复摔倒，有时朝向一个方向转圈。

治疗时首先将患猫全麻，用温和而有杀菌效果的药液清拭中耳、内耳，但不可伤及耳膜，清拭后涂抹广谱抗生素和类固醇药物。同时可肌注广谱抗生素。本病很难彻底治愈，常会留下步态不稳的后遗症。

3. 耳血肿

猫患耳病时（如耳痒病），用爪强力搔抓或在某物体上猛擦，一旦将耳廓皮下血管损伤，导致皮下血肿。

如果血肿很小，可以不予治疗，只要不再继续搔抓，皮下的出血自会慢慢吸收。否则，可将血肿切个小口，排出积血及凝块，以抗生素生理盐水冲洗，然后缝合刀口，如切口不大也可不缝。要根治原发病。

4.耳聋

耳聋的原因要进行具体分析。有遗传性的，如白化病的幼猫；有老龄猫内耳衰老骨化性的；也有因原发性或继发性细菌感染所致的暂时耳聋或不完全耳聋。

选种选购时要检查猫耳是否有病。

(十五) 疝

疝是腹腔内脏从自然孔道或病理性破裂孔脱至皮下或其他解剖腔的一种常见病。

1.腹股沟疝与阴囊疝

〔病因〕

因腹股沟管的撕裂或被牵拉，管腔增大，致使腹腔的肠管及肠系膜坠入其中。腹股沟管口的大小与遗传也有关系。

〔症状〕

有的患猫突然显示腹痛模样，坐立不安，表情痛苦。这时检查腹股沟，触知沟内似有柔软的肿胀物，稍加压力肿胀又复消失。肠管及肠系膜通过腹股沟管坠入阴囊，叫做阴囊疝，阴囊明显增大。

〔治疗〕

急去兽医院，请兽医做手术整复，预后良好。否则，拖延时间将会导致肠绞窄，后果不堪设想。

2.脐疝

〔病因〕

仔猫出生后脐孔闭锁不全，或产后母猫自食胎衣时将仔猫的脐带牵出，都可造成脐疝。

〔症状〕

仔猫脐带干脱后，脐部有个小“肿包”，有时“肿包”

较大，年青的小猫也可见到这种现象，但到成年后，“肿包”自然消退。假如肿包变为红色，并有腹痛症状，提示脐疝发生绞窄，应及时做手术整复。

〔治疗〕

小的脐疝不必治疗，随着个体的成长可以自愈。大的脐疝需要手术整复。有时母猫过分舔拭仔猫脐部，甚或造成腹壁穿孔和肠袢脱出，遇此情况，应去兽医院急诊，做修补手术。

3. 膈疝

〔病因〕

本病在猫较为常见。通常由于外力打击、高处坠落等意外事故引起，也有先天性的。

〔症状〕

膈破之后，腹腔脏器嵌入胸腔，使患侧肺叶萎陷，此时病猫引人注目的症状是高度呼吸困难，结膜发绀。有的资料记载胸壁听诊可闻肠鸣音，但更为确切的诊断是靠X光拍片。

〔治疗〕

全身麻醉，外科手术整复。手术越早预后越好。否则，嵌入胸腔的肠段一旦发生坏死，虽可将其截除，但后果不佳。

（十六）肿瘤

肿瘤是指组织上的新生物，分为良性肿瘤和恶性肿瘤。良性肿瘤生长缓慢，不扩散；恶性肿瘤生长快，可向周围组织和器官扩散，还可通过血流扩散到全身其他部位。

猫的肿瘤多属恶性，见于口、咽、喉、食管、肠管、淋巴结、皮肤及母猫的生殖器官等处。其中常见的是乳腺瘤和白血病。有时也见皮肤瘤和骨瘤。

1. 乳腺瘤

乳头下发生硬的肿块，一个乳头或几个乳头发病。腺癌扩散快。还有一种乳导管细胞癌。

早发现，早切除，以免扩散。

2. 白血病

见本书病毒疾病及细菌性疾病部分。

3. 皮肤瘤

据报道皮肤瘤有纤维瘤、组织细胞瘤、肥大细胞瘤、血管肉瘤、角化棘皮瘤、黑色素瘤及鳞状上皮细胞瘤等。

皮肤瘤治疗有以下几个方面。

(1) 外科手术摘除：这种手术技术要求高，经验要丰富，否则，反会加速猫的死亡。

(2) 放射疗法：目前国内兽医院好似尚未应用，有待建立。

(3) 化学疗法：抗肿瘤药物的使用要在具有实践经验的专家指导下才可进行，以免发生副作用。

(十七) 意外事故、急救及其他

1. 车祸

农村或城镇小巷有时发生猫的车祸。车祸发生后，猫主要一手托着猫的肩部，另一手托着猫的臀部，把它平稳地放在有铺垫物的纸箱内，防止患猫挣扎乱动，特别是骨骼的损伤。如四肢等处出血不止，应取一带子临时结扎止血，急送兽医院。寒冷季节注意保温。

2. 触电

猫玩耍带电软线或用嘴咬破电线都能发生触电，有时猫趾踏到电源也会发生意外事故。

遇到触电事故，猫主必须头脑冷静，首先拉开闸盒，切

断电源，不可有半点马虎。

急送兽医院抢救。如果一时不便，猫主将猫平放，伸展头颈，把舌拉出口外，用双手相互配合有节奏地按压患猫的两侧肋部，施以人工呼吸。直至患猫出现了自动呼吸，舌头伸缩自如为止。根据当时具体情况，可以反复进行人工呼吸。

切忌给患猫灌服酒、醋等物，不但与事无益，反而有害，甚或使猫窒息死亡。

3. 溺水

猫的游泳本事很强，一般不会发生溺水。最常遇到的是农村养猫不慎掉到水缸内，其中特别是细而高的水缸或其他装水器具，猫很难挣扎跳出。

猫溺水后，迅速抓住猫的颈背皮肤将猫捞出。随后倒手握住两后肢附关节上方，将猫在空中做垂直圆圈甩动几圈，甩出口、鼻及气管内的呛水。继之，平放猫体，进行人工呼吸，直至恢复呼吸为止。肌注抗生素，防止肺部细菌感染发炎。

4. 被毛沾染有害物质

猫的皮肤具有很强的吸收能力，因此，外界有毒物质（特别是液状物）沾染皮肤后常会引起中毒，甚或危及生命。平时常见的污染物有沥青、木溜油或油漆等。

沾染有害物质后，让助手抓住猫的颈部皮肤，将猫身体浸入加有无刺激性洗涤剂的温水中，进行耐心而细致地刷洗，实在无法洗掉的可把沾污的被毛剪除，以免猫舔污物中毒。浴后用毛巾揩干。如有异状，急请兽医诊断，是否已经吸收中毒，及时给以解救措施。

5. 烧伤和烫伤

猫在厨房寻找食物，有时误将炉灶上的汤锅弄翻，遭受烫伤。猫冬季畏寒，卧在炉台取暖或钻进尚有余火的灶堂，被火烧伤。

由于猫的感觉灵敏，动作敏捷，只要存在逃脱之路，一般不会造成严重的烧伤或烫伤。受烧伤者，被毛烧焦，皮肤红肿，较重的皮肤表面有血浆样渗出物。受烫伤者，烫伤处被稠密的被毛贴复，毛下皮肤水肿，或有小的水泡。

治疗时，剪去患部被毛，以3%硼酸水清洗伤区，用消毒纱布吸干，涂5—10%高锰酸钾水溶液2—3次，促进创面结痂，也可涂布抗生素软膏。严重的烧伤、烫伤，必须及时请兽医诊治，否则，会导致创面大范围的结痂，结痂脱落形成肉芽创，需要数月才能治愈。

6. 抓伤和咬伤

猫有时被同类或犬或鼠抓伤、咬伤，一般多在前肢。伤处有伤口及血迹，患猫不时以舌舔拭伤口。

治疗时先将伤口周围的污毛剪掉，用3%硼酸或抗生素生理盐水溶液清洗伤口，待干，涂抹紫药水。如伤口已经化脓，首先清除坏死组织，局部使用消炎杀菌药，全身应用抗生素或磺胺药。

7. 螫伤

猫喜欢在草丛中扑捉昆虫戏耍，有时被蜜蜂、黄蜂、土蜂等螫伤。如螫伤在猫的头部，头部肿胀，常会引起呼吸困难。应及时给患猫注射抗组织胺药物及抗生素，很快获得痊愈。如能找到螫伤处的螫刺，小心地用镊子将它摘除。

8. 异物缠绕

淘气的小孩用松紧带、猴皮筋或细线绳、细铁丝等将猫

的爪部、腿部或颈部缠绕，经过一段时间，局部肿胀。一旦发现，及时剪除，局部施以温敷，不药可愈。

9. 脓肿

脓肿是一种常见的猫病。多发生在腿部、头部、颈部及躯干。可能由于抓伤、咬伤未被及时发现感染所致。

脓肿不可过早的切开，否则，新的脓肿又会形成。全麻或局麻，切开成熟的脓肿，排出全部脓汁。清洗创腔，撒布抗生素，防止继发感染，伤口不久即可愈合。

10. 休克

车祸撞伤、手术切除大量组织、丢失过多体液及母猫分娩努责时间过久等，会使病猫血压突然下降、供氧不足以及体温下降，最后导致休克。

患猫不能起立，体躯末端发凉，可视粘膜苍白、发绀，心音弱而速，呼吸浅表，血压的低压极低，甚至一般血压计难以测出。

急请兽医抢救。抢救原则是输液、扩容、强心，活化微循环、防止酸中毒及供氧等措施。



附录一 健康猫常用生理数字

平均寿命12年（最高30年）

性成熟年龄7—14个月

平均性周期14天

平均妊娠期63天（60—68天）

产仔数4只（1—6只）

哺乳期60天

体温（直肠）38.0—39.5℃

呼吸频率15—32次/分钟

心率120—140次/分钟

（小猫168次/分钟）

尿量200毫升/天

尿液PH值6.0—7.0

附录二 猫传给人的疾病

（一） 病毒性疾病

病 名	病 原	传播途径	患病动物	注
猫抓热	疱疹病毒或衣原体或细菌	猫抓、咬	猫	主要见于儿童
狂犬病	狂犬病病毒	猫 咬	犬、猫和所有哺乳动物	
白血病	病 毒	接 触	牛、鸡、猫	是否传给人，尚有争议

(二) 细菌性疾病

病名	病原	传播途径	患病动物	注
炭疽病	炭疽杆菌	伤口、接触尸体、皮毛	牛、马、羊、猪、犬、猫	少见
肠炎	沙门氏菌 志贺氏菌	接触，进入消化道	猪、犬、猫、禽类	
气性坏疽	产气荚膜梭状芽胞杆菌等	通过伤口尸体剖检等	牛、羊、猪、马、犬、猫等	少见
出血性败血病	多杀性巴氏杆菌	通过伤口或叮咬	牛、羊、猪、马、犬、猫	少见
麻风病	鼠麻风分枝杆菌	接触	犬、猫、鼠	
伪鼻疽病	伪疽鼻假单胞菌	蚊子、跳蚤叮咬	马、羊、兔、犬、猫、鼠	
结核病	结核分枝杆菌	食物、吸入、职业接触	牛、犬、猫	
土拉菌病	土拉巴斯德氏菌	接触、消化道、昆虫叮咬	羊、兔、马、牛、犬、猫等	
诺卡氏菌病	星形诺卡氏菌	接触	牛、羊、犬、猫、野生动物	
隐球菌病	新生隐球菌	不太清楚	牛、羊、马、猫	少见
组织胞浆菌病	荚膜组织胞浆菌	自然接触，气源性	牛、马、犬、猫、鼠、鸽等	
钩端螺旋体病	钩端螺旋体	接触，消化道等	牛、犬、猪、猫、鼠等	
钱癣	小孢子菌、毛癣菌	接触及污染物	犬、猫、马、牛、猪、禽等	儿童最容易感染
衣原体病	鹦鹉衣原体	气源性，接触	牛、猫及其他哺乳动物	

(三) 寄生虫疾病

病 名	病 原	传播途径	患病动物	注
阿米巴病	痢疾阿米巴原虫	直接感染或苍蝇	猫、犬、猪、猿、鼠等	
钩虫病	犬钩虫、十二指肠钩虫等	幼虫穿透皮肤	猫、犬、猪	有时引起人的皮肤病
毛细线虫病	猫、犬肺线虫	接触	猫、犬	可引起人的支气管肺炎
枝睾吸虫病	华枝睾吸虫	吃生鱼	犬、猫及野生动物	
裂头绦虫病	阔节裂头绦虫	吃生鱼	犬、猫、吃鱼的哺乳动物	
犬绦虫病	犬复孔绦虫	跳蚤	犬、猫	
棘球蚴病	多室棘球绦虫	接触	犬、狐、猫、鼠等	
异形吸虫病	异形吸虫属	吃淡水鱼	犬、猫	
后睾吸虫病	猫后睾吸虫、麝猫后睾吸虫	吃淡水鱼	猫、犬等	
肺吸虫病	猫肺吸虫，卫氏吸虫	生吃小龙虾、蟹	犬、猪、猫等肉食动物	
血吸虫病	日本血吸虫	通过皮肤	犬、猫、鼠、牛等	
贾第虫病	兰伯氏贾第虫	通过食物和饮水	羊、犬、猫、猪、牛等	
泡翼线虫病	猫胃线虫	偶而感染	哺乳动物	
棘口吸虫病	伊族棘口吸虫	吃生蜗牛	犬、猫、鼠、猪	

接 (表三)

线虫病	有棘口线虫 刚棘口线虫 陶氏棘口线虫	生吃感染的中 间宿主鱼	猫、犬、 鼠、猪	
旋毛虫 病	旋毛虫	未煮熟的肉	猫、犬、熊 、猪、鼠	
弓形体 病	刚第弓形体 原虫	猫排出的卵囊可通 过多种途径感染人	猫、羊、鼠、犬、 牛、猪、马等	主要危害 怀孕早期 的妇女
锥虫病	罗德西亚锥虫 克氏锥虫	小昆虫叮咬	犬、猫、 猿、鼠	
疥 癬	疥螨、耳螨	接 触	犬、猫、牛 马、猪等	

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 养猫知识与猫病

作者=

页数= 2 4

出版社=

出版日期=

S S 号= 1 1 1 6 4 5 9 4

D X 号=

URL= h t t p : / / b o o k 1 . d u x i u . c o m / b
o o k D e t a i l . j s p ? d x N u m b e r = & d = 2 0
4 0 1 8 3 5 0 E 1 5 3 A B B 9 B 7 3 F E B C 8 2 B 5 6 7
1 5

封面页

书名页

版权页

前言页

目录页

一、概述

二、猫的解剖和生理特点

(一) 猫的解剖特点

(二) 猫的生理特点

(三) 猫的感觉器官

三、猫的自然习性

四、猫的选择和扑捉

(一) 猫的选择

(二) 猫的扑捉

五、猫的饲养管理

(一) 猫舍和猫的室内训练

(二) 猫的营养需要和饲喂

(三) 猫的梳理、洗澡、换毛和随人旅行

(四) 健康猫和病猫的一般鉴别

(五) 猫的护理和包扎

(六) 猫的给药

六、猫的繁殖

(一) 猫的生育控制

(二) 猫的性行为

(三) 孕猫的护理

(四) 妊娠猫的产前准备和生产

(五) 猫的哺乳和孤儿猫的哺育

七、猫病防治

(一) 病毒性疾病和细菌性疾病

(二) 体内寄生虫病

(三) 体外寄生虫病

(四) 消化系统疾病

(五) 呼吸系统疾病

(六) 泌尿系统疾病

(七) 生殖系统疾病

(八) 脑和神经疾病

(九) 代谢疾病

- (十) 骨骼疾病
 - (十一) 中毒疾病
 - (十二) 皮肤疾病
 - (十三) 眼的疾病
 - (十四) 耳的疾病
 - (十五) 疝
 - (十六) 肿瘤
 - (十七) 意外事故、急救及其他
- 健康猫常用生理数字
- 猫传染给人的疾病

附录一
附录二
附录页