

ZHONGGUOMINJIANMIFANG
YANZHENGDAQUAN

- 千古秘方 几经验证
- 疗效确切 可除百病

民间秘方与本草良方荟萃

中国 民间秘方验证大全



中医古籍出版社

ZHONGGUOMINJIANMIFANG YANZHENGDAQUAN

中国传统医药，自神农氏尝百草开始，历经五千余年，留传下来的秘方已有千万条，可说是历久弥坚，比如一颗大蒜就可以治百病；一片绿叶能使羊癫疯患者立刻苏醒；一杯白开水能制止打嗝……。这些秘方简便易行，疗效立现，连西医都拍案称奇，不得不承认中国秘方的神妙。

为了让中华医学经典能得以更完美的现身，笔者从上百部古今介绍偏方、秘方的医学书刊杂志中精心筛选，特别编著了这部《中国民间秘方验证大全》，敬献于读者。书中所收录的秘方，都是经过远至千年，近到当代的民间医疗机构多次临床验证，疗效理想的偏方，可供读者朋友参考选用。



ISBN 7-80174-111-0



9 787801 741110 >

ISBN 7-80174-111-0/R · 111

定价：32.80元

民间秘方与本草良方

中国 民间秘方验证大全

良石 主编

中医古籍出版社

责任编辑：高俊雄

封面设计：王云霞

图书在版编目 (CIP) 数据

民间秘方与本草良方荟萃/良石主编. - 北京:
中医古籍出版社, 2003.1

ISBN 7-80174-111-0

I. 民… II. 良… III. ①秘方—汇编②验方—汇编 IV. R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 086323 号

民间秘方与本草良方荟萃

中国民间秘方验证大全

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

新华书店总店发行

北京市通县蓝华印刷厂印刷

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 16 开 26.375 印张 350 千字

印数: 001-3000 册

ISBN7-80174-111-0/R·111

定价: 32.80 元

前 言

随着社会的快速发展，物质生活的逐步提高和文化知识的逐渐普及，人们也逐渐把目光投向健康，关注健康。特别是有一定文化知识的朋友，都想了解和认识自己的健康状况，把握自己的健康走向，更想通过阅览书籍来掌握常见病的预防和治疗方法。由此，现时期介绍偏方、秘方、验方的图书应运而生。此类书籍不胜枚举。因为笔者本身对这方面的书刊颇感兴趣，便对该类书籍做以长达数年的专项研究。随着时间的推移，笔者通过对中国民间秘方深入的了解，越来越感到自己已身不由己的陷入它无限魅力的“陷阱”之中，从而不能自拔；越来越感到它的博大精深，它简直就是摆在我们面前的一座宝藏。如果我们能够很好的挖掘和应用，它将是未来生活中身体健康方面最有力的保护神。它不仅可以帮助我们祛病，更可以助我们防身（预防疾病）。当然，在对众多书籍的阅读过程中，笔者也发现很多不尽如人意的地方，比方说在一些古籍类书刊中，有些介绍除病的方法明显带有迷信的色彩，还有一些方法非常简陋，在现实生活中绝对不可取。再有一些新版图书，可能因为出版商一味地追求时间和效益，而对书籍质量的把关有所疏忽，书中错别字明显超标，而且有的将治病的方法错了位，治疗 A 病的方法，误放在 B 病下面，读者朋友在阅读时一定要注意。我们要对这些现象有个清醒的认识，要弃其糟粕，择其精华，不能盲目地拿来主义，不然错用了方法，不仅不能治病，反而会影响健康。

出于对以上现象的不满，也是为了让中华医学经典能得以更完美的现身，笔者从上百部古今介绍偏方、秘方的医学书刊杂志中精心编选了这部《中国民间秘方验证大全》，敬献给广大读者朋友。书中所收录的秘方都是经过远至千年近到当代的民间医疗机构多次临床验证，疗效理想的偏方，可供大家放心选用。

如果书中所载的一方半剂能对你的健康生活有所帮助，或能使你的多年疾患得到根除，编者在挥汗之余，也感欣慰。如果读者朋友在阅读时发现书中疏漏之处，欢迎热情指正，我们也好在修订本书时能够及时改正。需要特别说明

的是，笔者对所选录的验方，态度是严肃认真的，但因每个人的病情，体质不一样，验方不可能对所有的人都有特效，当病情严重或服药无效时，应该到医院诊治，或在医生的指导下使用秘方、验方。

本书秘方的收集，参考大量的古今文献，不便一一列出，在此表示深深的谢忱。对在出版、编辑本书过程中给予支持和帮助的所有朋友，表示衷心的感谢！

编 者
2002 年 10 月

目 录

第一篇 中老年常见疾病防治秘方

一、高血压

1. 白矾治痰厥和高血压 (1)
2. 中药敷贴涌泉穴治疗高血压 (1)
3. 拌菠菜海蜇解头痛面赤 (2)
4. 松花蛋菜粥用治高血压 (2)
5. 花椒蛋治高血压 (2)
6. 鲜西红柿治高血压 (2)
7. 菊槐绿茶饮治高血压 (3)
8. 醋浸花生米治高血压 (3)
9. 西瓜皮草决明汤降血压 (3)
10. 玉米须煎饮治高血压 (3)
11. 猪脑炖枸杞补虚治高血压 (3)
12. 龙胆硫黄粉治高血压 (4)
13. 肉桂吴茱萸等外敷治高血压 (4)
14. 金银菊花汤治高血压 (4)
15. 泽泻混合并用汤治高血压 (5)
16. 向日葵叶汤降血压 (5)

二、低血压

1. 党参黄精治低血压 (6)
2. 黄芪党参等治低血压 (6)
3. 黄芪官桂等治低血压 (6)
4. 人参黄芪等治低血压 (6)
5. 西洋参桂枝等治低血压 (7)
6. 芪麻鸡治低血压 (7)

三、冠心病

1. 海带松可治冠心病 (8)
2. 香蕉茶防治冠心病 (8)
3. 长命包子防治冠心病 (8)
4. 蜂蜜首乌丹参汤治冠心病 (9)
5. 适量饮酒可预防冠心病 (9)
6. 水蛭九香虫等治冠心病 (9)
7. 党参黄芪等治冠心病 (10)

四、脑梗塞

1. 中风丸治疗脑梗塞 (10)
2. 香蕉花饮预防中风 (11)
3. 姜汁白矾治中风休克 (11)

五、高脂血症

1. 消脂丸治疗高脂血症 (11)
2. 醋泡花生降血脂 (12)
3. 双耳汤软血管降血脂 (12)
4. 常食猕猴桃防癌降血脂 (13)
5. 海带绿豆汤常饮降血脂 (13)
6. 黑芝麻桑椹糊降低血脂 (13)
7. 冬青子治高脂血症 (13)
8. 首乌泽泻汤治高脂血症 (13)

六、脑血栓

1. 桃红红花等治脑血栓 (14)
2. 葛根、红花、桃仁等治脑血栓 (14)
3. 黄芪丹参汤治脑血栓 (15)
4. 首乌当归汤治脑血栓 (15)

七、面神经麻痹

1. 蒺藜鳝血治面神经麻痹 (15)
2. 小续命汤加味和外敷巴豆治面神经麻痹
..... (16)
3. 蒲氏番蜜膏治面瘫 (16)
4. 面瘫方治疗面瘫 (17)
5. 马蓖散贴穴治面瘫 (18)
6. 强肌熄风汤治疗面神经麻痹 (18)
7. 相反药方治面瘫 (19)
8. 复方天牛膏治面瘫 (19)
9. 治咽膏治面瘫神效 (20)

10. 附乌散治面瘫 (20)
11. 天地膏治面瘫 (20)

八、癫痫

1. 逍遥散治癫痫 (21)
2. 雄黄停痫丸治疗癫痫 (21)
3. 柴胡桂枝汤加味治疗癫痫 (22)
4. 痫定散治疗癫痫 (23)
5. 乳犬猪肚硫黄汤治癫痫 (24)
6. 炖羊脑杞子治癫痫 (24)
7. 白矾散治羊角风 (24)
8. 甘麦枣汤治癫痫 (25)
9. 无毛羊胎治病症 (25)
10. 红白血砂粉治癫狂 (25)
11. 白鸽心治羊角风 (25)
12. 猪脑治似病非病 (26)

九、头痛

1. 偏头痛粉治偏头痛 (26)
2. 新牵正散治偏头痛 (27)
3. 头痛塞鼻散治疗偏头痛 (27)
4. 加减清上蠲痛汤治疗偏头痛 (28)
5. 全虫末外敷治偏头痛 (29)
6. 三白汤治偏头痛 (29)
7. 川芎白芷等治偏头痛 (29)
8. 龙骨汤治偏头痛 (30)
9. 四白丹参汤治偏头痛 (30)
10. 萝卜冰片治偏头痛 (30)
11. 热水浸手疗偏头痛 (30)
12. 鲤鱼头治头痛 (31)
13. 神经性头痛治方 (31)
14. 马前子、蝉衣治眶上神经性头痛
..... (31)

15. 全席汤治血管神经性头痛 (31)
16. 二白汤治血管神经性头痛 (32)
17. 川芎、丹参等治血管神经性头痛
..... (32)
18. 清空膏治疗顽固性头痛 (32)

十、三叉神经痛

1. 川芎止痛汤治疗三叉神经痛 (33)
2. 散偏汤治疗三叉神经痛 (33)
3. 加味五白汤治疗三叉神经痛 (34)
4. 向日葵盘治三叉神经痛 (35)

十一、坐骨神经痛

1. 蝎蛇散治坐骨神经痛 (35)
2. 身痛逐瘀汤加味治坐骨神经痛 ... (35)
3. 薏苡附子散合芍药甘草汤治坐骨神经痛
..... (36)
4. 身痛逐瘀汤加减治疗坐骨神经痛
..... (37)
5. 鸡血藤等治坐骨神经痛 (37)
6. 杜仲等治坐骨神经痛 (38)
7. 黄芪白芍等治坐骨神经痛 (38)
8. 乳香粉治坐骨神经痛 (38)

十二、脑炎、脑膜炎

1. 大蒜野菊花预防流脑 (38)
2. 大蒜液方治脑膜炎 (39)
3. 水牛角汤治乙型脑炎 (39)
4. 山羊角汤治乙型脑炎高热 (39)
5. 橄榄萝卜汤治流脑 (39)

十三、糖尿病

1. 滋肾善精丸治疗肾虚型糖尿病 (40)

2. 萝卜汁治轻、中型糖尿病 (40)
3. 黑木耳扁豆治糖尿病 (41)
4. 冷水茶治糖尿病 (41)
5. 煮玉米粒治糖尿病 (41)
6. 常食南瓜治糖尿病 (42)

十四、失 眠

1. 大枣葱白汤治失眠 (42)
2. 蝗虫粉补虚治失眠 (43)
3. 食醋镇静安神治失眠 (43)
4. 大葱治失眠 (43)
5. 半夏苡仁治失眠 (43)
6. 桑椹糖水治神衰失眠 (44)
7. 核桃芝麻丸温补肝肾虚 (44)
8. 酸枣仁粥治疗心悸失眠 (44)
9. 糖渍龙眼养心安神 (45)

十五、眩 晕

1. 抱神汤治眩晕 (45)
2. 大建中汤治眩晕 (46)
3. 防眩汤治眩晕 (46)
4. 柳枝粉治眩晕症 (47)
5. 镇眩汤治疗眩晕症 (47)

十六、呕 吐

1. 饮羊奶治反胃干呕 (48)
2. 醋矾糊外敷止呕 (48)
3. 萝卜蜂蜜止恶心呕吐 (49)
4. 白胡椒半夏治呕吐 (49)
5. 甘蔗姜汁治吐食干呕 (49)
6. 柿饼治胃寒呕吐清水 (49)
7. 豆腐白汤开胃止呕 (49)
8. 白胡椒治宿食呕吐 (50)

9. 韭菜根捣汁治呕吐反胃 (50)
10. 梗米煨姜汤治呕吐 (50)
11. 溜猪大肠治噎膈反胃 (50)

十七、胃下垂

1. 猪肚白胡椒补益脾胃 (51)
2. 敷脐法治胃下垂 (51)
3. 加味枳术汤治胃下垂 (52)
4. 葛倍膏治胃下垂 (52)
5. 二麻膏治胃下垂 (53)
6. 云苓、党参治胃下垂 (53)
7. 肉桂等治胃下垂 (53)
8. 鲜仙人球瘦猪肉治胃下垂 (54)
9. 西洋参等治胃下垂 (54)
10. 黄芪首乌治胃下垂 (54)

十八、胃肠炎

1. 龙眼核治急性胃肠炎 (55)
2. 枣树皮红糖汤治肠胃炎 (55)
3. 梅连平胃汤治胃肠炎 (55)
4. 大蒜头治腹泻不止 (56)
5. 番薯藤治急性胃肠炎 (56)
6. 羊肉秫米粥开胃健力 (56)
7. 牛肉砂仁汤健脾开胃 (56)

十九、胃脘痛

1. 炖猪肚治胃脘隐痛 (56)
2. 土豆粥治胃脘隐痛不适 (57)
3. 白砂糖水治中虚脘痛 (57)
4. 洋白菜粥治胃脘拘急痛 (57)

二十、胃及十二指肠溃疡

1. 洋白菜汁治胃溃疡疼痛 (58)

2. 煨猪肚温中和胃疗溃疡 (58)
3. 清胃散治胃及十二指肠溃疡 (58)
4. 止血散治十二指肠溃疡出血 (59)
5. 止血汤治十二指肠溃疡出血 (59)

二十一、呃逆

1. 打呃食疗 2 方 (60)
2. 大笑止呃逆 (60)
3. 黑芝麻治呃逆 (61)
4. 灵仙降逆汤治呃逆 (61)
5. 米醋止呃方治呃逆 (61)
6. 二香膏治呃逆 (62)
7. 赭沉散治呃逆 (62)

二十二、消化不良

1. 苹果汤润肠胃 (62)
2. 清拌蔓菁下气开胃 (63)
3. 胡萝卜炖羊肉补益脾胃 (63)
4. 茶膏糖治消化不良 (63)
5. 橘枣饮治消化不良 (64)
6. 山楂丸开胃助消化 (64)
7. 鸡肫皮治消化不良 (64)

二十三、肠炎

1. 归芍莱菔汤治肠道疾病 (64)
2. 苦参液灌肠治慢性结肠炎 (65)
3. 止泻散治肠炎 (66)
4. 二香散治肠炎 (66)
5. 野菊花灌汤剂治肠炎 (66)

二十四、腹泻

1. 野鸡肉馅馄饨治泄泻 (67)
2. 焦米粥益脾胃止泄泻 (67)

3. 焦黄米糕消宿食止腹泻 (67)
4. 烤馒头治胃酸腹泻 (68)
5. 莱菔山楂粥治急性腹泻 (68)
6. 山药大枣粥治慢性腹泻 (68)
7. 秫米枣丸治腹痛腹泻 (68)
8. 炮姜粥治腹泻 (69)

二十五、痢 疾

1. 大蒜治病疾肠炎 (69)
2. 苋菜拌蒜泥驱菌止痢 (69)
3. 田螺清热利湿止痢 (70)
4. 葡萄汁红糖治赤痢 (70)
5. 红枣汤治久痢不止 (70)
6. 薤理汤加鸦胆子治热痢 (70)
7. 二菜秦皮汤疗下痢 (71)
8. 马齿苋汤疗下痢 (71)

二十六、便 秘

1. 黑芝麻治便秘 (72)
2. 达原饮加味治疗便秘 (72)
3. 升润法治虚证便秘 (73)
4. 香蕉蘸黑芝麻治大便秘结 (73)
5. 马铃薯汁治便秘 (73)
6. 生花生仁治便秘 (74)
7. 猪肚苡米汤以补为通 (74)
8. 益气润肠汤治习惯性便秘 (74)
9. 贴敷法治便秘 (75)
10. 通便药条治便秘 (75)
11. 大戟红枣膏治便秘 (76)
12. 大黄膏治便秘 (76)

二十七、肝炎、肝脾肿大

1. 泥鳅治疗急慢性肝炎 (76)

2. 白丁香治黄疸 (77)
3. 南瓜治肝炎疗效惊人 (77)
4. 甜瓜蒂保肝退黄治肝炎 (77)
5. 猪油治肝脏肿大 (78)
6. 三草煎剂治疗急性病毒性肝炎 (78)
7. 益肾清解汤治慢性乙型肝炎 (78)
8. 五子汤治疗慢性肝炎 (78)
9. 茺菁子治黄疸型肝炎 (79)
10. 紫茄大米粥治黄疸型肝炎 (79)
11. 米醋猪骨汤治病毒性肝炎 (79)
12. 猪肝珍珠草汤防治肝炎 (80)

二十八、肝 脓 疡

1. 华佗治肝痈神方加味治肝脓疡 ... (80)

二十九、肝硬化腹水

1. 甲鱼炖大蒜治疗肝硬化腹水 (81)
2. 猪胆绿豆丸治肝硬化腹水 (81)
3. 葱白外用治肝腹水 (82)
4. 鲫鱼赤小豆治肝硬化腹水 (82)
5. 西瓜疗法治多种腹水 (82)
6. 贴敷法消肝硬化腹水 (83)
7. 烤牛脾治肝硬化腹水 (83)

三十、肾 炎

1. 复方地肤子汤治疗急性肾炎 (83)
2. 五白汤治疗急慢性肾炎及肾病综合征 ...
..... (84)
3. 茯苓四物汤治疗慢性肾炎 (85)
4. 宣肺利水饮治肾炎 (85)
5. 蜈蚣鸡蛋为主综合治疗慢性肾炎
..... (86)
6. 消风散治疗急性肾炎 (87)

7. 加味黄芪粥治肾炎 (87)
8. 二白汤治肾炎 (88)
9. 白茅根、益母草等治肾炎 (88)

三十一、感 冒

1. 参苏饮治病毒性感冒 (88)
2. 神仙粥治风寒感冒 (89)
3. 银翘合剂治风热感冒 (89)
4. 冰糖鸡蛋治感冒 (90)
5. 大白萝卜汁治感冒头痛 (90)
6. 萝卜甘蔗汤治发热咽痛 (90)
7. 西瓜番茄汁治夏季感冒 (90)
8. 绿豆茶饮治流感 (91)
9. 青龙白虎汤治流感 (91)
10. 醋熏法预防流感 (91)
11. 外用治感冒方 (91)
12. 鸡蛋白糖治嗓子痛 (91)
13. 加味葱豉汤治风寒感冒 (92)
14. 板蓝根等治感冒 (92)
15. 大青叶等治感冒 (92)
16. 香薷、银花等治感冒 (93)
17. 实表膏治感冒 (93)

三十二、咳 嗽

1. 萝卜葱白治风寒咳嗽 (93)
2. 白萝卜蜂蜜治风寒咳嗽 (94)
3. 饮马乳清热止嗽 (94)
4. 玉米须橘皮治咳嗽 (94)
5. 糖水冲鸡蛋补虚止咳 (94)
6. 芝麻冰糖水治夜嗽 (94)
7. 蜜枣扒山药治肺虚久咳 (95)
8. 花生枣蜜汤止咳化痰 (95)
9. 久食花生米止咳化痰 (95)

10. 剑花汤化痰止痛 (95)
11. 大蒜泥镇咳止嗽 (96)
12. 款冬花治咳嗽 (96)
13. 姜汁蜂蜜妙治咳嗽 (96)
14. 白萝卜子治痰饮凝结 (97)

三十三、哮 喘

1. 宁肺丸治疗支气管哮喘 (98)
2. 萝卜鸡蛋治慢性哮喘 (99)
3. 定喘烟 (99)
4. 平喘丸治咳喘 (99)
5. 敷麝香蒜泥止咳平喘 (100)
6. 猪板油麦糖蜜膏治哮喘 (101)
7. 南瓜姜麦芽汁治哮喘 (101)
8. 乌贼骨治哮喘 (101)
9. 柚子皮百合汤治哮喘 (102)

三十四、矽肺、肺病

1. 萝卜三汁治矽肺 (102)
2. 石榴花、夏枯草治肺病 (102)
3. 腊八蒜治肺病 (103)
4. 猪肺萝卜汤清热补肺 (103)
5. 云母膏治肺病 (103)
6. 金草桔梗治矽肺 (103)
7. 蒲公英等治矽肺 (104)

三十五、肺 结 核

1. 羊苦胆方促结核灶钙化 (104)
2. 扶本抗癆汤(丸)治疗肺结核 (104)
3. 鳗鲡大蒜治肺结核 (106)
4. 百合蜜治结核病 (106)
5. 南瓜藤汤治肺结核病 (107)
6. 猪肝白芨粉治肺结核 (107)

7. 蛋壳蛋黄治浸润型肺结核 (107)
8. 玉米须冰糖治肺结核之咯血 (107)
9. 吸蒜气疗肺结核 (107)
10. 四汁丸治肺癆 (108)

三十六、风寒湿痹

1. 壁虎散治骨质增生 (108)
2. 醋熏法治疗关节炎 (108)
3. 姜辣药汁熏敷法治疗风湿性关节炎.....
..... (109)
4. 自我治疗“落枕”方 (109)
5. 谷子秆烧灰治腰腿痛 (109)
6. 木瓜粥有去湿舒筋之功 (110)
7. 泡萝卜叶洗澡驱寒止痛 (110)
8. 两面针煮鸡蛋祛风止痛 (110)
9. 猪肉炖沙参治风湿痛 (110)
10. 鼠尾猪蹄汤除风湿 (110)
11. 姜醋威灵仙敷治足跟痛 (111)

三十七、汗证(盗汗、自汗)

1. 碧桃干红枣汤治盗汗 (111)
2. 加味牡蛎散治盗汗 (111)
3. 五倍子散治盗汗 (112)
4. 麦枣汤补气血敛汗 (112)
5. 黄芪羊肉汤滋养敛汗 (112)
6. 猪心黄芪汤治自汗盗汗 (112)
7. 酿羊肝主治体弱盗汗 (113)
8. 韭菜根治自汗盗汗 (113)
9. 燕麦米糠治虚汗不止 (113)
10. 肉苁汤圆有止汗功效 (113)

三十八、暑 病

1. 西瓜盅清暑祛热 (114)

2. 绿晶肘清热解暑 (114)
3. 西瓜蕃茄汁治暑热病 (114)
4. 海带冬瓜豆瓣汤消暑利尿 (114)
5. 红糖绿豆沙解暑祛热毒 (115)
6. 绿豆丝瓜花解暑 (115)
7. 猪肉冬瓜汤治暑热 (115)
8. 内服外用黍子汤治中暑 (115)
9. 冬瓜汁解暑热止烦渴 (116)
10. 姜韭蒜汁治中暑昏厥 (116)
11. 扁荷粥用于解暑 (116)
12. 饮杨梅酒预防中暑 (116)

三十九、神经衰弱

1. 安神补心汤(丸)治神性衰弱 (117)
2. “延”字茯苓梅花银耳补心安神 ... (117)
3. 玫瑰花烤羊心补心安神 (118)
4. 桂圆酒治神经衰弱 (118)
5. 猪肉怀山药治神衰 (118)
6. 虾壳枣仁汤治神经衰弱 (118)
7. 百合猪肉汤治神衰 (119)

四十、硬 皮 病

1. 乌头桂枝汤治疗硬皮病 (119)

四十一、下肢溃疡

1. 止血定痛生肌散治下肢溃疡 (120)
2. 枯矾猪甲膏治下肢溃疡 (120)
3. 化腐拔毒生肌膏治疮疡久不收口
..... (121)
4. 溃疡散治溃疡 (122)

四十二、水火灼伤

1. 鲜牛奶治灼伤 (123)

2. 猪蹄甲治烧烫伤 (123)
3. 枯矾糊治水火烫伤 (123)
4. 外用蘑菇粉治烫烧伤 (124)
5. 肖氏系列方湿润疗法治疗烧伤 ... (124)
6. 生姜汁治疗水火灼伤 (125)
7. 萤火虫治火烫伤 (125)

四十三、蛇、虫、兽咬伤

1. 白矾液治蛇咬伤 (126)
2. 羊奶治蜘蛛咬伤 (126)
3. 红薯叶治蜈蚣咬伤 (126)
4. 辣椒粉治狗咬伤 (127)
5. 守宫方疗蝎蜂螫 (127)
6. 杏仁雄黄治狗咬已溃 (127)
7. 鲜桃树叶疗犬咬伤 (127)
8. 疥蛤蟆治狂犬咬伤 (128)
9. 薺草治腹蛇咬伤 (128)
10. 蜗牛治毒虫咬伤 (128)

四十四、痈、疽、疔、疖

1. 豆蛋糊疗痈疽 (129)
2. 柳叶膏疗诸肿毒 (129)
3. 豆腐渣治疮口久不愈合 (130)
4. 米醋治外科炎症 (130)
5. 蒲公英糊剂治蛇头疔 (130)
6. 乌梅散疗臂疽 (130)
7. 绿豆陈醋膏治臃疮 (131)
8. 鲫鱼肉治恶疮乳癌 (131)
9. 马勃疗褥疮 (131)
10. 陈小麦粉治疗疮痈疽 (132)
11. 五倍子治疔肿 (132)
12. 黄连轻粉外敷治疔肿 (132)
13. 蒲公英治疔肿 (132)

14. 蛇皮金蝎治疔肿 (133)
15. 藤黄马钱子等治疔肿 (133)
16. 黄甘草粉外敷治疔肿 (133)
17. 芙蓉花等治疔肿 (134)

四十五、破 伤 风

1. 老葱白治疗破伤风 (134)
2. 棉子黑豆妙治破伤风 (134)
3. 鸡矢白治破伤风 (135)
4. 鱼鳔散治破伤风 (135)
5. 蜈蚣等治破伤风 (135)
6. 蝉蜕、僵蚕等治破伤风 (136)
7. 蝉蜕、防风等治破伤风 (136)
8. 地龙、蝉衣等治破伤风 (136)
9. 蜈蚣、全虫等治破伤风 (137)
10. 蒲公英、金银花等治破伤风 (137)
11. 丹皮、赤芍等治破伤风 (137)

四十六、脑 震 荡

1. 乌龟头黄瓜子治脑震荡 (137)
2. 猪脑天麻枸杞治脑震荡后遗症 ... (138)
3. 丹参、当归等治脑震荡 (138)
4. 当归防风等治脑震荡 (138)
5. 丹参、红花等治脑震荡 (138)
6. 当归尾、钩藤等治脑震荡 (139)

四十七、丹 毒

1. 油菜治成人丹毒 (139)
2. 油菜叶治风游丹毒 (140)
3. 鲫鱼肉赤豆粉治丹毒 (140)
4. 青鱼胆干粉治丹毒 (140)

四十八、脉 管 炎

1. 蜗牛泥治脉管炎 (140)

2. 蟾蜍丸治血管闭塞性脉管炎 (141)
3. 鹿角胶疗脉管炎 (141)

四十九、疝 气

1. 姜汁治疝气 (141)
2. 向日葵秆汤治肠疝 (142)
3. 红皮蒜治疗疝气疼痛 (142)
4. 荔枝核疗法治疝气痛 (142)
5. 荞麦川乌胡椒治疝气 (142)
6. 山楂红糖治小肠疝气 (142)
7. 丝瓜陈皮汤治疝气 (143)
8. 玉米茎心饮治疝气 (143)
9. 焙鲫鱼鳔治疝气痛 (143)
10. 焙麻雀治小肠疝气 (143)

五十、阑 尾 炎

1. 大田螺治阑尾炎 (143)
2. 鲜姜芋头泥治阑尾炎 (144)
3. 石膏桐油治阑尾炎 (144)
4. 鬼针草治阑尾炎 (144)
5. 白花蛇舌草等治阑尾炎 (144)

五十一、流行性腮腺 炎,扁桃体炎

1. 陈醋大蒜糊治流行性腮腺炎(炸腮) (145)
2. 赤小豆蛋清治炸腮 (145)
3. 红黄白膏治炸腮 (145)
4. 黄瓜霜治扁桃体炎 (146)

五十二、淋巴结核、慢性 淋巴结核

1. 海甘消瘰汤治颈淋巴结核 (146)

2. 荔枝疗法治淋巴结核 (147)
3. 海带汤治瘰癧瘰癧 (147)
4. 甘草蜂蜜消淋巴结核 (147)
5. 蝌蚪红糖水治淋巴结核 (147)
6. 蛤粉治淋巴结核 (148)
7. 蜗牛炖猪肉治淋巴结核 (148)
8. 蜈蚣蛋治淋巴结核 (148)

五十三、痔 疮

1. 马齿苋猪大肠治内痔 (148)
2. 乌药、大黄等治痔疮 (149)
3. 蝉冰膏治痔疮 (149)
4. 硝冰膏治痔疮 (149)
5. 麝冰散治痔疮 (149)
6. 无花果治痔疮 (150)
7. 荆芥防风等治痔疮 (150)
8. 五倍子治痔疮 (150)
9. 五倍子、朴硝治痔疮 (151)
10. 炉甘石、女真叶等治痔疮 (151)
11. 蒲公英、土茯苓治混合痔 (151)
12. 南瓜子煎熏治内痔 (152)
13. 茄子末治内痔 (152)
14. 鲫鱼治内外痔疮 (152)
15. 蝎蛋蛋治痔疮 (152)
16. 猪汤绿豆清热润肠 (153)
17. 猪肉槐花汤治痔疮 (153)
18. 红糖金针菜汤消痔 (153)

五十四、肛 裂

1. 乳没膏治肛裂 (153)
2. 润肤膏治肛裂 (154)
3. 生肌膏治肛裂 (154)

五十五、骨质增生症

1. 川芎末醋调外敷治骨质增生症 … (155)
2. 风湿威灵方治骨质增生 …… (155)
3. 威灵苁蓉汤(丸)治足跟骨质增生及老年骨关节炎疼痛 …… (155)
4. 外用筋骨止痛酒治骨质增生症 … (156)
5. 粉葛、秦艽等治骨质增生症 …… (156)
6. 当归白芍等外敷治骨质增生 …… (157)
7. 川芎没药等外敷治骨质增生 …… (157)
8. 威灵仙穿山甲等治骨质增生 …… (157)
9. 蜈蚣等治骨质增生 …… (157)

五十六、跌打损伤

1. 三六九软膏治疗软组织损伤 …… (158)
2. 少林发散法治疗软组织损伤 …… (158)
3. 消瘀止痛膏治软组织损伤 …… (159)
4. 活血止痛膏治软组织损伤 …… (159)
5. 栀黄酒治软组织损伤 …… (160)
6. 活血散治软组织中损伤 …… (160)
7. 消肿止痛膏治软组织损伤 …… (160)
8. 生桅子石膏治软组织损伤 …… (161)
9. 土鳖川芎治软组织损伤 …… (161)
10. 大黄丹参红花治软组织损伤 …… (161)
11. 生桅子,生韭菜治软组织损伤 … (161)
12. 土鳖虫血竭三七治软组织损伤 … (162)
13. 茜草根大黄土鳖虫治软组织损伤 ……
…………… (162)
14. 黄枝子,乌药等治跌打损伤 …… (162)
15. 大黄姜等治跌打损伤 …… (162)
16. 川乌草乌等治跌打损伤 …… (163)

五十七、急性腰扭伤

1. 闪腰定痛汤治疗急性腰扭伤 …… (163)

2. 内伤膏治急性腰扭伤 …… (164)

五十八、颈椎病

1. 桂枝加葛根汤治疗颈椎病 …… (164)
2. 全蝎、蜈蚣等治颈椎病 …… (165)
3. 全当归、细辛等治颈椎病 …… (165)
4. 葛根、丹参等治颈椎病 …… (166)
5. 葛根、白芍等治颈椎病 …… (166)
6. 乌梢蛇、甘草等治颈椎病 …… (166)

五十九、脚跟痛

1. 温补肾阳汤治疗足跟痛 …… (166)

六十、漏肩风

1. 黄芪桂枝五物汤加减治漏肩风 … (167)

六十一、踝关节扭伤

1. 鲜土牛膝捣敷踝关节扭伤 …… (167)

六十二、眼疾

1. 大发散治眼疾 …… (168)
2. 胡萝卜汤明目 …… (168)
3. 洗眼良方疗诸眼疾 …… (168)
4. 猪肝夜明汤治诸眼疾 …… (169)
5. 花椒制剂疗沙眼 …… (169)
6. 红番薯叶羊肝治夜盲 …… (169)
7. 南瓜露治眼球外伤 …… (170)
8. 张氏验方治疗眼疾 …… (170)

六十三、耳病

1. 治耳灵治疗化脓性中耳炎 …… (172)
2. 耳疳散治疗慢性化脓性中耳炎 … (172)
3. 矾冰散治中耳炎 …… (173)

4. 冰连散治疗化脓性中耳炎 (173)
5. 耳疳散治慢性化脓性中耳炎 (173)
6. 耳灵散治急性化脓性中耳炎 ... (173)
7. 药捻方治化脓性中耳炎 (174)
8. 猪胆白矾末治中耳炎 (174)
9. 海螵蛸治疗聾耳 (175)

六十四、鼻 症

1. 劫敏汤治疗过敏性鼻炎 (175)
2. 玉屏风散加味治疗过敏性鼻炎 ... (176)
3. 祛风宣肺汤治鼻炎 (176)
4. 斑蝥方治鼻炎 (176)
5. 苍耳油条方 (177)
6. 大蒜膏 (177)
7. 克敏灵治过敏性鼻炎 (177)
8. 复方麝香膏治过敏性鼻炎 (178)
9. 外用蒜液治鼻炎 (178)
10. 辛夷花散塞鼻治鼻窦炎 (178)
11. 大蒜贴敷方治鼻窦炎 (179)
12. 苍耳散治鼻渊 (179)
13. 辛夷散治鼻窦炎 (179)

六十五、牙 痛

1. 固齿散治疗牙周炎 (180)
2. 引火散风汤治疗牙痛 (181)
3. 石地丹黄汤治牙痛 (181)
4. 乐痛散治牙痛 (181)
5. 麝脐散治牙痛 (182)
6. 霜梅乳没散治牙痛 (182)
7. 牙痛小降丹治各种牙痛 (182)
8. 独头蒜煨熟治风虫牙痛 (183)
9. 姜矾粉止牙痛 (183)
10. 韭菜根花椒止龋齿痛 (183)

11. 胡椒绿豆治牙痛 (183)

六十六、口 疮

1. 口疮断生饮治疗复发性口疮 (184)
2. 外敷膏治口疮 (185)
3. 口炎散治口腔炎 (185)
4. 青砂散治口腔溃疡 (185)
5. 五倍青黛散治口腔炎 (185)
6. 二石青黛散治口疮 (186)
7. 矾黛散治鹅口疮 (186)

六十七、慢性喉炎

1. 爽喉饮治疗慢性喉炎 (186)

六十八、误吞硬物(刺)

1. 萆薢核桃仁治误吞铜物 (187)
2. 羊胛骨治误吞铜及金 (187)
3. 蚕豆韭菜治误吞针入腹 (188)
4. 韭芹制剂治误吞金属 (188)
5. 橄欖核散解骨鯁 (188)
6. 大蒜塞鼻治鱼骨卡喉 (188)
7. 鳊鱼胆治鱼骨卡喉 (189)
8. 醋治细骨卡喉 (189)
9. 竹木刺入肉验方 (189)

六十九、口 臭

1. 祛臊方治口臭 (189)
2. 葛根、木香等治口臭 (190)
3. 大黄冰片治口臭 (190)

七十、泌尿系统结石

1. 芒硝治疗泌尿系统结石 (190)
2. 硝石散治疗泌尿系结石 (191)

3. 鹿角霜治尿路结石 (191)
4. 通淋排石汤治尿路结石 (192)
5. 鸡内金治尿路结石 (192)
6. 睡前饮牛奶防治胆结石 (193)

第二篇 小儿常见病防治秘方

一、小儿发热

1. 葛根汤治小儿发热 (194)
2. 藿香汤治疗小儿夏季高热 (194)
3. 大剂石膏治疗小儿高热 (195)
4. 大柴胡汤治疗小儿高热 (195)
5. 黄瓜豆腐汤治小儿发热 (195)

二、小儿感冒

1. 姜糖水治风寒感冒 (196)
2. 葱液治感冒 (196)
3. 葱豉泥治小儿风寒感冒 (196)
4. 加味杏苏散治小儿风寒感冒 ... (196)
5. 茱矾膏治小儿感冒 (197)

三、小儿疳积

1. 疳积散外敷治疗小儿疳积 (197)
2. 疳积散外敷内关穴治疗小儿疳积
..... (198)
3. 蜈蚣蛋治小儿疳积 (198)
4. 治疳灵治小儿疳积 (198)
5. 疳积方治小儿疳积 (199)
6. 肥儿膏治小儿疳积 (199)
7. 阿魏散治小儿疳积 (199)
8. 贴敷方治小儿疳积 (200)
9. 炒玉米扁豆等治小儿疳积 (200)
10. 神曲山楂等治小儿疳积 (200)

四、小儿疳腮

1. 柴胡石膏汤治疳腮 (201)
2. 柴胡注射液治疗疳腮 (201)
3. 地龙白糖浸液治腮腺炎 (201)
4. 黛黄散治流行性腮腺炎 (202)
5. 莫杖散治腮腺炎 (202)
6. 消肿膏治疳腮 (202)
7. 疳腮散治疳腮 (202)
8. 六神冰黛散治疳腮 (203)
9. 腮腺炎膏治疳腮 (203)

五、百日咳

1. 牛胆汁治百日咳 (203)
2. 猪胆治百日咳 (204)
3. 麻雀肉治百日咳 (204)
4. 核桃梨汁治百日咳 (204)
5. 大戟芜花等治百日咳 (204)

六、小儿支气管哮喘

1. 鸡蛋加蜂蜜治小儿支气管哮喘
..... (205)
2. 芝麻秸治小儿盐哮 (205)
3. 猫胞衣治小儿咳喘 (206)
4. 胎猪治小儿哮喘 (206)

七、小儿肺炎

1. 加味升麻葛根汤治疗小儿病毒性肺炎 (206)
2. 新医散治小儿肺炎 (207)
3. 肺炎膏治肺炎 (207)
4. 外敷方治肺炎 (208)
5. 消炎膏治肺炎 (208)

八、小儿支气管炎

1. 桃花散治支气管炎 (208)
2. 桂枝加龙骨牡蛎汤治疗小儿支气管哮喘 (209)
3. 鹅梨汤治小儿哮喘性支气管炎 ... (209)
4. 生姜、大枣等治小儿支气管炎 ... (210)
5. 白芥子面粉治小儿支气管炎 (210)
6. 鱼腥草等治小儿急性支气管炎 ... (210)

九、婴幼儿哮喘证

1. 理痰汤治疗婴幼儿哮喘证 (211)
2. 昙花茶治婴幼儿哮喘证 (211)
3. 大蒜治婴幼儿哮喘 (211)

十、厌食症

1. 五香姜醋鱼治厌食症 (212)
2. 健脾开胃散治疗小儿厌食症 ... (212)
3. 梔杏膏治小儿厌食 (213)
4. 消化膏治小儿厌食 (213)
5. 吴茱萸椒矾散治小儿厌食 (213)
6. 怀山药等治小儿厌食 (213)
7. 皂荚治厌食 (214)
8. 鸡内金、芡实等治厌食症 (214)

十一、婴儿黄疸

1. 斐氏方治疗婴儿黄疸 (214)

十二、小儿疝气

1. 疝气汤治小儿疝气 (215)
2. 麝香膏治小儿疝气 (216)
3. 三辣膏治小儿疝气 (216)
4. 外敷方治小儿疝气 (216)
5. 茴香散治小儿疝气 (216)
6. 填脐丁香散治小儿疝气 (217)

十三、小儿脱肛

1. 乌龟头治疗小儿脱肛 (217)
2. 苦叶苗根膏治小儿脱肛 (217)
3. 脱肛外治方 (218)
4. 升鳖膏治小儿脱肛 (218)

十四、小儿遗尿症

1. 遗尿方治小儿遗尿症 (218)
2. 穴位贴药法治小儿及遗尿 (219)
3. 丁桂散治小儿遗尿 (219)
4. 遗尿散治小儿遗尿 (220)
5. 遗尿膏治小儿遗尿 (220)
6. 加味生姜膏治小儿遗尿 (220)

十五、婴儿湿疹

1. 大或小飞扬治婴儿湿疹 (221)
2. 半乌白汤治疗婴儿湿疹 (221)
3. 大白菜等治婴儿湿疹 (221)
4. 地肤子等治湿疹 (222)
5. 白鲜皮等治小儿湿疹 (222)
6. 千里光等治小儿湿疹 (222)

7. 二黄膏治小儿湿疹 (222)
8. 丹参等治小儿湿疹 (222)
9. 苍耳子等外洗治小儿湿疹 (223)

十六、小儿口腔溃疡

1. 四黄泻火汤治小儿口糜 (223)
2. 养阴清肺汤治小儿热病后期口腔溃疡
..... (223)
3. 白矾活蜘蛛治小儿口疮 (224)
4. 灯心草等治小儿口疮 (224)
5. 生大黄治小儿口疮 (224)
6. 青黛等治小儿口疮 (224)
7. 硼砂粉治鹅口疮 (225)
8. 川黄粉治小儿鹅口疮 (225)
9. 口炎散治口疮 (225)

十七、婴幼儿腹泻

1. 茴香肉桂散敷脐治婴幼儿腹泻 ... (225)
2. 外敷药治小儿泄泻 (226)
3. 敷脐方治腹泻 (226)
4. 止泻敷脐散治小儿腹泻 (226)
5. 地榆、白芨、治腹泻 (227)
6. 丁香肉桂囊外敷治腹泻 (227)
7. 三香辣肉桂治腹泻 (227)

十八、小儿睾丸鞘膜积液

1. 张氏水疝方治小儿睾丸鞘膜积液
..... (227)
2. 暖脐膏治小儿睾丸鞘膜积液 ... (228)
3. 二仁消液膏治小儿睾丸鞘膜积液
..... (228)
4. 桂冰散治小儿鞘膜积液 (228)
5. 肉桂、煅龙骨等治小儿睾丸鞘膜积液
..... (229)

6. 母丁香治小儿睾丸鞘膜积液 ... (229)
7. 麦芽汤治小儿睾丸鞘膜积液 ... (229)

十九、蛲虫病

1. 苦楝子塞肛治蛲虫病 (230)
2. 加味百部煎治蛲虫病 (230)
3. 百部煎药棉方治蛲虫病 (230)
4. 使君子丸治蛲虫病 (231)

二十、佝偻病

1. 鸡蛋皮治小儿佝偻病 (231)
2. 虾皮蛋羹预防小儿佝偻病 (231)
3. 陈皮丁香等治佝偻病 (232)
4. 菟丝子等治佝偻病 (232)
5. 龙骨粉治佝偻病 (232)

二十一、麻疹

1. 芝麻秆糯米粥治荨麻疹 (233)
2. 活鸡敷胸解毒透疹 (233)
3. 荸荠预防麻疹并发症 (233)

二十二、小儿汗证

1. 泥鳅治小儿盗汗 (234)
2. 猪肚糯米粥治小儿盗汗 (234)
3. 浮小麦黑豆汤治小儿虚汗 (234)
4. 胡萝卜腰花治小儿虚汗 (234)
5. 木耳红枣治小儿盗汗 (235)

二十三、小儿夜啼

1. 泻心导赤饼治小儿夜啼 (235)
2. 解热安神膏治小儿夜啼 (235)
3. 敷脐方止啼 (235)
4. 酸枣仁止夜啼 (236)

5. 蝉衣等治小儿夜啼 …………… (236)

二十四、小儿惊吓

1. 当归远志等治小儿惊吓 …………… (236)

二十五、小儿脂溢性皮炎

1. 猪胆治小儿脂溢性皮炎 …………… (237)

2. 川军、黄连治小儿脂溢性皮炎 …… (237)

3. 龙胆草治小儿脂溢性皮炎 …… (237)

二十六、小儿癫痫

1. 钩藤、天竺等治小儿癫痫 …… (238)

2. 黄芪等治小儿癫痫 …………… (238)

3. 蝉蜕等治小儿癫痫 …………… (238)

4. 小麦、大枣等治小儿癫痫 …… (239)

二十七、小儿漆过敏

1. 生绿豆、生薏米等治漆过敏 …… (239)

二十八、儿童手足冻疮

1. 当归、芍药等治手足冻疮 …… (239)

2. 红花、桃仁等治手足冻疮 …… (240)

二十九、婴幼儿尿布疹

1. 小米治尿布疹 …………… (240)

2. 三黄液治尿布疹 …………… (240)

3. 金银花等治尿布疹 …………… (241)

三十、儿童多动症

1. 珍珠汤治多动症 …………… (241)

2. 龙骨汤加琥珀粉治小儿多动症 …… (241)

三十一、小儿缺锌症

1. 黄芪党参等治小儿缺锌 …………… (242)

三十二、小儿过敏性紫癜

1. 茅根威灵仙等治小儿过敏性紫癜 ……
…………… (242)

2. 牡丹皮等治过敏性紫癜 …………… (243)

三十三、小儿流涎症

1. 大枣等治涎症 …………… (243)

2. 桑白皮治流涎症 …………… (243)

3. 鸡内金等治流涎症 …………… (243)

4. 滞颐方治流涎症 …………… (244)

5. 抽薪散治流涎症 …………… (244)

三十四、小儿疳子

1. 藿香正气水治小儿疳子 …………… (244)

2. 败酱草等治小儿疳子 …………… (244)

3. 地龙茶叶治小儿疳子 …………… (245)

三十五、重症小儿营养不良

1. 炒白术茯苓治小儿营养不良 …… (245)

2. 党参黄参等治重症小儿营养不良 ……
…………… (245)

三十六、小儿脾虚

1. 党参茯苓等治小儿脾虚 …………… (246)

2. 鸡内金等治小儿脾虚 …………… (246)

3. 草决明炒扁豆等治小儿脾虚 …… (246)

三十七、婴幼儿绿便

1. 黄连龙胆粉治幼儿绿便 …………… (247)

2. 知母黄柏粉治幼儿绿便 …………… (247)

3. 淮山药、扁豆等治小儿绿便 …… (247)

三十八、儿童便秘

1. 蒲公英治小儿便秘 (248)
2. 金银花野菊花等治小儿便秘 (248)
3. 忍冬藤等治小儿便秘 (248)

三十九、小儿尿频症

1. 生木瓜小儿尿频症 (248)
2. 茅根生地等小儿尿频症 (248)
3. 党参黄芪等治小儿尿频症 (249)

四十、小儿化脓性扁桃体炎

1. 霍香元参汤治小儿化脓性扁桃体炎 (249)
2. 生石膏、玄参治小儿化脓性扁桃体炎 (249)

四十一、小儿黄水疮

1. 鲜大桉叶治小儿黄水疮 (250)
2. 苦参等治小儿黄水疮 (250)
3. 苦参大黄等治小儿黄水疮 (250)

四十二、小儿肝炎

1. 郁金等治小儿肝炎 (250)

2. 茵陈等治小儿肝炎 (251)
3. 绵茵陈板兰根等治小儿肝炎 (251)
4. 马兰车前草等治小儿肝炎 (251)

四十三、小儿细菌性痢疾

1. 秦皮等治小儿细菌性痢疾 (252)
2. 白头翁等治小儿细菌性痢疾 (252)
3. 白菰等治小儿细菌性痢疾 (252)

四十四、小儿麻痹后遗症

1. 猴骨等治小儿麻痹后遗症 (253)
2. 生黄芪等治小儿麻痹后遗症 (253)
3. 通络起痿膏治小儿麻痹后遗症 ... (253)
4. 马乌起痿膏小儿麻痹后遗症 (254)

四十五、小儿肌性斜颈

1. 外敷正颈散治小儿肌性斜颈 (254)
2. 牵筋散治小儿肌性斜颈 (254)
3. 归芍煎治小儿肌性斜颈 (255)

四十六、骨髓炎

1. 萍蚨膏治疗骨髓炎 (255)
2. 麝香散 (256)
3. 红蓝药捻治骨髓炎 (256)

第三篇 妇科常见疾病防治秘方

一、流 产

1. 玉米嫩衣治习惯性流产 (257)
2. 母鸡黄米粥治习惯性流产 (257)

3. 安奠二天汤加味治疗习惯性流产 (257)
4. 固肾保孕汤治疗先兆流产 (258)
5. 摄护胎元饮治疗习惯性流产 ... (259)
6. 专保小产膏保胎 (259)

7. 安胎膏治习惯性流产 (260)

二、催生引产

1. 糯米稻草汤临产催生 (260)
2. 猪肉汤催生保胎 (260)
3. 醋熏治产妇血晕 (260)
4. 大麻子催产方 (261)
5. 催产膏催产 (261)
6. 乌梅等催产 (261)

三、产后疾患

1. 胎盘蟹肉治恶露不净 (262)
2. 蚕豆壳治产后风 (262)
3. 梨汁人乳治产后小便不通 (262)
4. 谷子汤治产后感冒发烧 (262)
5. 山药汤治产后大喘大汗 (263)
6. 鲫鱼治产后臂痛抽搐 (263)

四、子宫脱垂

1. 青山羊血治子宫脱垂 (263)
2. 外用茄根粉治子宫脱垂 (263)
3. 苏茴膏治子宫脱垂 (264)
4. 升提膏治子宫脱垂 (264)

五、月经不调

1. 牡丹甜糕治月经不调 (264)
2. 葵花盘止崩漏 (265)
3. 辣椒根方治功血 (265)
4. 丝瓜络炭棕榈炭治功血 (265)
5. 调经膏治月经不调 (266)
6. 养血调经膏治月经不调 (266)
7. 散寒调经膏治月经不调 (266)

六、痛经

1. 活血止痛汤(丸)治痛经 (267)
2. 脐痛舒治痛经 (267)

七、闭经

1. 团鱼治闭经 (268)
2. 乌鸡丝瓜汤治血虚经闭 (268)
3. 闭经疏养汤治疗功能性闭经 (268)
4. 蛭螂治闭经 (269)
5. 养血通经膏治闭经 (269)
6. 化瘀膏治闭经 (270)
7. 急性子治闭经 (270)
8. 冬葵子治闭经 (270)
9. 绿豆猪肝治闭经 (270)

八、带下病

1. 荞麦粉蛋清治带下病 (271)
2. 墨鱼猪肉补虚止带 (271)
3. 胡椒鸡蛋止带 (271)
4. 高粱根止带 (272)
5. 白扁豆止带 (272)
6. 小丝瓜止带 (272)
7. 荞麦粉鸡蛋止带 (272)
8. 墨鱼瘦猪肉止带 (272)
9. 鱼鳔胶、猪前蹄止带下 (272)
10. 向日葵梗或根荷叶治带下 (273)

九、阴道炎

1. 三黄粉治阴道炎 (273)
2. 六神丸外用治滴虫性阴道炎 (274)
3. 鬼针草洗剂治疗阴道炎 (274)
4. 祛霉子母方治疗霉菌性阴道炎
..... (275)

5. 灭滴栓治阴道炎 (276)
6. 治阴道滴虫验方 (276)
7. 大蒜治阴痒 (276)
8. 猪肝马鞭草治阴痒 (276)
9. 白萝卜加醋治滴虫性阴道炎 ... (277)
10. 青萝卜治滴虫性阴道炎 (277)
11. 鲜桃树叶治阴痒 (277)

十、崩 漏

1. 备金散治疗崩漏 (277)
2. 蒲氏老年血崩汤治疗阴道出血 ... (278)

十一、产后血晕

1. 回魂汤治疗产后血晕 (279)

十二、宫颈糜烂

1. 黄倍散治宫颈糜烂 (279)
2. 鱼腥草油膏治宫颈糜烂 (280)
3. 治糜灵治宫颈糜烂 (280)
4. 孩儿茶等治宫颈糜烂 (280)
5. 川黄柏等治宫颈糜烂 (281)
6. 牡丹皮、蒲公英治宫颈糜烂 ... (281)
7. 猪苦胆石榴皮治宫颈糜烂 (281)

十三、老妇行经

1. 俞氏验方治老妇行经 (282)

十四、产后便秘

1. 当归补血汤加味治疗产后便秘 ... (282)
2. 生黄芪等治产后便秘 (283)

十五、不孕症

1. 通任种子汤加味治阻塞性不孕 ... (283)

2. 嗣子汤治疗不孕症 (283)
3. 逐瘀疏通方治输卵管阻塞致不孕症 ...
..... (284)
4. 狗头散治不孕症 (284)
5. 助孕汤治疗不孕症 (285)
6. 调经种子汤治不孕 (285)
7. 椒附散治不孕症 (286)

十六、子宫外孕

1. 消症散治子宫外孕 (286)
2. 宫外孕外敷方 (287)

十七、倒 经

1. 珍珠母液治倒经 (287)
2. 芒硝治倒经 (287)
3. 全当归等治倒经 (287)

十八、缺 乳

1. 赤小豆治缺乳 (288)
2. 黑芝麻、僵蚕等治缺乳 (288)
3. 金银花等治缺乳 (288)

十九、回 乳

1. 神曲、蒲公英回乳 (288)
2. 生麦芽回乳 (289)
3. 莱菔子回乳 (289)
4. 陈皮等回乳 (289)

二十、乳 腺 炎

1. 乳痈方治乳痈(急性乳腺炎) ... (289)
2. 砂仁塞鼻法治疗乳腺炎 (290)
3. 泥鳅土豆外敷治乳痈 (290)
4. 芒硝外敷治乳腺炎 (290)

二十一、女阴瘙痒症

1. 蛇床子等治女阴瘙痒 (291)
2. 芒硝等治阴痒 (291)
3. 花椒等治阴痒 (292)
4. 龙胆草、龙黄治阴痒 (292)

二十二、外阴湿疹

1. 柳叶粉等治外阴湿疹 (292)
2. 蒲公英等治外阴湿疹 (292)
3. 地锦草等治外阴湿疹 (293)

二十三、胎位不正

1. 当归治胎位不正 (293)
2. 当苏散治胎位不正 (293)

3. 苏叶等治胎位不正 (294)

二十四、避孕

1. 紫茄花避孕 (294)
2. 带柄柿蒂避孕 (294)
3. 油菜子配中药避孕 (294)
4. 黑木耳红糖膏避孕 (295)
5. 明矾绝育 (295)
6. 药蛤蟆粉绝育方 (295)

二十五、更年期综合症

1. 白芍等治女性更年期综合症 (295)
2. 何首乌等治女性更年期综合症 ... (296)
3. 珍珠等治女性更年期综合症 (296)

第四篇 男性科常见病防治秘方

一、阳 痿

1. 小茴炮姜敷脐治阳痿 (297)
2. 健雄煎治疗阳痿 (297)
3. 亢痿灵治疗阳痿 (298)
4. 清化益肾通灵汤治疗阳痿 (298)
5. 补肾壮阳丸 (299)
6. 牛鞭韭菜籽等治阳萎 (300)
7. 当归牛尾汤治阳痿 (300)
8. 炖虫草鸡大补肾精 (300)
9. 肝胆丸疗阳痿验方 (300)
10. 苁蓉粥滋肾气补精血 (300)
11. 山药桂圆炖甲鱼 (301)
12. 泥鳅枣汤治阳痿不举 (301)
13. 焙狗阴茎治阳痿不举 (301)
14. 雀蛋羊肉汤治阳痿不举 (301)
15. 海参羹治阳痿 (301)
16. 白羊肾羹填精髓 (302)
17. 清炒虾仁治阳痿 (302)
18. 对虾酒治阳痿遗精 (302)
19. 烫活虾壮阳 (303)
20. 海虾仁葱叶治阳痿 (303)
21. 核桃鸭子疗肾虚 (303)
22. 炖麻雀虾治肾阳不足 (303)
23. 麻雀蛋治肾虚阳痿 (304)
24. 牛羣丸鸡蛋治肾阳虚 (304)
25. 牛鞭杞子汤治阳痿遗精 (304)

二、早 泄

1. 知柏三子汤(丸) (304)
2. 五倍子治早泄 (305)
3. 五倍子白芷等治早泄 (305)
4. 芡实莲子饮治遗精早泄 (305)
5. 锁阳鸡治男子早泄 (305)
6. 肾鞭汤治见色流精 (306)
7. 炸麻雀治早泄 (306)

三、遗 精

1. 双补固精丸 (306)
2. 蒸白果鸡蛋治遗精 (307)
3. 核桃猪肾治梦遗滑精 (307)
4. 荷叶治疗梦遗滑精 (307)
5. 龙骨粥固精止遗 (307)

四、阳强、阳缩

1. 白酒冲胡椒治缩阳 (308)
2. 白酒煮虾椒治缩阳 (308)
3. 韭菜汁治男子生殖器缩入 (308)
4. 烤老姜治缩阳 (308)
5. 热敷方治阴茎缩入 (309)
6. 韭菜子治阳物不痿 (309)
7. 桃仁粥治阴茎不倒 (309)

五、不射精症

1. 淫羊藿蛇床子等治不射精 (309)
2. 黄芪党参等治不射精 (309)
3. 仙灵丹治不射精 (310)
4. 参芪菟丝子等治不射精 (310)

5. 巴戟天仙灵脾等治不射精 (310)

六、男性不育症

1. 补肾填精方治不育症 (311)
2. 冬蛤生精饮治无精子症 (311)
3. 续嗣散治男性不育症 (312)
4. 河车大造丸治疗男性不育症 ... (312)
5. 加减七子散治男性不育症 (313)
6. 补育生精丸治早泄、不育症 ... (313)
7. 参芪七子汤治不育症 (314)

七、血 尿

1. 地龙大蓟治血尿 (314)
2. 金银花蒲公英等治血尿 (314)

八、尿 频 症

1. 火麻仁覆盆子等治尿频症 (315)
2. 参芪大黄等治尿频症 (315)
3. 蒲公英半边莲等治尿频症 (315)

九、老年性前列腺肥大

1. 疏肝散结方治老年性前列腺肥大
..... (316)

十、男性乳房发育症

1. 逍遥丸治疗男性乳房发育症 (317)

十一、辜 丸 痛

1. 生姜治辜丸痛 (317)
2. 川红丹参汤治辜丸痛 (317)

第五篇 皮肤科常见病防治秘方

一、酒渣鼻

1. 百苦雷散治酒渣鼻 (319)

二、冻疮

1. 黄芪桂枝五物汤加味治疗局限性冻疮
..... (320)
2. 复方乌头酊防治冻疮 (320)
3. 茄子方治冻疮 (321)
4. 辣椒酒防治冻伤 (321)
5. 老丝瓜末治冻疮 (321)
6. 谷糠治冻疮 (322)
7. 花生皮治冻伤 (322)

三、疥疮

1. 双黄油治疗疥疮 (322)
2. 乳鸽绿豆治干湿疥癣 (322)
3. 小蝌蚪治疥疮灵 (323)

四、黄水疮

1. 脓疮洗剂外治黄水疮 (323)
2. 麦秆灰治黄水疮 (324)

五、癣证

1. 大蒜治疗金钱癣证 (324)

六、手足癣

1. 苦参醋浸泡法治疗手足癣 (325)
2. 复方藿香洗剂治疗手足癣 (325)

3. 熏洗法治足癣感染 (326)
4. 治癣灵治癣疤 (326)
5. 涤癣净治疗手足癣 (326)

七、皮肤瘙痒症

1. 苍艾洗剂治皮肤瘙痒症 (327)
2. 凉血祛风汤治疗皮肤瘙痒症 ... (328)
3. 盐泔煎洗治皮肤瘙痒症 (328)
4. 祛风止痒汤 (328)
5. 润肤止痒液 (329)
6. 滋血止痒汤治疗老年皮肤瘙痒症
..... (329)
7. 祛风止痒汤治皮肤瘙痒症 (330)
8. 蛇床子散治皮肤瘙痒 (330)
9. 大黄芒硝冰片治皮肤病 (331)
10. 三叶甘草液治皮肤溃疡 (331)
11. 四黄液治皮肤感染 (331)
12. 醋蒜治神经性皮炎 (331)
13. 醋蛋治神经性皮炎 (332)
14. 鲜丝瓜叶治皮炎 (332)
15. 米糠馏油治皮炎 (332)
16. 苦参制剂疗皮炎 (332)
17. 猪胆汁治脂溢性皮炎 (332)
18. 豆腐皮治皮炎瘙痒 (333)

八、白癜风

1. 如意黑白散治白癜风(白斑病) ... (333)
2. 三季红酊治疗白癜风 (333)
3. 马齿苋配合日光浴治疗白癜风 ... (334)

4. 补骨脂酊治疗白癜风 (334)

九、扁平疣

1. 木贼外洗方治疗扁平疣 (335)

2. 消疣汤 (335)

十、烂脚丫

1. 梅叶酊治疗烂脚丫 (336)

十一、带状疱疹

1. 冰硼散治带状疱疹 (336)

2. 龙韭液清热凉血 (337)

3. 仙人掌治带状疱疹 (337)

4. 杉木炭方治带状疱疹 (337)

5. 蜂胶制剂治带状疱疹 (337)

6. 外用蜈蚣粉治带状疱疹 (338)

7. 马齿苋膏治带状疱疹 (338)

十二、荨麻疹

1. 程氏秘方治疗荨麻疹 (339)

2. 十全大补汤加味治荨麻疹 (339)

3. 艾叶酒治疗荨麻疹 (339)

4. 蟾蜍汤治荨麻疹 (340)

5. 芝麻根治荨麻疹 (340)

6. 韭菜治荨麻疹 (340)

7. 祛风凉血汤 (340)

8. 黄芪桂枝汤 (341)

十三、银屑病

1. 消屑汤治疗银屑病 (342)

2. 滋血熄风汤治疗银屑病 (342)

十四、皮肤过敏

1. 海螃蟹治漆过敏 (343)

2. 鹌鹑蛋防止过敏反应 (343)

十五、鹅掌风、鸡爪风

1. 海带白肉汤治鹅掌风 (343)

2. 醋治鹅掌风 (343)

3. 黑木耳苕麻根治鸡爪风 (344)

4. 土槿羊蹄醋治鹅掌风 (344)

十六、痱子

1. 枸杞梗叶消除痱子 (345)

2. 绿豆滑石粉治小儿痱子 (345)

3. 黄瓜方治小儿痱子 (345)

十七、痤疮

1. 丹紫黄白汤治痤疮 (346)

2. 紫丹饮治痤疮 (346)

十八、鸡眼

验方十二条 (347)

第六篇 美容秘方

一、青年脱发

1. 生发汤治疗青年脱发 (349)

二、青年粉刺

1. 香油使君子治粉刺 (350)
2. 皂角刺治粉刺奇效 (350)

三、腋 臭

1. 碘酊治疗腋臭 (350)
2. 泥鳅消炎除腋臭 (350)
3. 鲜姜汁涂腋消炎祛臭 (351)
4. 灶心土除治狐臭 (351)
5. 复方陀僧散治疗腋臭方 (351)

四、祛斑洁面

1. 丝瓜络汤治蝴蝶斑 (352)
2. 杏仁蛋清美面消斑 (352)
3. 乌梅方消黑痣 (352)
4. 消斑美容汤 (353)

五、美泽容颜

1. 容颜不老方 (353)
2. 慈禧太后美容方 (353)
3. 玉器美容 (354)
4. 莲藕方驻颜轻身 (354)
5. 黑豆丸悦泽面容 (354)
6. 核桃大豆汤永葆面部红润 (354)

六、去皱美容

1. 蛋黄蜂蜜去皱方 (355)
2. 养乐多祛皱养颜 (355)

七、青春痘

1. 盐水洗脸可除青春痘 (356)
2. 枇杷叶外洗可祛痘 (356)
3. 藜菜除面疱 (356)
4. 蟾蜍祛除青春痘 (356)

八、雀 斑

1. 冬瓜莲子粉祛雀斑 (357)
2. 桃花粉祛雀斑 (358)
3. 冬瓜祛斑美容 (358)
4. 牵牛花祛斑 (358)
5. 赤小豆花可消除雀斑 (358)
6. 香菜水治雀斑 (358)
7. 糯米膏祛雀斑 (359)

九、黑 斑

1. 消石灰外敷治黑斑 (359)
2. 黑砂糖增白祛斑 (359)
3. 薏仁祛黑斑 (360)
4. 四白香绿粉治黑斑 (360)

十、汗 斑

- 验方十一条 (360)

十一、化妆品引起的斑疹

1. 蜂蜜奇效祛斑疹 (361)

十二、妇女驻颜法

- 验方八条 (362)

十三、面颊发红

1. 冰热混合法治面颊发红 (363)

十四、使面如白玉五法

- 验方五条 (363)

十五、美肤法

1. 油性皮肤 (364)
2. 干性皮肤 (364)
3. 皮肤粗糙 (365)
4. 毛孔太粗 (365)
5. 晒太阳后的皮肤粗糙 (366)
6. 黑皮肤 (366)
7. 皮肤缺乏光泽 (367)
8. 皮肤脆弱 (367)
9. 病后皮肤活力的恢复 (367)
10. 美 肤 法 (368)

十六、减肥轻身

1. 玉米须利湿消胖 (368)
2. 常吃4种蔬菜减肥 (368)
3. 饭前吃水果减肥 (369)
4. 大腹皮冬瓜皮等减肥 (369)
5. 生地黄,生黄芪等可减肥 (369)

十七、乌须美发

1. 黑豆治青年白发 (370)
2. 芝麻核桃糖治须发早白 (370)
3. 芝麻油治发落不生 (370)
4. 南烛膏黑发驻颜 (370)
5. 姜皮生黑发方 (371)
6. 醋煮黑豆刷染白发 (371)
7. 核桃绿皮染发方 (371)
8. 乌发丸治疗少年白发 (371)

十八、爽口香身

1. 杏仁膏使齿洁口香 (372)
2. 浓茶漱口爽口洁齿 (372)
3. 松树皮丸美容香身 (372)
4. 香草浴液香身爽体 (373)

第七篇 解烟毒、酒毒秘方

1. 豆酱缓解烟毒 (374)
2. 戒烟糖戒除吸烟嗜好 (374)
3. 萝卜戒烟简单有效 (374)
4. 加味丁桂散戒烟 (374)
5. 萝卜解酒后头痛 (375)

6. 浓茶除口臭解烟酒之毒 (375)
7. 螺蚌葱豉汤治酒醉不省 (375)
8. 老菱角汤解酒毒 (375)
9. 柿子防酒醉 (375)
10. 甘蔗汁解酒醉不食 (375)

11. 解酒简易偏方 8 例 (376)

12. 葛花萝卜煎治酒精中毒 (376)

第八篇 解食物中毒秘方

1. 楠木治河豚鱼中毒 (377)

2. 南瓜根汤治河豚毒 (377)

3. 番薯叶解河豚及菌毒 (377)

4. 芦根汤解河豚或蟹中毒 (377)

5. 无花果叶治鱼蟹中毒 (377)

6. 鲜冬瓜汁解鱼蟹中毒 (378)

7. 杏树皮解杏仁中毒 (378)

8. 鱼脑石解野菌中毒 (378)

9. 生鸡血解砒霜中毒 (378)

10. 胡萝卜缨解砒毒 (378)

第一篇 中老年常见疾病防治秘方

一、高血压

高血压是指动脉血压过高，即舒张压超过 12 千帕（90 毫米汞柱），或收缩压在 40 岁以前超过 18.7 千帕（140 毫米汞柱）。可分为原发性高血压（高血压病）和继发性高血压（症状性高血压）两大类。前者是一种病因尚未完全明了的以动脉血压增高为主要表现的常见疾病，属中医的“头痛”、“眩晕”范畴；后者是由于某些疾病引起，作为这些疾病的主要症状之一。本节主要讨论前者。

1. 白矾治痰厥和高血压

〔方 剂〕 以白矾 60 克，米泔水一大煲。

〔制用法〕 煮热至白矾溶化后，乘温浸双足。

〔疗 效〕 降压效果奇佳。

〔验 证〕 刘××，女，53 岁。单用白矾米泔热水浸脚 10 分钟后，收缩压降低 4.00 千帕斯卡、舒张压降低 2.67 千帕斯卡，自觉舒服。其夫惊叹比服一般降压药效果还好。一老姬，患支气管哮喘，呼吸困难，面色苍白，即取白矾 10 克捣碎开水溶化，徐徐饮下，片刻患者呼吸轻松，病减大半，日后常以白矾冲服，同时服二陈汤加减，历经半年治疗而愈。

〔备 注〕 必须用米泔水煮溶白矾效果才好。有些体瘦病人用开水溶浸后，自觉胸中不适，而用米泔水无此感觉，机理待探。

2. 中药敷贴涌泉穴治疗高血压

〔方 剂〕 桃仁、杏仁各 12 克，栀子 3 克，胡椒 7 粒，糯米 14 粒。

〔制用法〕 上药共捣烂，加 1 个鸡蛋清调成糊状，分 3 次用。于每晚临睡时敷贴于足心涌泉穴，白昼除去。每天 1 次，每次敷 1 足，两足交替敷贴，6 次为 1 疗程。3 天测量 1 次血压，敷药处皮肤出现青紫色。

〔疗 效〕 有降压特效。

[验证] 刘××，女，47岁，1981年5月16日就诊。患高血压8年，长期服降压药收效不佳。头痛胀昏，头面烘热，手足心热，血压22.7/14.7千帕斯卡，舌红，苔薄白，脉弦细。停服降血压中西药，采用本法治疗。5月21日复诊，自觉症状减轻。5月29日三诊，除轻微头痛外，其他症状消失，血压18.7/11.7千帕斯卡。停用敷贴药物，至1982年6月曾多次复查血压，均在18.1~18.7/11.7~12千帕斯卡之间，一般情况良好。

3. 拌菠菜海蜇解头痛面赤

[方剂] 菠菜根100克，海蜇皮50克，香油、盐、味精适量。

[制用法] 先将海蜇洗净成丝，再用开水烫过，然后将用开水焯过的菠菜根与海蜇加调料同拌，即可食用。

[功效] 平肝，清热，降压。可解除高血压之面赤、头痛。

[验证] 郑××，女，57岁，因患高血压平素常头痛不已，后服用本方后明显好转，坚持服用未见复发。

4. 松花蛋菜粥用治高血压

[方剂] 松花蛋1个，淡菜50克，大米50克。

[制用法] 松花蛋去皮，淡菜浸泡洗净，同大米共煮作粥，可加少许盐调味。食蛋菜饮粥，每早空腹用。

[功效] 清心降火。治高血压、耳鸣、眩晕、牙齿肿痛等。

[验证] 据《卫生报》介绍本方深受广大群众喜爱。

5. 花椒蛋治高血压

[方剂] 鹅蛋1个，花椒1粒。

[制用法] 在鹅蛋顶端打一小孔，将花椒装入，面糊封口蒸熟。每日吃1个蛋，连吃7天。

[功效] 清热解毒。

[验证] 据《老年报》介绍，本方具有预防保健作用。

6. 鲜西红柿治高血压

[方剂] 鲜西红柿2个。

[制用法] 将西红柿洗净，蘸白糖每早空腹吃。

[功效] 清热降压、止血。

[验证] 周×，女，60岁，长期服用本方，未发现高血压征象。

7. 菊槐绿茶饮治高血压

〔方 剂〕 菊花、槐花、绿茶各 3 克。

〔制用法〕 以沸水沏。待浓后频频饮用。平时可常饮。

〔功 效〕 清热、散风。治高血压引起的头晕头痛。

〔验 证〕 本方深受广大高血压患者好评，不断反映效果良好。

8. 醋浸花生米治高血压

〔方 剂〕 生花生米、醋各适量。

〔制用法〕 生花生米（带衣者）半碗，用好醋倒至满碗，浸泡 7 天。每日早晚各吃 10 粒。血压下降后可隔数日服用 1 次。

〔功 效〕 清热、活血。对保护血管壁、阻止血栓形成有较好的作用。

〔验 证〕 石××，男，55 岁，患高血压 3 年，长期服用本方，收效甚佳。

9. 西瓜皮草决明汤降血压

〔方 剂〕 风干西瓜皮 30 克，草决明 15 克。

〔制用法〕 加水煎汤。代茶饮。

〔功 效〕 清热散风。

〔验 证〕 据《卫生报》介绍，本方疗效很好。

10. 玉米须煎饮治高血压

〔方 剂〕 玉米须 60~80 克。

〔制用法〕 将玉米须晒干，洗净，加水煎。每日饮 3 次，坚持服用。

〔功 效〕 利尿，利胆，止泻。玉米须中含有大量钙、磷、铁等微量元素，并含有丰富的谷氨酸，可促进脑细胞的新陈代谢，有利于人体内的脂肪与胆固醇的正常代谢。对治疗高血压病及慢性肾炎，有很好的作用。

〔验 证〕 经临床治疗 51 例，有效 45 例，好转 6 例，总有效率 100%。

11. 猪脑炖枸杞补虚治高血压

〔方 剂〕 猪脑 1 副，怀山药 30 克，枸杞 10 克，盐少许。

〔制用法〕 将怀山药、枸杞用纱布包扎好，与猪脑加水共炖，将熟时下盐或调料。食之。

〔功 效〕 补肾益精。

〔验 证〕 钱×，女，53 岁，坚持服用本方，收效甚好。

12. 龙胆硫黄粉治高血压

[方 剂] 吴茱萸（胆汁制）500 克、龙胆草醇根物 6 克、硫黄 50 克、白矾（醋制）100 克、朱砂 50 克、环戊甲噻嗪 17.5 毫克。

[制用法] 上药共研细末，贮瓶备用。每次用药粉 200 毫克左右，倒入患者肚脐窝内、覆盖棉球、胶布固定。每周换药 1 次，至愈为度。

[功 效] 降水泻肿、化疫、镇静、安神。

[验 证] 治疗 116 例，经治 4 次后，总有效率为 77.5%。其中显效率为 29.31%，从 85 例症状疗效看，总有效率为 82.35%。以Ⅰ、Ⅱ期高血压疗效较好。

[备 注] 引自《中药鼻脐疗法》。验之临床，本方对肝热、痰火所致的初中期高血压，确有较好的疗效。

13. 肉桂吴茱萸等外敷治高血压

[方 剂] 肉桂、吴茱萸、磁石各等份。

[制用法] 上药共研细末，密封备用。用时每次取上药末 5 克，用蜂蜜调匀，贴于涌泉穴上，阳亢者加贴太冲穴，阴阳不足者加贴足三里。每次贴两穴，交替使用。贴后外以胶布固定。并用艾条悬灸 20 分钟。每天于临睡前换药 1 次。

[功 效] 引火归原，降压止晕。

[验 证] 临床观察，尤对病情不太严重者疗效满意。对老年患者还可起保健作用。

[备 注] 引自《外治汇要》

14. 金银菊花汤治高血压

[方 剂] 金银花、菊花各 24~30 克。

[加 减] 若头晕明显者，加桑叶 12 克；若动脉硬化、血脂高者加山楂 24~30 克。

[制用法] 本方为 1 日剂量。每日分 4 次，每次用沸水冲泡 10~15 分钟后当茶饮，冲泡 2 次弃掉另换。可连服 3~4 周或更长时间。

[疗 效] 治高血压有奇效。

[验 证] 用上药治疗高血压患者 46 例，（其中单纯高血压病 27 例，单纯动脉硬化症 5 例，高血压伴有动脉硬化 14 例）。服药 3~7 天后头痛、眩晕、失眠等症状开始减轻，随之血压渐降至正常者 35

例，其余病例服药 10~30 天后均有不同程度的效果。

15. 泽泻混合并用汤治高血压

- [方 剂] 泽泻 30~50 克，川芎、白术各 20~30 克，草决明、野菊花、桑寄生各 15~20 克，钩藤 40~60 克，全蝎 5~10 克。
- [加 减] 若属气血瘀阻型者，加丹参、桃仁、红花各 15~30 克；若属气阴两虚型者，加川断、生地黄各 10 克；若属肝阳上亢型者，加玄参、枸杞、麦冬各 10~15 克。
- [制用法] 将上药水煎 3 次后合并药液，分 2~3 次口服。每日 1 剂。10 剂为 1 疗程。
- [疗 效] 治高血压有神效。
- [验 证] 用本方治疗高血压病患者 60 例，其中显效者（血压恢复正常，症状消失）45 例；有效者（血压基本恢复正常，症状好转）12 例；无效者（治疗前后无明显变化）3 例。显效病例经随访 2 年，均未见复发。

16. 向日葵叶汤降血压

- [方 剂] 鲜向日葵叶 120 克。
- [制用法] 洗净煎汤。每日 3 次分服。
- [疗 效] 治高血压。
- [验 证] 《江西中医药》介绍：一男性，年 67 岁，患高血压，头晕眼花、四肢瘫痪、语言謇涩、神志欠清、体温偏高。经连服本品煎剂十余天，血压、体温均恢复正常。

二、低 血 压

低血压是指由于不明原因引起收缩压低于 12.0kPa (90mmHg) 同时舒张压低于 8.00kPa (60mmHg)，并以头晕、头昏、心悸、乏力、脉弱为主的一种心血管系统疾病。本病原因有原发性与继发性之分。继发性因孕妇之胎儿或腹腔和盆腔肿物的压迫，或某些麻醉药阻断交感神经节前纤维，或大出血、心肌梗死、心肌炎等引起心收缩力减弱而心输出量减少所致；原发性者病因不明，但多与静脉血回流减少、心排血量减少有关。临床表现，急性而严重者，由于血压骤下降，引起心脑血管供血不足，出现头晕、头昏、面色苍白、心悸、出汗、恶心、脉搏摸不到等休克危象；慢性而较轻者，则有头晕头昏、面色苍白、精神不振、心悸、乏力、纳差、腰膝酸软、胸闷、嗜睡或少寐、脉弱、血压持续偏低等症。

心电图、脑电图及血常规检查，多无异常，或有轻微改变。

1. 党参黄精治低血压

【方 剂】 党参、黄精各 30 克，炙甘草 10 克。

【制用法】 将上药水煎顿服，每日 1 剂。

【验 证】 用上方治疗低血压症患者 10 例，均获近期痊愈。其中贫血性低血压 5 例，感染后低血压 3 例，直立性低血压 1 例，原因不明 1 例。一般服药 2~3 剂见效，如不治疗原发病则远期疗效欠佳。

2. 黄芪党参等治低血压

【方 剂】 生黄芪、党参各 20~30 克，白术、当归、柴胡各 10~15 克，升麻 10~12 克，枸杞子 25~35 克，附子 6~10 克，炙甘草 5~8 克。

【加 减】 若心烦失眠、健忘多梦者，加远志、夜交藤各 10 克；若腰酸腿软者，加川续断、牛膝、杜仲各 10~15 克；若全身疼痛者，加鸡血藤、川芎、威灵仙各 10~12 克，细辛 3 克。

【制用法】 将上药水煎，每日 1 剂，分 2~3 次口服。1 周为 1 个疗程。

【验 证】 用本方治疗低血压患者 69 例，其中显效者 53 例（血压升至正常，临床症状消失）；好转者 12 例（血压上升接近正常，临床症状基本消失）；无效者 4 例（治疗前后无变化）。一般服药 1~2 周即可收效。

3. 黄芪官桂等治低血压

【方 剂】 生黄芪、党参各 15 克，黄精 20 克，官桂 8 克，大枣 10 枚，生甘草 6 克。

【制用法】 将上药水煎 3 次后合并药液，分早、中、晚 3 次口服，每日 1 剂。20 天为 1 个疗程。可连服 2~3 个疗程，直至痊愈为止。

【验 证】 用本方治疗低血压患者 57 例，经用药 1 个疗程后，症状基本消失，血压升至正常范围者 20 例；连服 2 个疗程后，症状基本消失，血压升至正常范围者 35 例；2 例因未坚持用药疗效不明。服药中未见不良反应。

4. 人参黄芪等治低血压

【方 剂】 人参 6 克（或党参 15 克），黄芪、熟地黄、怀山药各 25 克，山茱萸、枸杞子各 20 克，牡丹皮、泽泻、麦门冬、茯苓、五味子各 10 克，生甘草 6 克。

- 【加 减】** 临床应用本方时，可随证加减。若气虚明显者，黄芪可重用至40~50克；若血虚者，加全当归、何首乌、鸡血藤各20~30克；若头晕甚者，加野菊花、天麻、钩藤各10~15克；若腰膝酸痛者，加杜仲、狗脊、川续断各10~15克；若阴虚火旺者，加川黄柏、知母、生地黄各8~12克。
- 【制用法】** 将上药水煎，每日1剂，分3~4次口服，半个月为1个疗程。
- 【验 证】** 用本方治疗低血压患者55例，经用药1~2个疗程后，其中痊愈者（血压恢复到正常范围）48例；显效者（血压接近正常者）5例；无效者（治疗前后无明显变化）2例。

5. 西洋参桂枝等治低血压

- 【方 剂】** 西洋参5克，桂枝15克，制附子12克，生甘草10克。
- 【制用法】** 将上药用开水泡服，频频代茶饮。每日1剂。服至症状消失，血压恢复正常为止。
- 【验 证】** 用本方治疗低血压病患者28例，经用药20~31天，血压均恢复到正常范围。随访3~5年，未见复发。

6. 芪麻鸡治低血压

- 【方 剂】** 嫩母鸡1只，黄芪30克，天麻15克，葱、姜各10克，食盐1.5克，黄酒10克，陈皮15克。
- 【制用法】** 母鸡去毛、爪及内脏，入沸水中焯至皮伸，再用凉水冲洗。将黄芪、天麻装入鸡腔内。将鸡放于砂锅中，加入葱、姜、盐、酒及陈皮，加水适量，文火炖至鸡烂熟，加胡椒粉少许即可食用。
- 【功 效】** 补宜肺脾，益气补虚。用治低血压引起的食欲不振，腹胀腰酸，头昏乏力，头晕目眩，眼冒金花，久立久卧突然起身时出现眼前发黑，并伴有心悸、胸闷、面色苍白、出冷汗、失眠等。
- 【验 证】** 用本方治疗低血压病患者50例，48例血压均恢复到正常范围，两例治疗期间中断用药。
- 【备 注】** 低血压，是指血压经常在12/8千帕（90/60毫米汞柱）以下，其症状如上所述。血压偏低的老年人血流缓慢，血液稠度高，凝固性高，使脑部供血不足。引起缺血、缺氧，加之动脉硬化使血管腔变窄，血管壁弹性减弱，容易形成血栓，发生中风。因此，老年人血压低，不能高枕无忧，更应引起重视。

三、冠心病

由冠状动脉粥样硬化，使血管腔阻塞，导致心肌缺血、缺氧而致动脉粥样硬化性心脏病（简称冠心病）。临床表现以心绞痛，心律不齐，心力衰竭等为主，心电图可有心肌缺血等相应的改变。

1. 海带松可治冠心病

【方 剂】 浸发海带 200 克，香油，绵白糖、精盐少许。

【制用法】 先将浸软泡发洗净的海带放入锅内煮透捞出，再用清水洗去粘液，沥干水分后，即可把海带摆叠好切成细丝。然后在锅内放入香油，油七成热时，把海带丝稍加煸炒，盖上锅盖，略经油炸，揭开锅盖继续焙炸。当海带发硬、松脆时，便捞出沥去余油入盘，加入绵白糖、精盐拌匀即可食用。

【功 效】 软坚化痰，利水泄热。对于预防高脂血症、高血压、冠心病、血管硬化等均有一定的作用。

【验 证】 史××，男，56岁，常年患高血压，高脂血症、冠心病，在医学杂志上发现此方，服用半年，去医院检查以上病症均恢复正常。

【备 注】 常食海带，对冠心病有辅助疗效。海带中含有大量的碘，有防止脂质在动脉壁沉着的作用，能使人体血管内胆固醇含量显著下降。

2. 香蕉茶防治冠心病

【方 剂】 香蕉 50 克，蜂蜜少许。

【制用法】 香蕉去皮研碎，加入等量的茶水中，加蜜调匀当茶饮。

【功 效】 降压，润燥，滑肠。用治冠心病、高血压、动脉硬化及便秘等。

【验 证】 李××，男，73岁，常年服用上方，身体强健，无高血压、冠心病等病史。

【备 注】 每日服蜂蜜 2 或 3 次，每次 2~3 匙，有营养心肌、保护肝脏、降血压、防止血管硬化的效果。

3. 长命包子防治冠心病

【方 剂】 马齿苋、韭菜等分，葱、姜、猪油、酱油、盐、鸡蛋各适量。

〔制用法〕 将马齿苋、韭菜分别洗净，阴干2小时，切碎末。将鸡蛋炒熟弄碎。然后将马齿苋、韭菜、鸡蛋拌在一起，加上精盐、酱油、猪油、味精、葱、姜末为馅，和面制成包子，放在笼里蒸熟食用。

〔功效〕 清热祛湿，凉血解毒。可防治老年人的冠心病，常吃能使人延年益寿，故有“长命包子”之美称。

〔验证〕 经《老年杂志》介绍，该方多次试用，效果理想，值得推广。

4. 蜂蜜首乌丹参汤治冠心病

〔方剂〕 蜂蜜25克，首乌、丹参各25克。

〔制用法〕 先将两味中药水煎去渣取汁，再调入蜂蜜拌匀，每日1剂。

〔功效〕 益气补气，强心安神。治冠状动脉粥样硬化性心脏病。

〔验证〕 王××，男，66岁，常服用上方，冠心病痊愈。

5. 适量饮酒可预防冠心病

〔方剂〕 葡萄酒或白兰地（以低度酒为限）。

〔制用法〕 每天用餐时适量酌饮。

〔功效〕 预防冠心病。

〔验证〕 黄××，男，76岁，有饮用习惯，据查无冠心病史。

〔备注〕 法国布隆市营养和血管病理生理学研究所研究员雷诺指出，法国人每天都饮佐餐酒，而且吃高脂肪的鸡肝酱，但患心脏病的人却不多。正是法国人的天天饮几杯酒这一嗜好保护了他们的心脏。因为酒使血液中高密度脂蛋白这一“好”胆固醇的含量增加。同时，适量的酒精还能阻止血小板凝聚，从而保护心脏。

国外媒介对适量饮用低度酒，预防冠心病的经验时有报道。应当指出，所谓“适量酌饮”，是根据不同人的不同体质和病情而决定饮用量。有的人不宜饮酒，如伴有高血压、心动过速等的冠心病患者。

6. 水蛭九香虫等治冠心病

〔方剂〕 水蛭、九香虫、廬虫各3克，郁金9克，茵陈30克。

〔制用法〕 本方为1日的剂量。将上药经水煎去渣浓缩成膏，加入适量的赋形药制成片剂，每片0.5克（相当于生药2克）。每次服4~8片，每日3次。

[疗效] 治疗冠心病。

[验证] 用上药治疗冠心病患者 100 例，其中对冠心病患者的心绞痛、胸闷、气短等症状的缓解，有效率为 94%；对冠心病合并有高血压的 36 例患者，有 30 例血压降至正常范围；血胆固醇增高的 14 例患者中，有 11 例降至正常；对改善心电图的有效率为 55%。对素有胃病者，服用本方后每感胃脘不适、肠鸣，或轻度腹泻。100 例患者中有 1 例出现过敏性皮疹。在停药后即自行消退。

7. 党参黄芪等治冠心病

[方剂] 党参 20 克，黄芪 30 克，川芎、枸杞子、制何首乌、牡丹皮各 15 克，丹参 25 克，炒白术、茯苓、淫羊藿、桂枝各 10 克，全当归 20 克，炙甘草 8 克。

[制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 1~2 次口服，20 天为 1 疗程。

[功效] 治冠心病有奇效

[验证] 用本方治疗冠心病患者 85 例，经用药 1~2 疗程后，显效者 53 例，有效者 32 例。

四、脑梗塞

脑梗塞是由于颅内外供应脑部的血管阻塞引起其供血范围内的脑组织缺血，缺氧所致之坏死。属中医之“中风”范畴。

1. 中风丸治疗脑梗塞

[方剂] 鳖甲、牛黄、麝香、马钱子、鸡血藤、黄芪、川芎、全蝎、僵蚕等。

[制用法] 碾碎制成丸，每次 1 丸，每天两次。

[功效] 有通经活络，扶正固本之效。主治中风、类中风。

[验证] 曾治 20 例均愈。住院最短 14 天，最长 65 天，平均 42 天。服药方法：每次 1 丸，每天 2 次；首先用倍量，疗程两周。服药后约 30 分钟，语塞即缓解，患肢肌力增加，并能增加小幅度的随意运动。如过量服用可出现肢麻、抖动。病例：吴×，男，58 岁，住院号 7074。主诉：患脑血栓形成后，在市血栓病防治中心用“蛇毒”治疗三个月，现仍步履艰难；左上肢呈弛缓性瘫，体检时血压 21/12 千帕斯卡，口语不清，口角右斜，精神

不振，面色无华，舌体左斜，舌苔薄白，脉沉弦。CT 诊断：脑梗塞。中风预报值：全血高切：15.3，全血低切：8.4，血浆粘度：3.4，纤维蛋白原：40300，胆固醇、甘油三脂均高于正常值。治疗以中风丸为主，每次 1 丸，首次倍量（丸重 5 克）。服药后 30 分钟，左上肢即能上举齐眉，服药 45 天兼用维脑路通。出院时病人五官正，语言清楚；左上肢肌力达Ⅳ级，手指分指运动灵活，左下肢肌力达Ⅴ级，步态稳。生活基本能自理，临床治愈。

〔备注〕 引自 1986 年《医学文选》。

2. 香蕉花饮预防中风

〔方 剂〕 香蕉花 5 克。

〔制用法〕 煎水。代茶饮。

〔功 效〕 散热滞，活血脉。预防中风。

〔验 证〕 据《家庭保健》杂志介绍多名读者反映上方对预防中风确有良效。

〔备注〕 香蕉花多见于我国南方，且受开花季节限制，取用多有不便，可用香蕉代替。香蕉花含有极丰富的钾，对预防中风，减小中风的发作危险很有作用。香蕉虽不及其花含钾量高，但每天坚持食用，同样具有一定的预防作用。

3. 姜汁白矾治中风休克

〔方 剂〕 鲜姜汁（榨汁）1 杯，白矾 6 克。

〔制用法〕 开水冲化白矾后对姜汁。灌服。

〔功 效〕 散风，温中，醒神。

〔验 证〕 据《老年杂志》介绍读者反映效果不错，可以推广。

五、高脂血症

高脂血症乃指以头昏、头晕、头痛、胸闷胸痛、腹胀、肥胖等为主的一种脂类代谢过剩性疾病。

1. 消脂丸治疗高脂血症

〔方 剂〕 炒苍术 60 克，炒枳壳 60 克，何首乌 60 克，决明子 180 克，炒山楂 180 克，泽泻 120 克，红花 60 克，丹参 60 克，车前子 60

克，肉苁蓉 60 克，刺蒺藜 60 克，杭菊花 60 克，茺蔚子 60 克，白茯苓 90 克，陈皮 40 克，石菖蒲 40 克，制胆星 40 克，川郁金 60 克，远志 60 克。

〔制用法〕 诸药粉碎为细末，过筛，水泛为丸如小绿豆大，每次服 5 克，1 日 3 次，3 个月为 1 疗程，复查。可连服 2~3 个疗程。

〔功效〕 行气活血，化湿消痰。

〔验证〕 胡某某，女，61 岁，退休职工。10 余年来，经常头晕、头昏、头痛、血压偏高不稳，曾检查，血糖、血脂偏高。近来头昏加重，近事易忘，故来就诊。形体肥胖，脉细涩，苔黄白，舌质红偏黯，舌体胖且有瘀斑；血压 20.0/12.7kPa，空腹血糖 6.8mmol/L，血清胆固醇 11.2mmol/L，血清甘油三酯 8.44mmol/L，血清高密度脂蛋白（HDL-C）0.6mmol/L。诊为高脂血症。证属阴阳失调，痰瘀湿浊内阻。用连服两个疗程，并适当节制饮食加强体质锻炼，后复查，血压及血脂、胆固醇皆降至正常范围，诸症消除。随访 2 年，上述指标持续稳定。

〔备注〕 本例患者血糖、血压均偏高，但尚未构成糖尿病、高血压病。见头昏头痛，检查血脂、胆固醇又明显升高，可能由于痰浊瘀滞脉络，脑动脉管壁受阻或舒缩失调以及阴虚阳亢所致。余以化痰活血之消脂药从高血脂治疗，并制成丸剂，缓缓进服，使邪浊得消于潜移默化之中，故血脂、胆固醇降至正常，诸症亦随之消失。

2. 醋泡花生降血脂

〔方剂〕 米醋、花生仁各适量。

〔制用法〕 以好醋浸泡优质花生仁，醋的用量以能浸透花生仁为度。浸泡 1 周后即可食用。每日早晚各吃 1 次，每次 10~15 粒。

〔功效〕 通脉，降脂。治疗高脂血症、冠心病。

〔验证〕 王×，男，65 岁，服用上方，高脂血症，冠心病症状皆消失。

3. 双耳汤软血管降血脂

〔方剂〕 白木耳、黑木耳各 10 克，冰糖 5 克。

〔制用法〕 黑、白木耳温水泡发，放入小碗，加水、冰糖适量，置蒸锅中蒸 1 小时。饮汤吃木耳。

〔功效〕 滋阴益气，凉血止血。适于血管硬化、高血压、冠心病患者食用。

〔验证〕 付××，男，58岁，服用上方，血脂正常。

4. 常食猕猴桃防癌降血脂

〔方剂〕 鲜猕猴桃。

〔制用法〕 可洗净吃，亦可榨汁饮用，常食有益。

〔功效〕 防止致癌物亚硝胺在人体内生成，有降低血胆固醇及甘油三酯的作用。对高血压等心血管疾病，肝、脾肿大均有疗效。

〔验证〕 李×，76岁，女，患高脂血症，常服上方，血脂归于正常。

5. 海带绿豆汤常饮降血脂

〔方剂〕 海带150克，绿豆150克，红糖150克。

〔制用法〕 将海带浸泡，洗净，切块。绿豆淘洗净，共煮至豆烂，用红糖调服。每日2次，可连续食用。

〔功效〕 清热，养血。治高血脂、高血压。

〔验证〕 张×，男，77岁，患高脂血症，服上方痊愈。

6. 黑芝麻桑椹糊降低血脂

〔方剂〕 黑芝麻60克，桑椹60克，白糖10克，大米30克。

〔制用法〕 将黑芝麻、桑椹、大米分别洗净后，同放入罐中捣烂。砂锅内放清水三碗煮沸后加入白糖，待糖溶化、水再沸后，徐徐放入捣烂的三味药物，煮成糊状服食。香甜可口，除病益身。

〔功效〕 滋阴清热。有降低血脂之良效。是治疗高脂血症的良方。

〔验证〕 据《健康杂志》推荐，疗效理想。

7. 冬青子治高脂血症

〔方剂〕 冬青子1500克，蜂蜜适量。

〔制用法〕 将冬青子加水煎熬2次，每次1小时，去渣，合并两次药液浓缩成膏状，烤干碾碎，加入适量蜂蜜混匀，贮瓶备用。用时，每日服用量相当于生药冬青子50克，分3次空腹服。服药1个月后抽血复查。

〔验证〕 用上药治疗高脂血症患者11例，其中10例有效。甘油三脂最高下降128毫克，最低下降57毫克，对 β -脂蛋白及胆固醇也有一定程度的降低。治疗中未发现副作用。治疗前后血常规检查未见不良影响。

8. 首乌泽泻汤治高脂血症。

〔方剂〕 制何首乌30克，泽泻20克，丹参10克，玉竹15克。

〔制用法〕 将上药水煎3次合并药液，分2~3次口服，每日1剂，半个月为1个疗程。

〔验证〕 用上药治疗高脂血症患者74例，临床治愈者56例，显效者11例；有效者5例；无效者2例。服药时间最短者15天，最长者45天，平均21天。对治愈和显效的67例随访1年，无1例复发。

六、脑 血 栓

脑血栓是指由于异常的物体（固体、液体、气体）随血流进入脑动脉或供应脑的颈部动脉，造成血流阻塞，使其供血区缺血、坏死，导致相应的脑功能障碍。

1. 桃红、红花等治脑血栓

〔方 剂〕 桃仁10~15克，红花、川芎各10~15克，当归10~30克，赤芍15克，穿山甲10克，鸡血藤30克。

〔加 减〕 若气虚者，加党参、黄芪、黄精等；若阴虚者，加白芍、生地、元参等；若失语者，加菖蒲、郁金；若高血压者，加野菊花；若便秘者，选加生地、元参、麦冬、火麻仁、大黄、芒硝等；若伴呼吸道感染者，加清热祛痰药等；若病重者，加丹参、苏木、三棱、莪术等。

〔制用法〕 将上药水煎，分2次服，每日1剂。连用2~3个月。少数病例配合服用路丁、维生素C、烟酸或烟酸肌醇脂，有8例每日肌注复方丹参注射液2ml。

〔验 证〕 用上药治疗脑血栓患者107例，经用药后，其中基本恢复者48例，显著好转者40例；好转者15例；无效者4例。总有效率为96.3%。

2. 葛根、红花、桃仁等治脑血栓

〔方 剂〕 葛根30~50克，红花、桃仁各15~25克，地龙、丹参各25~35克，全虫5~10克。

〔制用法〕 将上药水煎3次后合并药液，分早、晚两次空腹温服。每日1剂。15剂为1个疗程，休息3天后，再用本方治疗。

〔功 效〕 活血化瘀。

〔验 证〕 用此方治35例，32例痊愈。3例好转。

3. 黄芪丹参汤治脑血栓

[方 剂] 黄芪 50 克，丹参 30 克，炮穿山甲 15 克，川芎、赤芍、当归各 20 克。

[制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 3 次口服。半个月为 1 个疗程后，停药 2~3 日再行第二个疗程。

[验 证] 用本方治疗脑血栓患者 40 例，经用药 2~5 个疗程后，其中痊愈者 32 例；显效者 4 例；有效者 3 例；无效者 1 例。

4. 首乌当归汤治脑血栓

[方 剂] 何首乌、全当归各 30 克，川牛膝、赤芍、桃仁、红花、地龙、桂枝各 15 克，全蝎 6 克，茯苓 12 克，甘草 3 克。

[制用法] 每日 1 剂，水煎分 2 次服。

[验 证] 用本方治疗脑血栓患者 77 例，其中痊愈者 62 例；显效者 10 例；有效者 3 例；无效者 2 例。服药时间最少者 20 剂，最多者 56 剂，平均 41 剂。

七、面神经麻痹

本病又称“面神经炎”或“贝尔麻痹”。中医称“口眼歪斜症”。是一种急性非化脓性的茎乳突孔内的面神经炎。病因不明，特征为一侧面表情肌发生急性麻痹。

1. 蒺藜鳝血治面神经麻痹

[方 剂] 蒺藜草（又名丛枝蓼、火红辣蓼、辣蓼）、鳝鱼血各适量。

[制用法] 将蒺藜草捣烂，取一半炒热备用。然后将鳝鱼血涂布于患侧面部（如左侧口眼歪斜涂右侧面部，右侧涂左侧），待鳝鱼血干后，即将炒过与未炒过的蒺藜草混合拌匀敷在涂有鳝鱼血的部位，每天换 1 次，直到痊愈。一般在敷药 10~20 分钟后，患侧面部即有牵拉感，用药一天症状即有所减轻。治疗短的 3 天，长的 7~8 天，一般为 5 天。

[疗 效] 治疗 25 例，除 1 例因用药第 2 天自动放弃治疗外，其余 24 例全部治愈。

[验 证] 林×，女，56 岁。口眼歪斜已 7 天，经中药大秦艽汤、牵正散及西药治疗无效。诊见：口眼右斜，左眼不能闭合，眼泪外

溢，口涎淋漓不断，语言失利，前额皱纹消失。用上方治疗，首次敷药 20 分钟，患侧面部即出现强烈牵拉感，连用 5 天，病愈。随访 6 年，无复发。

2. 小续命汤加味和外敷巴豆治面神经麻痹

[方 剂] 肉桂末 2~6 克（冲服），附子、麻黄各 4 克，川芎 6 克，党参、白芍、杏仁、防风、黄芩、防己、白附子各 10 克，甘草 5 克，细辛 3 克，蜈蚣 3 条，地龙 15 克，陈巴豆（1~2 年内药效最好）10~13 克。

[制用法] 内服药水煎服。药渣趁热用两层纱布包敷熨患处，凉后加热再熨，反复多次。用药后最好睡觉，以利发挥药效。外敷药巴豆去壳捣烂如泥状（勿放水、油等物），按患者手心大小捏成饼状，置于患侧手心外，外盖敷料后绷带固定。24 小时后将巴豆饼翻转再敷 24 小时，48 小时后将巴豆饼取下捣烂，再做成饼状，再敷 24 小时，共 3 昼夜。敷药处一般有发痒、发热、起泡，甚至沿手臂到颈项、面部胀痛，眼睑浮肿等反应，均属正常，无须处理。反应太大可将敷药取下，反应很快减轻消失。若过后病未好转，可按原法再敷 1 次，治疗期适当休息。

[疗 效] 治疗 500 例，痊愈 443 例，显效 34 例，好转 8 例，无效 15 例。

[验 证] 李××，男，58 岁，1983 年 4 月 27 日诊。4 天前发现口眼歪斜，服中药 3 剂未效。检查：口眼鼻嘴唇等明显左侧歪斜，右眼睑裂变大，右口角下垂。诊为周围性右侧面神经麻痹。照以上方法，服药 5 剂后痊愈。

3. 蒲氏番蜜膏治面瘫

[方 剂] 番木鳖（即马钱子）500 克，白蜜适量。

[制用法] 将番木鳖加水 3600 毫升，煮沸 20 分钟，趁热刮去外皮，取净仁切片置瓦上文火烘酥，研筛为细末，白蜜调为稀糊状，文火煎熬 15 分钟，待温备用。将药膏涂患侧面部（向左边喎斜涂右侧，向右边喎斜涂左侧），厚约 0.2 厘米（口、眼部不涂），用纱布覆盖，每日换药 1 次。搽药处 3~5 天发生奇痒，6~8 天出现粒疹，9~14 日若疼痛剧烈，则为病愈先兆，即可停药。

[疗 效] 治疗 224 例，痊愈 199 例，好转 18 例，无效 7 例。

[验 证] 任××，女，3 岁，1977 年 10 月 3 日诊。患者于半年前高热后，次日发现口眼喎斜，迭经治疗无效。观右眼闭合不全，口

向左喎斜，苔淡白，指纹淡红微沉。用蒲氏番蜜膏外涂，每天更药1次，7次痊愈。随访6年，一直正常。

【备 注】 患者慎勿受风感寒，停止搽药2天后再洗脸，黑垢处每日擦鲜人乳3次，3~7天后肤色复原。据《中药大辞典》载：“马钱子苦寒有毒……并治面神经麻痹，重症肌无力。”本药有通络止痛，治麻痹瘫痪之功，白蜜外用有解毒之效，故本方对面瘫有卓效。

4. 面瘫方治疗面瘫

【方 剂】 当归、川芎各10克，蜈蚣3条，蝉蜕、甘草各6克，鲜地龙10条（焙干酒炒同煎），乌附片（先煎30分钟）、防风、钩藤、僵蚕各13克

【制用法】 上药加水煎3次，分3次温服，每天1剂，饭后服。

【疗 效】 均单服上方治疗24例，治愈20例，无效4例。无效4例中，1例脑瘤患者除口眼喎斜外，伴有同侧视力减退，头痛有跳痛感，呈阵发性发作，时有呕吐，服本方18剂无效，后经某医院X线摄片检查确诊为颅内恶性肿瘤，施行手术治疗无效而死亡；2例由化脓性中耳炎所致，经当地医院治疗无效，来我处求治，服本方5剂无好转，后中断治疗；另1例病程已达3年之久，来我处诊治1次，服药3剂无效。治愈20例中，1例因表虚自汗加黄芪一味，另1例由于中风偏瘫口眼喎斜用本方合用补阳还五汤加茯苓外，其余均未作加减，服本方治愈者最多12剂，最少3剂。

【验 证】 郭××，男，58岁，农民，1977年8月3日就诊。当天下午觉头晕，突然仆倒在地，扶起后先觉右侧手足不能动，随即面部肌肉有跳动感，口眼向右侧歪斜，神识清楚。检查能合作，语言稍不利，尚能少量饮食，舌质淡、苔白厚腻，脉沉滑。观其脉症，病位仍在经络，未见闭脱之象，证属风痰闭阻经脉，痰浊上扰清空。治用面瘫方合补阳还五汤加味。处方：黄芪、茯苓、乌附片、防风、僵蚕、钩藤各13克，桃仁、赤芍、当归、川芎各10克，红花、蝉蜕、甘草各6克，地龙10条。共服12剂，口眼喎斜恢复正常，右侧瘫痪肢体功能基本恢复，能参加轻体力劳动，生活能自理。

5/马蓖散贴穴治面瘫

【方 剂】 马钱子 5 粒，蓖麻子 10 粒。

【制用法】 将两药去壳取仁，粉碎为末，均匀混合后，用 0.2 克涂在小块伤湿止痛膏中央，贴在患侧。第 1 次贴翳风、颊车穴；隔日贴听宫穴、地仓穴，就此 4 穴轮换。

【疗 效】 治面瘫有奇效。

【验 证】 贾××，女，15 岁，1983 年 10 月 3 日诊。面部疼痛，瞪目不闭，露齿流泪 4 月余；眼、口角左斜。用“马蓖散”贴穴，4 次痊愈。

6. 强肌熄风汤治疗面神经麻痹

【方 剂】 炙黄芪 30 克，炒白术 30 克，怀山药 30 克，当归 30 克，桂枝 6 克，大青叶 30 克，牛蒡子 10 克，制胆星 6 克，制半夏 10 克，全蝎 1 克，蜈蚣 1 克，僵蚕 10 克，水蛭 3 克，廋虫 3 克，广地龙 10 克，蜂房 3 克，白芷 10 克，粉甘草 30 克，制马钱子 0.3 克。

【制用法】 每日 1 剂，水煎 3 次分 3 次服。3 周为 1 个疗程。后期可配丸服。

【功 效】 强肌通络，熄风化痰。

【验 证】 郑×，男，39 岁，干部。两个月前某日晨起洗漱时，突觉右侧脸部麻木，口角下垂，面部斜向左侧。经服药、针灸治疗不见好转，进食时右侧齿颊间隙常滞留残渣，口水频流而来就诊。检查口眼向左侧喎斜，前额皱纹消失，右眼裂变大，鼻唇沟平坦。诱其发笑，口眼喎斜尤为明显，鼓腮吹气，右侧口角漏气，脉弱，苔少舌红，血压 12.0/8.00kPa (90/60mmHg)。诊为面神经麻痹。证属气虚风袭，痰瘀阻络。拟用强肌熄风汤：炙黄芪、炒白术、怀山药、当归、大青叶、粉甘草各 30 克，川桂枝、制胆星各 6 克，牛蒡子、制半夏、僵蚕、广地龙，白芷各 10 克，水蛭、蜂房、廋虫各 3 克，蜈蚣（研末分 3 次冲服）。上方服 10 剂后，病侧面肌瘫痪好转。再服 10 剂，口眼及面部基本正常，唯发笑时仍有轻微喎斜。续以原方配丸剂内服以善后。1 年后随访，诸症悉除，未留遗患。

【备 注】 治疗本病，余认为当以补为主，以攻为辅，补以益气养血，意在强肌，攻以通络祛风，要在舒筋。但止痉药应当慎用，向以

白附子、防风之类治疗本病，然此二药止痉作用强，故余以桂枝温经通阳代之防风，牛蒡子祛风解毒消肿代之白附子。从吹冷风而发病，桂枝温经通阳不可少，从病理见有面神经水肿，牛蒡子等可消肿、解毒、燥湿化痰之品亦不可少，方中用了其它消肿解毒、化痰通瘀药，也正是围绕此病机；至于外敷药，余以为仅能作为辅助治疗之用，而且较为烦琐，若方便，可选其一辅以用之，不便则弃而不用。但汤方依然为本病的主用疗法，故本病患者，全凭汤剂坚持守方服药，终获满意疗效。

7. 相反药方治面瘫

〔方 剂〕 半夏、全瓜蒌、川贝母、白蔹、白及、川乌各 10 克，白附子 9 克、白芥子 12 克。

〔制用法〕 上药共研成细末，加陈米醋湿炒热，装入用 2 层纱布做的袋内即可。取上药袋敷于面部健侧（左歪敷右侧、右歪敷左侧）、绷带包扎固定。待药凉后，再炒再敷。

〔功 效〕 祛风、湿经、通络。

〔验 证〕 据多次临床验证，效果很好，一般 3~7 日即愈。

〔备 注〕 引自 1982 年《河南中医》(5)。本方不适用于脑血管意外和其它脑部疾患引起的面瘫。

8. 复方天牛膏治面瘫

〔方 剂〕 天牛虫 286 克、川芎、当归各 500 克、黄连 600 克、黄丹 360 克。

〔制用法〕 将天牛虫研细过 120 目筛备用。再将川芎、当归、黄连与食用植物油 2500ml，同置锅内煎枯，除渣滤过，熬至滴水成珠，另取黄丹，加入油内搅匀，收膏。取膏用文火熔化后，加入天牛虫粉搅匀，分摊于纸上即得。每张药膏重 2 克，含天牛虫粉 0.2 克，料可制 1430 张。同时取患侧听宫、下关、翳风为主穴，颊车、太阳、大椎穴为配穴。选定穴位后，将膏药加湿熔化，每个主穴贴 1 张，配穴视病情加减。每 5 天更换 1 次，为 1 疗程。总疗程不超过 35 天。

〔功 效〕 疏风活血，通经活络。

〔验 证〕 治疗 315 例，痊愈率为 78.41%，有效率 95.24%。无效 15 例，显效 35 例，好转 18 例。

〔备 注〕 引自 1995 年《江西中医药》。

9. 治咽膏治面瘫神效

【方 剂】 牙皂、潮脑各 30 克，麝香 0.3 克。

【制用法】 将牙皂研为细末，与潮脑、麝香同研和匀，加麻油适量，调和成糊状，装瓶备用。用时取上药膏适量，于临睡前涂敷。先用温肥皂水洗净患侧面部，再将上药敷于地仓至下关穴之间，宽约 1 横指，用纱布固定。次日清晨取下。每天 1 次，至愈为度。

【功 效】 祛风通络。

【验 证】 治疗 3 例，均痊愈。

【备 注】 引自 1956 年《上海中医药杂志》(10)。

10. 附乌散治面瘫

【方 剂】 熟附子、制川乌各 90 克，乳香 30 克。

【制用法】 上药共研细末，分成 8~10 包，备用。用时每取上药末 1 包，加生姜末 3 克拌匀，用开水调成糊状，即可使用。先嘱患者用热生姜生擦患处，擦至局部充血为好，再将上药糊状敷患侧（上至太阳穴，下至地仓穴），宽约 3 公分。用纱布敷盖，胶布固定。并嘱患者用热水袋热敷。每天换药 1 次，至愈为度。

【功 效】 温经、散寒、通络。

【验 证】 治疗 15 例，病程 2 个月至半年以上。半年以内者，一般连续用药 5~10 天痊愈，半年以上者，用药 15 天痊愈。

【备 注】 引自 1974 年《新中医》(1)。

11. 天地膏治面瘫

【方 剂】 天麻、南星、钻地风、白僵蚕、白及各 7.5 克、巴豆 5 粒（去皮）、鲜生姜 500 克。

【制用法】 上药（前 6 味）共研细末，用生姜捣汁调和成膏，备用。用时取上药适量，贴于患者面部健侧（右歪贴左，左歪贴右），外以纱布盖上，胶布固定，7~8 小时即可取下，每天换药 1 次。

【功 效】 温经散寒，祛风通络。

【验 证】 治疗 430 例，病程 1 周至 5 年。一般 1 剂即愈，有效率达 90% 以上。

【备 注】 引自 1981 年《黑龙江中医药》(4)。敷药后皮肤发痒，局部敷药处可能出现疱疹，不必用水洗。以防感染。注意防止药物流入口、耳、鼻、眼内。7 天内需避风。

八、癲 病

癲病，俗称“羊角风”，是一种突然发生短暂大脑功能失调的疾病。表现为阵发性全身抽搐伴有暂时的意识丧失，或表现为躯体局部肌肉的抽搐而不伴有意识障碍，或者仅有发作性的精神异常。

1. 逍遥散治癲病

[方 剂] 柴胡、当归各 9 克，白芍、白术各 12 克，茯苓 15 克，甘草 6 克，生姜 5 克，薄荷（后下）3 克。

[制用法] 发作期用水煎服，每天 1 剂，分 4 次服（临睡前必须服 1 次）。病情缓解后改丸剂，坚持服半年至一年。

[疗 效] 1987 年第 4 期刊登的“治癲病体会”经验，试用于临床很有效。

[验 证] 病例一：刘 × ×，经川医神经科确诊为“头痛性癲病”，每天发作 2~3 次，每次 10 多分钟至半小时，经中西医结合治疗 1 年多无效，后以丹栀逍遥散加升麻、白芷、川芎治之，服药 3 剂，发作停止，至今 3 个月未见复发。

病例二：李 ×，经川医确诊为“腹痛型癲病”。曾经多间医院中西医结合治疗 6 年罔效，每 2~3 天发作一次。处以丹栀逍遥散加香附、木香、佛手。服药 5 剂后腹痛消失。由于丹栀逍遥散治疗情志方面所致的癲病疗效甚佳，已列入我院“郁病”处方之一。

[备 注] 痰涎壅盛，喉中痰鸣加石菖蒲、胆南星、远志；气阴不足加红参、天冬。癲病病人发病几乎都有情志方面因素，而情绪易于激动者则发病也更为频繁。本着“舒肝解郁，理顺肝气，土不受侮，心以何伤”之理，选用本方治疗，可收良效。

2. 雄黄停病丸治疗癲病

[方 剂] 明雄黄、钩藤、制乳香各 25 克，琥珀、天竺黄、天麻、全蝎、胆南星、郁金、黄连、木香各 19 克，荆芥穗、明矾、甘草各 13 克，朱砂 5 克，珍珠末、冰片各 2 克，绿豆 200 克。

[制用法] 上药除雄黄、朱砂外，共研细末，制水丸如绿豆大，雄黄、朱砂研细末为衣。每天服 2 次，分早晚温开水送服，或据病情选 1~2 味中药煎汤送服。成人每天 4~6 克，1 周岁儿童每次 1~

1.5 克，可随年龄、体质增减用量，均以 3 个月为 1 疗程。

[疗 效] 经治 87 例，均以大发作型居多，结果：临床控制 34 例，有效 20 例，无效病 33 例，总有效率为 62%。经分析表明，病程短、年龄小者疗效明显。显效病例中相当部分是没有遵守注意事项。

[验 证] 郑××，男，6 岁，1968 年 5 月 12 日来诊。半年前高热抽风，经治愈。月余后突然昏倒仆地，不省人事，牙关紧闭，口吐涎沫，双目上视，持续数分钟后苏醒；继而沉睡，醒后如常。苔白腻，指纹青紫。证属痫证。予雄黄停痫丸 100 克，每天服 2 次，每次 1 克，柴胡 3 克水煎送下。药后未再发作，痊愈。随访 18 年，病无复发。

[备 注] 服药期间避免惊怒，禁烟酒、辛辣、荤腥食物；经服药停止发作后，须继续服药 100 天以上，病重者一年以上方可停药，以免复发；服药期间避免重体力或过度脑力劳动，禁房事；若服药前服用苯妥英钠、鲁米那等药者，或病程长、发作剧者，可继续与本药同服至 1 个月左右，症状明显好转后酌减、停药。“癫痫者，痰邪逆也。”治疗大法，当首重祛痰降逆。本方有豁痰降逆，开窍镇痉，安神之功，具有定痫之效。方中雄黄有一定毒性，但本方以丸缓服，且有甘草、绿豆解毒，所治病例仅个别有轻微皮疹过敏，停药即消失。

3. 柴胡桂枝汤加味治疗癫痫

[方 剂] 柴胡、半夏各 9 克，黄芩、党参、桂枝各 6 克，白芍 12 克，甘草 3 克，生姜 2 克，大枣 4 克。

[制用法] 每天 1 剂，水煎分 2 次服。以上为成人剂量，小儿酌减。服 1 月为 1 疗程，1 疗程后，间歇 3 天，续服下 1 疗程。发作期与休止期，均应服药。

[疗 效] 曾治 84 例，其中痊愈（发作完全控制，随访 2 年以上无复发者）25 例；显效（发作症状、时间、次数均减少 60% 以上，维持时间超过 2 年者）41 例；好转（发作症状、时间、次数减少不足 50%，维持时间未达 2 年者）13 例，无效（发作无明显改善者）5 例。总有效率达 94.05%。服此汤后大多很快见效，发作消失，一般在 3 个月到半年内发作消失，部分病例 1 个疗程发作即可消失。

[验证] 许×，女，6岁，1979年3月21日初诊。3岁时一次高热后，患发癫痫。发作时突然昏仆，不省人事，两目上视，口角流涎，喉中痰鸣，手足抽搐。数分钟后醒如常人。嗣后，每天发作1~2次，每次1~3分钟不等，最长间隔3天。骤感风寒时，发作加剧。多方求治，均无效验。其父带来余处诊治时，检视所服诸方，中药不外祛风豁痰镇惊之剂，西药多为苯妥英钠、癫痫安之属，几乎所有的抗癫痫药物均已用过。此时笔者参照《国外医学·中医中药分册》1979年第1期中，介绍“柴胡桂枝加芍药汤治疗癫痫的疗效观察”一文，该方剂用量小，颇适小儿服用。处方：柴胡、半夏、桂枝、大枣各4克，白芍6克，甘草、生姜各2克，黄芩、人参各3克。服药1疗程后，发作次数大减，效不更方，连服6个月，发作停止。继服上方2个月，顽疾终除。随访9年，未再复发。

郭×，男，29岁，1985年3月1日入院。患者14岁时不慎跌伤，伤愈后患发癫痫，服用中西药，病情有所缓解。但近来发作频繁，稍受精神刺激，即猝然仆倒，不知人事，两目僵直，面色苍白，喉中痰鸣，作猪羊叫，小便失禁，3~5分钟方苏醒；醒后自觉精神疲惫，对发作过程不能回忆；舌苔薄腻，脉弦滑。先用温胆汤加味治之，2月无功，乃改用柴胡桂枝汤加龙骨、牡蛎、浙贝母等治疗，1疗程后，发作次数锐减，连服6个半月，痊愈出院。随访3年未复发。

[备注] 风痰者加白附子、蜈蚣、全蝎、僵蚕；热痰加天竺黄、胆星、川贝母；寒痰加南星、石菖蒲、皂荚；惊痰加生龙齿、朱砂、夜交藤、钩藤；心肝火旺加黄连、山梔子、龙胆草、大黄；舌边有瘀加丹参、赤芍、郁金。服药期间，忌食肥甘厚味，煎炒炙烤之物，忌食绿豆、茶叶及生冷、辛辣刺激之品。

4. 痫定散治疗癫痫

[方剂] 葛根、郁金、木香、香附、丹参、胆南星各30克，白胡椒、白矾、皂角仁（炒研）、朱砂各15克。

[制用法] 上药研末和匀为散，装瓶备用。7岁以下每次服1.5克，7岁以上每次服3克，16岁以上每次服7克，均早、晚各服一次。30天为一疗程，一般两个疗程即可。服完一个疗程后，停药10天，再进行第二疗程。连服药30天，发作次数无减少，无症状

减轻和好转者为无效，应停药。

[疗 效] 经治 48 例，其中治愈 43 例，发作次数减少、症状减轻者 4 例，无效 1 例。

[验 证] 马×，女，14 岁。7 岁时患过脑膜炎，愈后面白无华，呆痴，右手臂感觉麻木；经常无定时抽搐，发作时卒然昏倒，两目上视，头向后仰，口噤咬牙流涎，怪叫，喉有痰声，四肢抽搐，腓肠肌痉挛。发作过后，神志渐醒，然后昏睡，头晕乏力。不思食，身体消瘦，唇红，舌淡无苔，脉沉细数。一年前在白天患病，现在每入睡则四肢抽搐、咀嚼、腓肠肌痉挛、哭叫。在武汉××医院诊为癫痫。曾用中西药无效，试用痫定散，每服 4 克，每天 2 次。服用 2 剂药后腿已不抽搐，余症较前减轻。共服 6 剂诸症消失，癫痫未再发作，智力如常人，饮食大增，脸色红润，体重增加，身体复康。

[备 注] 7 岁以下不用白胡椒。服药期忌情志刺激、浓茶、烟酒、咖啡、白萝卜、茄子、生冷寒凉诸品。

5. 乳犬猪肚硫黄汤治癫痫

[方 剂] 乳犬（未断奶者）1 只，硫黄 15 克，猪肚（猪胃）1 个，盐适量。

[制用法] 将硫黄研为细末，装入纱布袋内扎好。乳犬去毛及内脏，洗净。将硫黄放入犬腹中，再将犬放入猪肚内，加水盐炖烂。分 3~4 次空腹食下。

[功 效] 补肾温阳，活血熄风。

[验 证] 据《福建中医药》1996 年第 2 期介绍，每年服三四剂，可以除根，治疗 3 例均愈。

6. 炖羊脑杞子治癫痫

[方 剂] 羊脑 1 副，枸杞子 30 克，酱油、味精适量。

[制用法] 加清水与调料，以文火炖煮。顿服。

[功 效] 补肾益精，养血祛风。用治癫痫及血虚头痛、眩晕。

[验 证] 杨×，男，13 岁，患癫痫，用此方 3 个月痊愈随访两年，未发。

7. 白矾散治羊角风

[方 剂] 净白矾。

〔制用法〕 将白矾研成细粉，备用。成人每次服3~4.5克，每日早晚饭后、睡前各服1次，温开水冲服。

〔功效〕 清热解毒。用治羊角风。

〔验证〕 据《福建中医药》1962年7卷6期报道：“施某，男，22岁，患本病已3年，发作时突然晕倒，人事不知，10分钟后，口涌痰涎，渐渐苏醒，每日发作一两次，或3~6日发作1次。经连服此方3个月，3年未复发。

8. 甘麦枣汤治癫痫

〔方剂〕 甘草30克，小麦30克，红枣10枚。

〔制用法〕 水煎服。早晚空腹各1次。

〔功效〕 养心安神，除烦宁神。用治癫痫。

〔验证〕 据《家庭医学》杂志介绍，用该方治愈数名患者。

9. 无毛羊胎治病症

〔方剂〕 肚剥羊羔2只。

〔制用法〕 焙干，研成末。用黄酒送服，每次9~15克，每日1次。

〔功效〕 治羊角风。

〔验证〕 据《山西医药技术资料选编》介绍：张某，男，35岁，患羊角风十几年。发作时突然昏倒，四肢抽搐、面色苍白、口吐涎沫、声似羊鸣、影响劳动。服用肚剥羊羔2只，痊愈。

10. 红白血砂粉治癫狂

〔方剂〕 猪心1个，朱砂3克，白朱砂（研细粉）3克。

〔制用法〕 猪心取其血滴于碗内，将两味朱砂同猪心血调匀。分3次服下。

〔功效〕 补血脉，解邪热，安心神。用于癫狂初期。

〔验证〕 据《河北中医中药医药集锦》介绍：董某，女21岁。患此症，时哭时笑，如见鬼神，狂言乱语，不避亲疏，服此药3剂而愈。

11. 白鸽心治羊角风

〔方剂〕 白鸽子2只。

〔制用法〕 将鸽子宰杀取心。发作前一次生吃，2次可愈。

〔攻效〕 补虚镇惊。用治羊角风。

〔验证〕 据《中居效方精选》介绍，保定一妇患此症多年，每日发作，

吃本方1次，1年余未发作。

12. 猪脑治似痫非痫

[方 剂] 猪脑1个，冬虫夏草3克。

[制用法] 猪脑（剔去红筋不用），同冬虫夏草炖熟。食脑饮汤，每日服1或2次。

[功 效] 补脑髓，除脑中邪热，理虚通窍。用治似痫非痫症。

[验 证] 据《新中医》杂志介绍，该方经临床验证，效果理想。

九、头 痛

头痛是临床上常见的一种自觉症状，指整个或局部头部的疼痛的感觉，可以出现于多种急慢性疾病之中。引起头痛的原因虽然很多，但不外乎外感和内伤两大类。至于外伤跌仆，以及久病入络也容易引起头痛。头痛可见于现代医学内、外、神经、精神、五官等各科疾病中。

1. 偏头痛粉治偏头痛

偏头痛多见于女性，常于青春期起病，呈周期性发作。在发作前常先有嗜睡、倦怠、忧郁感，并可能在眼前出现闪光、暗点、偏盲以及局限性感觉运动障碍（如肢体麻木、失语）。头痛为搏动性钻痛、钝痛或刺痛。头痛发作持续数小时或数日后逐渐减轻，常在入睡后缓解。

[方 剂] 附子、干姜、桂枝、细辛、石膏、龙胆草、黄芩、大黄、党参、黄芪、白术、淮山药、当归、熟地、羌活、防风、柴胡、山萸肉、五味子、天南星、半夏、川芎、白芷、牡蛎、磁石、全蝎、威灵仙、蜈蚣、地龙、桃仁、茯苓、枣仁。

[制用法] 药味、剂量均随症加减，烘干，研末备用。每天20克，分2~3次，温开水送，连服10天为1疗程。服后有效，可连服2~3个疗程。

[疗 效] 本方祛风攻下，益气活血，寒温相合，刚燥柔润互济，掺入苦寒有大毒、清热止痛效果较佳的马钱子，总的药性偏寒凉，阳虚者不宜用。本方所治排除高血压、鼻窦炎、肿瘤所致头痛，多为血管神经性头痛呈中、重度者，病史均在一年以上。

[验 证] 治疗结果：近期治愈21例，显效8例，有效10例，无效10例。病例一：朱××，男，35岁，1986年7月9日诊。头右半侧痛4年余，每月必发3~4次，每次2~3天，每天痛1~2

次，每次1小时左右，呈针刺样，伴恶心、呕吐酸苦水，疼痛部无冷感，服西药无效。血压、眼底检查正常。诊为血管神经性头痛。予偏头痛粉200克，分10天服完，仅服1疗程，随访至今无复发。

[备 注] 本方集寒热温凉、气血阴阳、升降攻补于一方，乃为大杂烩，有违理法方药规范，但临床效果不错，真所谓理未明而效可见。

2. 新牵正散治偏头痛

[方 剂] 白附子、全蝎各6克，当归、柴胡各12克，僵蚕、川芎、白芷各10克，蜈蚣1条。

[制用法] 水煎服，每日1剂。

[疗 效] 搜逐血络，祛风止痉，通络止痛。

[验 证] 何××，女，78岁，1987年10月5日诊。头右侧掣痛时发时止，肋部尤重已十余年。经当地医院住院治疗无明显好转。曾服镇痛、消炎、营养神经药等，又经中医药治疗均罔效。现症头右侧掣痛，逢恼怒加重，肋部肿胀发热。近一周来，头晕、眼胀、口不能张，彻夜不眠，口苦咽干，舌边尖红、苔薄黄，脉弦。辨为肝火上炎，风痰阻络。投新牵正散加龙胆草、山栀子、黄芩、秦艽、赤芍各10克，5剂而愈。

共治5例，男3例，女2例，病程最长10年，最短5个月，均治愈。治疗天数长则15天，短则5天。

[备 注] 风痰偏重加半夏、防风、制南星、陈皮；肝火偏亢加龙胆草、山栀子、黄芩、丹皮；久病入络加赤芍、穿山龙、桃仁、红花。

3. 头痛塞鼻散治疗偏头痛

[方 剂] 川芎、白芷、灸远志各50克，冰片7克。共研细末，瓶装密贮勿泄气。

[制用法] 以消毒纱布一小块，包少许药末，塞入鼻孔，右侧头痛塞左鼻，左侧头痛塞右鼻。

[疗 效] 以本方治疗偏头痛百余例，疗效满意。一般塞鼻3~5分钟后，头痛即逐渐消失。有的塞鼻得嚏后，自觉七窍通畅而痛止。复发时再用仍有效。

[验 证] 顾××，女，43岁。患偏头痛年余，每月发作1~2次，每次

持续3~4天。发作时不能坚持工作，因畏服煎药，单纯给予头痛塞鼻散一瓶，每次取少许以绢包裹塞鼻，塞后即可止痛。痛发时再塞又可取效，连塞2天即完全痛止。半年余未再复发。

4. 加减清上蠲痛汤治疗偏头痛

[方 剂] 当归、川芎、白芷、细辛、羌活、防风、菊花、黄芩、麦冬各3克，蔓荆子6克，甘草1克。

[制用法] 水二碗，煎成一碗，内服。

[疗 效] 经多次临床应用，效果极佳。

[验 证] 罗××，女，55岁，1984年5月15日初诊。患者于1983年初开始自觉头部左侧疼痛，视力由1.2下降至0.2，伴前额部胀痛；1984年初先后到××大学学院，广州市第二人民医院诊治，做CT、脑血管造影等检查，诊断为脑动脉瘤，位于蝶鞍前部稍偏左侧，约2.1×3厘米大小；视力右眼1.2，左眼0.1，左眼视野缩小。经治未见明显改善，延请沈老治疗。自诉头部左侧及左眼眶周围疼痛不止，头部发胀感，头晕，左眼视物模糊，耳鸣，夜寐多梦，时有口苦，胃纳一般，舌淡红、苔薄白，脉弦细涩。证属风阳上扰清窍，治以祛风止痛，平肝明目为主，方拟加减清上蠲痛汤加味。处方：当归、川芎、白芷、羌活、防风、钩藤、蔓荆子、麦冬、独活、黄芩、细辛各3克，杭菊花、甘草各1.5克，蕤仁肉9克。水煎服，每天1剂。共服四剂，头痛、头胀减轻，依前方加草决明9克，每天1剂。共服14剂，头晕、头痛、耳鸣均消失，自觉左眼视力有改善。依上方再服七剂，眼科检查左眼视力由原来的0.1变为0.2，视物较前清楚。处方：当归、川芎、羌活、防风、杭菊花、麦冬、黄芩、甘草各3克，白蒺藜、蕤仁肉、草决明、蔓荆子、白芍、生地各9克。水煎服，隔天服1剂，连服14剂以善后。病者一直随诊至今，疗效巩固。

[备 注] 偏头痛或左或右，加柴胡3克；头顶痛，加藁本3克；前头痛，加葛根9克；眉棱骨痛，加法半夏3克；风湿头痛，头重如裹，加独活、苍术各3克；痰浊头痛，脘腹闷呕恶者，加法半夏、陈皮、天麻、枳实各3克；肝风上旋，伴见头晕目眩者，加天麻3克，钩藤、白蒺藜各9克；如肝阳上亢者，再加石决明（先煎）15克；“头风不治多害目”，如伴见视力减退，目视昏

花，视物不清者，加草决明、蕤仁肉各9克；肝火上攻，面红目赤，口苦溺赤者，加柴胡、龙胆草、山梔子各3克；大便干结者，再加大黄3克；气虚者，加生黄芪、党参各9克；血虚者，加制首乌、白芍各9克；肾虚者，加熟地；山萸肉、沙苑蒺藜各9克；阴虚有火，加生地、白芍各9克，羚羊骨（先煎）12克。

5. 全虫末外敷治偏头痛

〔方 剂〕 全虫、胶布

〔制用法〕 全虫研细末，每次取少许置于太阳穴，以胶布封固，每天换药1次。

〔疗 效〕 治偏头痛有奇效。

〔验 证〕 刘×，女，50岁，干部，1984年8月22日就诊。右侧偏头痛5天，胀痛剧烈，呼叫不已，彻夜不眠，伴烦躁易怒、恶心欲吐、大便时干、小便黄赤、舌红苔薄黄，脉弦细数。予平肝潜阳、祛风定痛法。处方：石决明30克，钩藤20克，当归10克，生地15克，白芍20克，丹参30克，地龙12克，僵蚕10克，黄芩12克，白蒺藜15克，甘草3克。配合西药止痛、镇静，治疗3天无效。遂用全虫末外敷太阳穴，用药1小时后疼痛明显减轻。第二天换药1次，痛未再作。随访年余，未见复发。

6. 三白汤治偏头痛

〔方 剂〕 川芎30克，白芷、白芍各15克，白芥子9克，香附6克，柴胡、郁李仁、甘草各3克。

〔制用法〕 将上药水煎2次，分2次温服，每日一剂。

〔验 证〕 用上药治疗偏头痛患者24例，一般都在服药2~5剂后头痛减轻。少则1~2剂，多则7~8剂，均能达到缓痛、止痛效果。另有人用本方治疗偏头痛患者7例，亦获痊愈。

7. 川芎白芷等治偏头痛

〔方 剂〕 川芎、白芷、灸远志各50克，冰片7克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装入瓶内备用，宜盖紧勿泄气。用时，以绸布或的确良布一小块，包少许药末，塞入鼻孔，右侧头痛塞左鼻，左侧头痛塞右鼻。

〔验 证〕 用上药治疗偏头痛患者百余例，效果颇佳。一般塞鼻3~5分钟后，头痛逐渐消失。药布塞鼻得嚏后，自觉鼻腔畅通而痛止获愈。

8. 龙骨汤治偏头痛

〔方 剂〕 白芍、夜交藤各50克，龙骨30克（先煎），蔓荆子、炒酸枣仁各20克，菊花、郁金、僵蚕各10克，栀子、红花、生石膏各15克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日1剂，分2~3次口服。5剂为1个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗偏头痛患者38例，经用药1~2个疗程，其中，治愈者35例；显效者2例；无效者1例。

9. 四白丹参汤治偏头痛

〔方 剂〕 丹参、白芍各40克，白菊花、白蒺藜、蝉蜕、防风、白芷、白芥子各15克，延胡索、羌活、地龙、生甘草各10克。

〔制用法〕 每日1剂，水煎分2~3次口服。

〔验 证〕 用本方治疗偏头痛患者56例，其中，治愈者50例，好转者2例；有效者4例。

10. 萝卜冰片治偏头痛

〔方 剂〕 萝卜（选用辣者佳），冰片少许。

〔制用法〕 萝卜洗净，捣烂取汁，加冰片溶化后，令患者仰卧，缓缓注入鼻孔，左痛注右，右痛注左。

〔疗 效〕 治偏头痛。

〔验 证〕 屡用效佳。

〔备 注〕 美国底特律亨利·福特医学博士说：“偏头痛的原因是脑部与血管系统受到侵犯的反应。”而镁对维持血管和神经的正常运行极为重要。研究发 正常人与患偏头痛的人，脑部含镁的程度，有显著不同，当补充镁后，可不同程度缓解偏头痛。因此，日常生活中常吃些含镁丰富的小米、玉米、黄豆、海带、瘦肉、萝卜及绿色蔬菜，有助于防治偏头痛。

11. 热水浸手疗偏头痛

〔方 剂〕 40℃以上的热水。

〔制用法〕 备足两热水瓶的热水。把双手浸泡在盆中热水里。浸泡过程中，要不断加入热水，以保持水温。半小时后，头痛逐渐减

轻，甚至完全消失。

[功效] 活血行血。治偏头痛。

[验证] 据《家庭医学》杂志推荐，效果奇佳。

[备注] 据美国专家介绍，偏头痛是由于脑血管充血扩张，压迫脑神经所致。双手浸泡在热水中以后，手的血管充盈，血液流聚于手部；脑血管充血量相对减少，脑神经的压迫也减轻了，痛感便逐渐消失。热水浸手治偏头痛，是美国人很熟悉的偏方，颇受青睐。

12. 鲤鱼头治头痛

[方剂] 黑鲤鱼头、红糖适量。

[制用法] 取活黑鲤鱼切下头，待水沸后放入煎煮至极烂，加入红糖。头痛发作时尽量服用。

[功效] 通经络，散风寒。用治头风。

[验证] 据《浙江中医》1985年12期介绍：付某，17岁，每天8~9时，眉棱骨开始疼痛。痛时狂叫，眼睛凸出，面色红，嘴角抽动，鼻尖发酸。曾经针灸、中西医结合治疗无效。后以此方治之，服后，其病若失，至今1年未见复发。

13. 神经性头痛治方

[处方] 带壳生白果（即银杏）60克。

[制用法] 将上药捣裂入砂锅内加水500ml，文火煎至300ml，分2次服，本方可连煎3次，服3日。

[验证] 用本方治疗头痛（检查无器质性改变，属于神经性头痛）患者10例，大多1剂见效。

14. 马前子、蝉衣治眶上神经性头痛

[方剂] 生马前子0.9克，蝉衣9克，黄酒120ml。

[制用法] 将生马前子放在麻油灯上烘透至炭黑色，不能存性，捏之成灰为度，与蝉衣共研细末。用时，以黄酒冲服，每日1剂。

[验证] 用上药治疗眶上神经性头痛（俗称眉棱骨痛）患者13例，其中，服1剂治愈者11例；服2剂治愈者2例。

15. 全席汤治血管神经性头痛

[方剂] 黄芪30克，全当归20克，川芎、天麻、乳香、没药、蒺藜、各10克，蜈蚣3条，细辛3克、全蝎5克，生甘草6克。

[制用法] 将上药水煎，每日1剂，分2~3次口服。

[验证] 用本方治疗血管神经性头痛患者120例，痊愈者108例；显效者5例；好转者4例；无效者3例。一般服药2~4剂见效。

16. 二白汤治血管神经性头痛

[方剂] 白芍30克，蝉衣、白芷各12克，葛根15克，桂枝6克、细辛3克，川芎、蔓荆子各10克，生甘草8克。

[制用法] 将上药水煎，每日1剂，分3次口服。

[验证] 用本方治疗血管神经性头痛患者53例，经用药3~8剂后，其中治愈者45例；有效者6例；无效者2例。

17. 川芎、丹参等治血管神经性头痛

[方剂] 川芎、丹参各20~30克，白芍30~50克，石决明（先煎）50~60克，全蝎（冲服）3~6克，细辛3克，白芷10~15克。

[制用法] 将上药水煎，每日1剂，分3次口服。

[验证] 用本方治疗血管神经性头痛患者38例，经用药2~6剂后，其中，治愈者32例；显效者4例；无效者2例。

18. 清空膏治疗顽固性头痛

[方剂] 川芎、羌活各10~15克，淡黄芩15克，川连、柴胡各10克，防风12克，炙甘草6~10克。

[制用法] 每天1剂，水煎分服。病程长，上方加蜈蚣1~2条，太子参20克（或红参6克），白蒺藜12克；头痛连面或牵引牙龈痛者，上方加细辛3克，生石膏30克。

[验证] 侯××，男，57岁，1989年8月13日入院，住院号：1997。患高血压病已3年。入院前3天因恼怒后头痛再发，右侧及枕部胀痛，视物黑矇，呕吐胃内容物，无意识障碍，无偏瘫失语、二便失禁等。当时血压：32/18.7千帕斯卡，拟诊“高血压脑病”，予降压、脱水等治疗。血压控制在21.3/13.3千帕斯卡左右，但头痛始终不能缓解，烦躁不安，转中医治疗而收入院。即投清空膏。处方：川芎、防风各12克，柴胡、川连各10克，羌活、黄芩各15克，甘草3克。1剂即知，复杯而愈。再予平肝潜阳、化痰熄风剂善后。

十、三叉神经痛

本病是一种原因尚未完全明了的神经科常见疾病，多发生于40岁以上妇女，特征为面部三叉神经分布区内有反复发作的阵发性剧痛，如刀割、钻刺样疼痛，不伴有器质性改变，感觉检查很少有障碍。疼痛性质独特，是一种突然急骤发作、突然停止的闪电样剧痛。持续数秒至数十秒，可引起同侧面肌抽搐、眼结膜充血、流泪或流涎等。

1. 川芎止痛汤治疗三叉神经痛

[方 剂] 川芎20~30克，荆芥、防风、全蝎、蕲拨各10~12克，蜈蚣2条，天麻10克，细辛3克。

[加 减] 寒重加制附子20~30克（先煎）；热重加生石膏20~30克，黄芩12克，黄连9克；便干加大黄15克；瘀重加赤芍12~15克，丹参30克，五灵脂12克；阴虚加生地、女贞子、龟板各15克，黄柏、知母各12克。

[制用法] 水煎服，每天1剂，重者2剂。

[功 效] 祛风通络，散寒止痛，活血化瘀。

[验 证] 张××，女，41岁，1976年6月6日诊。自诉右面颊部剧痛，痛连右目右上齿，痛如电击，时发时止，昼夜不宁、寒温不适；曾用去痛片、安定、青霉素等无效；拔牙2个而痛未解，右颊因搓切而溃破。检查：牙龈无红肿、无龋齿，舌苔薄白，脉微弦。诊为三叉神经痛（第1、2支），拟用川芎止痛汤。药进3剂痛大减，又进6剂痛止，随访1年未复发。

[备 注] 按临床观察表明，方中川芎剂量小于12克，效果较差，用至20克则获高效、速效，并未见任何副作用。细辛用至6克也未见不良反应。

2. 散偏汤治疗三叉神经痛

[方 剂] 川芎30克，白芷8克，白芥子、白芍、香附、郁李仁、柴胡各10克，甘草5克。

[制用法] 水煎2次，两汁混匀，分2次服。6天为1疗程，一般2~3疗程可愈。

[疗 效] 笔者运用《辨证录》中的散偏汤治疗三叉神经痛下颌支痛13例，效果满意。所治13例中，服药1疗程获愈者5例，服药2

疗程获愈者5例，服药3疗程获愈2例，服药3疗程后无效者1例。

[验 证] 高××，48岁，农场干部。1982年7月15日就诊。发作性左下颌痛伴牙龈根部痛1年余，疼痛时兼见口角及舌抽向患侧。1年内曾拔牙3次，将左侧臼齿全部拔掉，但疼痛不解，发作频。经用西药去痛片、消炎痛、普鲁卡因等，药效过后疼痛依然。诊为三叉神经下颌支痛。按上法服药3剂，疼痛缓解，续进3剂而愈。随访1年无复发。

[备 注] 三叉神经下颌支痛与祖国医学偏头痛相似，故用散偏汤治疗有良效。方中川芎行气开郁，活血止痛，为镇痛要药；柴胡、香附、白芥子理气涤痰消饮、散结和解；白芍、郁李仁、甘草柔润缓急。诸药合用，可使气血通畅无阻，而达到通则不痛的目的。

3. 加味五白汤治疗三叉神经痛

[方 剂] 白芷、白蒺藜、白附子、白僵蚕各9克，地龙15克，全蝎、蜈蚣各5克，白芍、川芎各30克，肉桂1.5克。

[制用法] 因寒而触发者，白芷可大至15克，加制川乌、制草乌各6克；因热而发者，加菊花9克，决明子15克；大便干结或闭塞者加生大黄6~9克。

[疗 效] 所治5例，痛点位于三叉神经第二支者2例，第三支者2例，二支同时受累者1例。病程1年以内者2例，1~2年者2例，3年以上者1例。服本方6剂痛止者1例，9剂痛止者1例，15剂痛止者2例，28剂痛止者1例。

[验 证] 方××，男，50岁，干部，1986年7月18日初诊。患偏头痛史3年，入夏发作频繁，曾在上海、南通等医院检查诊断为“三叉神经痛”。1984年在本院口腔科检查，疑为龋齿并拔除。术后仍经常发作，每年数十次。近来因工作疲劳加之情绪不畅引发，起病1周，加重3天，右侧面颊疼痛难忍，遇热更甚；不能咀嚼，每天发作20余次，每次持续1~2分钟，入夜稍安。曾在本院内科诊治，服用各种止痛药，疼痛渐缓，30分钟后如故，邀笔者诊治。拟加味五白汤，处方：白芷、白蒺藜、白附子、白僵蚕、煨川楝子各9克，全蝎、蜈蚣各5克，白芍、川芎各30克，地龙15克，肉桂1.5克。3剂。

三天后，患者复诊说：疼痛明显减轻，并每天发作减至2~3次，每次10秒钟左右。原方去川楝子，续进3剂。药后诸症悉除，随访至今未复发。

4. 向日葵盘治三叉神经痛

〔方 剂〕 向日葵盘100~200克（去子），白糖适量。

〔制用法〕 将向日葵盘掰碎，分2次煎成500~600克的汤，加白糖。每天早晚饭后1小时服下。若病情较重，可日服3次，服量也可加大一些。可根据病情灵活掌握疗程。为防止复发，病愈后可多服几日，以巩固疗效。

〔功 效〕 清热解毒，逐邪外出。用治三叉神经痛。

〔验 证〕 用本方治疗三叉神经痛患者89例，其中，痊愈者82例；显效者3例；有效者3例；无效者1例。

十一、坐骨神经痛

坐骨神经痛是指坐骨神经通路及其分布区内的疼痛，疼痛自臀部沿大腿后面，小腿后外侧向远端放射。起病多急，表现为下背部酸痛和腰部僵直感，及沿坐骨神经通路的剧烈疼痛。

1. 蝎蛇散治坐骨神经痛

〔方 剂〕 祁蛇（或乌梢蛇）、蜈蚣、全蝎各10克。

〔制用法〕 焙干研成粉，等份分成8包。首日上下午各服1包，继之每天上午服1包，7天为1疗程。每疗程间隔3~5天，一般1~2个疗程可显效至痊愈。

〔疗 效〕 用本法治疗54例不同程度的坐骨神经痛，治疗期间停用其他药物，经长期观察，疗效满意，值得推广。

〔验 证〕 蔡××，女，68岁，右下肢疼痛5年余，经西医诊为坐骨神经痛，服西药效不显，于1987年8月求治于中医，余投蝎蛇散原方，经服2个月痊愈，随访至今未复发。

〔备 注〕 所治病例无很大反应，一般在药后可有全身及患肢出汗或灼热感，有的可出现短暂性疼痛及麻木，不久即消失。

2. 身痛逐瘀汤加味治坐骨神经痛

〔方 剂〕 桃仁、红花、当归、地龙各15克，川芎、甘草、没药、五灵

脂、牛膝各10克，秦艽、羌活、香附各5克。

[制用法] 水煎服，每天1剂，分早晚2次，空腹温服。

[疗效] 身痛逐瘀汤出自《医林改错》。笔者运用本方加减治疗本病140例，其中治愈96例（症状完全消失，可参加正常工作）；好转32例（症状基本消失或好转，可做轻工作）；无效12例（服本方3~5剂，症状无改善，而中断治疗者）。

[验证] 刘××，女，36岁，农民。病历号6256。于1984年3月28日初诊。半年前患腰腿痛，症状日益加重，疼痛自腰骶部沿右侧大腿后外侧向腘窝、足跟部窜痛，如针扎、火烧样阵阵加剧，尤以咳嗽和用力大便时更甚，久治不效。检查面色苍白，表情痛楚，步态跛行，右侧第二、三骶后孔及臀线中点和承山穴有明显压痛，拉塞格氏征（+），脉沉迟而紧，舌淡苔薄白。诊为坐骨神经痛。证属寒凝气滞，瘀阻脉络，治宜化瘀通络，温阳散寒，除痹止痛，投以身痛逐瘀汤。原方减秦艽，加桂枝、延胡索各15克。3剂。药后疼痛大减，继用原方又进6剂，诸症皆除而治愈。1年后随访，未再复发。

[备注] 气虚血弱者减五灵脂、香附，加黄芪30~50克，熟地10~15克；脉数微热者减羌活，加黄柏15克；脉浮风重者加防风15克；脉紧寒重者减秦艽，加桂枝15~25克；脉缓湿重者加苍术15克；伴腰脊痛剧者加三七末3克（冲服）；便秘者加何首乌15~25克；病久肝肾两亏者减羌活、五灵脂，加狗脊、巴戟天各15克。

3. 薏苡附子散合芍药甘草汤治坐骨神经痛

[方剂] 薏苡仁60~90克，制附子（先煎）、炙甘草各10~30克，海风藤、川牛膝各10克，赤芍20~40克，党参15~30克，当归10~20克，秦艽12~18克，鸡血藤12克，

[制用法] 每天一剂，水煎，分早晚服。

[疗效] 经本方共治23例，痊愈15例（症状消失并观察1年以上未复发），显效7例（症状消失，观察半年至1年又复发，但经再次治疗仍可消失者），无效1例（症状无改善）。痊愈15例中，平均治愈天数为10.5天。

[验证] 傅××，男，50岁，干部，1982年8月5日就诊。两月前因坐骨神经痛，采用中西药治疗效果不显。近日加重，沿右腰胯至

腿后侧，酸楚疼痛；风雨之日尤甚，伴心烦不宁、头晕失眠。检查：臀中部、臀线、腘窝和小腿沿坐骨神经有触痛点，直腿抬高阳性，踝反射、小腿后侧皮肤触觉均减退，脉紧微弦，舌质淡稍紫，苔薄微黄。血压 18.7/12.06 千帕斯卡。辨证使用上述原方，药量稍作如下调整：薏苡仁 10 克，黑附子（先煎）、当归、海风藤、川牛膝各 10 克，鸡血藤秦艽各 12 克，赤芍 20 克，甘草 3 克，党参 15 克，经服本方 5 剂，上述症状基本消失，又服 5 剂而愈，随访至今未复发。

4. 身痛逐瘀汤加减治疗坐骨神经痛

- [方 剂]** 当归 12 克，川芎、桃仁、红花、羌活、独活、制没药、香附、川牛膝、秦艽、地龙、伸筋草各 9 克，甘草 6 克。
- [加 减]** 兼风寒者加制川乌、桂枝各 9 克；兼湿热者加苍术、黄柏各 9 克；气虚者加黄芪 30 克；痛剧者加蜈蚣 3 条。
- [制用法]** 水煎 2 次分服，每天 1 剂。
- [功 效]** 治疗坐骨神经痛有奇效。
- [验 证]** 治疗 36 例，其中治愈 29 例，显效 6 例，好转 1 例。平均治疗 17.4 天。随访治愈者 1 年以上，无一复发。
- [备 注]** 坐骨神经痛属“痹证”范畴，可因风寒湿邪客于经络，或因闪伤气血瘀滞，致使经络痹阻，气血不通而痛。身痛逐瘀汤加减具有活血化瘀，行血止痛，祛风除湿作用，临床结合辨证，增减恰当药物，均能收到显著疗效。

5. 鸡血藤等治坐骨神经痛

- [方 剂]** 鸡血藤、芒硝各 15~20 克，桂枝、柴胡、大黄各 10~15 克，黄芩 10~12 克。
- [加 减]** 若风偏盛，兼腰背疼痛，游走不定者加防风 10~15 克，独活 10~15 克；若湿偏盛，兼肿胀沉重者，加防己 10~12 克，苡米 15~20 克，若痰偏盛，兼形体肥胖，肢体麻胀者，加制南星 5~10 克，白芥子 10~12 克；若寒偏盛，兼恶寒肢冷者加制川乌 5~10 克，北细辛 2~3 克；若热偏盛，口苦便秘者重用大黄 15~20 克，芒硝 15~20 克；若瘀偏盛，痛有定处，舌有瘀点者，重用鸡血藤 30~60 克。
- [制用法]** 将上药水煎，分 2 次服，每日 1 剂。
- [验 证]** 用上药治疗坐骨神经痛患者 13 例，其中痊愈 11 例，好转 2 例。

6. 杜仲等治坐骨神经痛

【方 剂】 杜仲、川续断、淮牛膝、桑寄生各 30 克，没药、乳香、红花、桃仁、生甘草各 10 克，全蝎、蜈蚣各 2 克（共研末冲服），木瓜、威灵仙、独活、白芍各 20 克。

【制用法】 将上药水煎，分早、晚 2 次服，每日 1 剂。1 周为 1 个疗程。

【验 证】 用本方治疗坐骨神经痛患者 133 例，经用药 1~3 个疗程，其中，治愈者 125 例；显效者 4 例；有效者 3 例；无效者 1 例。

7. 黄芪白芍等治坐骨神经痛

【方 剂】 生黄芪 50 克，白芍、元胡、木瓜、全当归、桂枝各 20 克，赤芍、牛膝、鸡血藤、威灵仙、路路通各 15 克，地鳖虫、全蝎各 10 克，生甘草 5 克。

【制用法】 将上药水煎，每日 1 剂，分早、中、晚口服。10 天为 1 个疗程。

【验 证】 用本方治疗坐骨神经痛患者 161 例，经服药 20~30 天后，其中，治愈者 152 例；显效者 4 例；有效者 3 例；无效者 2 例。

8. 乳香粉治坐骨神经痛

【方 剂】 制马钱子 50 克，制乳香、制没药、红花、桃仁、全蝎、桂枝、麻黄各 20 克，细辛 15 克。

【制用法】 将上药共研为细粉末，装入空心胶囊内，每粒重 0.3 克。用时，每服 3~4 粒，每日早、晚用黄酒或温开水送服。15 天为 1 个疗程。

【验 证】 用本方治疗坐骨神经痛患者 144 例，经用药 2~4 个疗程，其中，治愈者 139 例；显效者 3 例；有效者 2 例。

十二、脑炎、脑膜炎

本病是由于病原体侵入软脑膜和脑实质所引起的脑部感染性疾病，其病原体包括细菌、病毒、真菌、螺旋体及寄生虫等。

1. 大蒜野菊花预防流脑

【方 剂】 大蒜瓣 60 克，野菊花 30 克。

【制用法】 加水煎成浓汁。嗽口，每日数次。

【功 效】 清热解毒。用以预防流行性脑脊髓膜炎。

[验证] 《家庭医学》介绍读者反映效果满意。

[备注] 流行期间每日生吃大蒜，然后用盐水漱口，每日数次，有助预防之效。

2. 大蒜液方治脑膜炎

[方剂] 大蒜、葡萄糖粉各适量。

[制用法] 大蒜去皮、捣烂取汁，用开水配成20%的溶液，再加入葡萄糖粉若干。根据病情、年龄给以不同剂量。成人一般可服20%的大蒜溶液20毫升，4小时1次，病重者3小时1次。脑压高致病危时，急针刺百会、十宣、水沟、少商（放血）等穴；头痛呕吐者，针合谷、太阳、列缺等穴。

[功效] 用治脑膜炎。

[验证] 《〈湖南医学院学报〉论文专集》介绍，用此方共治疗4例，均痊愈。

3. 水牛角汤治乙型脑炎

[方剂] 水牛角片适量。

[制用法] 加水煎汤，水煎2小时以上。每日2或3次分服。3岁以内每日用水牛角30克，3岁以上每日用60克，成人每日服100克，连续服用1周可愈。

[功效] 清热解毒，凉血镇惊。治流行性乙型脑炎、高热惊厥，对大便潜血，鼻衄亦有疗效。

[验证] 《新中医》杂志介绍，用此方治疗11例，9例痊愈，1例好转，1例无效。

4. 山羊角汤治乙型脑炎高热

[方剂] 山羊角50克，钩藤（中药）15克。

[制用法] 将羊角切片，水煎2小时后加入钩藤，再煎半小时。日2或3次分服。

[功效] 平肝熄风。治流行性乙型脑炎之高热神昏、谵语抽风。

[验证] 贾×，女，9岁，患乙型脑炎高热症，按上方服药3日，好转，10日痊愈。

5. 橄榄萝卜汤治流脑

[方剂] 橄榄6枚，萝卜250克。

[制用法] 两味洗净煎汤。当茶饮。

〔功效〕 清热解毒，凉肝止惊。用治流行性脑脊髓膜炎。

〔验证〕 赵××，男，7岁，患流脑，坚持用上方，治愈。

十三、糖尿病

糖尿病，又称“消渴病”。本病是常见的内分泌代谢病之一。典型者出现多尿、多饮、多食、疲乏、消瘦等综合征，严重时可并发酮症酸中毒。发病机制及致病原因尚未明了。化验检查，血、尿糖阳性，为诊断重要依据。

1. 滋肾蓉精丸治疗肾虚型糖尿病

〔方剂〕 黄精20克，肉苁蓉、制首乌、金樱子、淮山药各15克，赤芍、山楂、五味子、佛手片各10克。

〔制用法〕 按中成药质量控制标准制成小丸。每服6克，每天3次。

〔疗效〕 治疗肾虚型糖尿病有奇效。

〔验证〕 治疗170例肾虚型糖尿病获近期治愈49例，显效22例，有效77例，无效22例，总有效率为87.1%。

〔备注〕 中医定型标准：（1）主症：多饮、多食、多尿、消瘦或虚胖。（2）肾虚见症：面色萎黄或黧黑，头晕眼花，心悸气短，动则气促，多汗疲乏，失眠多梦，耳鸣耳聋，手足心热，肢麻肢痛，腰膝酸软，健忘，性功能低下，阳萎遗精，月经不调，夜尿频多，舌红少苔或舌淡苔白或舌质暗红，脉细数或沉细无力。

2. 萝卜汁治轻、中型糖尿病

〔方剂〕 红皮白肉萝卜

〔制用法〕 选红皮白肉萝卜，捣碎取汁100~500毫升为1次量，早晚各服1次，7天为1疗程，可连服3~4个疗程。

〔功效〕 清热降火，生津补液，健胃消食，止咳化痰，顺气解毒。

〔验证〕 冯××，女，45岁，农民，1983年4月16日诊。患糖尿病1年，曾经中西医治疗，病情时轻时重。症见口渴腰酸，疲倦无力，汗出尿频，心悸善饥，舌上赤裂、边尖红，脉细数。空腹血糖185毫克、尿糖（+++）。嘱停服它药，每天饮萝卜汁，早晚各1次，每次约100毫升，连续服21天。检查：空腹血糖85毫克、尿糖阴性，其余症状已不明显；自觉胃部略感空虚嘈杂。处以玉竹30克煎服，以益气阴，服半月后精神转佳，能

参加全日劳动。为巩固疗效，嘱续服萝卜汁1个月，观察2年未复发。

[备 注] 《卫生易简方》消渴方载“用萝卜捣汁服大效”。本方适用于肺燥胃热型。证见消谷善饥，烦渴多饮，口干舌燥，大便燥结，小便频数，舌边尖红、苔薄或黄燥，脉滑数等，属上、中消证，即轻、中型糖尿病。

3. 黑木耳扁豆治糖尿病

[方 剂] 黑木耳、扁豆等份。

[制用法] 晒干，共研成面。每次9克，白水送服。

[功 效] 益气，清热，祛湿。用治糖尿病。

[验 证] 黄××，男，55岁，患糖尿病2年，症见口渴腰酸，疲倦无力，汗出尿频，心悸善饥，经多方用药无明显好转，后每天服上方，连用两月，尿糖转阴，血压正常。

[备 注] 糖尿病是主要因胰岛素不足而引起的以糖代谢紊乱、血糖增高为主的慢性疾病。早期无症状，晚期典型病例有多尿、多饮、多食、消瘦、乏力等症状。本病中医学属“消渴”范围。

4. 冷水茶治糖尿病

[方 剂] 茶叶10克（以未经加工的粗茶为最佳，大叶绿茶次之）。

[制用法] 将开水晾凉，取200毫升冷开水浸泡茶叶5个小时即可。

[功 效] 用治糖尿病。

[验 证] 据《家庭医生》杂志介绍用此法疗效极佳。

[备 注] 禁用温开水冲泡，否则失去疗效。据日本新媒介报道，日本一教授的研究结果表明：茶叶中含有促进胰岛素合成及去除血液中过多糖分的多糖类物质，因而常饮冷水茶可治疗糖尿病。

5. 煮玉米粒治糖尿病

[方 剂] 玉米粒1000克。

[制用法] 加水煎煮至粒熟烂。分4次服食，连服1000克。

[功 效] 清热，利尿，降低血糖。用治糖尿病尿味带甜、身有浮肿、尿量增多。

[验 证] 据《锦方实验录》介绍：患者袁某患糖尿病两年余，尿带甜味，身有浮肿，尿量增多，经中西医治疗无效，服此方而愈。又，王某，63岁，患糖尿病数载，时好时犯，于1967年夏，

手指肿胀。检验尿糖增多，嘱其每日煎服玉米粒 60 克，连服 1000 克后，手指松软，血糖降低。

〔备 注〕 胃寒者应少食。

6. 常食南瓜治糖尿病

〔方 剂〕 南瓜（番瓜、倭瓜、窝瓜、北瓜）

〔制用法〕 熟食，或当主食食用。

〔功 效〕 用治糖尿病。

〔验 证〕 据日本新闻报道，日本北海道一村镇，通过卫生健康检查发现，有史以来该村镇居民中无一例糖尿病和高血压病患者。这一令人惊奇的报道，引起科学家的重视，经研究发现，原来该村镇居民世代以南瓜为主食。这一奥秘在日本引起极大轰动，人们争相食用南瓜。有预见的日本医学界和商界，通过科学加工制成富含维生素，且热量低的南瓜粉剂投入市场。日本一前首相患糖尿病，经食用南瓜粉而痊愈。报道还介绍，南瓜还有减肥与美容之功，因此颇受日本女性的青睐。据传，南瓜热目前又传入欧洲，继之席卷东南亚。

〔备 注〕 我国医籍《岭南草药志》云：南瓜味甘性温。温中止嗽，清热解毒，驱虫。从临床及效用中可见有关治疗消渴（糖尿病）的文字记载。近年我国已有纯南瓜粉生产和经销。

十四、失 眠

失眠，中医称“不寐”或“不得卧”，即因本身原因而引致的睡眠不足，表现为入睡困难，时常觉醒及（或）晨醒过早。按其发病原因可分为四种类型，一是身体原因，如疼痛和咳嗽引起；二是生理原因，如生活工作环境变化，三为精神原因，如兴奋和焦虑引起；四为药物原因，如应用某些兴奋剂。治疗关键在于针对病因，可辅以下法：

1. 大枣葱白汤治失眠

〔方 剂〕 大枣 15 个，葱白 8 根，白糖 5 克。

〔制用法〕 用水两碗熬煮成 1 碗。临睡前顿服。

〔功 效〕 补气安神。用治神经衰弱之失眠。

〔验 证〕 肖×，男，43 岁，长期失眠，在医学杂志上发现此方，后用之失眠症治愈。

[备 注] 临睡前用热水烫脚，多泡些时间，水凉再加热水，随烫随饮大枣葱白汤，疗效更好。用法改用冲鸡蛋汤热饮，亦有功效。

2. 蝗虫粉补虚治失眠

[方 剂] 蝗虫。

[制用法] 蝗虫去足、翅，焙燥研粉。每日服 10 克，分 2 或 3 次饭后服。

[功 效] 用治神经衰弱、肺结核、咳喘等。

[验 证] 《老年报》介绍，效果理想。

3. 食醋镇静安神治失眠

[方 剂] 醋（陈醋或香醋）。

[制用法] 用 10 毫升食醋，调在一杯温开水中喝下。每日睡前 1 小时饮用。

[功 效] 食醋能诱发机体产生一种叫 5-羟色胺的物质，有良好的镇静催眠作用。

[验 证] 读者反映效果很好，值得推广。

4. 大葱治失眠

[方 剂] 大葱（取白）150 克。

[制用法] 将大葱白切碎放在小盘内，临睡前把小盘摆在枕头边，便可安然入梦。

[功 效] 用治神经衰弱之失眠。

[验 证] 据《老年报》介绍，读者多次反映效果满意。

5. 半夏苡仁治失眠

[方 剂] 法半夏、苡仁各 60 克。

[加 减] 心脾亏虚加党参，心阴不足加麦冬，痰热扰心加黄连，胃中不和加神曲。

[制用法] 浓煎，临睡服下。

[验 证] 1. 我采用《新中医》1983 年第 11 期“半夏秫米汤加味治疗失眠”一文的方法，近半年来治疗 25 例失眠患者（其中心脾亏虚 13 例、心阴不足 6 例、痰热扰心 3 例、胃中不和 3 例），病程最短 3 天，最长 1 年余；服药少则 1 剂，多则 5 剂。显效 18 例，好转 7 例，疗效甚为满意。病例：张 × ×，男，45 岁，干部，1984 年 2 月 15 日诊。失眠半年多，每晚最多能睡 2~3 小时，常常彻夜难眠，屡服中药无效，又不愿服安眠药。辨证属

痰热扰心。即处以薏苡仁、半夏各 60 克，川黄连 15 克。服药当晚即能安静入睡。再服 2 剂，不再失眠。追访 3 个月，亦未见失眠，患者高兴地感谢我，我则认为应感谢《新中医》。来源 《新中医》1984 年第 10 期。

2. 读贵刊 1983 年 11 期“半夏秫米汤加味治疗失眠”一文后，颇受教益。笔者曾治 6 例失眠患者，按原方加减投服，确有显效。病例：夏××，女，46 岁，工人，1986 年 4 月 2 日诊。失眠 1 年余，常每晚只能睡 2~3 小时，且多梦；近因上晚班，白天更难入睡。神疲，面色无华，舌淡苔白腻，脉沉缓。予制半夏、薏苡仁各 60 克，党参 30 克，3 剂。服后能熟睡 5~6 小时。再予 3 剂，诸症消失。

〔备 注〕 半夏秫米汤是和胃的主方。其方由半夏秫米二药组成。李时珍《本草纲目》载：半夏除“目不得瞑”，吴鞠通谓：“半夏逐痰饮而和胃，秫米秉燥金之气而成，故能补阳明燥令之不及而渗其饮，饮则胃和，寐可立至。”现代药理研究证实：法半夏对中枢神经有良好的镇静和安定作用。因药房不备秫米，遵吴鞠通意，用薏苡仁代之。

6. 桑椹糖水治神衰失眠

〔方 剂〕 鲜桑椹 100 克，冰糖 10 克。

〔制用法〕 加水共煎煮。以糖调饮。

〔功 效〕 补肝益肾。用治神经衰弱之失眠、习惯性便秘等。

〔验 证〕 经试疗 10 例，均见效。

〔备 注〕 《随息居饮食谱》说，此方还有滋肝肾、充血液、祛风湿、健步履、熄虚风、清虚火等功效。

7. 核桃芝麻丸温补肝肾虚

〔方 剂〕 核桃仁、黑芝麻、枸杞子、五味子、杭菊花各等分，蜂蜜适量。

〔制用法〕 共捣烂，研为细末，炼蜜为丸，每丸重 15 克，每次 1 丸，每日 3 次，空腹服。

〔功 效〕 滋阴，清热。治疗头晕、眼花，失眠。

〔验 证〕 读者多次反映效果理想。

8. 酸枣仁粥治疗心悸失眠

〔方 剂〕 酸枣仁 5 克，粳米 100 克。

[制用法] 酸枣仁炒黄研末，备用。将粳米洗净，加水煮作粥，临熟，下酸枣仁末，再煮。空腹食之。

[功效] 宁心安神。用治心悸、失眠、多梦。

[验证] 和×，男，68岁，长期失眠，后用上方，治愈。

9. 糖渍龙眼养心安神

[方剂] 鲜龙眼 500 克，白糖 50 克。

[制用法] 将鲜龙眼去皮和核，放入碗中，加白糖，上笼蒸，晾 3 次，致使色泽变黑。将变黑的龙眼拌白糖少许，装入瓶中即成。每次服龙眼肉 4 粒，每日 2 次。

[功效] 养心安神。适用于病后体弱及心血不足所致的失眠、心悸、健忘等。

[验证] 《健康报》介绍该方效果理想。

十五、眩 晕

眩是目眩，即眼花或眼前发黑，视物模糊；晕是头晕，即感觉自身或外界景物旋转，站立不稳，因二者同时并见，故统称为“眩晕”。究其原因有四。

一是外邪袭人，邪气循经脉上扰巅顶，清窍被扰，可发生眩晕。

二是脏腑功能失调，或肾精亏耗，不能生髓，髓海不足，发生眩晕；或是肝阳上亢，上扰清窍，发生眩晕；或是脾胃不足，气血亏虚脑失所养。

三是痰湿中阻，痰湿上犯，蒙蔽清阳而发眩晕。

四是瘀血内阻，清窍受扰，而生眩晕。

根据上述情况，宜选用下列偏方、验方治疗。

1. 搗神汤治眩晕

[方剂] 生石决明（先下）21～45 克，生牡蛎 15～30 克，生地、生白芍、夜交藤各 9～15 克，白蒺藜 9～12 克，酸枣仁 9～18 克，合欢花 6～12 克，远志、黄芩各 6～9 克，番附 6 克。

[加 减] 肝血虚目昏、面色萎黄者重用白芍，加当归、何首乌、阿胶。肝阳上扰而致头晕目眩者重用生牡蛎，加生赭石、天麻。肝风内动而致筋惕肉瞤者加菊花、钩藤、僵蚕。肝火上炎而致头痛目赤者加龙胆草、芦荟、青黛。肾阴不足腰膝软、五心烦热者重用生地，加山萸肉、天冬、女贞子、龟板胶、当归；兼见肾阳不足者去白蒺藜、远志，加肉桂、附片、肉苁蓉，同时注意

阴中求阳，配熟地、龟板、桑椹、枸杞子。

〔制用法〕 水煎服，每日一剂。

〔功效〕 治眩晕奇效。

〔验证〕 高×，男，73岁，病历号192443，于1982年8月4日诊。眩晕目花2月余，耳鸣耳聋，视物不清如在雾中，头部有气窜之感，二便正常。舌根部苔黄厚，脉沉滑。此属阴虚阳亢，风痰上扰，治当益阴潜阳，驱风化痰。搃神汤加减：生石决明（先煎）40克，生地15克，钩藤20克，橘红、石斛、茯苓各12克，草决明、谷精草、半夏、菊花、白蒺藜，地骨皮、夜明砂、蔓荆子各10克。水煎服。服42剂痊愈。

〔备注〕 凡阴虚火旺而致的头痛、眩晕、失眠、抑郁、烦躁、汗多、易怒、心悸、胁痛等均可用此方治疗。

2. 大建中汤治眩晕

〔方剂〕 人参、干姜、蜀椒、饴糖。

〔制用法〕 治眩晕症加法夏6克、白术9克。

〔功效〕 此方出自《金匱要略·腹满寒疝宿食病》篇，是建中补虚名方。笔者运用此方注重“胸中大寒痛”等立方主证，为本方辨证要点，治疗嗜睡、眩晕各1例，均收满意疗效。

〔验证〕 陈×，病近半年，经中西药治疗效微，而求治于余。表现为眩晕，如坐舟车，腹痛不食，恶心欲吐，手足不温，面色苍白，舌淡胖嫩、苔白滑，脉沉迟。如法治疗，3剂显效，7剂痊愈。随访至今未复发。

3. 防眩汤治眩晕

〔方剂〕 党参、法半夏各9克，当归、熟地、白芍、白术各30克，川芎、山萸肉各15克，陈皮3克，天麻9克。

〔制用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 此方出自经方家曹颖甫先生治眩晕证所录，用之临证，每每有效，曰为治虚证眩晕好方。临证加减，治疗以眩晕为主证的高血压、低血压、脑动脉硬化、美尼尔氏病等症，可收意想不到之效。

〔验证〕 何××，家庭妇女，58岁。于1988年4月24日上午10时，突觉天昏地转，树摇欲倒，呕吐频繁，家人急邀余往诊。投以防眩汤。处方：党参、天麻、法半夏各9克，当归、白芍、熟

地、白术各 30 克，川芎、山萸肉各 10 克，陈皮 3 克。3 剂。服 1 剂后，眩晕明显好转，嘱原方再服 3 剂，安然痊愈。

4. 柳枝粉治眩晕症

[方 剂] 柳树枝。

[制用法] 取柳树枝晒干研末备用（最好在清明前后数日采取，阴干，存过冬）。用时，根据辨证选一、二味中药煎汁冲服 10 克柳树枝粉；若辨为火证，取夏枯草 15 克；风证，取钩藤 30 克；痰证，取制半夏 12 克；瘀证，取丹参 15 克；气虚取太子参 30 克；血虚取当归 12 克；阴虚取女贞子、旱莲草各 15 克；阳虚取仙灵脾、仙茅各 15 克），每天 1 次。

[功 效] 疗效经治 25 例，以头眩晕为主症，兼呕吐、头痛、胸闷、气急等；其中肝风内动 10 例，肝火上炎 4 例，痰湿上蒙 4 例，瘀血阻滞 2 例，阴虚 3 例，气虚 1 例，均经他法治疗未效者。用上法治疗后全部治愈，见效最快为 2 天，慢为 7 天。药后未见副作用。

[验 证] 赵××，男，46 岁，教师。因眩晕卧床不起已 1 个月余，伴恶心、头痛、失眠、易怒，舌苔薄白腻，脉弦滑。曾诊为美尼尔氏综合征，经用他药，效果不显。中医辨为痰湿上蒙，用半夏煎汁冲柳枝粉服，2 次见效，5 次获愈。

[备 注] 按柳枝入药，早有文献记载，《本草纲目》谓“煎服，治黄疸，白浊；酒煮，熨诸痛肿，去风，止痛，消肿”。经现代药理研究，证实含有水杨酸甙等成份；国内近年来亦有用柳枝治冠心病、慢性气管炎、传染性肝炎、烧烫伤等有效。至于治眩晕，是否系水杨酸甙等成份促使血管微循环改善，尚待进一步研究。

5. 镇眩汤治疗眩晕症

[方 剂] 川芎、白芍各 10～16 克，当归、生地、桂枝各 10～12 克，白茯苓 12～18 克，白术、甘草各 10 克，生龙骨、生牡蛎各 30～60 克。

[制用法] 每天 1 剂，水煎 2 次，每次煎取 200～300 毫升，早晚各服 1 次，15 天为 1 疗程。

[疗 效] 治眩晕症有良效。

[验 证] 严××，女，61 岁，干部，病案号 117667，1988 年 7 月 14 日

入院。主诉阵发性头晕 2 月余，加重 10 天。西医诊为高血压病。患者 1988 年 4 月下旬始出现阵发性头晕，未作诊治。症状每于休息不好，情绪波动而加重，近 10 天头晕明显，伴汗出少寐、胸闷心慌、例稀溺清。查血压 18.7/13.3 千帕斯卡，形体肥胖，面色红，舌暗红、苔薄白，脉弦细。头颅 CT 检查未见异常，X 线胸部摄片示：左心稍丰满，心电图检查：左室高电压。投镇眩汤加丹参 30 克，钩藤 20 克，麦冬、菊花各 15 克，泽泻 12 克。连服 10 剂，头晕、易怒、少寐症状减轻，血压 18.7/12.0 千帕斯卡，继服原方 15 剂，证状消失，血压正常，带药 7 剂出院。

十六、呕 吐

呕吐是胃内容物经口吐出体外的一种复杂的反射性动作。此种动作可将有害物质排出，具有一定的保护性作用，但剧烈持久的呕吐可以引起水电解质紊乱、代谢性碱中毒及营养障碍。引起呕吐的原因很多，一般以胃肠道疾病引起的为多见，其他如脑炎、脑肿瘤、尿毒症、妊娠等都可引起。

1. 饮羊奶治反胃干呕

- [方 剂] 鲜羊奶
- [制用法] 将羊奶煮沸。每次饮 1 杯，每日 2 次。
- [功 效] 滋阴养胃。治阴虚所引起的反胃、干呕等症。
- [验 证] 牛××，男，9 岁，犯有反胃呕吐症，食多种药物均无效，后用该方月余，症状消失。
- [备 注] 羊奶比牛奶更富于营养，尤其绵羊奶蛋白质及脂肪量较多，是很好的补益之品。羊奶归入胃、心、肺经，含蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁及多种维生素成分，有滋润心、胃的功能。

2. 醋矾糊外敷止呕

- [方 剂] 陈醋、明矾、面粉各适量。
- [制用法] 上三味共调成糊状。用时敷于两足心涌泉穴，用纱布包扎固定，一般半小时后可发生止呕作用。
- [功 效] 消积解毒、清热散瘀。用治呕吐不止、泄泻。
- [验 证] 据《上海中医药》1965 年 11 月号介绍典型病例：黄×，女，

半岁，呕吐频繁，饮水即吐，泄泻每天达 20 次，眼眶下陷，皮肤皱起，脱水明显，经用上方 2 小时后，吐止，继用参麦散加和胃之剂而愈。

3. 萝卜蜂蜜止恶心呕吐

[方 剂] 萝卜 1 个，蜂蜜 50 克。

[制用法] 将萝卜洗净切丝捣烂成泥，拌上蜂蜜。分 2 次吃完。

[功 效] 健脾，和中，养胃。用治恶心呕吐。

[验 证] 据《老年报》介绍效果理想。

4. 白胡椒半夏治呕吐

[方 剂] 白胡椒、制半夏、鲜姜等份。

[制用法] 前两味共研细末。鲜姜煎汤。以姜汤和面同白胡椒末、半夏末调匀并捏成大丸粒。每服 30~40 丸，用姜汤送下，每日 2 次。

[功 效] 暖肠胃。用治呕吐（包括胃炎，幽门肥厚、狭窄，胃癌初期等的呕吐）。

[验 证] 经多方验证，疗效良好。

5. 甘蔗姜汁治吐食干呕

[方 剂] 甘蔗汁半杯，鲜姜汁 1 汤匙。

[制用法] 甘蔗汁是将甘蔗剥去皮，捣烂取的汁液。姜汁制法与此同。将两汁和匀稍温服饮，每日 2 次。

[功 效] 清热解毒、和胃止呕。治胃癌初期、妊娠反应、慢性胃病等引起的反胃吐食或干呕不止。

[验 证] 经治 19 例，18 例痊愈，1 例好转。

6. 柿饼治胃寒呕吐清水

[方 剂] 柿饼（带蒂）5 个。

[制用法] 将柿饼在饭前蒸熟后食。

[功 效] 清热，降逆。治胃寒呕吐、反胃。

[验 证] 韩×，男，35 岁，患胃寒呕吐症，用上方，症状消失。

7. 豆腐白汤开胃止呕

[方 剂] 豆腐 2 块，盐适量，味精少许。

[制用法] 水开后下料，煮 20 分钟。食饮。

[功 效] 凉胃，止呕。用治饭后腹不适、口苦发粘、舌苔厚、食无味或反酸暖气，以及水土不服而引起的恶心呕吐等。

〔验证〕 据《家庭医生》杂志介绍效果良好。

8. 白胡椒治宿食呕吐

〔方剂〕 白胡椒、生姜、紫苏各5克。

〔制用法〕 水煎服，每日2次。

〔功效〕 健胃止呕。用治食荤腥宿食不消化引起的呕吐及腹痛。

〔验证〕 李××，男，34岁，因进宿食后呕吐不止，经人介绍，服用本方后呕吐立止。

9. 韭菜根捣汁治呕吐反胃

〔方剂〕 韭菜根。

〔制用法〕 洗净，捣烂绞取汁约一小酒杯。用少许开水冲服。

〔功效〕 健胃止呕。用治呕吐、恶心。

〔验证〕 据《新中医》介绍疗效值得推广。

10. 粳米煨姜汤治呕吐

〔方剂〕 粳米20~30克（炒黄），煨姜15~20克（将生姜剖开，放入少量食盐，用湿纸包裹煨熟），蜂蜜30克（用纱布过滤），食盐1~2克（炒爆为宜）。

〔制用法〕 先将炒好的粳米放入器皿中，加水250毫升，用文火煮至米粒开花；将煨姜切成姜米倒入，再煮至稀粥样时加入炒好的食盐和蜂蜜，拌匀后即可服用。令患者先进3~5匙，待10分钟后，再徐徐服之，药后一般30分钟许呕吐可止。

〔疗效〕 此方为笔者自拟方，经临床治疗20余例，疗效较好。

〔验证〕 陈××，男，35岁，农民。自诉胃痛3年，每次发作时呕吐频繁，先是食物残渣，后为大量涎沫和胃液，每用西药氯丙嗪、阿托品等均未效。于1986年12月20日来诊。用止呕方：粳米20克，煨姜15克，蜂蜜30克，食盐1.5克。嘱患者按原方炮制和用法。服药后约30分钟，呕吐即止，继用3天，每天1次。自后每次发作时仅疼痛，未见呕吐。

11. 溜猪大肠治噎膈反胃

〔方剂〕 猪大肠1挂，香油、黄酱、姜丝各适量。

〔制用法〕 将猪大肠用盐水抓洗，翻过来把肠内污物冲洗净，然后再翻过来用清水漂洗干净，用线将肠两端扎紧，放锅内加水煮熟。熟后切成小段，加香油、黄酱、姜丝溜炒，佐大米软饭吃，但不

宜吃过饱。可连续吃 5 挂。用此方忌食生冷、辣酸、干硬食物，忌生气，忌饮酒。

[功效] 宽膈利胃。治噎膈、呃逆、呕吐、饮食不进。

[验证] 屡用效佳。

十七、胃下垂

现代医学认为，胃下垂是由于胃壁及腹部肌肉松弛的结果。中医学则认为：胃下垂是由于思虑伤脾，气虚下陷所致。常用的临床验方、偏方主要如下：

1. 猪肚白胡椒补益脾胃

[方剂] 猪肚 250 克，白胡椒 15 克。

[制用法] 猪肚洗净切片，同白胡椒共煮熟后分 2 或 3 次食用。

[功效] 补益脾胃。治胃下垂及胃寒疼痛。

[验证] 刘××，男，29 岁，经查患胃下垂，食用上方、痊愈。

[备注] 牛肚可代替，功效相同。

2. 敷脐法治胃下垂

[方剂] 蓖麻子仁 3 克（选饱满洁白者为佳），五倍子 1.5 克。

[制用法] 上两味料为 1 次用量。将两味捣碎，研细，混匀后加水，制成形似荸荠状、上尖下圆的药团，大小可根据患者脐眼大小而定。将药团对准脐眼塞上，外用橡皮膏固定，每日早中晚各 1 次。用热水袋放于脐眼上热敷，每次热敷 5～10 分钟，以感觉温热不烫皮肤为度。一般 4 天后取掉药团。贴敷 3 次为一疗程。一疗程后可做 X 线造影复查。如胃的位置已复原，应停止用药；未复原，可再进行第二疗程。

[功效] 除湿通络，敛肺涩肠。用治胃下垂。

[验证] 据编者调查、观察，多名患者用上方治愈。

[备注] 据《老年报》介绍，采用此方治疗期间，应注意：①治疗不宜在寒、暑天进行，一般以室温在 20℃ 左右较好。②治疗期间应适当卧床休息，减少活动，适当减少茶、汤的饮用量，少吃水分量多的食物，饮食以少量多次为好。③禁房事。④热敷时腹部可能出现较强的牵拉感，这是正常现象，不必惊慌，个别病人可出现过敏反应，应引起注意，过敏者应停用。⑤吐血的病人及孕妇，不宜采用此法治疗。

3. 加味枳术汤治胃下垂

[方 剂] 枳实 15 克、白术 15 克、生姜 10 克。

[加 减] 消化不良者加生三仙各 10 克，同煎。

[制用法] 煎 150ml，日 3 次，食前半小时服之。

[功 效] 主治胃下垂弛缓无力、排空时间延长、水饮停留、上腹胀满、动摇有声（震水音）。

[验 证] 周××，女，33 岁。就诊日期：1980 年 5 月 6 日。患者上腹胀满，食后明显，纳差乏力 1 年余。曾住院诊断胃下垂，近来上腹胀满加重，食后更甚，乃予上方加生三仙煎服，服 2 周后胀满减轻，4 周后食后无不适，胃纳增加，体力亦好转。

[备 注] 枳实理气开胃、消食除满，现代药理研究认为对胃肠有一定的兴奋作用，能使胃肠收缩节律有力。白术补脾益气，燥湿和中，现代药理研究有增加体重，增强肌力的作用，生姜温中化饮、理气健胃，故三药合用相得益彰，能提高疗效。加强腹肌锻炼，忌食油腻不易消化之食物。

4. 蓖倍膏治胃下垂

[方 剂] 蓖麻子仁 98%，五倍子 2%。

[制用法] 将蓖麻子外壳剥去，除瘪的，灰的，选用饱满而洁白的仁。将五倍子去除灰屑，研成细末过筛，然后将蓖麻仁和五倍子末按上述比例混合均匀，打成烂糊，制成每颗重约 10 克，直径 1.5 厘米的药饼收贮备用。成人每人用量 1 粒，点准百会穴（剃去一块头发，与药饼等大），将药饼紧贴百会穴上，用纱布绷带固定，不使移动。每日早、中、晚各 1 次以搪瓷杯盛半杯开水、将杯底置于药饼上进行热熨，每次 10 次钟左右，以感觉温而不烫伤皮肤为度。一次贴上药饼，可 5 昼夜不换。如第 1 次治疗完毕，自觉症状未见好，休息 1 天后，进行第 2 次治疗，一般以 10 天为度。

[功 效] 收敛固脱。

[备 注] 引自 1974 年《四川中草药通讯》(3)，本方对子宫脱垂，脱肛也有一定疗效。

[验 证] 坚持用药，效果甚佳。余精心治疗 61 例，显效 28 例，好转 18 例，有效率为 75.4%。

5. 二麻膏治胃下垂

〔方 剂〕 蓖麻子仁 10 克，升麻粉 2 克。

〔制用法〕 将蓖麻仁捣烂如泥后拦入升麻粉，制成直径 2 厘米，厚 1 厘米圆饼备用。将患者百会穴周围（直径 2 厘米）头发剃掉后，上置药饼，用绷带或其它方法固定。敷药后让患者取水平仰卧位、宽松裤带，将盐水瓶（80℃）熨烫药饼，每日 3 次，每次 30 分钟。每块药饼可连续使用 5 天，休息 1 天后，更换药饼。10 天为 1 疗程。治疗以饭后 2 小时进行为宜。

〔功 效〕 升提固脱。

〔验 证〕 治疗 268 例。痊愈 105 例，显效 70 例，好转 78 例，无效 15 例，总有效率为 94.4%。

〔备 注〕 引自 1987 年，《上海中医药杂志》（8）。心脏病、高血压、呕吐、咯血患者及孕妇忌用。治疗期间注意休息，不暴饮暴食，不作剧烈运动，禁止房事。药饼切勿内服。以防中毒。如果胃的位置已在髂嵴连线 6 厘米以上，症状基本消失，则不需继续治疗。用药后患者胃蠕动增强，上升感越明显，疗效越好；个别患者用药后有恶心、胸闷、小腹牵拉性或撕裂样疼痛，一旦停止治疗，症状即消失。

6. 云苓、党参治胃下垂

〔方 剂〕 云苓 25 克，党参、黄芪、山药、当归、山楂各 15 克，柴胡、郁金、白术、枳壳、鸡内金各 12 克，升麻、陈皮、甘草各 9 克，大枣 10 枚。

〔加 减〕 若痛甚者，加元胡 12 克；若肝脾下垂者，加鳖甲 31 克，若溃疡者，加白芨 12 克，乌贼骨 15 克。

〔制用法〕 将上药水煎，分 2 次服。每日 1 剂。

〔验 证〕 用上药治疗胃下垂 103 例，其中痊愈者 54 例；显效者 25 例；有效者 22 例；无效者 2 例。用本方治胃下垂 5~8cm 的患者，一般服药 15 剂即可获痊愈。

7. 肉桂等治胃下垂

〔方 剂〕 肉桂 1 克（刮去粗皮），炒五倍子 2 克，炒何首乌 3 克。

〔制用法〕 将上药分别研为细末，混匀，每日 1 剂，用凉开水送服，20 天为 1 个疗程。

〔验 证〕 用上方治疗胃下垂患者 60 多例，用药 1~2 个疗程后，自觉症状消失，食欲正常，部分患者经 X 线复查，胃体上升 3~5cm。

8. 鲜仙人球瘦猪肉治胃下垂

〔方 剂〕 鲜仙人球 50~60 克，瘦猪肉 30~50 克。

〔制用法〕 先将瘦猪肉剁碎制成肉饼后，与仙人球一起煮熟，晚上睡前顿服，每日 1 剂。1 个月为 1 个疗程，可连服 2~3 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗胃下垂患者 46 例，均获治愈。其中用药 1 个疗程治愈者 20 例；2 个疗程治愈者 13 例；3 个疗程治愈者 3 例。随访 2 年，均未见复发。

9. 西洋参等治胃下垂

〔方 剂〕 西洋参 5~8 克（磨汁冲服），生黄芪 20~30 克，白术、升麻、枳实、青皮、女贞子、枸杞子各 10~12 克，砂仁、甘草各 8~10 克。

〔加 减〕 若伴湿热者，加川黄连 6~8 克，苍术 10~12 克，藿香 10 克；若伴气滞者，加苏梗、广木香各 6~9 克；若伴溃疡者，加乌贼骨 20 克，白芨 15 克；若中气下陷者，加葛根 15~20 克，炙甘草 10~12 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，分 3~4 次口服。10 剂为 1 个疗程。

〔验 证〕 用上药治疗胃下垂患者 101 例，其中治愈者（胃下垂恢复正常，主症消失）95 例；显效者（主症基本消失，胃上提 3~5cm 以上）4 例；无效者（治效前后无明显变化）2 例。服药期最短者 1 个疗程，最长者 3 个疗程。治疗中未见不良反应。

10. 黄芪首乌治胃下垂

〔方 剂〕 生黄芪 25 克，何首乌、全当归、鸡血藤各 15 克，柴胡 20 克，炒葛根、升麻、山萸肉、香附各 12 克，生甘草 10 克。

〔加 减〕 若患者口苦泛酸者，加吴茱萸、川黄连各 8~10 克；若患者口淡无味者，加焦三仙、藿香各 10~12 克；若大便秘结者，加郁李仁、生川军（后下）各 8~10 克；若大便稀溏者，加怀山药、生薏苡仁、茯苓各 10~15 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，分早、中、晚 3 次口服，半个月为 1 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗胃下垂患者 45 例，经用药 1~2 个疗程后，其中治

愈者 40 例；显效者 3 例；有效者 2 例。

十八、胃 肠 炎

急性胃肠炎以起病急，呕吐，腹泻，腹痛为主症，多发生于夏秋季，其发病原因多由暴饮暴食，过食生冷，饮食不洁或食用不易消化的食物引起。临床上常用的有效偏方主要如下：

1. 龙眼核治急性胃肠炎

[方 剂] 龙眼核（即桂圆核）适量。

[制用法] 将龙眼核焙干研成细粉。每次 25 克，每日 2 次，白开水送服。

[功 效] 补脾和胃。治急性胃肠炎。

[验 证] 张××，女，46 岁，患胃肠炎，多次用药疗效不佳，后用上方数次，即愈。

2. 枣树皮红糖汤治肠胃炎

[方 剂] 枣树皮 20 克，红糖 15 克。

[制用法] 水煎去渣，加红糖调服，每日 1 次。

[功 效] 消炎，止泻，固肠。用治肠胃炎、下痢腹痛、胃痛。

[验 证] 赵××，男，50 岁，经医院检查患肠胃炎，用上方 5 日好转，10 日即愈。

3. 梅连平胃汤治胃肠炎

[方 剂] 乌梅 15 克、黄连 10 克、秦皮 30 克、苍术 10 克、厚朴 10 克、陈皮 10 克、炙甘草 5 克、生姜 10 克、大枣 5 枚。

[加 减] 泄泻次数多，日久不减者加罂粟壳 10 克同煎。

[制用法] 每天 1 剂煎 2 遍和匀，日 3 次分服。

[功 效] 乌梅收敛涩肠；黄连、秦皮清热燥湿；苍术健脾胃、厚朴导滞、消除胀满；陈皮理气和中；炙甘草、姜、枣调和脾胃，本方苦寒清热燥湿，芳香理气健脾同用，故肠炎久延，脾虚而湿热留恋者宜之。

[验 证] 张××，女，35 岁。就诊日期：1980 年 9 月 10 日。2 个月来患者腹泻日 3~4 次，大便带粘液，伴腹胀腹痛，屡治不愈，予上方煎服 3 剂，腹泻次数减为日 1~2 次，服 6 剂后大便成形，每日 1 次。

[备 注] 脾胃虚寒者不宜用此。

4. 大蒜头治腹泻不止

[方 剂] 大蒜 2 头。

[制用法] 烧灰存性，煮水服之。

[功 效] 解毒，消炎。

[验 证] 经读者反映，效果理想。

5. 番薯藤治急性胃肠炎

[方 剂] 番薯藤 60~90 克。盐少许。

[制用法] 将番薯藤加盐炒焦，冲水煎服。

[功 效] 解毒，消炎。用治急性胃肠炎之上吐下泻。

[验 证] 马×，女，36 岁，患急性胃肠炎，用上方治愈。

6. 羊肉秫米粥开胃健力

[方 剂] 羊肉 100 克，秫米（高粱米）100 克，盐少许。

[制用法] 羊肉切丁，同秫米共煮粥食。

[功 效] 补虚开胃。治脾胃虚弱而致的消化不良、腹部隐痛等。

[验 证] 《健康保健》杂志介绍效果良好。

7. 牛肉砂仁汤健脾开胃

[方 剂] 牛肉 1 公斤，砂仁 5 克，陈皮 5 克，生姜 15 克，桂皮 3 克，盐少许。

[制用法] 先炖牛肉至半熟，然后将以上各味共炖烂，服前加盐调味，取汁饮用。

[功 效] 健脾醒胃。常用于脾胃虚弱而致的消化不良，久服能增进健康。

[验 证] 读者反映效果良好。

十九、胃 脘 痛

胃脘疼是指以上腹胃脘部近心窝处经常发生疼痛。其发病原因是由于饮食不调、情志刺激、脾阳素虚、感受外寒、胃火和降所致。临床常用有效的偏方、验方主要如下：

1. 炖猪肚治胃脘隐痛

[方 剂] 猪肚（猪胃）200 克，鲜姜 50 克，肉桂 5 克。

〔制用法〕 猪肚洗净切丝，同姜与肉桂放在碗内，隔水炖至熟烂，分2次吃完。

〔功效〕 补益脾胃。治疗脾胃阳虚或胃寒所致的胃脘隐痛、喜热畏寒、吐清水、口淡不渴等。

〔验证〕 据多名患者反映，用上方效果奇佳。

2. 土豆粥治胃脘隐痛不适

〔方剂〕 土豆（不去皮）250克，蜂蜜少许。

〔制用法〕 将土豆洗净，切成丁，用水煮至成粥状。服时加蜂蜜。每日晨空腹食用，连服半月。

〔功效〕 和中养胃。用于胃脘隐痛不适。

〔验证〕 孙××，男，65岁，久犯该病，后常食上方，渐愈。

〔备注〕 禁用发芽的土豆，吃后轻者导致泻痢，重者中毒呕吐，应特别注意。

3. 白砂糖水治中虚脘痛

〔方剂〕 白砂糖150克。

〔制用法〕 加水煎煮至汤浓为度。饮用。

〔功效〕 降浊解毒。治中虚脘痛、食鱼蟹引起的反胃不适及吃蒜口臭等。

〔验证〕 经编者多次观察，该方确有良效。

4. 洋白菜粥治胃脘拘急痛

〔方剂〕 洋白菜500克，粳米50克。

〔制用法〕 洋白菜洗净，切碎煮半小时，捞出菜不用，下米煮粥。日食2次。

〔功效〕 缓急止痛。用于胃脘拘急疼痛。

〔验证〕 患者反映疗效良好

二十、胃及十二指肠溃疡

胃及十二指肠溃疡，又称消化性溃疡，属中医“胃脘痛”范畴。是临床常见多发病。且病程缠绵，治疗上颇难。多因饮食失调，或忧思忿怒，肝郁化火，热灼胃阴，致胃粘膜受损；或脾虚失运，湿邪凝聚，湿郁日久，腐蚀胃体，日久不解，均可导致溃疡病的发生。临床常用的偏方、验方主要如下：

1. 洋白菜汁治胃溃疡疼痛

[方 剂] 洋白菜（甘蓝、圆白菜、包心菜）。

[制用法] 将洋白菜洗净，捣烂取汁。每次饮半茶杯。

[功 效] 清热散结。治胃及十二指肠溃疡疼痛，也是胃癌的预防药。

[验 证] 据《药学通报》介绍，用此方治疗 100 名胃溃疡患者，60% 的患者服药后 2~5 天疼痛消失，90% 的患者服药 7 天疼痛消失。

2. 煨猪肚温中和胃疗溃疡

[方 剂] 猪肚（猪胃）1 个，鲜姜 250 克。

[制用法] 将猪肚洗净，装入切成片的鲜姜，扎好，放入砂锅内用文火煨熟，然后去姜。猪肚切丝，拌酱油吃，汤亦同饮。每个猪肚分 3 天吃完，可连续吃 10 个。

[功 效] 温中养胃。治胃溃疡。

[验 证] 据《江苏中医》介绍，某患者胃溃疡胃痛，多方医治无效，经服此方而愈，7 年未复发。又据《食物疗法精萃》介绍，此方治疗胃寒疼痛效果理想。

3. 清胃散治胃及十二指肠溃疡

[方 剂] 珍珠粉 50 克、广木香 50 克、人工牛黄粉 10 克。

[加 减] 如上腹疼痛较重时方中加延胡索 50 克。

[制用法] 研极细末和匀，用胶囊装每粒 0.5 克，每服 2 粒、日 3 次，食前 1 小时温开水送下。连服 4 周为一个疗程。如一个疗程溃疡尚未愈合可继续用。

[功 效] 胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎所致胃热气滞之上腹疼痛或胀满暖气、嘈杂泛酸者。珍珠粉制酸收敛，人工牛黄镇静清热解毒（消炎），二者合用珠黄散有消炎促进溃疡愈合之功，木香理气解痉，加延胡索活血散瘀，加强理气止痛之效。

[验 证] 刘××，男，45 岁。就诊日期：1986 年 3 月 15 日。上腹疼痛 2 年加重 2 周，伴嘈杂泛酸，有时腕部胀满暖气，胃纳尚可。上消化道钡餐检查报告：胃小弯角切迹处溃疡。予上方服 1 周后痛止，嘈杂泛酸亦减，2 周后嘈杂泛酸均解，4 周后作上消化道造形复查：胃小弯龛形消失。

[备 注] 避免忧思恼怒七情刺激，忌食生冷酸辣油腻及不易消化之食物，注意勿过饱过饥，暴饮暴食以防复发。

4. 止血散治十二指肠溃疡出血

- [方 剂] 土大黄（大黄亦可）30 克、三七 10 克、白及 30 克。
- [加 减] 大便干或秘结者用大黄，大便稀者用土大黄，嘈杂泛酸者加乌贼骨 30 克共研。
- [制用法] 研极细末，每服 5~10 克，日 3 次，凉开水送下。
- [适应证] 胃、十二指肠溃疡出血，呕血，便血等均可。
- [功 效] 土大黄凉血止血，白及收敛生肌止血，三七祛瘀止血。大黄通便之力较土大黄为强但止血之力亦较强，乌贼骨制酸收敛。本方止血而无留瘀之弊。
- [验 证] 靳××，男，35 岁。就诊日期：1976 年 9 月 15 日。患者上腹时感隐痛 3 年，诊为十二指肠球部溃疡，于 1 周前上腹隐痛，大便黑色，潜血试验（++++），系上消化道出血，乃予上方，服 3 天后大便转为黄色，潜血试验阴性。
- [备 注] 大便转为黄色，潜血试验阴性后须继续服药 3~4 天以巩固疗效。

5. 止血汤治十二指肠溃疡出血

- [方 剂] 煅乌贼骨 15 克研细冲服、白及粉 12 克冲服、地榆炭 15 克、仙鹤草 30 克、藕节炭 30 克。
- [加 减] 大便干燥加生大黄 6 克或土大黄 15 克均可，上腹疼者加痛痉散入汤剂中服之，每次 1 克，日 3 次。
- [制用法] 先将后三味煎 2 遍和匀，共约 200ml 左右，日 3 次分服。待药液稍凉时将乌贼骨粉 5 克、白及粉 4 克和入调匀服之。过热则药粉溶化后凝成胶状影响疗效。
- [功 效] 胃、十二指肠溃疡出血，呕血，便血等均可。乌贼骨粉、白及粉制酸收敛生肌止血；地榆炭、藕节炭凉血止血；仙鹤草收敛止血并有调补气血之功，故民间称为“脱力草”。数药合用有协同作用，可以增强止血效力。
- [验 证] 张××，男，45 岁。就诊日期：1970 年 10 月 15 日。患者有发作性上腹疼痛史、冬天发作较频，饥时为甚，进食后缓解，已延 5 年，曾先后呕血 2 次，X 线钡餐造影示胃小弯溃疡，近 1 周来上腹疼痛发作频繁，3 天前发生呕吐，吐物呈咖啡色，随之大便呈黑色，潜血试验++++，血色素 8 克，系胃溃疡出血，予上方服 1 天呕血即止，3 天后大便转为黄色，潜血试验

阴性。

[备注] 血止之后，仍须继续治疗溃疡病，以防复发。

二十一、呃 逆

呃逆，俗称“打嗝”。是指气逆上冲，喉间呃呃连声，声短而频，令人不能自制。有几分钟或半小时1次，亦有连续呃7~8声始停的。本症可由多种原因（如受凉、手术等）引起。中医将其分为实证和虚证。

1. 打呃食疗2方

[方 剂] 白糖1汤匙。

[制用法] 打呃时立即吃1汤匙白糖。持续打呃6周以上者，可重复使用此法数次。

[功 效] 止呃。对呃逆有较好疗效。

[验 证] 据《健康报》介绍，读者反映效果极佳。

[方 剂] 柠檬1个，酒适量。

[制用法] 将鲜柠檬浸在酒中，打呃时吃酒浸过的柠檬（但不能吃柠檬皮）。

[功 效] 同上。

[验 证] 《中国食品》1985年第2期介绍，美国纽约呼吸疾病协会的科学家用上述第一方，收到理想的成效，治愈率达66%。《新英格兰药物杂志》报道，采用第二方的治愈率达87%。

2. 大笑止呃逆

呃逆是以胃气逆而上冲，喉间呃呃连声，声短而频，不能自制为主症。呃逆轻者数声后自愈，重者有上几十声、百余声或更多而不止者，苦极难言。笔者常用令患者大笑之法治之，屡试屡验。

[制用法] 患者仰卧床上，排尽杂念，两脚自然伸直，两臂垂直，略贴身，周身肌肉松弛。然后令其大笑，轻者笑数声呃逆即止，重者笑以疾止为度。

[功 效] 治呃逆，效果极佳。

[验 证] 我以《四川中医》1984年第6期载之大笑止呃方法，治疗3例均效。病例：兰××，男，1985年9月30日诊。呃逆频作3天，曾服镇静药无效。乃嘱仰卧，以手刺激其腋下，引其大笑，约1分钟，呃逆即止。但次日又发，同法治之仍效。继给

芍药甘草汤合旋复代赭汤 2 剂，不再复发。笔者体会：呃逆轻者大笑可止，重者以配合药物治疗为佳。

3. 黑芝麻治呃逆

〔方 剂〕 黑芝麻、白砂糖。

〔制用法〕 炒熟、杵碎，拌入白砂糖，服食数匙。

〔功 效〕 滋养肝肾，润肠通便。

〔验 证〕 黄××，男，48岁，1982年1月2日诊。呃逆频作，呃声洪亮，无其他不适。曾以旋复代赭石汤、丁香柿蒂汤加减投之，并给予阿托品、安定等西药，呃逆依然，又用针灸治疗，仍不能控制。1月5日半夜，患者偶服黑芝麻数匙（炒熟，杵碎，拌入白砂糖），食后呃逆即止，安静入睡。次日中午，呃逆又作，又服黑芝麻数匙，食后呃止。第3天再次发作，按原地服黑芝麻，食后呃逆停止，非常灵验，此后未再发。

〔备 注〕 按黑芝麻能滋养肝肾，润肠通便。用之治呃逆，可能同“香能治呃”有关。因黑芝麻炒熟杵碎后，香味浓烈。

4. 灵仙降逆汤治呃逆

〔方 剂〕 威灵仙 15 克，丁香 6 克，柿蒂 20 个，制半夏 15 克，制川朴 15 克，生姜 15 克。

〔加 减〕 病久气虚者加党参 15 克。

〔制用法〕 煎 2 遍和匀，1 日 3 次分服。

〔功 效〕 威灵仙去腹内冷滞、心膈痰水，现代药理研究证实对平滑肌有松弛作用，有报导用以治疗各种原因所致的呃逆 60 例，疗效达 90%，故与柿蒂同用降逆止呃。半夏、厚朴化痰除满。丁香、生姜温中下气。

〔验 证〕 袁××，男，78岁。就诊日期：1983年10月12日。因发热入院，热解之后胸满不舒，呃逆频频，纳差乏力。舌苔薄白，脉弱。此中焦虚寒胃气上逆也。予本方 3 剂胸满呃逆均解，复诊又予 3 剂，诸证均除。

〔备 注〕 胃热者忌服。

5. 米醋止呃方治呃逆

〔方 剂〕 米醋。

〔制用法〕 呃逆发作时服米醋 10～20ml，一般可立即生效，止后复发再服

仍效。

[功效] 米醋味酸苦性温，酸主收敛功能散瘀解毒，下气消食。故中焦虚寒胃气上逆之呃逆用之甚佳。

[验证] 陈××，男，69岁。就诊日期：1975年8月15日。患者胃癌手术后5天，胃纳不振，吃流质饮食，食后胸闷气逆，频频呃逆。舌苔薄白，脉弱。乃术后胃气上逆所致。予米醋15ml频服之，服后呃逆立止。半天后又有呃逆，仍予米醋15ml，服之又止。

[备注] 如肝火犯胃，嘈杂泛酸者忌之。

6. 二香膏治呃逆

[方剂] 丁香、沉香、吴茱萸各15克，生姜汁、葱汁各5毫升。

[制用法] 先将前3味药共研细末，加入姜汁，葱汁调匀如软膏状，装瓶备用。用时取药膏适量，敷于脐孔上，外以纱布覆盖，胶布固定。每日换药1次。

[功效] 温胃散寒，降逆止呃。

[验证] 屡用屡验，效佳。

[备注] 引自《中医外治法奇方妙药》。

7. 赭沉散治呃逆

[方剂] 生赭石30克，沉香、法半夏各15克。

[制用法] 上药共研细末，装瓶备用。用时取药末20克，以生姜汁调匀成膏，贴敷中脘，肚脐上，外以纱布盖上，胶布固定。每日换药1次。

[功效] 降逆止呃。

[验证] 治疗100例，有效率达98%。

[备注] 笔者经验方。

二十二、消化不良

消化不良是指具有上腹痛、腹胀、早饱、嗝气、食欲不振、恶心、呕吐等上腹不适症状，多属于功能性。

1. 苹果汤润肠胃

[方剂] 苹果，瘦猪肉。

- [制用法]** 苹果 2 个切块，用两碗水先煮，水沸后加入猪肉 200 克（切片），直煮至猪肉熟透，调味服食，久食有益。
- [功效]** 生津止渴，润肠健胃。治疗肠胃不适及消化不良。
- [验证]** 钱××，男，76 岁，常食用上方，肠胃通便。
- [备注]** 《滇南本草》云：“苹果熬膏名‘玉容丹’，通五脏六腑，走十二经络，调营卫而通神明，解温疫而止寒热。”《食疗本草》云：“苹果补中焦诸不足气，和脾；卒患食后气不通。”

2. 凉拌蔓菁下气开胃

- [方剂]** 蔓菁 200 克，酱油、醋适量。
- [制用法]** 将蔓菁洗净切成细丝，放入开水锅内焯熟，沥干水气，倒入碗内下调料拌食。
- [功效]** 《随息居饮食谱》载：“腌食咸甘，下气开胃，析醒消食，荤素皆宜，肥嫩者胜，诸病无忌。”
- [备注]** 蔓菁是十字花科植物，也叫芜菁、圆根、扁萝卜。拌蔓菁这道菜，在《西厢记》中有载：老夫人请张生吃饭，张生问：为什么请我？”红娘唱答：“淘下陈仓米数升，炸下七八碗蔓菁。”这里的“炸”是指水炸，即用水焯熟拌吃。
- [验证]** 据《家庭医生》杂志社介绍，读者来信反映用该法疗效甚佳。

3. 胡萝卜炖羊肉补益脾胃

- [方剂]** 胡萝卜 6 个，羊肉 250 克，盐少许。
- [制用法]** 炖熟食，后加盐。
- [功效]** 健脾，养胃，温肾。用于畏寒喜暖、消化不良、腹部隐痛、阳痿、口淡无味、小便频数之脾胃虚寒、脾肾阳虚患者，有较好的疗效。
- [验证]** 《健康报》推荐该方，读者多次反映甚好。

4. 茶膏糖治消化不良

- [方剂]** 红茶 50 克，白砂糖 500 克。
- [制用法]** 红茶加水煎煮。每 20 分钟取煎液 1 次，加水再煎，共取煎液 4 次。合并煎液，再以小火煎煮浓缩，至煎液较浓时，加白砂糖调匀。再煎熬至用铲挑起呈丝状，到粘手时停火，趁热倒在表面涂过食油的大搪瓷盆中，待稍冷，将糖分割成块即可。每饭后含食 1~2 块。

〔功效〕 清神，化食。用治消化不良、膨闷胀饱、胃痛不适等。

〔验证〕 用上方治疗 58 例，痊愈 50 例，8 例好转。

5. 橘枣饮治消化不良

〔方剂〕 橘皮 10 克（干品 3 克），大枣 10 枚。

〔制用法〕 先将红枣用锅炒焦，然后同橘皮放于杯中，以沸水冲沏约 10 分钟后可饮。

〔功效〕 调中，醒胃。饭前饮可治食欲不振，饭后饮可治消化不良。

〔验证〕 据《老年报》介绍该方效果良好。

6. 山楂丸开胃助消化

〔方剂〕 山楂（山里红）、怀山药各 250 克，白糖 100 克。

〔制用法〕 山药、山楂晒干研末，与白糖混合，炼蜜为丸，每丸重 15 克。每日 3 次，温开水送服。

〔功效〕 补中，化积。用治脾胃虚弱所致的消化不良。

〔验证〕 众多的患者反映此方效果极佳。

7. 鸡肫皮治消化不良

〔方剂〕 鸡肫皮（鸡内金）若干。

〔制用法〕 将鸡肫皮晒干，捣碎，研末过筛。饭前 1 小时服 3 克，每日 2 次。

〔功效〕 消积化滞。治消化不良、积聚痞胀等。

〔验证〕 牛×，男，28 岁，患消化不良症，介绍用上方，治愈。

二十三、肠 炎

肠炎是指各种病因所致肠粘膜的炎性病变。可分为急性和慢性两大类。以前者为多见。慢性肠炎系指不同病因所引起的慢性肠粘膜炎性病变。发病率随年龄增长，50 岁以上者的发病率可达 50%。

1. 归芍莱菔汤治肠道疾病

〔方剂〕 当归 120 克，白芍 60 克，甘草、槟榔、枳壳、车前子各 10 克，莱菔子 30 克。

〔制用法〕 水煎服。

〔功效〕 养阴清热，健脾利湿，疏肝理气，行血止痛。

〔验证〕 病例一：王×，男，34 岁，农民，1980 年 8 月 5 日初诊。患泄

泻下痢4载，每于夏秋反复，经治疗无效。表现：下痢糊状大便，味腐臭，时呈红棕色豆瓣酱状，挟带少量脓血，里急后重，日夜两行，脐周及左下腹钝痛，舌红、苔淡黄，脉沉细滑。大便镜检红细胞（+++），脓细胞（++），发现阿米巴滋养体。方予归芍莱菔汤加马齿苋30克，并配用鸦胆子3克，用桂元肉包裹成胶囊状，用上药液送服。9剂诸恙皆除。再以原法配香砂六君子丸调理而愈。随访至今9年，无复发，多次检查大便常规均正常。病例二：黄×，女，32岁，工人，1979年6月2日初诊，自诉于1976年5月初，因误食不洁之物而致腹痛，里急后重，大便带有红白粘冻，日间3、4次，肛周及外阴俱痒，屡用消炎、杀菌、解毒等法治3年，疗效不佳，病情无明显好转。大便多次化验霉菌阳性。表现：形体消瘦，头晕目眩，口干晨苦，舌苔白，脉沉细弦。拟归芍莱菔汤加黄连、荆芥、艾叶炭、贯众各10克，连服23剂，腹痛已止，余症皆轻。药已显效，乘势驱疴，续进上方1剂，症消病愈。随访至今未复发。

〔备注〕 临床上根据疾病的情况，可随证加减，该方对慢性阿米巴痢疾、霉菌性肠炎、肠管硬化症、血吸虫病并直肠炎、慢性非特异性溃疡性结肠炎、滴虫性肠炎等均有较明显的治疗效果。

2. 苦参液灌肠治慢性结肠炎

〔方剂〕 苦参30克。

〔制用法〕 将苦参加水500毫升，文火煎至80~100毫升，每晚临睡前保留灌肠。据直肠镜检病变部位的深浅而定灌肠时的深浅，如部位较高时，灌完后把臀部抬高些，以便药液充分流入。灌完睡觉，防止药液流出，第2天排便。灌肠期间忌食生冷、辛辣、油腻食物。7天为1疗程，休息2天再做第2疗程。

〔疗效〕 笔者用此法治10例慢性结肠炎。3~4个疗程痊愈者6例；大便次数减少，粘液减，腹痛消失3例；1例因未忌口，饮食不当引起复发。

〔验证〕 潘××，女，38岁，农民，患慢性结肠炎8年之久，常昼夜腹泻、腹痛，尤以夜间为甚，不论春夏秋冬，患者痛苦难忍，并明显消瘦、乏力、面色萎黄，服中西药乏效。后喜得此方，如法应用，连用2疗程，竟腹不痛，大便成形而愈。

3. 止泻散治肠炎

[方 剂] 白胡椒6粒，炮干姜、炒雄黄粉、肉桂、吴茱萸各1克。

[制用法] 上药共研细末，备用。将脱脂药棉蘸上药粉、敷贴于脐孔上，外以纱布盖上，胶布固定。每日换药1次。

[功 效] 温中、散寒、止泻。

[验 证] 效果很好，一般上午填药，下午能止泻。

[备 注] 引自《外治汇要》。又用葱、姜、黄丹各适量，捣烂如泥，敷于脐孔上，日1或2次，适用3或4次。用治各种泄泻，效果亦佳。

4. 二香散治肠炎

[方 剂] 丁香、木香、肉桂、吴茱萸、薄荷各等份。

[制用法] 上药共研细末，密封备用。用时取上药末10克，以生姜汁及酒调成糊状，炒热后，分敷于穴位上（取天枢、足三里，脾俞、中脘、命门、关元。每次选两个穴位。急性腹泻以天枢，足三里为主穴；慢性腹泻取脾俞，中脘为主穴；肾虚腹泻取命门、关元为主穴。腹泻伴恶心、呕吐者配内关穴。水泻较重者配阴陵泉穴），外以纱布盖上，胶布固定。每天换药1次。

[功 效] 散寒、理气、止泻。

[验 证] 屡用效佳，一般用药1~3次即止。

5. 野菊花灌汤剂治肠炎

[方 剂] 野菊花10~30克

[加 减] 如大便带脓血者加茶叶（绿茶）5~15克同煎。

[制用法] 煎汤去渣，煎液100~300ml，待温至38~40℃，排空大便，插入橡皮导管约20cm左右，保留灌肠，每晚睡前一次，最好能保留4小时以上，连灌2周为一个疗程。

[功 效] 慢性肠炎、肠功能紊乱之湿热留恋者、证见慢性腹泻经久不愈、腹痛、大便带粘液者。

[验 证] 陆××，男，60岁。就诊日期：1975年3月10日。患者腹痛腹泻，时发时止，已5~6年，曾住院检查诊为慢性肠炎。近来加重大便带粘液，1日4~5次。服黄连素无效，予上方灌肠治疗，一个疗程后腹痛缓解，大便成形、每日一次，粘液消失而愈。

[备 注] 野菊花清热解毒，茶味收敛止泻。脾肾两虚之五更泄泻疗效不佳。

二十四、腹 泻

腹泻，俗称“拉肚子”，多由肠道疾患引起。中医称之为“泄泻”。分急、慢性两种。急性者系指急起发病、历时短暂的排便次数频繁，粪便稀薄，或含有脓血黏液的腹泻；慢性者则是指大便次数增多，大便不成形，稀薄或有脓、血、黏液相杂，间歇或持续历时2个月以上。

1. 野鸡肉馅馄饨治泄泻

[方 剂] 野鸡肉、葱、姜、花椒粉、盐、面粉各适量，怀山药50克。

[制用法] 野鸡肉剁成肉泥，放入葱姜末、花椒粉及盐，搅拌均匀，成馄饨馅。面粉加水调和面擀成馄饨皮，包馅备用。锅内水中加怀山药煮沸5~10分钟，下馄饨煮熟。食用。

[功 效] 补益脾胃。治疗脾胃气虚而致的泄泻。

[验 证] 赵××，男，13岁，患腹泻，用上方痊愈。

[备 注] 不宜与核桃、木耳同食。

2. 焦米粥益脾胃止泄泻

[方 剂] 白粳米100克。

[制用法] 将米炒焦，加水煮作粥。可任意食用。

[功 效] 用治脾虚泄泻，水泻或稀便日达数次且不思饮食。

[验 证] 据《家庭医学》杂志推荐该方，读者反映效果理想。

[备 注] 白粳米饭锅粑（焦饭）再炒成炭，研细，每服5克，温水送服，亦有上述功效。

3. 焦黄米糕消宿食止腹泻

[方 剂] 黄米。

[制用法] 将黄米碾成面，按常法蒸成黄米糕，晾凉，切成一指厚的薄片，放在将尽的灰火中煨焦黄，取出研面。每日2次，每次15克，开水送下，连服2~3日有效。

[功 效] 对肠胃功能薄弱、饮食稍有不当即致腹痛作泻的患者有较好的疗效。

[验 证] 焦×，男，32岁，患腹泻用上方，泻止。

[备 注] 消化不良者应少食黄米糕或以不食为佳。因为糕性粘腻，难于消化，多吃可致腹泻。这是多食则泻，少食则补的功效。

4. 烤馒头治胃酸腹泻

[方 剂] 馒头 1 个。

[制用法] 将馒头置于烤架上，放在炉上慢烤，烤至焦黄色，只吃馒头的焦外皮。早晚各吃 1 次。

[功 效] 用治胃酸多、消化不良的腹泻。其道理和某些胃肠道疾病患者服用活性炭相同。

[验 证] 《家庭保健》杂志介绍疗效理想。

5. 莱菔山楂粥治急性腹泻

[方 剂] 莱菔子 15 克，山楂 20 克，生姜 3 片，红糖 15 克，大米 250 克。

[制用法] 先将莱菔子、山楂、姜片加水适量煎煮 40 分钟，去渣取其汁液，放入淘洗净的大米煮作粥，临熟时下红糖调味。1 天内分 3 次服下，可连服 5 天。

[功 效] 用治因饮食不节所致的急性腹泻。

[验 证] 王×，男 33 岁，患急性腹泻，用上方治愈。

6. 山药大枣粥治慢性腹泻

[方 剂] 山药 30 克，大枣 10 枚，薏苡仁 20 克，糯米 30 克，干姜 3 片，红糖 15 克。

[制用法] 按常法共同作粥。每日分 3 次服下，连续服用半月至愈。

[功 效] 补益脾胃。用治脾胃虚弱引起的慢性腹泻，症见久泻不愈、时发时止、大便溏稀、四肢乏力。

[验 证] 张××，男，35 岁，患病多年不愈经服上方好转，坚持治疗后痊愈。

7. 秫米枣丸治腹痛腹泻

[方 剂] 红高粱米 120 克，黑豆 60 克，大枣 30 克，神曲 40 克。

[制用法] 大枣煮熟去核，其他三味研成细粉，加适量枣与汤调和，捏成饼，蒸熟，焙干，轧成细粉，置砂锅内炒成黄黑色，用蜂蜜少许调捏成丸，每丸 8 克。晚饭后服 4 丸，白水送下。

[功 效] 红高粱味甘涩，温中，燥湿，收敛；黑豆除热下瘀，解毒止痛；大枣健脾和胃，止泻安神；神曲则有健脾进食之功。四味配伍对治疗腹痛腹泻或胃气不和刺痛吐酸有较好疗效。

[验 证] 赵×，男，36岁，患腹泻，并带有腹痛感，先用西药治未愈，后用上方，症退。

8. 炮姜粥治腹泻

[方 剂] 炮姜6克，白术15克，花椒和大料少许，糯米30克。

[制用法] 上述前四位共装在纱布包里，先煮20分钟，然后下糯米煮作粥。每日分3次服食，连服1~2周。

[功 效] 用于因受寒湿而引致的腹泻，症见大便清稀如水、脘腹胀满、四肢无力。

[验 证] 《老年报》介绍，效果极佳。

二十五、痢 疾

痢疾是指以腹痛、里急后重、泻下赤白粘冻为特征的一种疾病。它是由于感受外邪和饮食内伤，大肠气血壅滞，血络损伤，传导功能失司所致。常用于临床治疗的有效偏方、验方主要如下。

1. 大蒜治痢疾肠炎

[方 剂] 大蒜1头，白糖20克。

[制用法] 大蒜去皮切细末，用白糖拌和。每日早晚各1次，饭前吞服，连用7~10天。

[功 效] 杀菌解毒。

[验 证] 伍××，女，16岁，患痢疾，用上方不久即痊愈。

[备 注] 如系菌痢，同时用大蒜液灌肠则效果更佳。

2. 苋菜拌蒜泥驱菌止痢

[方 剂] 苋菜100克，大蒜1头，香油少许。

[制用法] 将苋菜洗净切段备用，大蒜去皮捣烂，铁锅倒入油后立即将苋菜放入，而后置于旺火上炒熟，撒上蒜泥。

[功 效] “养精益气补血，食之肥健，嗜食。”（见《神农本草经》）因此经常食用苋菜能增强身体素质。对细菌性痢疾有辅助疗效。

[验 证] 刘××，女，15岁，患菌痢，用上方，即愈。

[备 注] 苋菜入夏上市，不但价廉，而且营养丰富。此菜不宜久炒过熟，以免养分受到破坏，影响疗效，如直接取苋菜汁，疗效更为理想。

3. 田螺清热利湿止痢

[方 剂] 田螺。

[制用法] 取田螺挑出螺肉，晒干，炒焦，水煎。日服3次，每次15克。

[功 效] 清热解毒。用治菌痢。

[验 证] 据《常见药用食物》介绍，某女，10岁，排脓性大便，里急后重伴腹痛，用此方3次即愈。

4. 葡萄汁红糖治赤痢

[方 剂] 鲜葡萄250克，红糖适量。

[制用法] 将葡萄洗净，绞取汁，放入红糖调匀。顿服，数次即愈。

[功 效] 消炎止痢。治赤痢疾。

[验 证] 据《食物疗法精萃》介绍，某人患血痢日夜十余次，里急后重，身有微热，食欲不振，服用此方1剂而愈。

5. 红枣汤治久痢不止

[方 剂] 红糖60克，红枣5枚。

[制用法] 煎汤服。

[功 效] 治痢有神效。

[验 证] 刘××，小儿，证见痢下赤白，红少白多，血色不鲜，伴有乳白色粘液，饮食如常，睡时露睛，舌苔白。曾处以理中合芍药汤加减治疗，效不佳。其父与一单方：红糖60克，红枣5枚，煎汤服。连服2次而痢下赤白自止。

[备 注] 本方健脾温中，大建中气，并有活血之功。用此方治久痢不止的虚寒痢甚效。

6. 燮理汤加鸦胆子治热痢

[方 剂] 生山药25克，白芍18克，银花15克，牛蒡子（炒捣）、甘草各6克，黄连、肉桂各1.5克。

[制用法] 1. 热痢下重数天者可煎服此汤，另加鸦胆子（去壳）40~80（去壳时仁破者不用），用温开水分两次囫囵吞服。通常服1~2剂，大便即由赤转白，腹痛、里急后重也可大大减轻或消失。
2. 如属热痢下重已久，或迁延失治，造成肠粘膜严重损害，所下之痢色紫腥臭，杂以脂膜，则宜加三七粉9克，温开水分两次吞服。多能止住脓血。

[验 证] 本汤出自《医学衷中参西录》，为治热痢下重的良方。用此方

临床治疗 90 例，痊愈 82 例（脓血便停止，腹痛、里急后重消失，大便形状恢复正常），好转 5 例（脓血便减少，腹痛、里急后重减轻），无效 3 例（各症均无改善）。

7. 二菜秦皮汤疗下痢

[方 剂] 委陵菜、铁苋菜、秦皮各 30 克。

[加 减] 发热、大便脓血较多、苔黄腻、脉数者加黄连 10 克。

[制用法] 每天 1 剂煎 2 遍和匀，日 3 次分服。

[功 效] 急慢性细菌性痢疾，下痢大便带脓血；粘液，里急后重者。委陵菜清热解毒，凉血止血，有抗菌治痢的作用；铁苋菜消炎收敛，有保护肠粘膜的作用；秦皮清热燥湿“主热痢下重”，现代研究对痢疾杆菌有强大抗菌作用。三药合用相辅相成，方简而效宏，为热毒下痢（菌痢）之良方。

[验 证] 刘××，男，25 岁。就诊日期：1980 年 6 月 15 日。患者病起 2 日，下痢脓血便日 5~6 次，每次量不多，腹痛里急后重，低热 38℃，舌红苔黄腻、脉滑数，左下腹明显压痛，大便镜检每视野白细胞 10 个/高倍，诊为热毒痢（菌痢），予本方治疗，连服 3 剂后热退痢减，每天大便 1~2 次无脓血，诸症均减，苔薄白，脉弦滑，大便常规阴性，再予原方 3 剂以净余焰。

[备 注] 症状消除大便正常后须继续再服 3 剂，以求彻底治愈。

8. 马齿苋汤疗下痢

[方 剂] 马齿苋每次 30~60 克（鲜的加倍）。

[加 减] 如发热较重加黄连 10 克同煎。

[制用法] 煎服每日 3 次。

[适应证] 急慢性细菌性痢疾，下痢大便带脓血粘液，里急后重者。

[功 效] 马齿苋味酸性寒、清热解毒、凉血止血，主治热痢便脓血，疗效可靠为菌痢之良药。现代药理研究，水煎剂对志贺氏、宋内氏、斯氏及费氏痢疾杆菌均有抑制作用。

[验 证] 王××，男，35 岁。就诊日期：1959 年 8 月 15 日。患者昨日起发热 38.5℃，腹痛下痢脓血便，日 7~8 次，里急后重，舌苔黄腻、脉沉而数。证属热毒痢。予本方服 2 天后热解，下痢次数减为日 2~3 次，服 4 天后大便成形，无粘液，日 1 次。连服 1 周痊愈。

[备 注] 症状消除大便正常后须继续再服 3 剂，以求彻底治愈。

二十六、便秘

便秘指大便干结、排出困难、排便间隔时间延长，通常两三天不大便，或有便意，但排便困难者。本病发生原因常有燥热内结、气虚传送无力、或阴虚血少等。临床常用的有效的偏方主要如下。

1. 黑芝麻治便秘

〔方 剂〕 黑芝麻 500 克，糯米 250 克。

〔制用法〕 先将黑芝麻炒熟，糯米炒至黄色，混合研成粉末。然后对药粉 1 汤匙，加白蜜半汤匙，于空腹时用开水冲服。每天 1 次，连服 1 月。

〔功 效〕 用于大便燥结（习惯性便秘）、产后及热性病后期便秘，一般坚持服用 1 月可愈。

〔验 证〕 笔者验证于临床，经治 7 例，确有实效，兹附典型病例如下。病例：李××，男，52 岁，1990 年 9 月 4 日就诊。主诉：大便干燥，难以解出 2 年余，屡服中西药效果不佳。证见面色苍白，眩晕心悸，舌淡苔白，脉细。即用贵刊介绍便秘验方治之，服用 20 天，大便正常，症状消失。

〔备 注〕 引自《新中医》。

2. 达原饮加味治疗便秘

〔方 剂〕 厚朴 8 克，槟榔 10 克，草果 6 克，知母、黄芩各 12 克，白芍、玄参、石斛各 15 克，甘草 5 克，桑椹、花粉、麦冬各 20 克。

〔制用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功 效〕 用该方治疗大便秘结一年以上者 31 例，均获痊愈。并经一年后随访，均未复发。

〔验 证〕 齐××，女，36 岁，1985 年 9 月来诊。自述于 1984 年 7 月起，大便干燥，需三四天才能大便一次。每当临厕，虽然用力排便，但觉干硬难下，实为痛苦。曾多方求治，其病仍不得解。现已六天未大便，故来就诊，就诊时，其脉弦且微数，舌苔黄腻，面色少华，口干。此证属外邪留于膜原所致。遂投上方 16 剂后，每天傍晚大便一次，呈条状软便。一年后随访，未曾复发。

3. 升润法治疗虚证便秘

[方 剂] 黄芪、当归、炙甘草各 20 克，升麻、防风各 10 克。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂。

[功 效] 升阳润燥，补气益血。

[验 证] 以本方治虚证便秘 32 例，显效 20 例（大便畅通，每日自动排便一次，2 月以上未复发）；好转 11 例（大便畅通，每日或 2 日自动排便 1 次，2 月未复发者）；无效 1 例（治疗中自改他法治疗）。马 × ×，男，72 岁，1983 年 11 月 20 日就诊。患便秘多年，大便 5~6 天一行，便秘甚时需服麻仁丸。近 7 天来又不大便，腹微胀，服麻仁丸罔效，故前来就医。证见咳嗽喘气，纳呆，口干欲饮不多，神疲乏力语音低微，面色不华，形体消瘦，肌肤甲错，舌偏红，苔薄少津，脉虚细。治用增液汤加味，服 2 剂后病情不减，大便 9 天未行，伴烦躁寡言。又用急则治其标之法，于上方加厚朴、大黄。服 1 剂，腑气未通，大便仍未行，精神极差。自诉虽有便意，但临厕努挣乏力，挣出汗出短气而喘。细辨此证非热结大肠，亦非单纯津枯肠燥，实属脾气不升，推动无力，并津枯肠燥。法当升举阳气，养血润燥，处予基本方 1 剂，药后次日解出棉条状软便 1 次。守方 3 剂，大便自调，日行 1 次，纳增，精神转佳。再服 3 剂以巩固疗效，并嘱饮食调养，追访 2 年未复发。

[备 注] 气虚甚者重用黄芪或加太子参；血虚甚者重用当归或加熟地、首乌；若兼虚火上炎者可加肉桂引火归源。

4. 香蕉蘸黑芝麻治大便秘结

[方 剂] 香蕉 500 克，黑芝麻 25 克。

[制用法] 用香蕉蘸炒半生的黑芝麻嚼吃。每天分 3 次吃完。

[功 效] 润肠通便。

[验 证] 据《医学之窗》杂志介绍该方效果甚好。

[备 注] 患有高血压病的人，可经常吃。

5. 马铃薯汁治便秘

[方 剂] 马铃薯。

[制用法] 将马铃薯洗净，在搅肉机中挤压，将液汁用纱布滤过。每早空腹及午饭前各服半玻璃杯。

- [功效]** 和中养胃，利湿解毒。用治便秘。
- [验证]** 据《中级医刊》1954年第1期介绍，用上法曾治疗84例长期便秘，其中74例为胃溃疡及十二指肠溃疡，5例为慢性肠炎，4例为慢性胆囊炎，1例痔疮，全部获愈。大部分在服用2~4天内见效，个别服用20天才有效。
- [备注]** 发芽的马铃薯禁忌食用，因为芽眼附近含龙葵精，这是一种有毒物质，吃后轻者泻痢，重者发生恶心呕吐，甚至麻痹痉厥，应特别注意。

6. 生花生仁治便秘

- [方剂]** 生花生仁30克（1次量）。
- [制用法]** 空腹咀嚼生吃，早晚各1次。忌食辛辣及饮酒。
- [功效]** 润肠通便。用治大便干燥费力，大便间隔时间延长的习惯性便秘。
- [验证]** 据山东济宁市第一人民医院苗××介绍，服用此方大多在第2~3天大便开始变软易解，以后坚持长期服用，并根据大便质地适当增减原用量，以不稀薄为度。临床治疗获满意疗效。
- [备注]** 气虚甚者重用黄芪或加太子参；血虚甚者重用当归或加熟地、首乌；若兼虚火上炎者可加肉桂引火归源。

根据大便质地适当增减原用量，以不稀薄为度。临床治疗获满意疗效。

7. 猪肚苡米汤以补为通

- [方剂]** 猪肚、苡米各适量。
- [制用法]** 分别煮烂，当主食吃。
- [功效]** 补虚劳，益血脉，利肠胃。用治大病后空存皮骨、大便燥结。
- [验证]** 据《中国新医药》1955年5期介绍：“一妇女30许，大病新愈，空存皮骨，不能转侧，奄奄一息，大便极度困难。医生惟恐一放润滑剂，元气随脱而止，诸医束手，不敢下药。一老医出一方，以补为通，乃定一猪肚苡米汤：猪肚一具，苡米五合，分煮极烂。初服撇去浮油，专以此为食物，诸症一一见效，不月而愈。”

8. 益气润肠汤治习惯性便秘

- [方剂]** 炙黄芪15克，潞党参15克，炒白术30克，当归15克，熟地

30克，升麻6克，炒枳壳6克，柏子仁10克，郁李仁6克，肉苁蓉10克，桔梗10克，火麻仁10克，桃仁10克，杏仁10克，松子仁10克，橘红6克，沉香3克，天花粉10克。

【制用法】 每日1剂，水煎3次分3次服。1个月为1个疗程。亦可制丸服。

【功效】 益气助运，生津润肠。

【验证】 邱某某，男，78岁，市民。反复发作便秘、腹胀5年余，用中西药物时，吃药后仅缓解一时，过后症状如故。食后腹胀甚，微咳气喘，无烟酒嗜好，有时便次间隔5~7天，粪质硬结，艰涩不爽，常因此不敢多进食。形瘦面悴，脉细涩，苔薄白，舌淡红而质瘦，X线胸片示肺纹理增粗，两肺稍有透亮度，肛检一期子痔，余未见明显异常。诊为习惯性便秘伴“慢支”及轻度肺气肿。证属肺脾气虚，津亏肠燥。方用益气润肠汤：炙黄芪、潞党参、当归各15克，炒白术、熟地各30克，升麻、炒枳壳、郁李仁、橘红各6克，柏子仁、肉苁蓉、桔梗、火麻仁、桃仁、杏仁、松子仁、天花粉各10克，沉香3克。上方连服30剂，腹胀已除，大便每隔3~4天一次，质软，再以前方制丸续服3个月以巩固疗效。2年后追访，便秘基本未复发。

9. 贴敷方治便秘

【方剂】 ①甘遂3克。②巴豆1克，肉桂1克，吴茱萸3克。

【制用法】 上2方均为细末，备用（均为1次量）。均用生姜汁调敷。方①敷支沟、天枢穴上，方②炒热敷足三里，神阙穴上。上方均可用艾卷隔药悬灸。

【功效】 ①泻通。②温通。

【验证】 一般药后6~24小时气通排便。效佳。

【备注】 引自《外治汇要》

10. 通便药条治便秘

【方剂】 牙皂末、蜂蜜各6克，麝香0.3克。

【制用法】 上药和匀为药条如手指状，备用。用时取药条插入肛门内。

【功效】 通便。

【验证】 一般药后5分钟即通，效捷。

【备注】 引自1988年《医学文选》(1)中祖传秘方验方集。

11. 大戟红枣膏治便秘

[方 剂] 大戟 1.5 克 (研末)、红枣肉 5~10 个。

[制用法] 将上药捣如膏状，备用。用时取上药膏贴敷神阙穴，外用纱布包扎固定。

[功 效] 补中通便。

[验 证] 一般 1 次，最多 2 次即通。

[备 注] 引自《理渝骈文》。

12. 大黄膏治便秘

[方 剂] 大黄适量。

[制用法] 研为细末，备用。用时取药粉 10 克，以酒调成软膏状，敷于脐部，外以纱布盖上，胶布固定。再用热水袋在膏上热敷 10 分钟。每日换药 1 次。

[功 效] 泻下通便。

[验 证] 据报道：治疗小儿便秘 30 例，病程 1 周以上，用药 1~3 天，治愈 28 例，另 2 例症状也有所改善。

[备 注] 民间方。临床验证，用治热秘，效果亦佳。

二十七、肝炎、肝脾肿大

肝炎分慢性肝炎和急性肝炎，属祖国医学的“黄疸”，“湿阻”，“胁痛”，“虚证”和“症积”等病范畴。在临床上较为常见，且病程缠绵，根治颇难。病由实致虚，终成肝郁脾虚，肝肾不足，脉络瘀阻等虚实夹杂的病理表现，肝压作痛，头昏乏力，面色少华，肝肿大，口苦肋胀，胃脘腹胀满，或纳谷不香，或形体消瘦，或便溏，或睡眠不佳、肝功能异常等。

1. 泥鳅治疗急慢性肝炎

[方 剂] 泥鳅若干条。

[制用法] 泥鳅放烘箱内烘干（温度以 100℃ 为宜），达到可捏碎为度，取出研粉。每次服 15 克，每日 3 次，饭后服。小儿酌减。

[疗 效] 用治急性或亚急性、迁延性肝炎。

[验 证] 据《食物中药与便方》介绍，辽宁省盖城县医院用此方治疗传染性肝炎 35 例，其中黄疸型 32 例，病程最长者达 7 个月，通过 12~16 天的治疗，痊愈 33 例，明显好转 2 例。

2. 白丁香治黄疸

[方 剂] 白丁香（即雄雀屎）。

[制用法] 温开水化服之。

[功 效] 清热解毒。

[验 证] 据《食物疗法精萃》介绍，雄雀屎一名白丁香，一端细尖，一端圆尖，雌雀屎两端均圆。雄雀屎性苦温有小毒，治目痛。陈藏器说：“急黄欲死者，汤化肠之立苏。”余以本品治疗黄疸颇有效验。

3. 南瓜治肝炎疗效惊人

[方 剂] 南瓜粉适量。

[制用法] 将南瓜蒂去掉，以手工或机械将南瓜粉碎成稀浆，用 100 目的网过滤，待滤液自然沉淀后，次日倾尽清水，取出晒干，并压碎成粉备用。每日冲食数次，可经久食用。

[功 效] 治慢性肝炎、肝硬化、肾炎及糖尿病，有惊人的疗效。

[验 证] 经化学成分分析，南瓜含脂肪，蛋白质，维生素 B、C，葫芦巴碱，腺嘌呤，精氨酸，天门冬素，胡萝卜素，葡萄糖，蔗糖，多缩戊糖及南瓜氨基酸等多种元素，对预防和治疗上述疾病的作用，已被公认。

4. 甜瓜蒂保肝退黄治肝炎

[方 剂] 甜瓜蒂适量。

[制用法] 将瓜蒂置于烘干箱内烘干，研成细末，取 0.1 克分成 6 份。先以 2 份从两个鼻孔深深吸入，约 40 分钟后，清洁鼻腔再吸 2 份，再隔 40 分钟又吸 2 份，前后共吸 3 次，将 0.1 克吸完。间隔 7 日后再用同样方法吸 0.1 克，吸完 0.4 克为一疗程。慢性肝炎一般两个疗程即可，肝硬化则需三至五个疗程。吸药后从鼻腔流出大量黄水，每天可达 1000 毫升。吸药时，患者头须向前俯，使黄水滴入碗内，切勿吞咽，以免引起腹泻。有时会出现头痛、畏寒发热，类似感冒症状，或肝脾区疼痛增加，约 1 天左右即可自然消失。

[功 效] 用于黄疸或无黄疸型肝炎、肝硬化。

[验 证] 据沈阳部队后勤部卫生部编《新医疗法手册》介绍，此方经某部医院治疗 130 例。在住院病人 15 例中，有 8 例痊愈，7 例好

转。门诊 115 例，一般反应良好。

5. 猪油治肝脏肿大

[方 剂] 猪板油 90 克。

[制用法] 将猪板油溶化晾凉。1 次饮服。

[功 效] 用于黄疸型肝炎之肝脏肿大。

[验 证] 据《江苏中医》介绍，某女患此症，令服猪油后，大便泻数次，肝肿即消，肋下亦不痛，隔数日黄亦退，后未再发。

6. 三草煎剂治疗急性病毒性肝炎

[方 剂] 白花蛇舌草 30 克，金钱草 20 克，益母草 10 克。

[制用法] 上药加水 600 毫升，浓煎去渣取汁 400 毫升，加糖适量，每天 3 次，每次服 100 毫升，连服 2 周为一疗程。儿童剂量减半。

[功 效] 清热解毒，利疸退黄，散结消肿。

[验 证] 共治 93 例，治疗 1 个疗程后检查，治愈 90 例，显效 3 例，总有效率达 100%。3 年后，笔者随机对其中的 71 例作了追访，未发现慢性或迁延性肝炎病变及其他肝外损害，肝功能多次复查未见异常。

7. 益肾清解汤治慢性乙型肝炎

[方 剂] 巴戟、肉苁蓉、制首乌各 20 克，仙灵脾、菟丝子、丹参、黄芪、白芍、黄柏各 15 克，虎杖、旱莲草各 30 克，晚蚕砂，郁金各 10 克。

[制用法] 水煎服，每天 1 剂。

[疗 效] 据医学杂志介绍用此法治疗 6 例乙肝病人，疗效很好。

[验 证] 彭××，男，60 岁，农民。不思食，恶闻油气，口渴，喜浓茶，心烦，腹胀，小便黄，精神不振，面色萎黄、暗滞，形瘦，经多方治疗，未能控制症状。后来采用“益肾清解汤”，服药 30 剂，上述症状消失，面色转华，形体转胖，精神佳，食量大增，小便清，能参加正常体力劳动，经多方化验为阴性，一切如平人。

8. 五子汤治疗慢性肝炎

[方 剂] 川楝子 18 克，女贞子 20 克，枸杞子 15 克，菟丝子 12 克，蛇床子 12 克

[制用法] 水煎服，每天 1 剂，30 天为 1 疗程。

[疗 效] 用本方法治疗慢性肝炎 20 例，降酶效果好。谷丙转氨酶降至正常的天数短于水飞蓟（德国）和甘草甜素（日本），而且不像联苯双酯易反跳。

[验 证] 范某，男，18 岁，近 10 个月来自觉全身乏力、食欲欠佳，小便微黄；6 个月前作肝功能检查：黄疸指数 10 单位、锌浊 14 单位、麀浊 8 单位、麀絮（++）、谷丙转氨酶 200 单位以上。经用肝泰乐、维生素 C、齐墩果酸、联苯双酯和间断服中药半年，疗效欠佳，特求余诊治。查舌质黯红、边有瘀点、舌苔少，脉细涩。复查肝功能：黄疸指数 8 单位，其它同上；B 超提示：肝光点增粗，脾厚 4.5 厘米，门静脉 1.5 厘米。临床诊断：慢性活动性肝炎。中医证属：肝肾阴亏，肝郁血瘀，投五子汤加郁金、茵陈。每天 1 剂，水煎分服。另用鸡内金 6 克，炙鳖甲 10 克研末冲服。上方药进 20 剂，症状消失，肝功能检查正常。再以上方改 2 天服 1 剂，再进 10 剂巩固疗效。后多次检查肝功能未见异常。

9. 芜菁子治黄疸型肝炎

[方 剂] 芜菁子。

[制用法] 将菜子晾干，研末。以开水调服，每次服 10~15 克。

[功 效] 清热，祛湿，润肠。用治黄疸、便秘。

[验 证] 钱××。女，37 岁，患黄疸性肝炎，经服上方 22 剂愈。

10. 紫茄大米粥治黄疸型肝炎

[方 剂] 紫茄子 1 公斤，大米 150 克。

[制用法] 将茄子洗净，切碎，同大米共煮粥。服数日。

[功 效] 清热，祛湿。用治黄疸型肝炎。

[验 证] 据《卫生报》反映，此方效果良好。

11. 米醋猪骨汤治病毒性肝炎

[方 剂] 米醋 1000 克，鲜猪骨 500 克，红糖 120 克，白糖 120 克。

[制用法] 置锅内以醋共煮（不加水），沸后 30 分钟取出过滤。每次成人 30~40 毫升，小儿 10~15 毫升，每日 3 次，饭后服，1 个月为一疗程。

[疗 效] 用治急慢性病毒性肝炎。对有高热者不适用。

[验 证] 经临床应用，治疗 15 例显效 12 例，好转 3 例，总有效率

100%。

12. 猪肝珍珠草汤防治肝炎

[方 剂] 猪肝 60 克，珍珠草 30 克。

[制用法] 共煮煎熟。可食肝饮汤，日服 2 次。

[功 效] 清热，利尿。用于防治病毒性肝炎。

[验 证] 据《老年报》报道，此方效果良好。

二十八、肝 脓 疡

肝脓疡，古谓肝痈。多因忿怒抑郁，木失条达，肝火内生，肝胆不和；或嗜食高深厚味，醇酒炙搏；或痢后肠受阻，运化失常，湿痰内郁，燥结肝胆之谷；或用力过猛，闪挫跌仆，以致气机失畅等致气滞血瘀，痰湿交阻，郁积成痛所致。发病或急或缓、恶寒发热或无全身症状，期门穴初起隐痛，继而胀痛增剧，胁肋膨满，肝脏肿大，表皮挛急，局部肿块皮色或白或紫红，进而中软成脓。或伴有面目发黄，形体消瘦，精神萎靡，口苦纳呆，时时汗出，或咳嗽舌苦由白转黄，脉弦滑转数。

1. 华佗治肝痈神方加味治肝脓疡

[方 剂] 当归、生甘草、柴胡、龙胆草各 10 克，金银花 60~100 克，连翘、蒲公英、白芍、茵陈各 30 克，栀子 15 克。

[制用法] 水煎服。

[功 效] 治肝脓疡神效。

[验 证] 张××，男，2 岁，反复寒战高热，右胁疼痛 10 余天，伴口苦口臭，食欲不振，大便秘结，小便短赤。体温 39.8℃，肝区叩击痛（+++），肝肋下 4 厘米，压痛明显。超声波检查见右腋前线第 8 肋间至腋中线第 9 肋间，可见一液平段。粪检 3 次未发现阿米巴原虫。诊断为肝脓疡。经用青、链霉素及红、氯霉素等治疗，未见好转，而求治于中医。来诊时舌质红赤、苔黄厚腻，脉弦数。此为肝胆湿热，结毒成痈，乃用上方治之，3 剂后热退，右胁痛减轻；再进 3 剂，超声波检查液平段已消失。再以上方去栀子、龙胆草、加沙参、麦冬调治 1 周痊愈。随访 1 年未见复发。

二十九、肝硬化腹水

肝硬化是一种或多种致病因素反复作用损害肝脏所引起的慢性肝脏疾病。肝硬化腹水则为肝功能失代偿期的一种特殊表现。少量（100 毫升以下）时，可无任何症状。中等量以上的腹水则有腹胀及一些不适感。

1. 甲鱼炖大蒜治疗肝硬化腹水

[方 剂] 甲鱼 1 只（500 克左右），独头大蒜 125 克。

[加 减] 呕吐不能进食者加入生姜 10 克；气滞腹胀甚者加入白萝卜 200 克；大量腹水者配合双氢克尿塞、氨苯喋啶，每次各服 25 毫克，每天 3 次。

[制用法] 将甲鱼宰杀后洗净、去内脏，同去皮大蒜清炖（勿放盐），炖至烂熟，即可食用。2 天 1 次，15 次为 1 疗程。

[功 效] 治愈 8 例（腹水消退，自觉症状消失，血浆总蛋白上升达 6.00 克/dl 以上，白蛋白达 3.80 克/dl 以上，A/G 比值 $\geq 1.5:1$ ，停药后 3 个月内无反复者）；显效 14 例（腹水消退，自觉症状缓解，血浆总蛋白、白蛋白上升接近正常，原 A/G 比值倒置转为正常，停药后 3 个月内有轻度反复者）；有效 7 例（腹水部分消退，自觉症状减轻，血浆总蛋白、白蛋白均有上升，A/G 比值有一定改善者）；无效 3 例（腹水不减，临床症状无变化或出现严重并发症，血浆总蛋白、白蛋白、A/G 比值均无改善者。）

[验 证] 夏某，男，44 岁，于 1984 年 7 月 2 日以腹部胀满、四肢浮肿一月为主诉而入院。腹围 89.5 厘米，面色晦暗，左侧面颊及胸部可见蜘蛛痣 4~5 处，腹部静脉曲张明显，腹水征阳性，舌黯红、苔白腻，脉弦细。西医诊断为肝硬化腹水。先服双氢克尿塞、氨苯喋啶每次各服 25 毫克，每天 3 次，3 天后开始服食甲鱼炖大蒜，共服食 13 次。住院 40 天，于 8 月 11 日痊愈出院，随访一年未再复发。

2. 猪胆绿豆丸治肝硬化腹水

[方 剂] 猪胆 4 个，绿豆面 500 克。

[制用法] 将猪胆阴干或烘干，研末，同绿豆面加水捏成豆丸。每服 6~9 克，每日 3 次，服完为止。

[功 效] 疏肝健脾、利二便。用治肝硬化腹水。

[验 证] 据《常见药用食物》介绍，某男，患肝硬化腹水3年，服上方后症状基本消失。

3. 葱白外用治肝腹水

[方 剂] 连头葱白5根，甘遂末适量。

[制用法] 葱白捣烂，加入甘遂末拌匀，再捣。使用时，脐部先用醋涂擦，以防止感染和刺激皮肤，然后将药适量敷在肚脐上，再用纱布覆盖，固定即可。一般2~4小时即能排尿或排稀水便。

[功 效] 泻水通阳。葱白味辛性平。可通阳利水，宣通脉络，治小便闭胀；甘遂味苦，性寒，泻水逐饮，治大腹水肿。二药一苦一辛，合用外敷，消腹水有良效。

[验 证] 据《赤脚医生》1977年第9期介绍典型病例：张某，男，成人，患肝硬化腹水如鼓，大便不解，小便不利。用上方敷肚脐，3小时小便自利。后以调理肝脾而腹水消尽治愈。赵某，男，成人，患肝硬化腹水，大便不解，小便不利，腹胀甚剧。用上方3次，腹水消尽。后以调理肝脾为主，使疗效得以巩固。

[备 注] 据《中药贴敷疗法》介绍，如无甘遂可用商陆代替，中药房有售。文中指出，如病人畏寒怕冷，可加少量肉桂粉，对症疗之。

4. 鲫鱼赤小豆治肝硬化腹水

[方 剂] 鲫鱼（或鲤鱼）1条（约500克），赤小豆500克。

[制用法] 将鱼去鳞及内脏，同赤小豆加水共煮至烂熟，不加任何调料。每晨服用，只趁热饮汤，不吃鱼、豆，连续服饮。

[功 效] 利水消肿。用治肝硬化腹水，久服排尿量明显增加。

[验 证] 据《新中医》介绍，本方治疗腹水疗效极佳。

5. 西瓜疗法治多种腹水

[方 剂] 西瓜1个，砂仁120个，大蒜瓣250克（去皮）。

[制用法] 将西瓜顶端开一小盖，去瓜瓤不用，留瓜皮，纳入砂仁和大蒜，再把小盖盖好封严。然后用和好的黄泥涂裹西瓜，成为大泥球，置日光下晒干再置木柴火堆上架起烘烤（禁用煤火）。去泥，将瓜干研成细面，备用。每日早晚各服1.5克，白开水送下。腹水消退后禁忌食盐及西瓜。

[功效] 清热利尿。用治肝硬化腹水、营养不良性水肿、肾炎腹水等。

[验证] 据《家庭保健》介绍疗效理想。

6. 贴敷法消肝硬化腹水

[方剂] 肉桂末 6 克，辣椒粉 6 克，食醋适量。

[制用法] 用食醋将药末混合调匀，折成三块小饼。分别外敷于神阙穴（脐窝处）和双侧曲泉穴（位于膝部内侧膝横纹凹陷处），外以胶布或伤湿膏粘贴固定。每日更换药饼 1 次。一般敷药 3 次后即可见效。

[功效] 温通气血，除滞利水。肝硬化腹水多为肝气郁滞，脾失健运，肾气不足，痰水凝固而致。此方有一定的消除腹水作用。

[验证] 经临床治疗 10 例，显效 6 例，有效 3 例，无效 1 例。

7. 烤牛脾治肝硬化腹水

[方剂] 黄牛脾 90 克，仙人掌 90 克。

[制用法] 将仙人掌纵切成两片不断，夹入牛脾，以木炭火烤熟，弃去仙人掌不用。吃熟牛脾，每日 1 次。

[功效] 补脾消肿。用治肝硬化腹水。

[验证] 吴××，女，39 岁，患肝硬化腹水经多方治疗收效甚微，后坚持服用本方，腹水渐退，收到理想效想。

三十、肾 炎

肾盂肾炎，又分急性与慢性两种，急性肾盂肾炎的病变部位、主要在肾盂，这种肾脏炎症是肾盂直接被细菌感染而引起的，所以是一种化脓性炎症；若不及时治疗，即转变成慢性肾盂肾炎。

急性肾盂肾炎主症为高热、寒战、腰痛、伴尿急、尿频、尿痛、口干便结、舌红、苔黄腻、脉滑数，宜用清热利湿之验方。

1. 复方地肤子汤治疗急性肾炎

[方剂] 地肤子 15 克，荆芥、苏叶、桑白皮、瞿麦、黄柏、车前草各 10 克，蝉蜕 10 只。

[制用法] 水煎服，每天 1 剂。

[功效] 曾治 79 例，其中治愈 62 例、好转 16 例、无效 1 例。总有效率 98.7%。

[验 证] 笔者拜读《新中医》1975年第5期刊登广东省蕉岭县中医院钟思潮老师写的“复方地肤子汤治疗小儿急性肾炎”一文后，10多年来用此方治疗该病32例，痊愈24例、好转5例、无效3例（为中途转医者2例、转院1例），有效率达90%。只服此方不使用它药作辅疗者15例（其中痊愈12例、好转3例）；加用青霉素作辅助治疗的17例（其中痊愈12例、好转2例、无效3例）。最多服药7剂，最少2剂。本方最适宜小儿急性肾炎患者，均用于15岁以下的儿童。在临床32例患者中，有1例（17岁）诊治无效，年龄越小疗效越佳。

[备 注] 现代医学认为本病是变态反应性疾病。复方地肤子汤可能有抗过敏的作用。过去常用本方治疗荨麻疹，亦有显著疗效。查《现代中药学》（叶橘泉著）有地肤子方（地肤子、桑白皮各10克，浮萍8克，木贼叶6克）治皮肤性肾脏炎的介绍。本方用地肤子苦寒入膀胱经，消皮肤之风邪为主药，佐以车前草利尿，瞿麦治血尿，黄柏清下焦湿热，蝉蜕、荆芥轻清散风邪，少佐苏叶以散寒，收到发汗利尿、清热除湿之功效。应用本方时可随病情加减药量。如病势较急，地肤子之用量可增至18克；血尿较重可加重瞿麦；蛋白尿较重可加重苏叶、蝉蜕的用量；尿中白细胞较多者可加连翘，并加重黄柏的剂量；管型较多者可加石苇。

2. 五白汤治疗急性慢性肾炎及肾病综合征

[方 剂] 猪苓、茯苓、白术、泽泻、桂枝、桑皮、陈皮、大腹皮、茯苓皮各10~15克，白茅根20~30克，小儿酌减。

[制用法] 水煎服，每日1剂。

[功 效] 化气利水，健脾祛湿，理气消肿。

[验 证] 陈某，女，25岁。浮肿、血尿1个月，并心慌气短，求治中医。治疗1周后，两下肢出现皮肤紫癜，非蛋白氮78.58毫克、二氧化碳结合力22%容积、血浆蛋白4.2%克（白蛋白3克、球蛋白1.4克、血胆固醇240毫克）；尿检查：蛋白（++）、白细胞（+）、红细胞（+++）、透明管型少量、颗粒管型（+），红细胞管型少量。诊为紫癜性肾炎。证属脾肾阳虚，并出现浮肿及胸水、腹水，用五白汤加附子、肉桂各6克，白芍20克，连服60剂，浮肿及胸水、腹水全部消退，非

蛋白氮下降至 41% 毫克，尿蛋白、白细胞、红细胞均消失。

3. 茯苓四物汤治疗慢性肾炎

[方 剂] 苍术、茯苓、猪苓、泽泻、官桂少许，当归、川芎、白芍、生地（原书无剂量）。

[加 减] 笔者常将白芍易赤芍，并加滑石、芦根；红细胞多者加生蒲黄；急性肾炎热象显著者加蒲公英；病久肾虚明显者加二至丸。

[制用法] 水煎服。

[疗 效] 治慢性肾炎疗效甚佳。

[验 证] 祝××，男，21岁，1983年2月15日诊。患慢性肾盂肾炎半年，腰痛浮肿，尿频尿痛短赤，纳少，舌淡红苔薄白，脉弦滑。尿常规：脓细胞（++）、白细胞（++++）、红细胞少许。投茯苓四物汤加减，自觉症状消失，但尿白细胞或脓细胞波动于（+~++）。笔者鉴于患者求愈心切，改投清利下焦湿热的龙胆泻肝汤加减，3剂后胃脘不适、呕吐频作、尿常规转差。暂投和胃止呕之剂，并用庆大霉素等，治疗5天未见好转。遂以投茯苓四物汤加减，数天后症状消失，20天后尿检正常，方悟守方的重要。患者至今未复发。

[备 注] 引自1984年《医学文选》10。

4. 宣肺利水饮治肾炎

[方 剂] 桔梗4.5克，杏仁、苡仁、猪苓、泽泻、大腹皮各6克，陈皮、木通、五加皮各3克，茯苓9克，葱白1小撮。

[制用法] 水煎服，每天1剂。

[功 效] 宣肺行气，利水渗湿理脾。后以此方治几例小孩肾炎，均治愈。

[验 证] 杨××，男孩。1966年7月间突然面颊肿大，迅速及全身，经医院诊为肾炎。给服中西药等，肿仍时轻时重，虽经先后住院治疗4个多月，病情终未见好转而出院。多方寻找草药单方治疗均未见效。笔者诊时患儿仍全身浮肿，有时喘气口渴，精神倦怠，食欲不振，小便量极少而色黄。治以宣利行水，理脾利湿。予上方，服6剂后小便较清长，浮肿减轻，饮食增加，精神较好。服至20剂，肿消如常人。在此期间并服用饮食单方：鲫鱼煮大蒜。3个月后。患儿因偷吃了盐腌辣椒，全身肿又复

作，按原方又服 10 剂，水肿又消退。此后，患儿戒盐 3 年，肿未复发。经尿复查无异常始食盐，至今已长大成人。

5. 蜈蚣鸡蛋为主综合治疗慢性肾炎

[方 剂] 1. 蜈蚣 1 条，新鲜鸡蛋 1 个。将蜈蚣焙干为末；在新鲜鸡蛋气室端打一小洞，纳入蜈蚣末搅匀，外用温纸及黄泥包裹，放灶内煨熟，每日服 1 个，一个月为 1 疗程，隔 3~5 天再进行下 1 疗程。一般服 2 个疗程停药。

2. 中药基本方：黄芪 20 克，党参、生地、泽泻、车前子、益母草各 15 克，枸杞子、女贞子、菟丝子、丹皮各 10 克，蝉蜕 6 克，赤小豆 30 克。

[加 减] 兼血瘀者重用益母草 30 克，加丹参、红花；兼肾阳虚者加葫芦巴、熟附子、仙灵脾；兼脾阳虚者适当减少滋阴药，另加干姜、鸡内金；兼肝肾阴虚，肝阳上亢者加钩藤、怀牛膝、石决明；兼感冒诱发者，先以越婢加术汤或其它感冒药治疗，表证解后复用基本方加减治疗。

[制用法] 每日 1 剂，一个月为 1 疗程，一般服 2~3 个疗程后改为 2 日 1 剂，巩固疗效，须 3~4 个疗程善后调理。

[功 效] 以本法治疗 40 例慢性肾炎，缓解（临床症状消失，小便常规正常，尿蛋白定性连续 6 个月阴性，尿素氮、肌酐正常）13 例，显效（临床症状基本消失，尿常规接近正常，尿蛋白定性 $\pm \sim +$ ，肾功能明显好转，尿素氮 10.71mmol/L 以下，肌酐 $176.8 \sim 265.2\text{mmol/L}$ ）17 例，好转（临床症状减轻，尿蛋白减少，定性 $+ \sim +++$ ，肾功能有改善）6 例，无效 4 例。

[验 证] 李×，女，7 岁，1990 年 8 月患者父母发现女儿浮肿，精神不佳。经徐州市×医院诊为肾病综合征。因住院困难，回本地就医，经中西医多方治疗 4 月余无效。浮肿显著，腹大如鼓，眼圈青黑，尿蛋白（ $++ \sim ++++$ ），管型（ $+ \sim +++$ ），血 $\text{WBC} 20 \times 10^9/\text{L}$ 。于 1990 年 11 月，经用激素、布洛芬等及中药治疗，浮肿虽消，但尿蛋白下降不理想（ $++ \sim +++$ ）。余投蜈蚣鸡蛋每天 1 个，服用至第 8 个蜈蚣鸡蛋时尿蛋白转阴。巩固治疗 1 周后改隔天服 1 个，疗程间歇为 10 余天。随访症状消失，尿蛋白阴性，至今半年无复发。

[备 注] 慢性肾炎病程漫长，容易复发，正虚邪恋，治疗上当以扶正祛

邪为大法。我们采用三联疗法（蜈蚣鸡蛋+中药+激素）有效率达90%，提高了缓解率，降低了复发率。观察到蜈蚣鸡蛋对利尿、消除蛋白效果较好。

6. 消风散治疗急性肾炎

[方 剂] 防风、荆芥各8克，生石膏、羌蔚子、苦参、大力子各10克，知母、生白术、当归各6克，蝉蜕5克，木通4克。

[制用法] 水煎服，每日一剂。

[功 效] 疏风清热，除湿利水止痒。共治30例，疗效满意。

[验 证] 读《浙江中医杂志》1986年第9期金明星氏所撰“消风散治疗急性肾炎30例”一文，颇受启发。试用于临床，确获良效。如陈×，男，14岁。7天前感冒发热、咽痛，近日发现眼睑及周身浮肿，时咳，身倦乏力，小便短赤；舌红、苔薄黄，脉浮数。血压16/9.5千帕斯卡。尿检：尿蛋白（+++），红细胞（++），白细胞（+），颗粒管型少许。证属风热伤肺，肺失宣疏，水溢肌肤之风水证。治宜疏风泄热，利湿消肿。予消风散加减。处方：荆芥、防风、大力子、羌蔚子、苦参各9克，生石膏、生地各10克，知母、苍术、当归各8克，蝉蜕、木通各5克，茯苓皮12克，甘草4克。水煎服，每日1剂。服6剂，尿量增多，浮肿消退。尿检：尿蛋白（±），红细胞少量。继服原方7剂而愈。随访半年，尿检正常。

7. 加味黄芪粥治肾炎

[方 剂] 黄芪、生薏仁、糯米各30克，赤小豆15克，鸡内金（研末）9克，金橘饼2枚，或酌情加入白茅根40克，六月雪12克，紫丹参10克。

[制用法] 先以水600毫升煮黄芪20分钟，去渣，次入薏仁、赤小豆煮30分钟，再入鸡内金，糯米，煮熟成粥。如加入白茅根等药，可与黄芪同煮。此为1天量，分2次服，食后含服金橘饼。

[疗 效] 治肾炎效果甚好。

[验 证] 所治8例中，男6例，女2例，年龄35~75岁；初发6例，复发2例；病程最长1.5年，最短6个月。伴贫血3例，心律失常1例。蛋白尿在+~+++之间，红细胞在+~++++之间，血红蛋白在6~11克%之间。服药1月后复查，若蛋白尿消减，则持续服用1~2个月；尿蛋白完全消失后，仍继续服用

3个月以巩固疗效。经治疗后，8例患者均获临床治愈，症状消失，所有化验指标均在正常范围内，且能参加轻体力劳动。从药物及临床分析，此方对肾阳虚、肾气不足者，疗效较好。

8. 二白汤治肾炎

[方 剂] 白花蛇舌草、白茅根、旱莲草、车前草各9~15克。

[制用法] 将上药水煎，分2次口服，每日1剂。1周为1个疗程。

[验 证] 用上药治疗急性肾炎患者50例，其中治愈40例，好转10例，浮肿一般在2~7天内完全消退。

9. 白茅根、益母草等治肾炎

[方 剂] 白茅根50克，益母草、泽泻、半边莲各20克，大腹皮15克。

[加 减] 风寒侵袭型加麻黄、苏叶15克；水湿浸渍型加木通20克，茯苓25克，桂枝15克；湿热蕴结型加蒲公英、竹茹各15克，生地25克；腹胀、便秘或有氮质血症者加槟榔、二丑、厚朴、大黄、芒硝；血压持续不降者重用黄芪（50克以上）、人参、川芎；蛋白尿始终不消者加黄芪、石苇、大黄、泽泻；尿中持续见红细胞者加生地榆、生柏叶；有血瘀征象者加丹参、川芎；合并咽炎者加金银花、蒲公英、生地；伴恶心者加竹茹、半夏。

[制用法] 将上药水煎，每日1剂，早、晚各服1次。

[验 证] 用上方治疗急性肾炎患者110例，治愈87例，显效14例，有效9例，其中，经1~2周治愈者54例；3~4周治愈者17例；4周以上治愈者16例。治愈时间最长者45天，最短者7天，平均为25天。

三十一、感 冒

感冒是由流感病毒所引起的一种常见病，一年四季均可发生。在身体过度疲劳、着凉、抵抗力低下时容易染发此病症。患者有咽喉发痒、鼻塞、流涕、咳嗽、咳痰、头痛、发热、全身疲倦、四肢酸痛等症状。

1. 参苏饮治病毒性感冒

[方 剂] 人参、苏叶、葛根、前胡、半夏、茯苓各22克，陈皮、甘草、桔梗、枳壳、木香各15克，生姜3片，大枣1枚。

〔制用法〕 水煎服，每天1剂。

〔功效〕 益气解毒，祛痰止咳。

〔验证〕 王××，男，6岁，于1985年11月24日初诊。3天来，身热无汗，鼻流清涕，头痛形寒，倦怠乏力，某医院诊为病毒性感冒。选用病毒灵、阿斯匹林，服后汗出热度暂降，须臾汗收身热复作。又加用速效感冒胶囊、紫雪散，热仍不退，遂来院求治。查体：身热暮重，体温37.8℃，热前略有形寒，手足微凉，鼻仍流涕，面色苍白，心烦胸闷气短，形体消瘦，倦怠无力，纳差，口干不欲饮，小便清，大便稀溏，舌苔薄白质淡，脉细无力。证属素体虚弱，外邪遏表，未得宣散，有里虚邪陷之虞。治当益气解毒，和中达邪，宗参苏散加减。处方：太子参、苏叶、葛根、前胡、淡豆豉、神曲各10克，橘皮、法半夏、枳壳各5克，葱白3个。每天1剂水煎，分3次服。上方服药3剂，身热渐降，晚间体温37.2℃左右，形寒肢冷已解，心烦气短亦已，面色略转红润，胃纳转佳，舌苔白，脉缓。余邪尚未尽除，治宗原方化裁。处方：太子参、苏叶、陈皮、法半夏各5克，柴胡、葛根、茯苓、神曲各10克，炙甘草3克，生姜2片，大枣5枚。又服3剂，诸症均解。

2. 神仙粥治风寒感冒

〔方剂〕 糯米100克，葱白、生姜各20克，食醋30毫升。

〔制用法〕 先将糯米煮成粥，再把葱姜捣烂下粥内沸后煮5分钟，然后倒入醋，立即起锅。趁热服下，上床覆被以助药力。15分钟后便觉胃中热气升腾，遍体微热而出小汗。每日早晚各1次，连服4次即愈。

〔功效〕 发表解毒，驱风散寒。治外感初起周身疼痛，恶寒怕冷无汗，脉紧，其效甚佳。有人写诗赞曰：“一把糯米煮成粥，7个葱白7片姜，煮熟对入半杯醋，伤风感冒保安康。”

〔验证〕 刘××，女，8岁，于1997年10月6日初诊。被诊为风寒感冒，先服西药感冒通、康必得等药，疗效不佳，后服用上方一连用三日痊愈。

〔备注〕 风热感冒不宜服用。

3. 银翘合剂治风热感冒

〔方剂〕 板兰根、银花、连翘各30克，荆芥10克（后下）。

〔制用法〕 煎成 50% 浓液，每服 30 ~ 60ml，1 日 3 次，儿童酌减。服药后多饮水。

〔加 减〕 咳嗽加生甘草、桔梗、杏仁各 10 克，咽喉肿痛加锦灯笼、山豆根各 10 克。

〔功 效〕 主治风热感冒，咽红喉痛，目赤发热或咳嗽痰黄等。

〔验 证〕 靳××，男，20 岁。就诊日期：1970 年 3 月。患者发热头痛，咽喉红痛，咳嗽痰粘黄，咯不爽。舌红苔薄黄，脉浮数。予上方加味，每服 60ml，1 日 3 次。第 2 天退热，第 4 天咳嗽咽喉红痛均解而愈。

〔备 注〕 风寒外感忌用。

4. 冰糖鸡蛋治感冒

〔方 剂〕 鸡蛋 1 个，冰糖 30 克。

〔制用法〕 将鸡蛋打破，同捣碎的冰糖混合调匀。临睡前用开水冲服，取微汗。

〔功 效〕 养阴润燥，清肺止咳。治感冒，症见流清涕、咳嗽、发冷等。对小儿流鼻血亦有效。

〔验 证〕 赵××，女，17 岁，感冒后经治疗较差，遂取本方服用，一次即愈。

5. 大白萝卜汁治感冒头痛

〔方 剂〕 大白萝卜。

〔制用法〕 将大白萝卜洗净，捣烂取汁。滴入鼻内，治各种头痛；饮用治中风。

〔功 效〕 治感冒头痛、火热头痛、中暑头痛及中风头痛等。

〔验 证〕 据《新中医》介绍，本方曾治愈感冒患者 23 例，收效良好。

6. 萝卜甘蔗汤治发热咽痛

〔方 剂〕 萝卜、甘蔗各 500 克，金银花 10 克，竹叶 5 克，白糖适量。

〔制用法〕 萝卜与甘蔗切块，加水于砂锅内，下金银花、竹叶共煎，饮服时加白糖。可当茶饮，每日数次。

〔功 效〕 消积化热，润燥止痛。治感冒，症见发热、咽喉疼痛及鼻干等。

〔验 证〕 经临床治疗 9 例，9 例全部痊愈。

7. 西瓜番茄汁治夏季感冒

〔方 剂〕 西瓜、番茄各适量。

[制用法] 西瓜取瓢，去子，用纱布绞挤汁液。番茄先用沸水烫，剥去皮，也用纱布绞挤汁液。二汁合并，代茶饮用。

[功效] 清热解毒，祛暑化湿。治夏季感冒，症见发热、口渴、烦躁、小便赤热、食欲不振、消化不良等。

[验证] 据《卫生报》介绍，本方治疗感冒可获良效。

8. 绿豆茶饮治流感

[方剂] 绿豆 50 克，绿茶 5 克，冰糖 15 克。

[制用法] 绿豆洗净，捣碎，同茶、糖放入碗内，用开水冲沏，约泡 20 分钟。代茶饮用。

[功效] 清热解毒。治流行性感冒，症见咽痛、热咳。也可用于预防流感。

[验证] 本方在广大群众中被广泛应用。

9. 青龙白虎汤治流感

[方剂] 橄榄 5 枚，白萝卜 200 克。

[制用法] 将白萝卜洗净，切作小块，同橄榄共煮汤。日服 3 次，用量不限。

[功效] 清热解毒。治流行性感冒、白喉等。

[验证] 经临床治疗 10 例患者，8 例痊愈，2 例症状明显减轻，有效率 100%。

10. 醋熏法预防流感

[方剂] 米醋不拘量。

[制用法] 米醋加水适量，文火慢熬，在室内烧熏约 1 小时。

[功效] 消毒杀菌。有预防流行性感冒、脑膜炎之功效。

[验证] 本方系民间方，被广大人民群众广泛应用。

11. 外用治感冒方

[方剂] 葱白、生姜各 15 克，食盐 3 克。

[制用法] 葱姜洗净，捣烂成糊，用纱布包裹。用力涂擦前胸、后背、脚心、手心、腋窝、肘窝，擦后安卧。

[功效] 清热，发表，通阳，解毒。治感冒。

[验证] 本方系民间方，被广大人民群众广泛应用。

12. 鸡蛋白糖治嗓子痛

[方剂] 鲜鸡蛋 2 个，白糖 15 克，香油数滴。

[制用法] 将鸡蛋打破，三味共搅匀。空腹服食，一次食尽。

[功效] 清咽润喉。

[验证] 李×，女，22岁，感冒后经服用本方，1次即愈。

13. 加味葱豉汤治风寒感冒

[方剂] 豆豉、紫苏叶、生姜各10克，葱白5枚。

[制用法] 每天1剂，煎2遍，1日3次分服。服后多饮热开水。如无汗者，争取出汗为佳。

[加 减] 头痛肢楚较重者加白芷10克；鼻塞嚏多较甚者加辛夷10克、麻黄6克。咳嗽加杏仁10克、桔梗10克。

[功效] 主治风寒感冒，恶寒发热、头痛、鼻塞、嚏多、流清涕，肢楚无汗，咳嗽痰白等。

[验证] 叶×，男，25岁。就诊日期：1978年12月10日。严冬多雪，患者2天前外出着凉后鼻塞，嚏多，流清涕，恶寒肢楚，咳嗽痰稀白。苔薄白，脉浮紧。予上方加味，服1剂后微觉温热感，微微出汗，鼻塞已通，恶寒亦解。续原方2剂，诸证均解。

[备注] 风热外感忌用。

14. 板蓝根等治感冒

[方剂] 板蓝根20~30克，金银花、黄芪各10克，连翘、桔梗、黄芩各12克，蒲公英30克，芦根40克，虎杖、玄参各15克，甘草6克。

[制用法] 将上药用温水浸泡20分钟，煎2次共约40分钟，滤得药液200ml，分3次1日内服完。

[验证] 用本方治疗流行性感患者324例，其中24小时内服药1剂，体温降至正常者45例，服药2剂体温降至正常105例，服药3剂体温降至正常174例。总有效率为100%。1个疗程为1~3天。

15. 大青叶等治感冒

[方剂] 大青叶、板蓝根、紫草各50克。

[制用法] 将上药用温水浸泡半小时后，用文火煎，煮沸后3~5分钟即可，忌煎时间过长，每日1剂，分2次服。小儿以少量昼夜服。

[验证] 用本方治疗流行性感患者156例，均获痊愈。一般服药2剂

而愈，少数服3~4剂痊愈。愈后观察，未发现反复和副作用。

16. 香薷、银花等治感冒

- 〔方 剂〕 香薷10克，银花、连翘各15克，青蒿12克，板蓝根、大青叶各30克。
- 〔制用法〕 将上药水煎，分2次服，每日1剂。
- 〔加 减〕 若偏寒者，加淡豆豉；若偏热者，加薄荷、野菊花；若汗多者，去香薷；若热盛者，加鸭跖草；若咳重者，加杏仁、虎耳草；若暑湿明显者，加鲜藿香、鲜佩兰、厚朴、六一散；若恶心呕吐者，加姜半夏、竹茹。
- 〔验 证〕 用上方治疗夏季流感患者198例，均获治愈。平均退热时间为1.57天，自觉症状消失时间为2.4天。

17. 实表膏治感冒

- 〔方 剂〕 羌活、防风、川芎、白芷、白术、黄芪、桂枝、白芍、甘草、柴胡、黄芩、半夏各等份。
- 〔制用法〕 上研粗末，麻油熬，黄丹收。每取药膏适量，做成小饼，贴于心口上，外用胶布固定。每日换药1次。
- 〔功 效〕 实卫解表。
- 〔验 证〕 曾用本方治疗体虚感冒15例，表虚自汗5例，用药2~5天，均收良效。
- 〔备 注〕 引自《理渝骈文》。本方有调和营卫，祛邪实表之功。凡卫阳不固，外感风邪所致外感诸症，用之皆效。本方亦可用麻油熬煎后、研细，用白酒调敷胸口。

三十二、咳 嗽

咳嗽此为肺部疾患的主要证候，可见于多种疾病中。正如《黄帝内经》里说：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”。也就是说，咳嗽虽然主要是肺经的病，但与其它脏腑都有关系。临床上常用的治疗咳嗽的较为有效的偏方、秘方主要如下：

1. 萝卜葱白治风寒咳嗽

- 〔方 剂〕 萝卜1个，葱白6根，生姜15克。
- 〔制用法〕 用水三碗先将萝卜煮熟，再放葱白、姜，煮剩一碗汤，连渣一

次服。

[功效] 宣肺解表，化痰止咳。治风寒咳嗽，痰多泡沫，伴畏寒、身倦酸痛等。

[验证] 贾××，久咳不止，用多种药方，效果不佳，后服上方，连用5日全好。

2. 白萝卜蜂蜜治风寒咳嗽

[方剂] 大白萝卜1个，蜂蜜30克，白胡椒5粒，麻黄2克。

[制用法] 将萝卜洗净，切片，放入碗内，倒入蜂蜜及白胡椒、麻黄等共蒸半小时。趁热顿服，卧床见汗即愈。

[功效] 发汗散寒，止咳化痰。治风寒咳嗽。

[验证] 屡用效佳

3. 饮马乳清热止嗽

[方剂] 鲜马乳300毫升，白糖适量。

[制用法] 将马乳煮沸，饮时加白糖。

[功效] 据《唐本草》介绍，马乳“止渴疗热”，有补血生津，润燥止嗽的功效。对肺结核的咳嗽、潮热有良好的辅助治疗作用。

[验证] 本方在草原地区广泛应用。

4. 玉米须橘皮治咳嗽

[方剂] 玉米须、橘皮各适量。

[制用法] 共加水煎，日服2次。

[功效] 止咳化痰。治风寒咳嗽、痰多。

[验证] 屡用效佳。

5. 糖水冲鸡蛋补虚止咳

[方剂] 白糖50克，鸡蛋1个，鲜姜适量。

[制用法] 先将鸡蛋打入碗中，搅匀。白糖加水半碗煮沸，趁热冲蛋，搅和，再倒入已绞取的姜汁，调匀。每日早晚各服1次。

[功效] 补虚损。治久咳不愈。

[验证] 本方在广大农村被广泛应用。

6. 芝麻冰糖水治夜嗽

[方剂] 生芝麻15克，冰糖10克。

[制用法] 芝麻与冰糖共放碗中，开水冲饮。

[功效] 润肺、生津。治夜嗽不止、咳嗽无痰。

〔验 证〕 本方在广大农村被广泛应用。

7. 蜜枣扒山药治肺虚久咳

〔方 剂〕 山药 1000 克，蜜枣 10 个，板油丁 100 克，白糖 350 克，桂花汁、湿淀粉、熟猪油少许。

〔制用法〕 ①山药洗净，放入锅内，加清水淹没山药为度，用旺火煮，待山药较烂时捞起，去皮，用刀剖成 6 厘米长、3 厘米宽的长方形，拍扁。蜜枣一剖两半去核待用。②半大汤碗内涂抹上熟猪油，碗底排上蜜枣再排上一层山药，夹一层糖、板油丁，逐层放至碗口，撒上糖，扣上盖盘，上笼蒸 1 小时左右，然后取下，翻身入盘。③炒锅上火，滤入盘内汤汁，放清水 100 克、白糖 150 克和少许桂花汁烧沸，用水淀粉勾芡，起锅浇在山药上即成。

〔功 效〕 补肾润肺。治肺虚久咳，脾虚腹泻、神疲体倦、四肢无力，久食补肾强身。

〔验 证〕 经临床治疗 21 例，13 例显效，6 例有效，2 例无效，总有效率 96.8%。

8. 花生枣蜜汤止咳化痰

〔方 剂〕 花生米、大枣、蜂蜜各 30 克。

〔制用法〕 用水共煎极烂。饮汤，日服 2 次。

〔功 效〕 止嗽化痰。用治咳嗽、痰饮（形体消瘦、肠鸣、胸胁胀满、目眩气短）。

〔验 证〕 屡用效佳。

9. 久食花生米止咳化痰

〔方 剂〕 花生米 60 克。

〔制用法〕 炒或煮熟。每日吃，不间断，痊愈后停用。

〔功 效〕 润肺，化痰。治老年慢性支气管炎。

〔验 证〕 屡用效佳。

10. 剑花汤化痰止痛

〔方 剂〕 剑花 2 个。

〔制用法〕 煮汤或当茶饮。

〔功 效〕 行气止痛，止咳化痰。用治咳嗽、痰多等。

〔验 证〕 王×，男，32 岁，咳嗽多年，经服上方后痊愈。

11. 大蒜泥镇咳止嗽

[方 剂] 紫皮大蒜 1 头。

[制用法] 蒜去皮，捣成烂泥。每晚睡前洗足后，敷于两足底涌穴处（足底必须先涂上凡士林），上面盖一层纱布，足心有较强刺激感时可揭去。如足底无不适感，可连敷 3~5 次。

[功 效] 解毒，镇咳。用治风寒咳嗽、燥咳以及小儿百日咳。

[验 证] 据《新中医》介绍，本方疗效甚佳，值得推广应用。

12. 款冬花治咳嗽

[方 剂] 款冬花 9 克，晶糖 9 克。

[制用法] 泡开水，时时服之。

[功 效] 此方出自清代《种福堂公选良方》，雷平著的《时病论》中也曾提及。方中款冬花一般用蜜灸，晶糖南方地区称冰糖。本方适应大人咳嗽及小儿吼咳。

[验 证] 肖××，女，3 岁，患了支气管炎，常因感冒而发，痰鸣吼咳，夜不安寐。家长在翻看医药杂志时发现此方，其方仅用款冬花、冰糖 2 味，味甘不苦，正适小儿服用，遂用此法，竟 1 剂止咳，3 剂而愈。后也多次用此方治疗咳嗽患者，均获速效。

[备 注] 方中加入紫菀，碧桃干 2 味（量与款冬花同）则疗效更佳。

13. 姜汁蜂蜜妙治咳嗽

[方 剂] 生姜、蜂蜜。

[制用法] 取生姜 30~50 克，捣烂取汁为一份，再取蜂蜜四份，即为 1 天成人量（儿童酌减）。按此比例混匀于碗中，再置锅内隔水蒸热约 10 分钟，早晚两次分服，连用 2 天。风寒或虚寒咳嗽，咯稀白痰或少痰，咽喉发痒，或咳嗽夜甚，无论新久咳，凡见上症者均可用之。

[功 效] 散寒补中，化痰止咳。

[验 证] 郑×，22 岁，打字员。头痛鼻塞流清涕，咳嗽、咯少量白稀痰，咽痒数天。检查仅见咽部轻微充血，余无特殊。经对症处理，诸症减，唯咳嗽咯痰加重，入夜更甚，用多种抗生素、止咳药治疗罔效。后改用上法，当晚睡前服 1 次，即见咳嗽顿减，夜寐安宁。次日再服 1 次，咳止痰消。

14. 白萝卜子治痰饮凝结

[方 剂] 白萝卜子（莱菔子）生熟各 15 克，生赭石末 9 克。

[制用法] 先将白萝卜子捣碎煮汤一大碗，送服生赭石细末，半小时后，再用此方 1 次。

[功 效] 消积化痰。用治痰饮凝结症。

[验 证] 据《医学衷中参西录》介绍，一青年素多痰饮，受外感后痰涎凝结于上脘，阻隔饮食不下。用此方后，即觉上脘顿开，可进饮食。

[备 注] 据《时氏处方学》介绍，单用莱菔子煎汤化停痰宿饮，大有功效。将莱菔子研末开水冲服，多饮热水，以指探吐，痰浊宿饮亦能吐出，与煎汤功效相同。

三十三、哮 喘

天气聚变，空气潮湿或是气压低时，最易诱发哮喘，患者异常敏感，发作时间并无规律，有的是夏发，有的是冬发，也有四季常发。

其症状就是气急。上气不接下气，不仅呼吸困难，且带喘声，喉中咻咻作响，胸喉之间，顽痰淤积梗塞，有的兼有咳嗽。患者面色苍白，甚至发青发紫，眼球突出，冷汗淋漓，坐卧不宁，睡眠不安，有的因呼吸困难而言语不便。

此症致病原因，大致分为二种。一为心病性气喘，是因心脏有病而起。每个人心脏的收缩力量是不同的，心脏收缩力量小的人，他的心脏在跳动时期输送出去血液就不多，也不能把血管内的血液顺畅的推进向前，于是，有些血液便散布在肺部或是其它肢体各部门为患。血液在心脏内排出不多，稍劳动，便感心跳，血液如散在肺里，便会通过神经起反射作用，引起大、小支气管收缩起来，空气通过便有困难，兼之肺里积有郁血，肺的呼吸面积缩小，就发生呼吸困难而气喘。例如有心脏病的人，因血液循环不好，血液散积在脚或腿时，会使血管肿胀，血液便从血管的疏松处渗入皮下，以致腿脚肿起，所以，心脏病患者皆可能患水肿。肺里积聚血液，自会引起哮喘，这是很自然的。

另一种是支气管性气喘，这纯粹是支气管本身所引起的毛病，每个人的支气管对外来及内在的物质，其感觉也不同，有的人闻到某一种气味，神经就能反射到支气管发生变化，也有的吃到某种食物，也会如此，例如逢吃到咸味的食品，喉头沾着咸味，哮喘便会发作，这是“咸哮”；有的人会因闻到煎糖的气味，促使哮喘发作，便称“糖哮”；或是油炒洋葱、烟熏鱼、油炒辣椒时，闻到

热锅发出的气息，便大发“油哮”，这是敏感性的症状。也有因已身的某种慢性病变分泌出来的毒素，也会起敏感作用，于是使引起支气管的收缩，而呼吸困难，形成哮喘。

哮喘二字虽连称；但疾病不同，哮是喉中有痰，喘则胁肩呼吸急促，与哮各异，普通的哮症多兼有喘，有喘者有不兼哮者，故种类多，大都是因气管狭窄，肺部弹力不够与持久性痉挛，或粘膜肿胀及分泌物障碍呼吸而成。

1. 宁肺丸治疗支气管哮喘

I 号宁肺丸

[方 剂] 海藻、昆布、蛤粉各 150 克，北沙参、百合、生地、玄参、茯苓、黄芩、钩藤、紫河车各 90 克，党参、黄芪、枇杷叶、半夏、陈皮、百部、杏仁、桔梗、萎皮、马兜铃各 60 克，旋覆花、麻黄各 45 克，瓜蒌仁 450 克，白果 100 粒，小青蛙（干品）300 克。

[制用法] 炼蜜为丸，每天服两次。

[功 效] 平喘止咳。

II 号宁肺丸

[方 剂] 生地、礞石、桃仁、钩藤各 150 克，大黄、大海子、陈皮、黄芩、党参、南沙参、白芍、紫河车各 90 克，昆布、蛤粉、海藻各 120 克，瓜蒌仁 500 克，柴胡 45 克，当归、麻黄各 60 克，石膏 180 克，青黛 9 克，小青蛙（干品）300 克。

[制用法] 炼蜜为丸，每天服两次。

[验证一] 陈××，男，45 岁，干部。患支气管哮喘 5 年，于 1970 年 9 月给 I 号宁肺丸 1500 克分服。服后 1 年内未发作。翌年起每年秋季起给药 1500 克分服，连续 3 年，至 1977 年 11 月随访，7 年未见复发。

[验证二] 王××男，16 岁。自 4 岁起患支气管哮喘，每月反复发作，夜间更甚，气候转变症状加重，常年服药，未见显效。1996 年先后按上法分服 II 号宁肺丸 500 克，服药期间未再发作。于同年按上法续服 500 克，以后未服他药，至今 10 年未见复发。

自 1966 年起 10 年间，共制宁肺丸 50 万余克，供门诊治疗支气管哮喘之用，接受治疗数百例（随访 2~5 年 40 余例），病情多获得改善，不少病例多年未见复发。

2. 萝卜鸡蛋治慢性哮喘

[方 剂] 红萝卜 1.5 公斤，鸡蛋、绿豆适量。

[制用法] ①冬至时日买红萝卜，去头尾，洗净，用无油污洁净刀切成 3 毫米厚的均匀片，再以线穿成串，晾干后收藏好。②每次取萝卜干 3 片，鸡蛋 1 个，绿豆 6 克，共放入锅内，加水煮 30 分钟至豆熟烂。③服时剥去鸡蛋皮，连同萝卜、绿豆及汤一起吃下。从三伏第一天开始服用，每日 1 次，连续用 30 天。

[功 效] 止咳平喘。治慢性气管炎和支气管哮喘。

[验 证] 杨××，男，56 岁，多年哮喘，求医数年，各种药方均用，一直不能除根，后用该方数年未犯。

[备 注] ①方剂中的食物原料，只能选用这种“萝卜”，不能用其他萝卜代替。②烹制和服用时，不要加其他佐料。用砂锅或搪瓷器皿煮制，不能用金属锅或油污容器。③饭前空腹食，早晚均可。④制作时间以冬至这一天为最理想，“三伏”即指头伏第一天至末伏最后一天这段时间。

3. 定喘烟

[方 剂] 曼陀罗花（或叶）（又名洋金花）。

[制用法] 上药切成细丝，用薄纸卷烟每支约重 1 克。哮喘发作时点燃吸烟，喘平即止。每次最大用量 0.1~0.2 克，不可过量，谨防中毒。

[功 效] 止咳平喘，具有抑制呼吸道腺体分泌、松弛支气管平滑肌和加强排痰的作用。

[验 证] 杨××，男，50 岁。就诊日期：1970 年 3 月 15 日。哮喘反复发作已 12 年，每逢冬季，受凉或感冒后诱发。3 天前受凉，先是鼻痒嚏多继则哮喘痰鸣，痰多稀白，不能平卧，舌苔薄白，脉象弦滑。已服宣肺平喘之剂，疗效不佳，予定喘烟吸入，每天 3 次，每次 1/5 支，第 1 次吸后约 5 分钟缓解，半天后发作再吸约 5 分钟又止，连续吸烟 2 天后发作停止。

[备 注] 痰热盛者忌用。毒副反应有：口干，头晕眼花，心跳加快，有青光眼及前列腺肥大者忌用。

4. 平喘丸治咳喘

[方 剂] 曼陀罗花（或叶）30 克、灸远志 150 克、甘草 150 克、地龙

150 克。

〔制用法〕 研极细末，炼蜜为丸，每粒 3 克，每次服 1 粒，1 日 3 次。

〔功效〕 解痉平喘豁痰，润肺止咳。

〔验证〕 王××，女，35 岁。就诊日期：1958 年 1 月 10 日。哮喘反复发作 3 年，3 天前因受凉后鼻痒涕多，哮喘阵作，胸闷气粗，夜间较重不能平卧，痰白而多，咯吐不爽，舌苔白腻，脉弦滑，听诊满肺哮鸣音，予平喘丸 1 粒日 3 次，第 2 天哮喘渐减，第 4 天缓解，咯痰亦少。

〔备注〕 痰热盛者忌用。毒副反应有：口干，头晕眼花，心跳加快，有青光眼及前列腺肥大者忌用。

5. 敷麝香蒜泥止咳平喘

〔方剂〕 麝香 1~1.5 克，紫皮蒜 10~15 头（所用头数随患者年龄及蒜头大小而定。）

〔制用法〕 麝香研成细末。蒜皮捣为烂泥、农历五月初五（即端午节）中午近 12 时，患者俯卧，用肥皂水、盐水清洁局部皮肤。中午 12 时整，将麝香末均匀撒在第 7 颈椎棘突到第 12 胸椎棘突的区域内，继将蒜泥复于麝香上，60~70 分钟后将麝香及蒜泥取下，清洗局部，以消毒硼酸软膏涂上，再敷一塑料薄膜，并以胶布固定。大部分患者做 1 次哮喘即减轻，有的不再发作。为巩固疗效，可连续贴治 3 年。

〔功效〕 补益散结，止咳平喘。治陈旧性哮喘。

〔验证〕 经用本方医治的 184 例中，观察不满 2 年者共 72 例，治疗结果：半年以上无哮喘发作者 35 例，偶有发作，但症状减轻者 23 例，发作次数减少或症状减轻者 10 例，无效 4 例。近期总有效率为 99.4%。典型病例：王某，男 55 岁，于 1954 年春季始发哮喘。虽经中西医治疗，病情仍日渐加重，四季发作，秋季尤重。患者曾患过敏性鼻炎，对花粉及灰尘过敏。其外祖母及母亲均患哮喘。患者常因气候变化、受寒、潮湿及气压低诱发哮喘，发作前预感胸闷异常，发作时呼吸急促，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，张口抬肩，喉中痰鸣，喘息不能平卧，有时彻夜不寐。每年均需住院治疗。1959 年 6 月至 1960 年 4 月曾在广州治疗，胸片检查为中度肺气肿。1961 年端午节患者开始用此方治疗，用后顿感呼吸通畅，不憋气，胸部轻松，喘息

消失，脊背再不感发凉，全身舒适，哮喘发作日渐减轻，次数减少，自1961年治疗后未再住院。1966年以来，每日坚持上班，至1981年6月20日随访时间已达20年。患者自述10年来哮喘已不再发作，体质亦比过去增强。

[备 注] 方见《陕西中医》1983年第4卷第3期。又据《中药贴敷疗法》按语介绍：有麝香和蒜泥敷贴区内，分布有大椎、风门、肺俞、膏肓俞、心俞、膈俞诸穴，大都交于交感神经链的附近，正是治疗肺部疾患的有效穴位。膀胱经又主一身之表，为人身之藩篱；督脉统一身之阳，为阳脉之海，麝香蒜泥敷贴后可通太阳经及督脉，有振阳而养外之作用。敷贴选在端午节中午12时，是根据祖国医学的“春季养阳”的治则而定的。

6. 猪板油麦糖蜜膏治哮喘

[方 剂] 猪板油120克，麦芽糖120克，蜂蜜120克。

[制用法] 将上述三味共熬成膏，每日服数次，每次一汤匙，口中含化，数日后喘即止。常服，病可除根。忌食生冷及辛辣刺激性食物。

[功 效] 润肺平喘。用治咳嗽痰喘。

[验 证] 据《民间灵验便方》介绍，某患者久咳气促十余年，每冬哮喘声哑，夜不能寐，后服本方一冬未犯。

7. 南瓜姜麦芽汁治哮喘

[方 剂] 南瓜5个，鲜姜汁60克，麦芽1500克。

[制用法] 将南瓜去子，切块，入锅内加水煮极烂为粥，用纱布绞取汁，再将汁煮剩一半，放入姜汁、麦芽，以文火熬成膏。每晚服150克，严重患者早、晚服用。

[功 效] 平喘。用于多年哮喘，入冬哮喘加重者。

[验 证] 据《中医效方精选》介绍，某患者哮喘10年，曾用多种方法治疗无明显效果，后服此方3天见效，服81天痊愈。

8. 乌贼骨治哮喘

[方 剂] 乌贼骨（墨斗鱼骨）500克，砂糖1000克。

[制用法] 放乌贼骨于锅内焙干，捣碎，研成粉末。加砂糖调匀，装入瓶内封存。成人每次服15~25克，儿童按年龄酌减，每日3次，开水送服。

[功效] 收敛，定喘。用治哮喘有明显疗效。

[验证] 据《祖国医学》介绍，病史长达27年的哮喘患者，经服本方半月而愈，后未复发。

9. 柚子皮百合汤治哮喘

[方剂] 柚子1个（约1000克重，去肉留皮），百合125克，白糖125克。

[制用法] 将上述三味加水60毫升，煎2~3小时。分3次服完，每日1次，每服3个柚子为一疗程。儿童减半。

[功效] 补脾虚、清肺热、消痰涎。用治陈久咳嗽、痰多，哮喘，肺气肿等。

[验证] 经临床实践治疗34例，显效25例，有效6例，无效3例，总有效率95.5%。

[备注] 服药期禁忌食油菜、萝卜、鱼虾。

三十四、矽肺、肺病

矽肺是由于长期大量吸入一种含有游离二氧化硅粉尘后，引起肺内发生广泛的结节性纤维化，简称矽肺。本病起病缓慢，早期可无症状或者症状不明显。多属中医的“胸痹”，“咳喘”，“肺癆”等病范畴。孙思邈的《千金方》里说：“病咳唾脓血，其脉数实者，属肺病。”此病足使阴气大伤，现介绍几种民间疗法：

1. 萝卜三汁治矽肺

[方剂] 大白萝卜、鲜茅根、荸荠各适量，鸡内金、麻黄、贝母、牛蒡子、桔梗、枳壳、石斛、枇杷叶（随症加减，请教医生）。

[制用法] 将鲜萝卜、茅根、荸荠洗净，捣烂取汁，再将鸡内金等八味中药煎汤，然后与三汁混合一起饮用。

[功效] 治矽肺。

[验证] 据《岭南草药志》介绍：服此方治疗矽肺21人，疗效显著。一般在1个月内黑痰消失，9个月黏痰消失，1年左右症状消失，体重增加，恢复健康。

[备注] 如每日不拘量吃鲜萝卜及鲜荸荠，日久黑痰减少，咳嗽必轻。

2. 石榴花、夏枯草治肺病

[方剂] 白石榴花、夏枯草各50克，黄酒少许。

〔制用法〕 白石榴花与夏枯草同煎汤。服时加少许黄酒饮用。

〔功效〕 清肝火，散瘀结，消炎。用治肺痈、肺结核。

3. 腊八蒜治肺痈

〔方剂〕 陈醋、大蒜。

〔制用法〕 我国民间农历腊月初八有用醋泡“腊八蒜”之习俗，用这种陈醋泡过的腊八蒜，每天佐餐或早晚食蒜数瓣并饮醋1盅。

〔功效〕 宣窍通闭，解毒消炎。用治肺痈。

〔验证〕 经《家庭医生》杂志介绍以上两方，效果理想。

4. 猪肺萝卜汤清热补肺

〔方剂〕 猪肺1具（去气管），青萝卜2个。

〔制用法〕 洗净，切块，加水共煮熟，分次服食。

〔功效〕 清补肺经，消肿散瘀。用治肺脓肿。

〔验证〕 据《健康报》读者反映，该法效果很好，值得推广。

5. 云母膏治肺痈

〔方剂〕 云母、焰硝、甘草各128克，槐枝、桑白皮、柳枝、侧柏叶、橘皮各64克，川椒、白芷、没药、赤芍、肉桂、当归、黄芪、血竭、菖蒲、白及、川芎、白薇、木香、防风、厚朴、桔梗、柴胡、党参、苍术、黄芩、龙胆草、合欢皮、乳香、茯苓各15克。

〔制用法〕 麻油熬，黄丹收，加松香32克搅匀。用时每取适量，贴敷患处，外以纱布盖上，胶布固定。每日换药1次。

〔功效〕 清肺、化痰、清瘀、排脓、兼以补虚。

〔验证〕 屡用神效。

〔备注〕 引用《理渝骈文》

6. 金草桔梗治矽肺

〔方剂〕 石上柏（全草）20克，桔梗15克，鱼腥草12克，生甘草10克。

〔加 减〕 临床应用本方时，可根据病情灵活加减。若气血两虚者，加党参、黄芪各20克；若咳嗽剧烈者，加川贝母、前胡、蝉衣、橘络各10克；若大便秘结者，加生川军（后下）10克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日1剂，分3~4次口服。两个月为1个疗程。可连服2~3个疗程，直至症状消失时为止。

〔验证〕 有本方治疗矽肺患者 135 例，经用药 1~2 个疗程后，效果显著。其中胸痛消失者占 72.5%；头痛，气促、心悸改善者占 61.4%；咳嗽、咳痰改善者占 62.7%。应用本方未见副作用。仅个别患者出现一时性头晕加重，但在继续用药中自然消失。不必停药和惊慌。

7. 蒲公英等治矽肺

〔方剂〕 蒲公英、半枝莲各 30 克，浙贝母、前胡、麦门冬、制川军、三棱、莪术、路路通各 10 克，瓜蒌、苏子、青皮、白果、枳壳各 12 克，鸡内金、杜仲、川续断、山萸肉、枸杞子各 15 克，生甘草 8 克。

〔制用法〕 将上药水煎，分早、中、晚 3 次温服。每日 1 剂。两个月为 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗矽肺患者 276 例，总有效率为 78.62%，其中显效率为 52.54%。服药 20 天左右症状开始好转，尤以胸痛、咳嗽、气喘、咯痰效果比较显著。治程中未见不良反应。

三十五、肺 结 核

本病是在人体抵抗力降低的情况下，因感染结核杆菌而发病。中医认为，本病外因即“痨虫”传染，是致病的条件；内因指下体气血虚弱，阴精亏损，正气不足。临床常用的有效的偏、验方主要如下：

1. 羊苦胆方促结核灶钙化

〔方剂〕 羊苦胆 1 枚。

〔制用法〕 洗净后蒸食之。每日 1 枚，3 个月为一疗程。

〔功效〕 清热解毒，有抑制结核菌作用。

〔验证〕 据《浙江中医杂志》介绍，31 例病案分析，服用此方后，大部分病例均有不同程度的好转，无一例在内服羊胆期间病变发生扩散或恶化。

〔备注〕 为了便于保存和食用，把羊胆焙干，研细，过筛，成为粉末，每日服 1 克，亦有同等功效。

2. 扶本抗痨汤（丸）治疗肺结核

〔方剂〕 汤方——怀山药 60 克，生地 30 克，潞党参 10 克，当归 10 克，

济阿胶 10 克（烊冲），白蔹 10 克，海浮石 20 克，夏枯草 20 克，白及 10 克，壁虎 6 克，仙鹤草 10 克，白茯苓 10 克，天麦冬 10 克，神曲 10 克，北沙参 10 克，杭白芍 10 克，杏仁 10 克，橘皮 6 克；

丸方——汤方加熟地 30 克，地骨皮 10 克，丹皮 10 克，紫河车 30 克，炒白术 10 克，川贝母 10 克，鹿角胶 10 克，龟甲胶 10 克，水蛭 6 克，廬虫 6 克，三七粉 3 克，十大功劳 10 克，灸甘草 10 克。

〔制用法〕 先服汤剂，每日 1 剂，水煎 3 次分 3 次服，42 剂为 1 疗程，可连服 1~2 个疗程；后用丸剂，以丸方 3 倍量，粉碎过筛，其中阿胶、鹿角胶、龟甲胶化水，水泛为丸如小绿豆大，每次服 5 克，1 日 3 次，3 个月为 1 疗程，可服 3~4 个疗程。

〔功效〕 补气养血益精，清热化痰抗癆。

〔验证〕 王某某，男，21 岁，学生。1 年前，始患感冒，发热，咳嗽，经治疗好转，继则全身乏力，下午低热不退，微咳，查 X 线胸片示右上肺第一二前肋间有片状阴影，密度中等，边缘模糊，痰液结核菌培养阳性，诊为浸润型（Ⅲ型）肺结核。予青霉素静滴 1 周，链霉素肌注 90 天，并加利福平、异烟肼及乙胺丁醇四联疗法，治疗 8 个月，复查病灶未能吸收好转，病况如前。又加吡嗪酰胺，内服近 2 周，出现腹胀、恶心呕吐，巩膜黄染，小便呈酱黄色，遂就诊。面色清瘦，形削体弱，乏力，夜间偶有盗汗，脉细涩，苔薄白，舌淡红。体温 37℃（午后 37.6℃），肝功能检查，血清总胆红素 31.2 $\mu\text{mol/L}$ （正常值 5.1~17.1 $\mu\text{mol/L}$ ），血清谷-丙转氨酶 350U（正常值 <40U），血清谷-草转氨酶 370U（正常值 <40U）， γ -谷氨酰转酞酶 362U（正常值 <50U），HBsAg 阴性。诊为体质特异性肺结核，对抗癆药耐药及耐受力弱致肝功能损害。辩证为阴虚内热，癆虫蚀肺，兼夹湿热。遂停服抗癆药，改用扶本抗癆汤加茵陈。处方：绵茵陈 30 克，怀山药 60 克，生地 30 克，潞党参 10 克，当归 10 克，济阿胶 10 克（烊冲），白蔹 10 克，海浮石 20 克（先煎），夏枯草 20 克，白及 10 克，壁虎 6 克，仙鹤草 10 克，白茯苓 10 克，天麦冬 10 克，神曲 10 克，北沙参 10 克，杭白芍 10 克，杏仁 10 克，橘皮 6 克。上药连服 20 剂，腹胀、恶心

已除，巩膜黄染已退，小便转清，饮食增进，肝功能恢复正常。仍以上方去茵陈，继续服用。先后共服 80 余剂，潮热消除，体力渐复，胸片示病灶吸收良好。再拟原方加丸剂，以 3 倍量制丸缓服，以收全功。处方：怀山药 180 克，生地、熟地、紫河车各 90 克，潞党参、当归、济阿胶、白薇、白及、仙鹤草、白茯苓、天门冬、麦门冬、神曲、北沙参、杭白芍、杏仁、地骨皮、丹皮、炒白术、川贝母、鹿角胶、龟甲胶、十大功劳、炙甘草各 30 克，海浮石、夏枯草各 60 克，壁虎、橘皮、水蛭、廬虫各 18 克，三七粉 9 克。上药粉碎过筛，以阿胶、鹿角胶、龟甲胶化水，水泛为丸如小绿豆大小，每次服 5 克，1 日 3 次。丸方共服两个疗程，1 年后复查，右上肺阴影消失，体力恢复正常，乃返校复读。

[备 注] 肺结核患者，西药抗痨治疗，若按系统及疗程服药，原本疗效理想。然临床常见诸多原因，致病情迁延。此案患者由于服药抗痨引起肝功能损害而中途停药，就是例证。停药则必治疗不彻底，可死灰复燃，若不停药，则肝脏又受到严重威胁，在此两难之际，改弦易辙，用中药治之，虽非良法亦为良策。市售有佑福宁虽可替代，然疗效极其缓慢。余用扶本抗痨汤（丸），乃精选确有疗效药物所组成，并屡经验证，即可以汤剂求急于燃眉，又可以丸剂缓治于末尾，两相有得，相济共成，其病自竭。但用方守而不能素，亦为取效之要诀也。

3. 鳗鲡大蒜治肺结核

[方 剂] 鳗鲡（白鳢）150 克，大蒜 2 头，葱、姜、油、盐各适量。

[制用法] 将鳗鲡开膛洗净，切段，大蒜去皮，洗净。将锅置于旺火上，加油烧热，放入鳗鲡煎炸至呈金黄色，下大蒜及调料，加水 1 碗焖煮至鱼熟即成。

[功 效] 补虚羸，祛风湿，杀菌。有抑制结核病菌的作用。

[验 证] 据《新中医》介绍，本方在治疗结核方面有独到疗效。

[备 注] 鳗鲡烧存性，研细（或作成丸剂），每服 5~10 克，每日 2 次，亦有治疗肺结核、淋巴结核之功效。

4. 百合蜜治结核病

[方 剂] 鲜百合、蜂蜜各适量。

[制用法] 百合与蜂蜜共放碗内蒸食。每日 2 次，可常服食。

- [功 效] 清热，润肺，生津。能抑制结核菌扩散，促使结核病灶钙化。
[验 证] 崔××，女，28岁，经服上方后病情得到好转，并逐渐稳定。

5. 南瓜藤汤治肺结核病

- [方 剂] 南瓜藤（即瓜蔓）100克，白糖少许。
[制用法] 加水共煎成浓汁。每次服60克，每日2次。
[功 效] 清肺，和胃，通络。用于肺结核之潮热。
[验 证] 据《卫生报》报道，久用其方，可获奇效。

6. 猪肝白芨粉治肺结核

- [方 剂] 猪肝、白芨。
[制用法] 将猪肝切片，晒干，研成细粉，与白芨粉相等量调匀。每服15克，每日3次，开水送下。
[功 效] 敛肺止血，消肿生肌。
[验 证] 据《卫生报》报道，久用其方，可获奇效。

7. 蛋壳蛋黄治浸润型肺结核

- [方 剂] 鸡蛋壳（皮）6个，鸡蛋黄6个。
[制用法] 将蛋壳研细，放入蛋黄搅匀，然后置于搪瓷或陶器内，于炭火上炒拌呈焦黑色，即有褐色之油渗出，将油盛在盖碗内备用。每次饭前1小时服5滴，每日3次。
[功 效] 滋阴养血，润燥利肺。
[验 证] 屡用效佳。

8. 玉米须冰糖治肺结核之咯血

- [方 剂] 玉米须60克，冰糖60克。
[制用法] 加水共煎。饮数次见效。
[功 效] 利水，止血。
[验 证] 屡用效佳。

9. 吸蒜气疗肺结核

- [方 剂] 紫皮大蒜2或3头。
[制用法] 蒜去皮，捣烂。置瓶中插两管接入鼻内，呼气用口，吸气用鼻。每日2次，每次30~60分钟，连用3个月。
[功 效] 止咳祛痰，宣窍通闭。
[验 证] 据《广东中医》1963年第5期介绍，用此法治疗20例重症肺结核，痰菌、血沉、呼吸系统及全身症状都有所改善。

10. 四汁丸治肺癆

- [方 剂]** 生藕汁、大梨汁、白萝卜汁、鲜姜汁、蜂蜜、香油、飞箩面各120克，川贝18克。
- [制用法]** 将川贝研细面，和各药共置瓷盆内，以竹箸搅匀，再置大瓷碗或砂锅内，笼中蒸熟，为丸如红枣大。每服3丸，日3次夜3次，不可间断，小儿减半。
- [功 效]** 散瘀止血，养阴清热、化痰润肺。主治肺劳之喘咳、吐痰吐血等。
- [验 证]** 据《中医验方汇编·内科》（第1集）介绍验例：张某，10岁时患咳，食纳减少，呼吸困难，四肢无力，面黄肌瘦，久治不愈。服此方3日好转，10日病愈，后未再发。曾用此方治愈33人。
- [备 注]** 服药后如厌食油味、恶心者，急食咸物可止。忌食葱、蒜。

三十六、风寒湿痹

痹证是以肢体、筋骨、肌肉、关节等处疼痛、酸楚、重着、麻木和关节红肿或屈伸不利为主症的一类疾病。痹即闭阻不通之意，它表明人体肌表经络遭受外邪侵袭后，病邪阻闭气血的正常运行而成疾。临床常用的偏方、验方主要如下：

1. 壁虎散治骨质增生

- [方 剂]** 壁虎6个，辰砂（朱砂）4克。
- [制用法]** 用镊子把活壁虎口张开，每个喂一些辰砂，放入瓶内，不久将食用辰砂死去的壁虎焙干，研末即成。用时取适量药粉，用醋调成糊状，敷于增生疼痛处，外用麝香膏固定，隔日换药。敷后疼痛立即减轻。2日为一疗程，隔3~5日可继续下一疗程，直至疼痛消失为止。
- [功 效]** 祛风定惊、消瘀散结。用治常发于颈、背、腰及足跟等处缠绵难愈的骨质增生症，症见局部疼痛麻木、活动受限等。
- [验 证]** 据《老年报》介绍：“采用壁虎散治疗骨质增生，可获满意效果。”

2. 醋熏法治疗关节炎

- [方 剂]** 陈醋300毫升，新砖数块。

〔制用法〕 砖放在炉内烧红，取出放在醋内浸透，趁热放在关节下烟熏（熏前把纱布一块放于醋内浸湿，然后包在关节处，为了防止烟熏散热过快和醋味走失，可用被子遮盖，并根据砖的热度逐渐向砖贴近，以稍热些为好，砖凉即停止，隔日1次。）

〔功效〕 散瘀消肿。用治关节炎。

〔验证〕 据《江苏中医》、《食物疗法精萃》介绍：用此方曾治愈多年关节炎。有的关节肿胀不能行走，仅用烟熏疗法3次，自觉症状消失。某木工两肩关节酸痛，二头肌收缩无力，用上法烟熏1次而愈。

3. 姜辣药汁熏敷法治疗风湿性关节炎

〔方剂〕 干姜60克，干辣椒30克，乌头20克，木瓜25克，水2000毫升。

〔制用法〕 将上药四味放入水中煮30~40分钟。用煎好的药乘热熏患部，药凉再加热，将药汁倒出，用干净毛巾蘸药汁敷于患部。如此反复2或3次，每日早晚1遍。

〔功效〕 温经散寒，除湿止痛。用治风湿性关节炎或慢性关节炎之遇寒痛甚、屈伸不利，伴有脚趾麻木。

〔验证〕 据《健康报》介绍，读者多次来信反映此方甚妙。

〔备注〕 乌头（中药名），含乌头碱，有剧毒，主根经加工炮制后毒性减低，中医用作温经散寒、止痛药品。为此，蘸药汁使用过的毛巾，建议不再使用时应当丢弃，以防发生中毒。

4. 自我治疗“落枕”方

〔方剂〕 整砖1块。

〔制用法〕 患者平躺在床上，两腿自然合拢，全身放松，由一人扶住其双腿，另一人将一本薄书垫在其落枕一侧的脚底处，用一块整砖隔书猛击脚底三四下即可。

〔功效〕 用治落枕牵动脖颈疼痛难忍。

〔验证〕 据《老年报》介绍，此法为一老中医所传授，治疗1次疼痛减轻，次日自愈，已治愈落枕患者数十例。

5. 谷子秆烧灰治腰腿痛

〔方剂〕 谷子秆（茎）。

〔制用法〕 用谷秆烧灰熏烤，并以热灰敷于患处，每晚1次，8次见效。

【功效】祛寒湿，舒筋骨。治寒湿性腰腿痛、肩背痛、关节痛。

【验证】据《卫生报》介绍：“江西一农民，患腰腿痛多年，久治不灵，后经用上方后，疼痛减轻，再治疗后，腰腿痛基本消失。随访2年未见复发。

6. 木瓜粥有去湿舒筋之功

【方剂】木瓜15克，粳米100克，姜汁、蜂蜜各少许。

【制用法】木瓜研末与粳米煮作粥，临熟调入姜汁、蜂蜜。可任意服食。

【功效】治霍乱转筋、足膝无力以及湿痹脚气等。

【验证】屡用效佳。

【备注】此方据《济众新编》化裁而成，原名“木果粥”。经查考，木果可能即木瓜，其药性相似。

7. 泡萝卜叶洗澡驱寒止痛

【方剂】干萝卜叶100克。

【制用法】先将干萝卜叶上的尘土冲净，然后放在澡盆里用温水泡开，再加热水洗澡。

【功效】对医治寒症及神经痛有一定的疗效。

8. 两面针煮鸡蛋祛风止痛

【方剂】两面针（入地金牛）10克，鸡蛋1个。

【制用法】将两面针与鸡蛋同煮，蛋熟去皮再煮片刻。饮汤食鸡蛋。

【功效】定痛。用治风湿骨痛、胃痛、牙痛以及挫伤疼痛等。

【验证】据《临床杂志》介绍：“以上两方在治疗疼痛方面具有一定疗效。

【备注】两面针有较好的止痛作用，过量可致头晕、眼花、呕吐。

9. 猪肉炖沙参治风湿痛

【方剂】瘦猪肉250克，沙参30克，油、盐、葱、姜各少许。

【制用法】瘦猪肉切片，锅置于火上烧热下油，先煸炒猪肉，再放入沙参及各种调料，加适量温水煮熟。连肉带汤分2次吃下。

【功效】治风湿疼痛。

【验证】山东一农民，经服本方后其风湿痛竟不治而愈，至今未复发。

10. 鼠尾猪蹄汤除风湿

【方剂】鼠尾（中草药）50克，猪蹄1只，盐少许。

【制用法】将猪蹄劈开切块，加水与鼠尾共炖，食盐调味。吃猪蹄饮汤。

[功效] 祛风湿，舒筋络。治风湿性关节痛、腰脊劳损、跌打扭伤等。

[验证] 据《新中医》介绍，久用该方可获良效。

[备注] 据《常用中草药手册》记载，鼠尾能治“风湿性关节炎，风湿性腰腿痛”。

11. 姜醋威灵仙敷治足跟痛

[方剂] 姜、醋各适量，威灵仙 50 克（中药店有售）。

[制用法] 将威灵仙及鲜姜捣碎，研成细末，以少量醋调成糊状。外敷于足跟痛处，用纱布或胶布包扎固定（注意要包紧，以使药糊充分接触患部），每日换药 1 次，数次可愈。

[功效] 宣通经络，驱风散寒。用治足跟疼痛或足跟部骨质增生。

[验证] 众多读者来信反映此方效果奇佳。

三十七、汗证（盗汗、自汗）

汗证，是指在安静的状态下，如静坐静卧、睡眠等时，全身或身体某些部位出汗过多，或大汗淋漓不止为主的一种证候，常用的临床偏方、验方、主要如下：

1. 碧桃干红枣汤治盗汗

[方剂] 碧桃干 15 枚（以未熟果风干，色绿者佳），红枣 10 枚。

[制用法] 煎汤。每晚 1 剂，连服 3 剂。

[功效] 止汗。

[验证] 据《中华内科杂志》介绍，碧桃干对肺脓肿、败血症等不同疾病所致的盗汗，都有一定效果，经临床应用无任何副作用。

2. 加味牡蛎散治盗汗

[方剂] 煅牡蛎 100 克、生黄芪 100 克、麻黄根 50 克、五味子 50 克。

[加 减] 久病气虚加人参须 6 克；阴虚燥热加生地 10 克、白芍 10 克；心悸眠差加酸枣仁 10 克、麦冬 10 克。

[制用法] 上药研粗末。瓶贮备用。每次 10~20 克，用浮小麦 15 克同煎，滤去渣热服，1 日 2 次。

[功效] 治体常自汗，动则益甚，时易感冒者；夜寐盗汗，醒则汗止，气短神疲者；气虚表弱，卫阳不固之证。

[验证] 方××，男，50 岁。就诊日期：1980 年 10 月 16 日。患者神疲

乏力，时易盗汗，动则尤甚，易感冒，舌质淡红，苔薄白，脉弱。此气虚卫外之阳不固也，予本方每天 20 克，加人参须 6 克、浮小麦 15 克同煎去渣，日 2 次分服。连服 2 周，体力好转，自汗亦解。

[备 注] 煅牡蛎潜阳敛汗；生黄芪益气固表；麻黄根走表固卫；五味子敛阴止汗；浮小麦滋养心阴，共奏益气固表、潜阳敛阴，养心止汗之功，故自汗盗汗均可随证加减用之。本方对病后体虚之自汗盗汗极为适宜，但对亡阳的大汗淋漓则不能胜任。

3. 五倍子散治盗汗

[方 剂] 五倍子适量。

[制用法] 研极细末，贮瓶备用。每次 2~3 克，用温开水调成糊状，临睡时敷肚脐窝，上盖纱布，以胶布固定，次晨除去。

[功 效] 本药味酸涩功专收敛，用于自汗、盗汗有收敛止汗之效。

[验 证] 王××，女，35 岁。就诊日期：1975 年 10 月 5 日。患者夜间睡中盗汗，醒后即止，时有燥热感，余无不适。予本方治疗 4 次，汗止而愈。

[备 注] 脐部有湿疹或皮肤破损者勿用。用 5~6 次无效者停用。

4. 麦枣汤补气血敛汗

[方 剂] 浮小麦 50 克，大枣 50 克。

[制用法] 水煎。日服 1 剂。

[功 效] 养心神，敛虚汗。用治盗汗。

[验 证] 此方在农村被广泛应用。

5. 黄芪羊肉汤滋养敛汗

[方 剂] 黄芪 15 克，羊肉 90 克，桂圆肉 10 克，怀山药 15 克。

[制用法] 将羊肉用沸水先煮片刻，捞出后用冷水浸泡以除膻味。用砂锅将水煮开，放入羊肉和三味中药同煮汤，食时调好味。饮汤吃肉。如小儿无咀嚼能力，可煮成浓汤饮用。

[功 效] 健脾补虚，滋养敛汗。主病后体虚盗汗。

[验 证] 孙××，女，15 岁，经服 3 剂盗汗即愈。

[备 注] 阴虚太重的小儿忌用。

6. 猪心黄芪汤治自汗盗汗

[方 剂] 猪心 1 个，黄芪 12 克，党参 12 克，五味子 4 克。

〔制用法〕 将黄芪等三味纳入猪心内，加水炖熟。吃肉饮汤。

〔功效〕 补气血，安心神。用治体虚所致的自汗、盗汗。

7. 酿羊肝主治体弱盗汗

〔方剂〕 羊肝1个，糯米60克，红枣5枚。

〔制用法〕 将羊肚洗净去污，糯米淘洗干净，同红枣放入羊肚内，用粗线缝口，放锅内隔水炖熟。饭时切开羊肚，调好味，佐餐。

〔功效〕 强壮脾胃，补中益气，复元敛汁。主治体虚盗汗、自汗。

〔验证〕 据《新中医》介绍，以上2方在治疗的体虚所致盗汗、自汗均有良效。

8. 韭菜根治自汗盗汗

〔方剂〕 韭菜根100克。

〔制用法〕 水煎汤。顿服。

〔功效〕 敛汗。用治自汗、盗汗等。

〔验证〕 屡用神效。

9. 燕麦米糠治虚汗不止

〔方剂〕 燕麦50克，米糠25克，饴糖15克。

〔制用法〕 将前二味水煎，去渣。分2次服，服时加饴糖调味。

〔功效〕 补虚敛汗。用治自汗、盗汗、虚汗不止。

〔验证〕 屡用神效。

10. 肉麸汤圆有止汗功效

〔方剂〕 小麦麸100克，猪肉末250克，水磨糯米粉250克，葱末、姜末、盐、酱油各少许。

〔制用法〕 将小麦麸与肉末、葱末、姜末等调料调成肉馅，水磨糯米粉加水适量，拌成软料，再与肉馅包成汤圆。煮熟后可随量食用。

〔功效〕 用治虚汗、自汗、盗汗等。

〔验证〕 吴××，女，35岁，时常夜间入睡即汗出，睡醒后即止，经服上方2剂好转。6剂痊愈。

三十八、暑 病

中暑是人体感受暑热后引起的疾病。暑为夏病之首，中暑的“中”字，形容暑热侵犯人体，来势凶猛，有如箭头石块猛烈击中人体一样。当环境气温超

过 32℃ 时，就可能有中暑发生。本病的发生除与高温、高湿、通风不良等有关外，还有每个人的身体健康状况密切相关。临床常用的主治中暑的偏方如下。

1. 西瓜盅消暑祛热

〔方 剂〕 西瓜 1 个，鸡肉、火腿、莲子、龙眼、胡桃、松子、杏仁各适量。

〔制用法〕 把鸡肉和火腿切成丁。将西瓜上端切下（小为盖，大块为盅），挖去瓜瓤。将上述用料一并填入瓜内，盖上盖，隔水蒸熟即成。食之。

〔功 效〕 消暑祛热。消烦止渴，利小便。

〔验 证〕 据《老年报》介绍该方疗效很好。

〔备 注〕 此方见于《御香缥缈录》，是慈禧很欣赏的食品。加入鸡肉、火腿、莲子等都是为了滋补养。山东孔府菜有“西瓜鸡”，其制法相同，是将调好味的雏鸡，配以干贝、香菇、盐笋、口蘑、南荠，也是蒸制，都是宫廷颐养的食品。

2. 绿晶肘清热解暑

〔方 剂〕 猪肘（去骨）1000 克，绿豆 500 克，葱、姜、盐、白矾各少许。

〔制用法〕 ①猪肘子刮洗干净，加水放入锅内，下绿豆和少量的白矾，用微火煮至用筷子一扎肘子即透时取出晾凉。②将煮透的猪肘子皮朝下放在大碗内，上面放葱、姜和盐，再倒入原汤（不要绿豆），用旺火上锅蒸烂，取出再晾凉。③将连汤的肘子放进冰箱或冰上，待凝结成冻时取出切片，摆在盘内即可食。

〔功 效〕 清热、生津。适用于口渴心烦者及酷暑时食用。

〔验 证〕 据《老年报》介绍该方疗效很好。

3. 西瓜蕃茄汁治暑热病

〔方 剂〕 西瓜 1 个，番茄 1 公斤。

〔制用法〕 西瓜切开取瓤，番茄去皮，用洁净纱布挤压，取瓜汁和番茄汁液，尽量饮用。每日 2 次，连用 2 天即愈。

〔功 效〕 清热解暑，利水开胃。用治暑热及温病发热、口渴、心烦、食欲不振、消化不良及小便热赤涩痛。

〔验 证〕 据《老年报》介绍，本方具有较好的清热解暑作用。

4. 海带冬瓜豆瓣汤消暑利尿

〔方 剂〕 浸发海带 100 克，冬瓜 500 克，去皮蚕豆瓣 100 克，香油及盐

适量。

〔制用法〕 先将浸软泡发洗净切成条块状的海带和蚕豆瓣一起下锅，用香油煸炒一下，然后添加 500 克清水，加盖烧煮，待蚕豆将熟时，再把切成长方块的冬瓜和盐一并放入，继续烧至冬瓜九成熟，即可停火出锅。食之。

〔功效〕 消暑利尿。治中暑头晕、头痛、烦渴。

〔验证〕 据《老年报》介绍，本方具有较好的清热解暑作用。

5. 红糖绿豆沙解暑祛热毒

〔方剂〕 绿豆 100 克，红糖 25 克。

〔制用法〕 将绿豆煮烂，用勺在锅中碾碎如泥，再以文火煮至无汤，加红糖调味即成。食之。

〔功效〕 清暑解毒。治小儿暑热生疮疖。夏季炎热时小儿常食有解暑清热、除烦解渴之功用。

〔验证〕 本方在广大农村被广泛应用，效果明显。

6. 绿豆丝瓜花解暑

〔方剂〕 绿豆 60 克，鲜丝瓜花 8 朵。

〔制用法〕 用清水一大碗，先煮绿豆至熟，然后捞出豆，再加入丝瓜花煮沸。温服汤汁。

〔功效〕 清热，解暑。治夏季气温酷热引起的中暑。

〔验证〕 本方在广大农村被广泛应用，效果明显。

7. 猪肉冬瓜汤治暑热

〔方剂〕 瘦猪肉 50 克，冬瓜 100 克，盐、姜适量。

〔制用法〕 将肉切碎与冬瓜共煮汤，待将熟时下姜片及盐。日服 2 次。

〔功效〕 清热解暑。用于暑热之口渴、尿黄等。

〔验证〕 本方在广大农村被广泛应用，效果明显。

8. 内服外用黍子汤治中暑

〔方剂〕 黍子 50 克。

〔制用法〕 将黍子炒黄，加水两杯，煎取一杯，一次温服。再煎二渣，加四碗水，熏洗全身。

〔功效〕 解暑热，止吐泻。用治中暑身热、头痛、乏力、呕吐、腹胀、腹泻、不思饮食等。

〔验证〕 赵××，女，39 岁，因田间劳作而中暑，即服上方并外用，随

之好转，再用1剂后即痊愈。

9. 冬瓜汁解暑热止烦渴

[方 剂] 鲜冬瓜1个。

[制用法] 将瓜洗净，切成碎块，捣烂绞取汁。尽量饮服。

[功 效] 消暑，清热，除烦。治中暑后烦躁不安、口渴、尿黄，有清热利尿之作用。

[验 证] 据《老年报》介绍，本方具有解暑良效。

10. 姜韭蒜汁治中暑昏厥

[方 剂] 鲜姜、大蒜、韭菜各适量。

[制用法] 洗净，姜蒜去皮，共捣烂取汁。灌服。

[功 效] 解表，温中。治中暑昏厥，不省人事。

[验 证] 刘××，男，23岁，中暑后立即服本方，痊愈。

11. 扁荷粥用于解暑

[方 剂] 白扁豆50克，冰糖30克，鲜荷叶1小张，大米50克。

[制用法] 先用清水把白米洗净，浸泡。锅内加水三碗煮白扁豆，水沸后，下白米小火煎煮，待扁豆已黏软，放入冰糖及洗净的鲜荷叶，再煮20分钟即成。食之。

[功 效] 消暑解热，和胃厚肠，止泄泻。

[验 证] 经临床治疗18例，12例1剂即愈，6例1剂好转，2剂即愈。

[备 注] 据《药性辨疑》云：“扁豆专表暑，故和中而止霍乱。”《本草再新》云：“荷叶清凉解暑，止渴生津，治泄痢，解火热。”白扁豆与荷叶都具清热解暑之力，故盛暑季节常食不仅有益健康，而且可防治暑热不适，如四肢乏力，咽干口渴、头昏脑胀、食欲不振等。

12. 饮杨梅酒预防中暑

[方 剂] 鲜杨梅500克，白糖80克。

[制用法] 将杨梅洗净，加白糖共装入瓷罐中捣烂，加盖（不密封，稍留空隙），7~10天自然发酵成酒。再用纱布绞汁，即成约12度的杨梅露酒，然后倒入锅内煮沸，待冷装瓶，密闭保存，时间愈久愈佳。夏季饮用最宜。

[功 效] 预防中暑。

[验 证] 本方在南方被广泛应用。

三十九、神经衰弱

神经衰弱涉及到祖国医学的“不寐”、“心悸”、“郁证”、“虚损”、“遗精”、“阳痿”等病证，是大脑皮质兴奋与抑制平衡失调引起的一种功能性疾病。临床所见，大致属功能减退一类病变反应，其证多虚。

中医认为，人的意识、思维、情志活动，皆属心肝所主，所以神经衰弱一证离不开心肝功能活动的衰退或亢进，多与脾肾有关。所以本病之起，多因思虑过度，劳伤心脾，使肾气亏损，情志不舒，肝气郁滞，肝肾阴虚，虚火上炎，房事不节，肾气不宁，脏腑失调，阳不交阴所致。

本病症状繁多，临床表现极为复杂，一般常见的有头痛、头晕，耳鸣眼花，疲劳气短，消化不良，失眠多梦，心悸健忘，焦虑不安，遗精阳痿，或月经不调以及一些不明的症状。

1. 安神补心汤（丸）治神性衰弱

[方 剂] 人参叶6克、五味子6克、石菖蒲10克、酸枣仁10克。

[加 减] 时有自汗或盗汗者加炙黄芪10克、煅牡蛎10克，以补气固表敛汗。

[制用法] 每天1剂，煎2遍和匀，早晚分服。或用10剂，研细末，炼蜜为丸，每粒10克，每服1粒，日2次。

[疗 效] 用于用脑过度，劳心伤神，心虚神烦而致眠差、健忘、时易心悸、动辄易惊者。

[验 证] 王××，男，45岁。干部。就诊日期：1979年5月15日。患者长期工作紧张，劳心伤神，故夜间心烦不眠。梦多易醒，白天头晕乏力。予本方治疗，2周后睡眠好转，4周后头晕消失，精神亦佳。

[备 注] 人参叶大补元气、安心神，有调节神经功能之效；五味子敛心神，健脑益智，有生津敛汗之功；石菖蒲宁心神，可治眠差、心悸、健忘；酸枣仁养心安神、敛汗、善治心烦不寐。注意生活规律，参加适当的体力劳动及活动，有助于神经功能的恢复及体质增强。

2. “延”字茯苓梅花银耳补心安神

[方 剂] 茯苓15克，银耳50克，鸽蛋20个，味精15克，料酒15克，鸡油15克，淀粉25克，盐少许。

- 〔制用法〕** 将茯苓研末成粉，对入 50~70 毫升水，在砂锅内熬煮 20 分钟，除去沉淀杂质待用。银耳用温水发好，洗净去根待用。鸽蛋洗净，批入抹好油的梅花模子内，同时将银耳镶在鸽蛋上，蒸 1~2 分钟取出放盘内待用。锅烧热放油，加入鸡汤、调料和煮好的茯苓汁液，滚几开后，勾芡并加鸡油，淋于银耳上即成。
- 〔功效〕** 补心安神，健脾除湿，利尿消肿，润肺补肾，生津止咳。适用于失眠健忘、头晕眼花、脾胃不合泄泻、肾炎水肿等。
- 〔验证〕** 《食品科技》1983 年第 11 期介绍，本方疗效显著。
- 〔备注〕** 本菜系听鹂馆寿膳堂滋补药膳之一。听鹂馆寿膳堂，原是为慈禧做寿的宴会处所。菜点要求既要精美，又要确有非常的营养和滋补功能，就连菜名也都带有延年益寿吉祥意味儿，诸如“万寿无疆”席、“延年益寿”席等。“延”字茯苓梅花银耳，就是“延年益寿”席中的一道菜。

3. 玫瑰花烤羊心补心安神

- 〔方剂〕** 鲜玫瑰花 50 克（干品 15 克），盐 50 克，羊心 500 克。
- 〔制用法〕** 先将玫瑰花放在小铝锅中，加入食盐和适量水煎煮 10 分钟，待冷备用。羊心洗净，切作块，用竹签串在一起后，蘸玫瑰盐水反复在火上烤，嫩烧即可。趁热食用。
- 〔功效〕** 养血安神。用治心血亏损所致惊悸失眠。
- 〔验证〕** 据《老年报》介绍，该方治疗神经衰弱具有很好的疗效。

4. 桂圆酒治神经衰弱

- 〔方剂〕** 桂圆肉 250 克，白酒（60 度）400 毫升。
- 〔制用法〕** 桂圆肉切碎，装入瓷瓶中，以酒浸泡 15~20 天。每日 2 次，每次服 10~20 毫升。
- 〔功效〕** 补心脾，治神衰。用治神经衰弱之失眠、健忘、心悸等。
- 〔验证〕** 据《老年报》介绍，该方治疗神经衰弱具有很好的疗效。

5. 猪肉怀山药治神衰

- 〔方剂〕** 瘦猪肉 50 克，山药 10 克，枸杞 10 克。
- 〔制用法〕** 共煮。饮汤，日服 1 次。
- 〔功效〕** 养血安神。
- 〔验证〕** 屡用效佳。

6. 虾壳枣仁汤治神经衰弱

- 〔方剂〕** 虾壳 25 克，酸枣仁 15 克，远志 15 克。

[制用法] 共煎汤。日服 1 剂。

[功效] 安神镇静。用治神经衰弱。

[验证] 据《老年报》介绍，该方在广大农村，基层工作中犹为实用。

7. 百合猪肉汤治神衰

[方剂] 百合 50 克，瘦猪肉 200 克，盐少许。

[制用法] 瘦猪肉切成小块，与百合加盐共煮烂熟，顿服。

[功效] 清热润肺，养血安神。

[验证] 屡用效佳。

四十、硬皮病

硬皮病是一种以皮肤胶原纤维硬化为特征的慢性局限性或泛发性皮肤结缔组织病。一般经过红肿、硬化及萎缩三个阶段，受累皮肤常与深部组织固着，不易移动，因而可造成面貌变形和相应器官的功能障碍。

中医称本病为“皮痹”、“血痹”等。其发病外因与风、寒、湿邪气有关，内因与脾肾阳虚、营卫气血不和有关。

1. 乌头桂枝汤治疗硬皮病

[方剂] 制川乌、制草乌、桂枝、防己、当归、桑寄生、牛膝、玄参各 9 克，羌活、独活各 4.5 克，秦艽、防风各 6 克，伸筋草、连翘、黄芪各 12 克，白芥子 1.5 克。

[加 减] 雷诺氏症明显者减玄参，加附子、丹参、白薇、贯众；咳嗽加麻黄、前胡、桔梗；尿蛋白阳性者加白术、黑豆、玉米须、薏苡仁根；肝脏损害者加黄芩、丹皮、香附。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂。

[功效] 有逐风寒湿之气，达正清源之功。

[验证] 胡××，女，36 岁。发病 4 年，曾多次住院，四肢关节活动受阻，不能动弹，近乎尸蜡，口仅能轻张。停用一切药物，改用上方。4 剂后自诉全身松动感，8 剂两手始能动，14 剂能坐起，40 剂能自行翻身，3 个月能料理自己生活。

四十一、下肢溃疡

下肢溃疡是发生于小腿下三分之一胫骨嵴两旁（腓部）肌肤之间的慢性溃疡，俗称“老烂脚”，现代医学称“小腿慢性溃疡”，其疮口凹陷，脓水淋漓，久不愈合，臭秽不堪，症属顽疾。多因久立负重，气陷血瘀，肌肤失养所致。

1. 止血定痛生肌散治下肢溃疡

〔方 剂〕 乳香、没药（去油）、龙骨各 10 克，血竭 6 克，七三丹 30 克，香白芷 8 克，冰片 3 克。

〔制用法〕 共研细末，罗筛，瓷器盛放。以棉签蘸之，均匀地洒于疮口之上，以覆盖疮面为度，2~3 日换药 1 次。换药时见黄褐色药末已化为灰白色脓液，无重腥臭为佳，中医称为“煨脓长肉”。以后脓液渐尽，肌肉红活，疮周见嫩红色上皮生长，平均每天可达 1.5 厘米。当疮面缩小至 1 平方厘米时，可 1 次结痂愈合。

〔疗 效〕 本方出自《伤科汇纂》。作者用以治疗溃疡经久不愈及手指外伤 25 例，收效显著。其中 17 例久溃不愈者，大多糜烂恶臭或脓水清稀，肌肉灰白不生，经长期清洁换药不效，改用本散外敷 2~3 次后，化脓腐肉脱尽，渐而肌肉红活，四周长皮，直至结痂收口，7 例指端外伤，起因均为切割、冲压，致手指末节断离或伴开放性骨折，经用本散外敷 2~6 次，疮口全部结痂愈合。随访结果，功能感觉均良好。

〔验 证〕 沈××，女，21 岁。住院号：9158。患者于 1986 年 11 月 30 日被电杆压伤，致右小腿开放性骨折，伴软组织挫裂伤。清创缝合后形成大片软组织坏死、溃烂，换药 1 月余，疮面仍恶臭，跟腱呈进行性坏死达 2/3。改用本散外敷 3 次后，肌肉红活，结合部分植皮而愈。

2. 枯矾猪甲膏治下肢溃疡

〔方 剂〕 取新鲜猪蹄甲放锅中炒黄研成粉，按枯矾 1 份，猪甲粉 3 份，海螵蛸粉 1 份，冰片少许。

〔制用法〕 诸药末和匀，装瓶备用。创面用双氧水清洗，去除脓性物；用麻油或蜂蜜将粉末调成糊状，均匀敷于创面上，外用纱布包扎。1 周后换药，此时可见新鲜肉芽组织，其后每 3 天换药 1 次，再后每天 1 次至痊愈。一般 5~10 次即可。首次敷药局部

可见疼痛，不需作其他处理。

[疗 效] 笔者用此方治下肢溃疡，多发于小腿下 1/3，踝上三寸内腓或外腓的地方，俗称“腓疮腿”，特点是溃疡面久而不敛，轻微损伤即能复发。治愈 16 例，均未复发。

[验 证] 病例 1：张×，男，52 岁，农民。于 1987 年夏天上山砍柴跌倒，右下肢内踝骨上三寸处被一石头撞破，口不大，流血不多。回家敷青草药，表面结痂，自以为无事。5 天后伤口出现 1 小溃烂脓疱，周围皮肤呈紫黑硬痛，经外用中西药，内服消炎抗菌药，并注射青霉素治疗年余，但创面反复，继续恶化，溃疡面积约 20×5 厘米，腐烂渗液，恶臭，边缘不整。经人介绍来我处就医，采用该法治疗 15 天痊愈（未用其他药物），至今未复发。

病例 2：冯××，55 岁，农民。患右下肢溃疡 18 年，经外用中西药治疗数次，未愈。1974 年经县医院手术治疗，仍不能治愈。现右下肢溃疡面积约 20×10 厘米，深达骨膜，边缘不整，创面腐烂，恶臭，周围皮肤变硬，呈紫黑色，经用“枯矾猪甲膏”治疗，换药 2 周痊愈。追访 6 个月未复发。

3. 化腐拔毒生肌膏治疮疡久不收口

[方 剂] 珍珠 5~6 粒（或用珍珠母代），琥珀、青黛各 3 克，冰片 0.5 克，黄丹 100 克，麻油 240 克。

[制用法] 将珍珠粒纳入豆腐内加水煎 2 小时，取出晒干研末。麻油用瓦罐煎至浓黑，将黄丹慢慢撒入油中，并不断搅拌，勿令沸出罐外，文火熬至滴水成珠，加入珍珠粉、琥珀、青黛、冰片粉，搅匀即成。按疮口大小，用纸摊膏，贴于疮口上，每天换药 1 次。

[功 效] 治疮疡有奇效。

[验 证] 陈××，女，20 岁，工人。1962 年患颈淋巴结核，到某医院治疗。患部破溃流脓血，伤口 1 年多不愈。用上药敷贴，20 多天即收口痊愈，至今 20 余年未复发。又如李××，右手拇指甲沟炎溃烂 3 个多月，几经治疗效不理想。后用上药治疗 10 多天即愈。

[备 注] 本方为家传验方，适用于疮疡溃后，脓血淋漓，久不收口的疮面。本方以珍珠为主药，可获祛腐生肌之奇效。为使体内毒气

能够尽泄，以琥珀散血解毒，青黛清热凉血解毒，冰片祛腐消肿止痛，黄丹解毒收敛生肌。诸药合用，共收活血化瘀、祛腐敛疮、拔毒生肌之功效。本方用于临床 50 余年，疗效肯定。

4. 溃疡散治溃疡

〔方 剂〕 茄子 100 克，地龙 25 克，猪头骨 30 克，侧柏叶 20 克，灯心草 15 克，冰片 10 克。

〔制用法〕 采收经霜打后的茄子（个小为佳品）切片晾干（如急用烘干也行）研细末。把地龙、侧柏叶去掉杂质洗净烤干，焙黄后研细末；将猪头骨放炉灶内煨透、灯心草直接用火烧成炭后共研细末；冰片用乳钵研细末。诸药末混搅均匀过筛后装瓶备用。用食油或蜂蜜调合涂溃疡处，也可直接将药粉撒敷患处，每天上药 2~3 次即可。

〔功 效〕 此散治疗 54 例溃疡（口腔溃疡 15 例、下肢溃疡 23 例、上肢溃疡 12 例、其他溃疡 4 例），临床疗效满意，尤其对口腔溃疡疗效明显。此外，对全身久治不愈的溃疡均有清热解毒，消肿止痛的功效。

〔验 证〕 刘××，男，55 岁，工人。患下肢皮肤溃疡 7 年，溃疡面为 3.5×2.2 厘米，四处求治无效。来院治疗，遂用文中方法，常规消毒，取药粉适量均匀撒于溃疡面上，包扎，每天更换 1 次，62 天治愈。

四十二、水火灼伤

烫烧伤，又称水火灼伤。是外科临床常见多发病，无论何时何地 and 男女老幼皆可发生。临床上，一般分为：“水烫、油烫、烧伤（火烫）”三大类。病性与水、油、水和烫伤面积大小，深浅有关。一般水烫较轻，油烫较重，火伤更重。若烫伤面积过大，过深和头面胸部受伤成为严重。若不及时处理，合理治疗，常可危及生命。

多因不小心或意外被沸水、沸油和烈火烫伤所致。

局部潮红疼痛，随之起水泡，甚则红肿及皮破肉烂。或皮焦肉卷，疼痛难忍，继则泡破溃烂，肉腐难脱。严重者还伴有全身症状，甚者毒火气攻心，多见神识昏迷。根据烫伤面积大小，深浅不同，一般分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度，或轻症、重症和极重症。

1. 鲜牛奶治灼伤

[方 剂] 鲜牛奶适量。

[制用法] 将消毒过的纱布浸于牛奶中。将纱布敷于伤口。

[功 效] 生津润燥。用治火灼致伤。

[验 证] 据国外报道，一妇女被火灼伤手臂，痛不可忍，遂将手入冷藏的牛奶里，其后医生观察，发现她的伤势意外地减轻了。此后，此方便在国外推广用于治疗火灼伤。

2. 猪蹄甲治烧烫伤

[方 剂] 猪蹄甲。

[制用法] 将蹄甲烧制成炭，研极细面，以香油混合成膏。将伤面用凉水洗净，局部涂敷。

[功 效] 解毒，收湿，敛疮。用治烧烫伤。

[验 证] 据《黑龙江中医药》1966年第6期介绍：王某，女，3岁，被炉盖烧伤手掌及五指并两侧膝盖部位，红肿疼痛，起水泡，当即消毒后刺破，涂布此膏，1周而愈。

3. 枯矾糊治水火烫伤

[方 剂] 枯矾适量。

[制用法] 将枯矾放入锅内熬至溶化不再冒气泡即成，待凝固再研为细末，装瓶盖封备用。用时根据伤面大小取适量枯矾末，加菜油少许，充分混匀调成糊状，涂敷患处，然后用消毒纱布覆盖包扎。2~3天换药1次。

[功 效] 清热解毒，燥湿收敛。用治水火烫伤，皮肤感染糜烂、溃疡。

[验 证] 据《四川中医》介绍，一般烧烫伤（有水疱者先刺破放液后敷药）及溃疡用药后2~3天即可结痂，1周左右可脱痂痊愈。典型病例：奚某，男，58岁。右手中指掌指关节腹侧、拇指第1节腹侧、食指第二节腹侧、鱼际及掌心等处患鸡眼年余，握物作痛，经削剖后敷药治疗，5天后鸡眼脱落，但局部感染，红肿疼痛加剧伴脓性分泌物，乃转西医治疗。用生理盐水，雷佛奴尔等处理后，急性炎症有所控制，红肿疼痛减轻，但创面有大量黄水样分泌物，潮湿，糜烂扩延，肉芽组织呈暗红色，边缘腐败坏死。后改用枯矾糊敷治，仅敷1次，次日创面已干燥，第三天创面结痂，1周即脱痂痊愈，且未遗留瘢痕。

4. 外用蘑菇粉治烫烧伤

[方 剂] 蘑菇适量。

[制用法] 蘑菇在砂锅内煨黑存性，研为细粉，以少许香油调拌均匀。用时将蘑菇粉敷于患处，每日2或3次。敷药后约30分钟痛止。

[功 效] 温经，止痛。用治烫伤、烧伤。

[验 证] 据《中医验方汇编》介绍：魏某，男，20岁，农民。被火烧伤胸、腹、足等处，伤口黄油样，有脓液，疼痛。用此方，唯有胸闷、心烦欲吐之症状，此火毒传里之候。用四顺清凉饮方加减，连服4剂而安。17日痊愈。

[备 注] 四顺清凉饮方：防风，栀子、连翘、当归、赤芍、羌活、葛根、木通、甘草各6克。便秘加大黄12克。

5. 肖氏系列方湿润疗法治疗烧伤

[方 剂] 桉叶清创液组成 云桉叶、白芷、川芎、千里光、了哥王根、当归、金银花等。

[制用法] 加水煎熬浓缩，弃渣过滤备用。用于烧伤创面清洗消毒。

[方 剂] 智奄烧伤灵Ⅰ号组成 金银花、山楂、黄柏、地榆、大青叶、云桉叶、三角风、柿木皮、蒲黄、山栀子、连翘、天花粉、生乳香、麝香、人指甲等。

[制用法] 入烤箱烘烤30分钟后共研细末，再以麻油、黄腊搅拌均匀，装瓶备用。用于烧伤初期的外敷。

[方 剂] 智奄烧伤灵Ⅱ号组成 丹皮、苦地胆、黄柏、黄芩、生地榆、金钱草、当归、蒲黄、千里光、三条筋、迷迭香、黄芪、盘龙参、乳香。

[制用法] 上药用小磨香油熬制80分钟，弃渣过滤，冷却后加入冰片、穿山甲、麝香、黄腊粉等（皆为细末），装瓶备用。用于烧伤中期正盛邪实时的外敷治疗。

[方 剂] 智奄烧伤灵Ⅲ号组成 白及、珍珠、象片、胎盘、当归、连翘、伸筋草、迷迭香、过山龙、南蛇藤。

[制用法] 烘干共研细末，用小磨香油搅拌成膏，装瓶备用。用于烧伤恢复期。

[功 效] 在1000例病人中，除2例中途转院外，其余998例全部治愈。轻度烧伤者，一般6~12天痊愈；中度烧伤者20~40天痊愈；重度、特重度烧伤者60~120天痊愈。

[验 证] 乔××，男，17岁，1988年4月26日因汽油箱爆炸烧伤转入我院。入院检查：体温38.2℃，呼吸27次/分，脉搏120次/分，血压10.4/6.7kPa。患者表情淡漠，反应迟钝，神志恍惚，脉细数；烧伤分布于头、面、四肢、躯干前后，总面积达88%，其中深Ⅱ°烧伤占73%，Ⅲ°烧伤占15%。烧伤部位创面呈暗黄色焦痂、无渗出，全身水肿严重。根据患者临床表现，以抢救休克为急，治疗措施如下：（1）特级护理。（2）给足液体、血浆、全血、糖盐等，补充血容量。（3）抗感染。（4）内服中药，方用生脉饮合清营汤化裁，另加独参汤。（5）外用清创液淋洗，敷以烧伤灵Ⅰ号。5月3日患者神志清醒，血压复常，脱离危险期。内服黄连解毒汤合增液汤加减，外敷烧伤灵Ⅱ号。5月28日，病情继续好转，创面愈合35%，颜面稍暗，创面Ⅲ°焦痂基本落脱液化，患者明显消瘦，体重下降，处以补中益气汤合四物汤化裁。6月16日，创面大部分愈合，只有小腿内侧约4.2%的面积未愈合，改用烧伤灵Ⅲ号调敷，嘱患者适当活动，加强功能锻炼。6月28日，肢体功能活动良好，步行出院。

6. 生姜汁治疗水火灼伤

[方 剂] 生姜。

[制用法] 将生姜捣烂揉汁，用药棉蘸姜汁涂于患处，能立即止痛；已起泡红肿者，能消炎退肿，消去水泡；水泡已破者，敷之亦无刺激。由于生姜能灭菌，故破口者亦不致溃烂。灼伤轻者，敷药1次即可；严重者可时时涂姜汁，保持湿润36小时，即可停药。

[功 效] 味辛性温，能解表散寒止咳，温中降逆止呕。历来视为温通要药，寒证效佳。但很少人知道生姜能治灼伤，疗效之奇，远较一般灼伤药为佳。

[验 证] 我用《新中医》1984年第2期“生姜汁治疗水火灼伤”一文的方法治一小儿，疗效确佳。小儿的双小腿被火灼伤，起数个水泡，疼痛不堪。用生姜汁涂患部，疼痛即减轻渐至消失，调治数天，痊愈迅速。

7. 萤火虫治火烫伤

[方 剂] 萤火虫50~100只，蜂蜜适量。

- 〔制用法〕** 将萤火虫置碗内捣烂，用蜂蜜调匀，用棉签沾以轻搽患处，干后再搽，连续搽6~7次，不须包扎，一般1~3天可愈，重者2周可愈。
- 〔功效〕** 本药最好在伤处未起泡时涂搽，涂后不起水泡。已起水泡者，将水泡刺破小孔排水后再涂，伤口切勿着冷水。
- 〔验证〕** 经多次临床使用，疗效奇佳。
- 〔备注〕** 泻火解毒，消炎止痛，保护创面，控制感染，防止局部渗液及促进患处早日生肌结痂的良好作用。

四十三、蛇、虫、兽咬伤

毒蛇虫咬（螫）伤，包括毒蛇、蚂蜂、蝎子、蜈蚣等，若人被其咬（螫）伤，可使毒素扩散于皮肤之内，引起局部肿胀，疼痛等症，甚则毒蛇咬伤，可引起毒气攻心，而导致死亡。

1. 白矾液治蛇咬伤

- 〔方剂〕** 白矾适量。
- 〔制用法〕** 将白矾放于热锅中溶化。趁热将白矾液滴于伤处。
- 〔功效〕** 清热解毒，消炎定痛。用治蛇咬伤。
- 〔验证〕** 据《肘后备急方》介绍：有二僧到邓州，为蛇咬伤，势甚危，教以烧刀头令赤，以白矾置刀上，成汁，热滴咬处立愈，后以此治愈者数十人。本方据此化裁。

2. 羊奶治蜘蛛咬伤

- 〔方剂〕** 鲜羊奶适量。
- 〔制用法〕** 煮沸。尽量饮用。
- 〔功效〕** 解毒，利尿，消肿。用治蜘蛛咬伤。
- 〔验证〕** 据《医心方》记载，一人被蜘蛛咬伤，腹大如妊，遍体生丝，有人教饮羊乳，遂愈。

3. 红薯叶治蜈蚣咬伤

- 〔方剂〕** 红薯叶。
- 〔制用法〕** 将红薯叶洗净，以滚开水烫软叶片。敷盖伤处，数次可愈。
- 〔功效〕** 解毒，利尿，医疮。用治蜈蚣咬伤。
- 〔验证〕** 据《中医杂志》1966年5号介绍：蜈蚣咬伤后，以小刀将伤口

刺破，挤出含毒素的血，再以米粒大的艾炷置伤口上，灸一壮，用以消毒。然后再按上述制法，将薯叶贴敷伤口。黄某，20岁，被蜈蚣咬伤，红肿疼痛，西药治疗无效，改用此方数次而愈。

4. 辣椒粉治狗咬伤

〔方 剂〕 成熟辣椒。

〔制用法〕 将辣椒晒干，研成细粉。撒于患处并包扎固定，每日换1次。

〔功 效〕 杀菌，消肿，止痛。用治狗咬伤。

〔验 证〕 据《黑龙江中医药》介绍，侯姓农民，男，45岁，被狗咬伤外踝上15厘米处，流血、疼痛，先用红汞药水消毒后，撒辣椒粉于敷料上，贴于伤口包扎，每日换药1次，5日伤口愈合。

5. 守宫方疗蝎蜂螫

〔方 剂〕 守宫（又名蝎虎、壁虎）1条，鸡蛋1个。

〔制用法〕 鸡蛋打一个孔，将全守宫塞入蛋内，然后将小孔封固，埋于阴凉土内（暑热天埋20厘米深），20天后取出备用。敷于患处，包扎固定。

〔功 效〕 消肿止痛。用治蝎、蜂螫伤。

〔验 证〕 据《本草纲目》载，守宫“疗蝎螫”，鸡蛋亦能解毒。临床治疗二十余例，均一次治愈。

6. 杏仁，雄黄治狗咬已溃

〔方 剂〕 杏仁、雄黄等份。

〔制用法〕 将鲜杏仁捣烂如泥，调入雄黄和匀。将伤口洗净，敷上药泥，包扎固定。

〔功 效〕 解毒，生肌。用治狗咬伤。

〔验 证〕 据《常见药用食物》介绍，某女左下肢被狗咬伤，多次治疗无效，伤口已溃，用此方换药2次，未及1周即愈。

7. 鲜桃树叶疗犬咬伤

〔方 剂〕 鲜桃树叶。

〔制用法〕 洗净，嚼烂成饼状。伤口未化脓者将药饼敷于伤口，1贴可愈。伤口化脓者切不可将药敷于伤口上，只宜敷在伤口周围，每日换药，直至痊愈。用药量视伤面大小而定。用药前应用盐水洗净伤口。

〔功效〕 解毒，敛疮。用治狗咬伤。

〔验证〕 此方为一老中医秘授，言只能鲜用，且必用口嚼。然冬秋无鲜叶可寻，加之桃树叶味极苦，口嚼刺激性极强。笔者夏季采鲜叶，焙干研末，装瓶密封，用时以米水调之，治疗3例，疗效亦佳。

8. 疥蛤蟆治狂犬咬伤

〔方剂〕 疥蛤蟆（癞蛤子、蟾蜍）2或3个。

〔制用法〕 煮熟食肉。

〔功效〕 清热行湿，解毒消炎。用治狂犬咬伤。

〔验证〕 刘×，男，28岁，被狂犬所伤，用上方治愈。

〔备注〕 《类说》引《北户录》云：“张畅之弟，为狂犬（疯狗）咬伤，医劝其煮食暇蟆，果愈。”

9. 蓍草治腹蛇咬伤

〔方剂〕 蓍草（别名：千条蜈蚣、花牡丹、飞天蜈蚣）60~120克。

〔制用法〕 先扩创排毒，伤口周围皮肤用酒精消毒后，以牙痕为中心作纵形切开，一般深约0.2~0.3厘米，拔火吸毒。然后，用0.1%高锰酸溶液反复冲洗，一边冲洗，一边用双手从近心端向远心端，从四周向远心端，从四周向伤口方向挤压排毒约10~15分钟。再将蓍草洗净，捣汁冲服，每日1剂，分2次服；或用蓍草干品30~60克，每日1剂，水煎服。重症患者，每日可服2剂。同时，外敷蓍草；取蓍草适量，嚼烂或捣烂，将药渣敷于伤口周围，每日换药1~4次。伤口溃烂，有腐肉者，以破毒散敷于溃烂处，待腐脱新生，改用生肌散。

〔验证〕 用上药治疗蝮蛇咬伤患者106例，均获治愈。平均治愈时间5.4天。

10. 蜗牛治毒虫咬伤

〔方剂〕 蜗牛适量。

〔制用法〕 先将被蜂、蝎螫伤或毒虫咬伤处毒汁挤出后，立即取活蜗牛2~3个捣烂，敷于受伤部位。

〔验证〕 用上药治疗蜂、蝎螫伤及毒虫咬伤患者19例，一般敷后10分钟痛止，次日红肿随之消退。

四十四、痈、疽、疗、疔

痈疽，所指范围很广，中医根据发病部位不同又有不同的命名。是外科常见多发病。

原因虽多，不外乎是热毒所致。又因人的体质不同，若邪从寒化，又多寒湿为患，但总因素体阳虚所致。

局部红、肿、热、痛。继而化脓溃破，或流黄稠脓，或淡黄水或清稀脓液等。大抵红肿热痛，脓色黄稠者为阳、为痈；肿痛而不红不热、脓色淡黄或清稀者为阴、为疽。且又多相互转化，故痈证中也有虚寒，疽证中又有热毒，或本虚标实之证。

1. 豆蛋糊疗痈疽

〔方 剂〕 绿豆、鸡蛋清各适量。

〔制用法〕 绿豆反复碾碎，过箩取极细粉末，与鸡蛋清调和均匀。敷贴于患处，每日2次。

〔功 效〕 清热解毒，祛瘀通络，消肿止痛。用于治疗各种痈疽之红肿疼痛。

〔验 证〕 据《新中医》1977年第1期介绍：某患者，男，七十余岁。患背痛，注射青、链霉素，外敷四环素药膏，治疗十余天无效，红肿高大益甚，经敷用此方，当晚疼痛锐减，次日继敷用2次，红肿大部分消失，只有微痛，……后痂落而愈。

2. 柳叶膏疗诸肿毒

〔方 剂〕 鲜柳树叶或嫩芽。

〔制用法〕 将采集的鲜柳树叶或嫩芽用水洗净，加水适量浸煮，2~4小时后过滤，如此浸煮2次，合并2次滤液，浓缩成膏状，即可装入瓶中密封备用。使用时将患处用医用酒精消毒，涂敷柳叶膏，然后用纱布包扎固定，每天换药1次。

〔功 效〕 退热，杀菌，消肿，止痛，提脓，生肌。外敷疗疔疮疖肿及外伤感染诸疾。

〔验 证〕 据《赤脚医生杂志》介绍，用此法观察治疗30例，疗效较好。轻者1次，重者2~5次即愈。典型病例：某男，20岁。颈部患疔肿，反复发作缠绵不愈，曾服长效磺胺，肌注青霉素，皆无明显效果，经敷此方3次即愈。

3. 豆腐渣治疮口久不愈合

[方 剂] 豆腐渣。

[制用法] 豆腐渣是做豆腐剩下的渣滓。外敷患处。

[功 效] 清凉，消炎，止血。用治疮口久不愈合。

[验 证] 据《江苏中医》1986年第4期介绍，一妇女，48岁，乳痈如碗口大，医治5个月不收口，经用本方20天而愈。

4. 米醋治外科炎症

[方 剂] 米醋250毫升，乳香末、没药末各6克，淀粉60克，厚牛皮纸适量。

[制用法] 将米醋放于砂锅内煮沸，再将二味中药放入搅匀，随搅随下淀粉，待成糊状后便倒在牛皮纸上涂抹。糊的厚度约1.5厘米，面积要大于患部。待药糊稍凉时趁温热敷于病变部位，用纱布包扎固定。

[功 效] 消瘀解毒。用治疔、痈、蜂窝织炎、丹毒、疔腮、乳腺炎等急性外科炎症。

[验 证] 据《山东医刊》介绍，用此方治疗50例，除5例（系寒性脓肿、喉头结核及骨髓炎）无效外，一般敷药后2小时疼痛减轻，6小时后开始消肿，3~10天均获治愈。

5. 蒲公英糊剂治蛇头疔

[方 剂] 干蒲公英适量，甘油、75%酒精（比例1：3）适量。

[制用法] 干蒲公英研为细末与甘油、75%酒精调成糊状，装瓶密封备用。使用时将药糊摊于纱布上，敷于患处固定。每日换药1次。

[功 效] 清热解毒，消肿散结。主治蛇头疔。

[验 证] 据《河北中医》1984年第4期载，赵××，女，20岁，右侧食指化脓性指头炎（俗称蛇头疔），局部青紫发热剧痛，给予蒲公英糊剂外敷，当日肿痛减轻，2日后肿消痛止，4日后创面干燥而愈。

[备 注] 对已溃破的创面，将糊剂敷于四周，留下中间，以利脓液引流。

6. 乌梅散疗臂疽

[方 剂] 乌梅肉。

- [制用法] 乌梅肉烧存性，研为细末。敷于患处，胶布固定。
- [功效] 收敛，止血，生肌。
- [验证] 马××，男，29岁，用上方症状消失。
- [备注] 《简便方》云：“臂起一疽，脓疡百日方愈，中有恶肉突起，如蚕豆大，月余不消，医治不效，因阅本草得此方，试之，一日夜去其大半，再上一日而平。”可见乌梅治臂疽确有疗效。

7. 绿豆陈醋膏治臁疮

- [方剂] 绿豆60克，老陈醋适量。
- [制用法] 绿豆用文火略炒，研末，用陈醋调成糊状。敷于患处，3天换药1次。药膏在用时调配，不能久存，以免影响效力。一般敷药10周可愈。
- [功效] 清热解毒，收敛愈合，用治臁疮（即小腿溃疡）。
- [验证] 肖×，女，32岁，经用上方疾患消除。
- [备注] 臁疮是生在胫部内腓或外腓的溃疡。疮口深陷，肉色暗红或紫黑，边缘高，有时足及小腿浮肿。

8. 鲫鱼肉治恶疮乳癌

- [方剂] 大尖鲫鱼。
- [制用法] 将鱼宰杀后，去刺，只取鲜鱼肉加盐少许，捣成烂泥。敷于患处，每3~4小时更换1次。
- [功效] 解毒生肌。用治一切恶疮、乳癌及臁疮等。
- [验证] 经多次临床应用，治疗20例，18例痊愈。
- [备注] 小鲫鱼200克，香油500克，黄醋适量。先将香油放于锅内烧沸，然后放入小鲫鱼，熬至鱼枯后，去渣过滤，加入黄醋，待溶化后离火，冷凝即成软膏。将鲫鱼膏涂在布上敷贴患处，每日更换1次。功效同上。

9. 马勃疗褥疮

- [方剂] 马勃数枚。
- [制用法] 马勃去外皮，切成薄片，经高压灭菌。置于疮面上，再用纱布覆盖，胶布固定，每日换药1次。
- [功效] 清热解毒，消炎止血。用治褥疮、臁疮等。
- [验证] 据《四川中医》1986年第6期介绍，某女，59岁，因患蛛网膜下腔出血卧床不起达月余，左侧臀部发生3厘米×4厘米褥疮

一块，经用此方治疗，2天疮面即干燥结痂，1周疮面完全愈合。

10. 陈小麦粉治疗疮痈疽

〔方 剂〕 陈小麦1公斤，醋适量。

〔制用法〕 将陈小麦加水浸泡（夏季2天，冬季7天），捣烂，过滤，去渣。静置沉淀后，去上清液，将沉淀物晒干（成小粉浆），放锅内小火炒。炒时会翻泡，要不断搅动，待至焦黄成块状时取出，隔纸放地上，冷却，研成细末，过筛，装瓶备用。用时取干粉加醋，调成软膏（500克约需食醋240毫升）。外敷患处。

〔功 效〕 清热解毒，消肿排脓。用治疔肿、痈、蜂窝织炎、流行性腮腺炎、带状疱疹、急性乳腺炎、丹毒、外伤感染等具红肿热痛的外科疾病。

〔验 证〕 据《健康报》推荐反映效果极佳。

〔备 注〕 软膏在夏季易发霉变质，最好当日调用，以免日久醋酸挥发，影响疗效。敷药范围需大于病灶面。未破，敷肿痛处；有脓肿未出头或已出头者，应在中间留一孔，以便排脓。

11. 五倍子治疔肿

〔方 剂〕 五倍子适量。

〔制用法〕 将上药焙干研粉，加入适量的香油搅拌成糊状，敷在痛的表面，盖上纱布，胶布固定。

〔验 证〕 用上药治疗痈（多头疔肿）患者近100例，未配用任何抗生素和止痛药，一般敷药1~2次即获痊愈。对未发脓的痈或疔头刚破者，疗效确切，用得越早，效果越好。

12. 黄连轻粉外敷治疔肿

〔方 剂〕 黄连、轻粉各50克，蜈蚣1条，75%酒精200ml。

〔制用法〕 将黄连、轻粉、蜈蚣加入酒精中，密封浸泡1周后备用。用时，将患处洗净后涂此药液，每日2~3次。

〔验 证〕 用上药治疗无名肿毒、疔肿患者60余例，都有明显效果。一般1~3次可见痛减肿消，4~6次即可获得痊愈。

13. 蒲公英治疔肿

〔方 剂〕 干蒲公英适量。

〔制用法〕 将上药研为细末，用75%酒精调成糊状，外敷局部，然后包

扎，每日换药 1 次。对已破溃的创面敷四周，中间留一小孔洞，以利引流。

[验 证] 用上药治疗多发性疖肿患者 45 例，其中，局部红肿者 30 例，破溃化脓者 15 例，均在 2~4 天肿痛止，脓血排出而获痊愈。

14. 蛇皮金蝎治疖肿

[方 剂] 蛇皮 1 张，全蝎 2 个，蜂房 10 个。

[制用法] 将上药浸泡于 300ml 食醋中，24 小时后即可使用。时间长些则更好。药液用完后可再加醋 1 次。用棉花或纱布蘸药液后敷患处，用绷带胶布固定，每日 2 次。

[验 证] 用上药治疗疖肿、毛囊炎、多发性疖肿，蜂窝组织炎等患者共计 35 例，其中 1~3 天痊愈者 21 例；4~5 天痊愈者 12 例；8~14 天痊愈者 2 例。

15. 藤黄马钱子等治疖肿

[方 剂] 藤黄 10 克，马钱子、龙脑（冰片）各 6 克，新鲜猪胆汁 100 克。

[制用法] 将马钱子用砂拌炒软，去毛，研成粉末。然后将藤黄、龙脑分别研成粉末。将上药掺在猪胆汁中备用。用时，以棉签或小毛刷蘸药汁涂在疖肿上，涂药范围要比红肿的范围大 0.35 厘米，每日涂 2~3 次。涂后需保持 24 小时以上，保留的时间短，效果较差。重复涂药时，前次药液不要洗掉。

[验 证] 治疗 108 例（多发性疖肿患者 61 例，单发性疖肿患者 39 例，外伤合并感染患者 8 例），其中，有 18 例伴有发热等全身症状者，加用抗生素或中草药外，其余均在涂药后 2~4 天痊愈。疖肿初期，涂本药后多自行消退；就诊较晚者，涂药后周围红肿很快缩小，中央化脓溃破，溃破后用药 1~3 次痊愈。涂药 4 小时后，多数患者疼痛明显减轻，在临床应用本药外涂，未发现任何副作用。

16. 黄甘草粉外敷治疖肿

[方 剂] 川黄连、黄芩、川黄柏各 200 克，生大黄、蒲黄、姜黄各 150 克，生甘草 100 克。

[制用法] 将上药共研为细末，装入瓶内密封备用。用时，取上药粉适量，用 70%~75% 酒精调匀外敷局部，每日换药 1~2 次，至

红、肿、热、痛消失为止。

〔验证〕 用本方治疗疖肿患者 138 例，经用药 2~5 天，均获治愈。

17. 芙蓉花等治疖肿

〔方 剂〕 芙蓉花 200 克，蒲公英、川黄连各 100 克，蜂蜜 500 克，冰片 15 克。

〔制用法〕 将前三味药研为极细末，加入蜂蜜内搅拌均匀，用高压消毒后，趁热加入冰片后密封备用。用时，以此膏外涂患处。如已成脓者，其中央露头。不令其干，干则更换，可外覆盖薄敷料。

〔验证〕 用本方治疗疖肿患者 259 例，经用药 3~6 天后，均获痊愈。

四十五、破 伤 风

破伤风，又称“金疮痉”，多因皮肤破伤处受邪（破伤风杆菌）所致。临床表现以面唇青紫，颜面肌肉阵发性痉挛，苦笑面容，角弓反张，牙关紧闭，舌强流涎，甚而呼吸困难，痰鸣，窒息等为特征。

1. 老葱白治疗破伤风

〔方 剂〕 老葱白（连须，去叶不去皮）500 克，黑扁豆 45 克，棉子 90 克，高粱原酒 75 克。

〔制用法〕 ①棉子炒焦至酱紫色，碾碎，过筛去壳。②葱白加水四五碗，煎成汤。③酒温热。④黑扁豆放大铁勺内炒，先冒白烟，后冒青烟至 90% 炒焦时离火。⑤把温酒倒入铁勺，过滤，留酱紫色酒液。把棉子粉与酱紫色酒液混合，加适量葱汤搅如稀饭样，灌服，服后盖被发汗。连服 2 天。

〔功 效〕 发表，通阳，解毒。用治破伤风。

〔验证〕 据《食物疗法精萃》转载《全国中草药新医疗法展览会技术资料选编》介绍，用本方共治 62 例，有效 56 例，多数服 1 剂见效。

〔备 注〕 服药期间忌食腥冷食物。

2. 棉子黑豆妙治破伤风

〔方 剂〕 果实饱满的棉子 150 克，马料豆（即黑豆）75 克，老葱白（连须弃叶不去皮）500 克，高粱原酒 150 克（量可根据病人酒量

而定，若病人酒量大，可多增加些，不会饮酒者 125 克)。

〔制用法〕 将棉子炒焦至酱紫色，研碎过箩成细面。葱加水四五碗，熬成三碗。将酒温热。把马料豆放入铁锅用火炒，先是冒白烟，后冒青烟，至大冒青烟时（黑豆约 90% 已炒糊）离火。然后把温酒倒入铁锅内，待豆子不发出响声时过滤，留酱紫色液体。把棉子粉和马料豆液放在一起，加入适量葱汤，如同稀粥一样。服下，连服 1~2 天。热天服后盖一个被单，冬天服后盖上棉被，使汗出透。

〔功效〕 清热解毒，活血消肿，通阳利尿。用治破伤风。

〔验证〕 据《老年报》介绍，此方系安徽利辛县焦家伦同志提供的秘方，经用此方治疗 63 名破伤风患者，96.8% 治愈，一般患者服用 1 剂可愈，重者需连用 2 剂。

〔备注〕 治疗期间应忌腥冷食物，病人需静卧休息。

3. 鸡矢白治破伤风

〔方剂〕 鸡矢白（白鸡屎）3~9 克。

〔制用法〕 以烧酒冲服。

〔功效〕 治破伤风。

〔验证〕 据《中医杂志》1962 年 10 期及《食物疗法精萃》介绍：某患者因伐木被树枝刺破手背，2~3 日后伤口愈合，但出现发热、口噤、牙关紧闭、全身痉挛、面呈苦笑状，急予本品 9 克，烧酒冲服汗出而愈。另 2 例均因碰伤指头，出现破伤风症状，用本品 3 克，酒送服取汗而愈。

4. 鱼鳔散治破伤风

〔方剂〕 鱼鳔胶 10~15 克，黄酒 120 克。

〔制用法〕 将鱼鳔胶用线捆扎数周，用草燃烧，烧焦后，放土地上晾干，研末。用黄酒煎开冲服，见汗即愈。

〔功效〕 祛风邪，消肿毒。用治破伤风。

〔验证〕 据《中医实用效方》介绍治疗病例：赵某，男，40 岁。因足碰伤致痉挛抽搐，不能行动，手足不遂，曾去两家医院均不收治，后用上方 4 剂痊愈。

5. 蜈蚣等治破伤风

〔方剂〕 蜈蚣 1 条，全蝎、南星、天麻、白芷、防风各 3 克，鸡矢白

(焙干、研末，冲服)、羌活各 6 克。

〔制用法〕 先煎诸药去渣，放入鸡矢白末，加黄酒 1 杯，分 3 次口服，上药为 1 日剂量。必要时成人也可加倍服用，对牙关紧闭不能咽下的患者，可做保留灌肠。亦可收到同样的效果。

〔验证〕 用上药治疗破伤风患者 5 例，其中痊愈 4 例，1 例因病情急，来院迟，不能服药，于数小时内死亡。

〔备注〕 鸡矢白即鸡粪中之灰白色部分。

6. 蝉蜕、僵蚕等治破伤风

〔方剂〕 蝉蜕、僵蚕各 9 克，全蝎，地龙各 3 克，蜈蚣 1 只。

〔制用法〕 将上药用火微焙，共研极细粉末，贮瓶备用。新生儿破伤风于开始时好哭、烦躁，鼻头和人中呈现黄色，渐下颌强直，不能张口，吮乳困难。此时用上药末 3 克，开水调匀，慢慢喂服。如出现唇口收缩、舌体强硬、牙关紧闭、口吐白沫、啼声不出、吞咽困难、口及面不断抽搐，呈苦笑面容，此时将上药末 3 克，用开水 60ml 化匀，分 3 次鼻饲，每 1~2 小时 1 次日鼻饲 9 克。如面唇青紫、颈项强直、角弓反张、四肢抽频繁、呼吸气促，这是严重危险征象，即用上方水煎 2 次，过滤，约 180ml，每 1 小时鼻饲 30ml，每次鼻饲加犀角 0.3 克，1 次鼻饲完。继用 2 剂，方法同上，如痉挛已缓，每 2 小时鼻饲完。如痉挛未缓，如能积极抢救，可获治愈。

〔验证〕 笔者采用上方治愈 100 多例新生儿破伤风患者，效果极佳。

7. 蝉蜕、防风等治破伤风

〔方剂〕 蝉蜕 20 克，防风、全蝎、蜈蚣、僵蚕、钩藤各 15 克，竹黄、胆南星、大辰砂各 7 克，苯巴比妥 0.1 克×10 片。

〔制用法〕 将上药共研为极细末。装入瓶内备用。成人 6 克，小儿 0.7~3 克。每日分早、中、晚 3 次口服。

〔验证〕 用本方治疗破伤风患者 15 例，一般服药 6~8 天即可获痊愈。

8. 地龙、蝉衣等治破伤风

〔方剂〕 地龙、蝉衣、天麻、羌活、防风、荆芥、胆南星各 9 克，钩藤、赤芍、明矾各 10 克，蜈蚣、全虫各 5 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，过 120 目筛后，装入干净瓶内备用。用时，以凉开水冲服。每日 2~3 次。3 天为 1 个疗程，直至痊愈

为止。

〔验证〕 用本方治疗破伤风患者 24 例，服药 2~3 个疗程后，均获治愈。

9. 蜈蚣、全虫等治破伤风

〔方剂〕 蜈蚣 3 克，全虫、防风、胆南星、白芷、天麻、钩藤各 5 克，羌活 8 克，丹皮 10 克，鸡矢白末 6 克（成人可加量）。黄酒适量。

〔制用法〕 将前 9 味药水煎 2 次后，去渣，加入鸡矢白、黄酒，搅拌均匀后，分早、中、晚 3 次口服。本方药为 1 日剂量。如患者牙关紧闭，不能咽下，可保留灌肠。小儿可随年增减用量。

〔验证〕 用本方治疗破伤风患者 13 例，效果显著。一般用药 3~5 剂均获痊愈。

10. 蒲公英、金银花等治破伤风

〔方剂〕 蒲公英、金银花、当归、败酱草各 30 克，连翘 20 克，僵蚕、钩藤、防风、川芎、羌活各 15 克，红花、桃仁、全蝎各 10 克，栀子 12 克，蜈蚣 3 条。

〔加 减〕 若大便秘结者，加生大黄（后下）、火麻仁各 10 克；若兼有痰盛者，加天竺黄 15 克，

〔制用法〕 上药水煎 3 次后合并药液，分早、中、晚 3 次口服，每日 1 剂。

〔验证〕 用本方治疗破伤风患者 6 例，经服药 5~7 剂，均获治愈。

11. 丹皮、赤芍等治破伤风

〔方剂〕 丹皮、赤芍、麦门冬、茯神、胆南星、钩藤、羌活、防风各 10 克，薄荷叶、陈皮、当归、全蝎各 6 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，分 3~4 次口服。3 剂 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗破伤风患者 18 例，经用药 1~2 个疗程治愈者 10 例，3~4 个疗程治愈者 8 例。治程中未见不良反应

四十六、脑 震 荡

脑震荡后遗症，多因跌坠，撞击颅脑受伤 3 个月后仍后遗头痛、头晕、失眠、健忘，或耳鸣、目眩等一群综合征。且无颅脑器质性损伤。在临床上较为常见。

1. 乌龟头黄瓜子治脑震荡

〔方剂〕 乌龟头 1 个，黄瓜子 9 克，黄酒适量。

〔制用法〕 将乌龟头用干燥箱干燥，黄瓜子晒干，同研为细末。分3次服，黄酒送下。5个乌龟头为1剂，轻症服2剂后，症状消失；重症服4剂后，病情减轻，连服五六剂可愈。

〔功效〕 安神定志。用治脑震荡后遗症，症见头昏、头痛、健忘、失眠、注意力涣散等。

〔验证〕 据《家庭医生》杂志介绍，效果奇佳。

2. 猪脑天麻枸杞治脑震荡后遗症

〔方剂〕 猪脑1具，天麻15克（切片），枸杞子25克。

〔制用法〕 猪脑去筋膜，洗净，同天麻、枸杞子共放入碗内，加水少许蒸熟。吃脑饮汤。

〔功效〕 养血，祛风，安神。用治脑震荡后遗症。

〔验证〕 牛×，女，43岁，用上方脑震荡后遗症消失。

3. 丹参、当归等治脑震荡

〔方剂〕 丹参、当归、赤芍、淮牛膝各25克，川芎、石菖蒲、钩藤、白芷各10克；生龙骨、生牡蛎各20克，红花、桃仁、薄荷各8克，生甘草6克。

〔加 减〕 若头痛剧烈者，加田三七末5克（冲服）；若烦躁易怒者，加栀子、珍珠母各10克；若夜不能寐者，加柏子、远志、酸枣仁各10克；若胸闷呕恶者，加法半夏、桔梗、苏叶各10克；若瘀血日久，疼痛仍甚者，加水蛭、蜈蚣、全虫各6克。

〔制用法〕 每日1剂，水煎分3次服。

〔验证〕 用此方治疗脑震荡患者38例，其中，治愈者（症状消失，未留后遗症者）34例；好转者（症状显著减轻，仍偶感有头晕或头痛）3例；无效者（治疗前后无变化）1例。

4. 当归防风等治脑震荡

〔方剂〕 全当归、防风、羌活各20克，制南星、全蝎、桃仁、红花、川芎、蔓荆子、钩藤各15克，槟榔、琥珀、三七各6克。

〔制用法〕 每日1剂，水煎分早、中、晚3次服。5剂为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗脑震荡患者79例，经用药1~3个疗程后，其中，治愈者76例；显效者2例，无效者1例。

5. 丹参、红花等治脑震荡

〔方剂〕 丹参30~45克，红花6克，茯神、骨碎补、续断、白菊花各12

克，钩藤（后下）18克，甘草、三七（冲）各3克。

〔加 减〕 若头痛甚者，加血竭、元胡，或加地龙、蜈蚣；若头晕甚者，加生石决明、蒺藜；若耳鸣者，加磁石；若失眠甚者，加珍珠母、酸枣仁、生龙齿等；若神志恍惚者，加琥珀、生钱落、朱砂（冲）；若恶心呕吐者，加代赭石、麦芽等。

〔制用法〕 将上药水煎，每日1剂，分2次服。

〔验 证〕 用上药治疗脑震荡后遗症患者16例，其中，症状全部消失者11例；症状减轻者4例；无效者1例。

6. 当归尾、钩藤等治脑震荡

〔方 剂〕 当归尾15克，钩藤、丹参、川续断、狗脊、威灵仙各20克，何首乌、天麻、桂枝各10克，蜈蚣、穿山甲各12克，白芍25克，生甘草9克。

〔制用法〕 将上药水煎3次后合并药液，分早、中、晚3次口服，每日1剂。1周为1个疗程，直至痊愈为止。

〔验 证〕 用本方治疗脑震荡后遗症者145例，其中，治愈者138例；显效者4例，有效者2例；无效者1例。治愈的138例中，用药1个疗程治愈者45例，2个疗程治愈者33例，3个疗程治愈者40例，4个疗程治愈者20例。

四十七、丹 毒

丹毒乃受毒性极强之链球菌所引起的疾病，其伤口若受感染，则皮肤呈现红赤，如丹涂脂染，故名丹毒。丹毒生于头部的，多由于风热时毒之气所生，叫抱头火丹或大头瘟；生于胫踝足部者，多由湿火下注所致，称为流火；游行于全身的则多发于婴儿，是由胎火所致，称为赤游丹毒。

1. 油菜治成人丹毒

〔方 剂〕 油菜适量。

〔制用法〕 外敷法：将油菜洗净，捣烂为泥敷于患处，每日更换2或3次。同时以内服法调治：把油菜洗净捣烂，用纱布挤取汁，稍温热。每次饮30毫升，每日3次。

〔功 效〕 散血，消肿。用治成年人丹毒。

〔验 证〕 据多名患者反映，用上方有奇效。

2. 油菜叶治风游丹毒

[方 剂] 油菜叶（芸苔叶）。

[制用法] 取叶捣烂。敷患处，每日换药2或3次。

[功 效] 行瘀散血，消肿解毒。用治风游丹毒。

[验 证] 据《本草纲目》介绍，“思邈曰：贞观七年三月，予在内江县饮多，至夜觉四肢骨肉疼痛。至晓头痛，额角起丹如弹丸，肿痛。至午通肿，目不能开，经日几毙。予思本草芸苔治风游丹肿，遂取叶捣敷，随手即消……”又据《罗氏会约医镜》介绍，此方亦治乳痈丹毒，其效如神。

3. 鲫鱼肉赤豆粉治丹毒

[方 剂] 鲫鱼肉、赤小豆粉各适量。

[制用法] 将鲜鱼肉捣烂，同赤豆粉调匀，加水之和。敷于患处，每日2或3次。

[功 效] 清热，解毒，祛湿。用治小儿丹毒。

[验 证] 屡用效佳。

4. 青鱼胆干粉治丹毒

[方 剂] 青鱼胆、青黛等份，香油少许。

[制用法] 将青鱼胆晒干，同青黛共研细，以香油调匀。涂于患处，每日2次或3次。

[功 效] 清热解毒。治丹毒、腮腺炎。

[验 证] 据《新中医》介绍，该方治疗丹毒疗效良好。

四十八、脉 管 炎

血栓闭塞性脉管炎是一种慢性全身性血管疾患，多发生于青壮年，以男性为多，是一种动静脉的周期性、节段性炎症病变。属中医“脱疽”范畴。临床表现以下肢肢端疼痛或间歇性跛行，足背动脉搏动减弱或消失，足趾持续变冷，皮肤苍白或青紫，甚至出现干性坏疽为主要表现。

1. 蜗牛泥治脉管炎

[方 剂] 活蜗牛。

[制用法] 将活蜗牛洗净，连同壳捣烂如泥状。敷于溃烂面上，以湿纱布盖之，每日换药1次。

[功效] 通经活络，祛腐生肌。用治血栓闭塞性脉管炎。

[验证] 据《陕西中医药》载：某男患此症，见患肢踝关节以下红肿发紫，足背前 2/3 呈紫黑色，四趾脱落，疮口紫暗，中趾肉腐，烂筋见骨，溃疡面 5 厘米×6 厘米，奇臭。小腿亦肿，无肿处肌肉明显萎缩。足背动脉、胫后动脉、腘动脉均未触及搏动，全身消瘦，面色苍白。医院曾建议截肢，后用此法，敷后半日，疼痛逐渐减轻，只觉局部有收引牵拉样轻痛及痒感。隔日换药 1 次，共敷 6 次，疼痛消失，腐肉全部脱落。肉芽新生，嫩皮渐长，未溃处肿消，肤色逐渐正常。半月后溃疡愈合，行走不需拐杖。3 个月后双下肢粗细相等，动脉恢复搏动，行走无跛行，体质恢复。至今已 4 年未发。

2. 蟾蜍丸治血管闭塞性脉管炎

[方剂] 蟾蜍（蛤蛤蟆）。

[制用法] 活蟾蜍去肠杂洗净，入锅煮烂去骨，和面粉做成丸药。不拘分量，可随时服用。

[功效] 清热行湿，解毒杀虫。用治血管闭塞性脉管炎。

[验证] 据《江苏中医》1960 年第 12 期载，某男，40 岁，患此病经多方医治无效，后用此方，1 个月后病势顿减，2 个月后疼痛全除，服至 3 个月后，溃破之小趾脱落 1 节而收口痊愈。

3. 鹿角胶疗脉管炎

[方剂] 鹿角胶（鹿角煎熬浓而成的胶物）15 克，熟地 50 克，肉桂 5 克，麻黄 2 克，白芥子 10 克，姜炭 2 克，生甘草 5 克。

[制用法] 水煎服。每日 1 剂。

[功效] 补肾虚，强骨髓。用治血管闭塞性脉管炎、阴疽。

[验证] 据《新中医》介绍，本方疗效良好。

四十九、疝 气

现代医学认为，疝气是由腹腔内脏器连同腹膜壁层，经腹壁薄弱区或孔隙，向体表突出所形成；中医所称之“疝”，除包括上述疾病外，还包括部分以疼痛为主要表现的睾丸、阴囊的疾病。

1. 姜汁治疝气

[方剂] 鲜生姜适量。

〔制用法〕 鲜姜洗净，捣烂绞取其汁，去渣，将汁贮于碗中。阴囊浸入姜汁内片刻即成。

〔功效〕 解肌散寒。用治疝气。

〔验证〕 据《中国医学大辞典》介绍：某君患疝气多年，病发时卧床数日，经用此方浸泡阴囊，囊际微觉若针刺，即渐收缩，小如常人，黄汁悉从毛孔吸入无余，数年无患，由此永告脱离矣。

2. 向日葵秆汤治肠疝

〔方剂〕 向日葵秆（陈年者更佳）1棵，红糖适量。

〔制用法〕 将向日葵秆去皮，取内白心，切碎，加水煎熬。每次饮1碗，红糖冲服。

〔功效〕 利尿通淋。用于治疗小肠疝。

3. 红皮蒜治疗疝气疼痛

〔方剂〕 红皮蒜2头，柑核50克，金橘2个，白糖50克。

〔制用法〕 蒜去皮，同其他三味用水两碗，煮成一碗。顿服。

〔功效〕 消肿，止痛。

〔验证〕 上述2方经《老年报》推广应用确有良效。

4. 荔枝核疗法治疝气痛

〔方剂〕 荔枝核、大茴香等份，黄酒适量。

〔制用法〕 将荔枝核炒黑，大茴香炒焦，捣碎，研末。每服5克，以温酒送下。

〔功效〕 解郁止痛。用治小肠疝气致阴囊肿胀、偏坠、疼痛。

〔验证〕 本方在群众中广泛流传。

5. 荞麦川乌胡椒治疝气

〔方剂〕 荞麦面100克，生川乌15克，白胡椒9克，白酒适量。

〔制用法〕 将生川乌、白胡椒研成细末，同荞麦面用好白酒拌成泥状，包扎在脚心处。连用1周，每日换药1次。体虚者禁用。

〔功效〕 祛风湿，散寒，止痛。用治疝气。

〔验证〕 屡用效佳。

6. 山楂红糖治小肠疝气

〔方剂〕 山楂30克，红糖适量。

〔制用法〕 将山楂洗净，加水煮烂后放糖。每日分2次服完。

〔功效〕 活血化瘀，温中散寒。

〔验证〕 陈××，女，14岁，经用上方后痊愈。

7. 丝瓜陈皮汤治疝气

〔方剂〕 干老丝瓜1个，陈皮10克。

〔制用法〕 丝瓜焙干，研细。陈皮研细。两味混合，开水送服，每服10克，日服2次。

〔功效〕 理疝消肿。用治小肠疝气致睾丸肿痛。

〔验证〕 据《山东医刊》介绍，本方疗效独特。

8. 玉米茎心饮治疝气

〔方剂〕 玉米茎心（玉米茎内之白色柔软绵状物质）10条。

〔制用法〕 加水煮汤。代茶饮用。

〔功效〕 清热利尿。用治疝气、尿道刺痛、溺白等。

9. 焙鲫鱼鳔治疝气痛

〔方剂〕 鲫鱼鳔7枚，黄酒适量。

〔制用法〕 将鱼鳔焙干，不可枯焦，研末。每晚临睡前黄酒送下。

〔功效〕 暖下，止痛。用治疝气痛。

〔验证〕 上述两方经《医药保健》介绍，对治疗疝气及其所致疼痛效果较好。

10. 焙麻雀治小肠疝气

〔方剂〕 麻雀1只。

〔制用法〕 麻雀连毛用泥裹封，放火上焙成炭，研成细末。早晚1次以米汤送服。

〔功效〕 补虚扶阳。用治小肠疝气。

五十、阑尾炎

阑尾炎是指阑尾的化脓性疾病，但有急慢性之分。若有下腹固定压痛对急性阑尾炎具有重要诊断意义；若是慢性阑尾炎则多有急性阑尾炎史，仅有右下腹不适感或隐痛，可因活动、饮食不节而诱发。本病常用的有效的偏方主要如下。

1. 大田螺治阑尾炎

〔方剂〕 大田螺、荞麦面各适量。

〔制用法〕 大田螺捣碎，去壳，将其肉捣成烂泥，用荞麦面拌成糊，再捣

和。摊于布上贴在腹上阑尾部，每日换药2次。

〔功效〕 清热解毒。

〔验证〕 黄××，男，32岁，患阑尾炎，用上方治愈。

2. 鲜姜芋头泥治阑尾炎

〔方剂〕 鲜姜、鲜芋头、面粉各适量。

〔制用法〕 先将姜和芋头去粗皮，洗净、捣烂为泥，再加适量面粉调匀。外敷患处，每日换药1次，每次敷3小时。

〔功效〕 散瘀定痛。

〔验证〕 据《健康报》介绍上方有良效。

3. 石膏桐油治阑尾炎

〔方剂〕 生石膏12克，黑桐油适量。

〔制用法〕 将生石膏研为细末，用黑桐油与生石膏粉混合搅拌成糊状，外敷疼痛区，一般2~3日更换1次，如药干枯或滑动，则需要随时更换。

〔功效〕 治疗阑尾炎有奇效。

〔验证〕 用上药治疗急性阑尾炎患者48例，均获治愈出院。住院时间最短者3天，最长者13天。右下腹部疼痛症状在3天内逐渐减轻至完全消失。其中有3例阑尾炎穿孔伴发腹膜炎患者，使用本方亦获得痊愈。

4. 鬼针草治阑尾炎

〔方剂〕 鬼针草、败酱草各30克。

〔制用法〕 将上药加水3碗，煎至1碗，频频呷服。每日服1剂，重症患者每日服2剂。

〔功效〕 治疗阑尾炎有奇效。

〔验证〕 用上药治疗阑尾炎患者73例，其中，治愈者71例，好转者1例，无效者1例。73例中包括单纯性阑尾炎患者22例，均获治愈。慢性阑尾炎急性发作患者13例，其中痊愈者12例，好转1例，有效率为100%。阑尾周围脓肿患者31例，均获治愈。阑尾切除后并发腹腔感染患者7例，其中痊愈6例，无效1例。73例中有15例配合针灸和抗生素治疗。

5. 白花蛇舌草等治阑尾炎

〔方剂〕 白花蛇舌草、蒲公英、败酱草、忍冬藤各25克，生薏苡仁、伏

苓各 20 克，川军（后下）、芒硝（冲服）、桃仁（冲碎）、丹皮各 10 克，紫花地丁草 30 克，生甘草 12 克。

〔制用法〕 每日 1 剂，水煎分 3 次口服。

〔验证〕 用本方治疗急性阑尾炎患者 43 例，经服药 5~10 剂，均获治愈。

五十一、流行性腮腺炎，扁桃体炎

流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒所引起的一种传染性疾病，多发生于儿童，表现为腮部疼痛、肿胀、发热，且多伴有扁桃体炎。其临床主要验方如下：

1. 陈醋大蒜糊治流行性腮腺炎（疳腮）

〔方 剂〕 陈醋、大蒜（去皮）等份。

〔制用法〕 将醋与蒜共捣成糊。敷于患处，每日 1~3 次，现捣现敷，直至炎症消退为止。

〔功 效〕 消积解毒。用治流行性腮腺炎（疳腮）及一般痈肿。

〔验证〕 马××，男，13 岁，患流行性腮腺炎，经用上方治疗痊愈。

2. 赤小豆蛋清治疳腮

〔方 剂〕 赤小豆 70 粒，鸡蛋清 1 个。

〔制用法〕 将赤小豆捣碎为末，用鸡蛋清调和成糊状，敷于患处。

〔功 效〕 清热，解毒。用治疳腮之肿痛。

〔验证〕 据《新中医》杂志推荐，该方效果极佳。

〔备注〕 据《朱氏集验方》介绍：宋仁宗在东宫时，患疳腮，命道士赞宁治之，取小豆七十粒为末敷之而愈，中贵人任承亮后患恶疮近死，尚书郎傅永授以药（即此方），立愈。

3. 红黄白膏治疳腮

〔方 剂〕 赤小豆 100 克，大黄 100 克，白矾 20 克，芒硝 100 克，凡士林 300 克。

〔制用法〕 共研末，过细筛，将凡士林溶化与药粉调为膏。外敷，每日数次。

〔功 效〕 泻热解毒，活血化瘀。

〔验证〕 据《四川中医》介绍典型病例：李某，6 岁。寒热 1 周，继之左耳下酸痛，肿胀，吞咽咀嚼不利。诊断为“流行性腮腺炎”。

查左耳垂下方弥漫性红肿如手掌大，质硬微热，有压痛。用此膏外敷3次而愈。随访268例炸腮患者，采用红黄白膏外敷患部，均在3~5天治愈。

4. 黄瓜霜治扁桃体炎

〔方 剂〕 成熟大黄瓜1条，明矾适量。

〔制用法〕 将黄瓜切开顶端，剝去瓜瓤、种子，填满明矾，仍以原瓜盖盖牢，挂于阴凉通风处。数天后，瓜皮上不断冒出白霜，用鹅毛扫下，装瓶待用。用时以细塑料管蘸药吹于喉侧病体，每日2~3次。

〔功 效〕 清热解毒，通阳利水。用治咽喉肿痛、扁桃体炎。

〔验 证〕 郭××，女，12岁，患痛扁桃体炎，服本方12次即好转。3次后痊愈。

五十二、淋巴结核、慢性淋巴结核

本病主要指发生于颈部淋巴结的慢性感染性疾患。常结成串，累累如贯珠，故名“瘰癧”。临床以起病缓慢，初结块如豆，皮色不变，坚硬无痛，后渐大成串，将溃时皮色暗红，溃后脓水清稀，久不收口，可形成窦道或痿管为特征，又名“鼠疮”。

1. 海甘消瘰汤治颈淋巴结结核

〔方 剂〕 海藻、昆布各24克，浙贝母、郁金、甘草、青皮、枳实各9克，玄参12克，生牡蛎、桔核各15克。

〔制用法〕 水煎服。

〔疗 效〕 治疗9例均愈。

〔验 证〕 肖××，女，10岁，学生，1964年5月4日就诊。主诉：半年前右颌下生1结节如蚕豆大，推之能动，不觉疼痛，经用清热散结之中药及链霉素肌注无效，且结节渐增，形如鸡卵，其父意欲转院治疗，因道路艰难未往。诊时头已倾斜，面已改形，按之坚硬，推之不动，皮色未变。西医诊断：颈淋巴结结核；中医印象：瘰癧。处方如上，水煎服至4剂，肿块全散，皮下波动；再加活血祛瘀之药2剂，脓液尽消，表皮皱瘪，停药观察，10年未发。

〔备 注〕 本方由《医学心语》消瘰丸加味而成。用海藻、昆布、浙贝化

痰以清其源；青皮、郁金、枳实理气以解其郁；玄参、牡蛎、桔核软坚散结；用甘草取其激海藻助牡蛎软坚破结。海藻甘草同用，虽属中药配伍禁忌（为本草“十八反”内容之一），但前人亦有破例运用。如《医宗金鉴》海藻玉壶汤、“验方”内消瘰癧丸。实践启示：在消瘰丸中加海藻甘草，软坚散结之力更强，未发现不良反应，且疗效满意，设想本方可能有抑制结核杆菌，促进病灶修复作用。

2. 荔枝疗法治淋巴结核

- 〔方 剂〕 鲜荔枝 10 枚。
〔制用法〕 将荔枝洗净，捣烂如泥。外敷患处，每日更换 1 次。
〔功 效〕 生津益血，理气止痛。用治淋巴结核、赤肿疔毒及小儿疹疮。
〔验 证〕 据《新中医》杂志介绍上方疗效理想。

3. 海带汤治瘰癧瘰癧

- 〔方 剂〕 海带 1000 克。
〔制用法〕 水煮。饮汤，尽量服用。
〔功 效〕 消痰软坚。用治瘰癧、瘰癧。
〔验 证〕 据《医学衷中参西录》介绍：一妇人起一瘰癧，大如小橘。其人亦甚强壮无他病，俾煮海带汤，日日饮之，半月之间，用海带 2 斤而愈。本品对甲状腺囊肿、高血压均有较好疗效。

4. 甘草蜂蜜消淋巴结核

- 〔方 剂〕 甘草、蜂蜜各适量。
〔制用法〕 每次取适量甘草粉碎，加蜂蜜调成糊状。涂在淋巴结核疙瘩上，并用纱布包好，每 2 天更换 1 次，几周后疙瘩自消。
〔功 效〕 和中缓急，清热解毒。
〔验 证〕 屡用效佳。
〔验 证〕 甘××，男，32 岁，患淋巴结核，经多方治疗，效果不佳，后用上方痊愈。
〔备 注〕 淋巴结核已破溃的不适宜此方。

5. 蝌蚪红糖水治淋巴结核

- 〔方 剂〕 蝌蚪 15 克，红糖适量。
〔制用法〕 将蝌蚪捣烂成泥，对入红糖开水煨。初起者服 1 次，已溃者 3 或 4 次可愈。

[功 效] 清热解毒。

[验 证] 屡用效佳。

6. 蛤粉治淋巴结核

[方 剂] 蛤粉 20 克，海蒿子 25 克，牡蛎 25 克，夏枯草 30 克。

[制用法] 共煎汤。每日早晚分服。

[功 效] 软坚散肿。用治淋巴结核、甲状腺肿大。

[验 证] 马××，42 岁，经服上方痊愈。

7. 蜗牛炖猪肉治淋巴结核

[方 剂] 鲜蜗牛肉 100 克（干品减半），瘦猪肉 150 克，盐、酱油少许。

[制用法] 蜗牛洗净，用沸水烫死，以针挑出蜗牛肉，再洗，然后同猪肉共炖。饮汤食肉。

[功 效] 养阴清热，消肿解毒。用于淋巴结核、慢性淋巴结炎。

[验 证] 据《卫生报》介绍本方在治疗淋巴结核时疗效独特。

8. 蜈蚣蛋治淋巴结核

[方 剂] 大蜈蚣 1 条，鸡蛋 1 个。

[制用法] 将蜈蚣瓦上焙干，研为细末。鸡蛋打一小孔，装入蜈蚣粉末，封闭小孔，放入有盖茶杯内蒸熟。每晚食用 1 个。

[功 效] 清热解毒，定惊止痛。用治颈淋巴结核。

[验 证] 据《医药保健》介绍本方效佳。

五十三、痔 疮

痔疮发作时，多现肛门坠痛或痔核红肿剧痛，或便时出血，兼有便秘、溲赤，唇干咽燥等热象。本病病因多由素积湿热嗜食炙煨、辛辣之品，或过饮酒浆而致湿热内蕴，而湿热瘀滞即可导致痔疮的发作。临床常用的偏方主要如下：

1. 马齿苋猪大肠治内痔

[方 剂] 马齿苋 100 克，猪大肠 1 截（15 厘米长）。

[制用法] 先将两物洗净，然后将马齿苋切碎装入大肠内，两头扎好，放锅内蒸熟。每日晚饭前一次吃完，连续服用。

[功 效] 清热解毒，润肠止血。

[验 证] 经治疗 90 例，80 例治愈。10 例好转。

[备 注] 无马齿苋，可用花椒 120 克代替。

2. 乌药、大黄等治痔疮

[方 剂] 乌药、大黄、当归、血竭、地榆各 150 克，黄柏、菖蒲、红花各 75 克，黄连 15 克，冰片、枯矾各 50 克。

[制用法] 上药共研极细末，过 120 目筛，加凡士林 1500 克调匀成膏，贮瓶备用（高压消毒）。先用 1:5000 高锰酸钾液坐浴后，再将药膏涂敷患处，每日换药 2 次。

[功 效] 清热解毒，散血消肿。

[验 证] 治疗 60 例，其中炎性外痔 23 例，痊愈 15 例，好转 7 例，无效 1 例；血栓性外痔 37 例，痊愈 26 例，好转 10 例，无效 1 例，总有效率为 96.67%。

[备 注] 引自 1985 年《辽宁中医杂志》(3)。

3. 蝉冰膏治痔疮

[方 剂] 蝉蜕 15 克，冰片 12 克，麻油 30 毫升。

[制用法] 先将蝉蜕用微火焙焦存性、研末，入冰片同研成极细末，用麻油调匀即成。每晚临睡前，先用金银花 20 克，大鳖子 12 克（捣碎），甘草 12 克，煎汤趁热熏洗患处，然后用棉签蘸油膏涂敷痔核上，连用 5~7 天。

[功 效] 消炎、散结、止痛。

[验 证] 治疗 53 例，全部痛除血止核消。

[备 注] 引自 1981 年《辽宁中医杂志》(6)。忌食辛辣、鱼虾等物。

4. 硝冰膏治痔疮

[方 剂] 芒硝 30 克，冰片 10 克，猪胆汁适量。

[制用法] 先将前 2 味药共研细末，再用猪胆汁调匀成糊状（如痔疮表面有溃汤或分泌物多者加白矾 10 克），备用。外敷于痔疮外，再用纱布棉垫覆盖，胶布固定。每日早、晚各敷 1 次。

[功 效] 消肿止痛。

[验 证] 试治数例，均愈。

[备 注] 引自《外治汇要》。

5. 麝冰散治痔疮

[方 剂] 麝香、熊胆、冰片、猬皮各 0.3 克。

[制用法] 上药共研极细末，备用（贮瓶勿泄气）。外痔：每日敷药 3 次。内痔：将药棉缠在如火柴杆粗的小棍上，浸湿蘸药末插入肛门

内，随即将小棍抽出，任药棉留在肛门内。

[功效] 消肿止痛。

[验证] 屡用屡验、效佳。

[备注] 引自 1988 年《医学文选》(1) 祖传秘方验方集。又治痔漏，取蛇胆，阴干即成胆条，塞入瘻管内。塞入时有凉的感觉。五、六日瘻管随胆条脱出。治愈人数不可胜举。

6. 无花果治痔疮

[方剂] 无花果 10~20 颗（如无果，用根叶亦可）。

[制用法] 将上药加水 2000ml 放在砂锅内煎汤。于晚上睡前 30 分钟，熏洗肛门 1 次，连续 7 次为 1 个疗程。无愈，可再继续 1 个疗程即愈。

[验证] 用本药治疗痔疮患者 77 例，均获痊愈。一般无不良反应。无 1 例复发。

[备注] 用本法时，须禁用酒类、酸、辣等刺激物，以免减低药效。

7. 荆芥防风等治痔疮

[方剂] 荆芥、防风、土茯苓、使君子各 9 克，芒硝 120 克，马钱子 6 克。

[制用法] 将上药放砂锅内加水煮沸。然后，倒入罐内，令患者蹲在罐上先熏后洗，每晚 1 次。

[验证] 用上药治疗外痔患者 100 余例，一般熏洗 1 次后疼痛即可减轻，经 2~5 次后可以获得痊愈。

8. 五倍子治痔疮

[方剂] 五倍子 500 克。

[制用法] 取五倍子清洗并捣碎，浸泡于 52.5% 乙醇 1000ml 中，密封放 1~2 个月，然后过滤后煮沸消毒备用。用时，（1）器械装备：消毒包内备有 5ml 注射器工具，6、7 号针头各 1 个，中号弯血管钳 2 把，组织钳、手术剪各 1 把，中号圆针 1 根，10 号丝线 2 尺，纱布数块。（2）操作方法：患者侧屈膝，充分暴露肛门，用 1% 新洁尔灭液常规消毒肛门及臀部，用 2% 普鲁卡因局部麻醉，血管钳固定痔核根部，再注入五倍子酒精液适量于痔疮内，使之成为紫色为度。然后用弯血管钳反复挤压痔核，直至变为薄薄的焦痂。最后，在痔核根部行“8”字缩缝扎，并松

开根部血管钳。如有多个痔核，再用同样方法处理。术毕将部分残痔剪去，剩余痔核根部送入肛门。并涂九华膏后，外加纱布覆盖，胶布固定。便后高锰酸钾溶液坐浴，用九华膏或黄连膏换药至痔核脱落，伤口痊愈。

[验 证] 用上药治疗痔疮患者 80 例，均获治愈。其中，10~12 天治愈者 21 例；21~30 天治愈者 54 例；30 天以上治愈者 5 例。

9. 五倍子、朴硝治痔疮

[方 剂] 五倍子、朴硝、荆芥、防风、明矾、乌梅、穿心莲各 30 克。

[制用法] 将上药加入清水 1200ml，浓煎至 600ml 备用。用时取液 200ml 放入盆内兑开水或温热水 800ml 搅匀，用热气薰蒸，水温后坐浴 15 分钟左右。按上法每日早、中、晚各熏 1 次。血栓外痔较大者要圆利针刺破。方法是患者取截石位或侧位，充分暴露痔核，用 1% 新洁尔灭液消毒患处后。再用点刺的方法迅速地刺入血栓内，用泻法使痛感消失后出针，放出瘀血为度，随后用新洁尔灭棉球消毒揉按数下，此法隔日 1 次，1~3 次为 1 个疗程。

[验 证] 用上药治疗痔疮患者 200 例，痊愈 164 例，好转 36 例，总有效率为 100%。其中炎性外痔 100 例，痊愈 92 例，好转 8 例；血栓外痔 42 例，痊愈 38 例，好转 4 例；肛门湿疹 2 例痊愈；混合痔 58 例，痊愈 8 例，好转 48 例。

10. 炉甘石、女贞叶等治痔疮

[方 剂] 炉甘石、女贞叶、艾叶各 30 克，冰片 3 克，芝麻油 50ml。

[制用法] 将前四味药分别为极细末，混合均匀，徐徐加入芝麻油中搅匀，贮瓶备用。用时，根据痔疮大小，取药膏 1~2 克，涂搽患处，用药前应排净大便，不需包扎。每晚用药 1 次。3 次为 1 个疗程。

[验 证] 用本方治疗外痔患者 125 例，均于用药 1~4 个疗程，均获治愈。

11. 蒲公英土茯苓治混合痔

[方 剂] 蒲公英、土茯苓、苦参、芒硝、马齿苋各 30 克，生大黄、生甘草各 10 克。

[加 减] 若术后肛门水肿，加重芒硝至 50 克；若分泌物比较多，加重蒲

公英、苦参、土茯苓、马齿苋至 50 克；若伤面有赘肉，加丹参、乌梅各 15 克。

〔制用法〕 将上药加水适量，浓煎至 600ml，自术后第 1 次大便后立即坐浴，坐浴时将肛门放松，清除粪便，一般坐浴时间以 20～30 分钟为宜，每日坐浴 1～2 次。浴后揩干患处，用无菌敷料覆盖胶布固定。

〔验 证〕 用本方治疗混合痔术后并发症患者 133 例，经用药 2～10 天，均获治愈。

12. 南瓜子煎熏治内痔

〔方 剂〕 南瓜子 1000 克。

〔制用法〕 加水煎煮。趁热熏肛门，每日最少 2 次，连熏数天即愈。熏药期间禁食鱼类发物。

〔功 效〕 用治内痔。

〔验 证〕 牛××，女，32 岁，用上方后内痔即痊愈。

13. 茄子末治内痔

〔方 剂〕 茄子。

〔制用法〕 茄子切片，烧成炭，研成细末。每日服 3 次，每次 10 克，连服 10 天。

〔功 效〕 清热止血。用治内痔。

〔验 证〕 屡用效佳。

14. 鲫鱼治内外痔疮

〔方 剂〕 鲫鱼 1 条（重 200 克），韭菜适量，酱油、盐各少许。

〔制用法〕 将鱼开膛去杂物留鳞，鱼腹内洗净，纳满韭菜，放入盖碗内，加酱油、盐，盖上盖，蒸半小时即成。食鱼肉饮汤，每日 1 次。

〔功 效〕 治疗痔漏、内外痔疮。

〔验 证〕 杨×，女，35 岁，患痔疮久治不愈，经服上方 3 剂好转，坚持服用后逐渐痊愈。

15. 蝎蚕蛋治痔疮

〔方 剂〕 全蝎 6 克，僵蚕 6 克，鸡蛋适量。

〔制用法〕 全蝎、僵蚕（中药店有售）研成细末，共分为 15 份。每日早晨取新鲜鸡蛋 1 枚，在蛋壳上打一个小孔，将 1 份全蝎僵蚕粉从

小孔内装入鸡蛋，搅匀后用面粉将鸡蛋上的小孔糊上，放入锅内蒸熟。服用时将鸡蛋去皮整个吃下，每日1个，连吃15天为一疗程。如一疗程未能痊愈，可再吃一两疗程，以巩固疗效。

〔功效〕 理气血，除热毒。

〔验证〕 据《老年报》介绍，本方疗效良好。

16. 猪汤绿豆清热润肠

〔方剂〕 绿豆200克，猪大肠1截，醋少许。

〔制用法〕 先将猪大肠翻开用醋洗净（连续洗3次），把绿豆填入猪肠内，再用线绳将肠两端扎紧，放入水锅中煮约1个半小时即成。食时切成段，一次吃完，每日1次。

〔功效〕 清热解毒，润肠通便。用治内外痔便血。

17. 猪肉槐花汤治痔疮

〔方剂〕 瘦猪肉100克，槐花50克。

〔制用法〕 加水共煎汤。日食1次。

〔功效〕 凉血，止血。

18. 红糖金针菜汤消痔

〔方剂〕 红糖120克，金针菜120克。

〔制用法〕 将金针菜用水2碗煎至1碗，和入红糖。温服，每日1次。

〔功效〕 活血消肿。对痔疮初起可以消散，对较重症有减轻痛苦之功。

〔验证〕 上述3方经临床验证，疗效确切。

五十四、肛 裂

肛裂因粪便干硬，肛管皮肤受到损伤所致。多发生于肛门后中线处，严重者裂口可深达肛门括约肌。

1. 乳没膏治肛裂

〔方剂〕 乳香、没药各20克，丹参10克，冰片5克，蜂蜜30克。

〔制用法〕 先将前4味药共研细末，用75%乙醇适量，浸泡5天左右，加入蜂蜜调匀，即行煎熬加工成油膏状，贮瓶备用。用药前嘱病人排尽大便，以1:5000高锰酸钾溶液坐浴10分钟左右，再用双氧水溶液清洗创面裂口，再经干棉球拭干泡沫，再取药膏外敷创面处，然后覆盖无菌纱布，胶布固定。每日换药1次，直

至裂口愈合。

[功效] 活血止血，止痛生肌。

[验证] 治疗 32 例，效果颇佳。止血效果：32 例中敷药后全部止血，大多数患者 3~4 天便血停止；止痛效果：敷药后有 23 例患者在 3~5 天疼痛消失；裂口愈合效果：经治疗后，除 1 例因伴有大哨兵痔疮面未愈合，一般愈合时间为 7 天左右。

[备注] 引自《百病中医膏散疗法》。

2. 润肤膏治肛裂

[方剂] 当归、生地各 15 克，麻油 150 克，黄蜡 30 克。

[制用法] 先将当归、生地入油内煎熬，药枯后去渣，投入黄蜡，即成半液状油膏，备用。每天大便后，清洗疮面，然后取药膏适量涂敷于患处。每日换药 1 次。

[功效] 润肤生肌。

[验证] 用治上症，效果颇佳。

[备注] 引自《疡科妙方》。

3. 生肌膏治肛裂

[方剂] 冰片、煅龙骨粉各 6 克，朱砂 7.5 克，煅炉甘石 64 克，煅石膏 143 克，凡士林 264 克，麻油适量。

[制用法] 先取冰片及少许煅炉甘石共研成细末。再入煅龙骨粉，朱砂及余下的煅炉甘石，混合均匀，掺入煅石膏，拌匀后倾倒凡士林内充分搅拌，最后加适量麻油调成软膏，备用。肛门局部用红汞消毒后，据肛裂范围，涂满此膏，用纱布盖好，胶布固定。

[疗效] 止血敛疮，封口止痛。

[验证] 治疗 74 例，效果满意。肛裂愈合，无不良后应。

[备注] 引自 1963 年《中医杂志》(6)。

五十五、骨质增生症

骨质增生，又名“骨刺”，古称“骨赘”。是一种慢性骨质生长异常退行性疾病。中老年人发病居多。好发于脊椎、髌、膝关节、跟骨结节等处，尤以颈椎、足跟骨节处发病居多。

多因风寒湿三气杂合，侵入肌肉，筋络关节，客于经脉，邪气壅阻，气滞血瘀，关节磨损所致。或因跌仆挫伤，损伤骨络；过频；或低头弯腰，或行走

站立过度所致。凡此种种，尤其在肝肾亏虚时极易诱发本病。

脊柱（颈、胸、腰、骶椎）、髌、膝关节、足跟骨节等处疼痛，或微痛，触之则痛剧，仰、俯、屈、伸、转侧、步履受限、功能活动不灵，或伴见头晕、麻木等症。一般多发生在一处或多处。

1. 川芎末醋调外敷治骨质增生症

[方 剂] 川芎末 6~9 克，山西老陈醋适量，药用凡士林少许。

[制用法] 将药末加老陈醋调成浓稠糊状，然后混入少许药用凡士林调匀。随即将配好的药膏涂抹在患者增生部位，涂好后盖上 1 层塑料纸再贴上纱布，用宽胶布将纱布四周固封。2 天换药 1 次，10 次为 1 疗程。

[疗 效] 经治 20 例，其中颈椎骨质增生 9 例、肱骨外上髁骨质增生 7 例、腰椎骨质增生 2 例、脚跟骨质增生 2 例。经治疗后自觉症状消失者 13 例、好转者 5 例，有 2 例在敷药中出现局部灼痒，起丘疹停止治疗。治疗次数最多 18 次，最少 7 次。

[验 证] 杨××，女，52 岁，腰椎骨质增生 3 年余，腰痛及下肢麻木，多方治疗病痛未减。用川芎末醋调外敷 15 次，痛麻基本消失，即能走 15 华里，随访 5 年症状无复发。

2. 风湿威灵方治骨质增生

[方 剂] 白花蛇（学名银环蛇）4 条，威灵仙 72 克，当归、土鳖虫、血竭、透骨草，防风各 36 克。共碾细末，过筛。

[制用法] 每次服 3 克，每天服 2 次，开水送服。以上为一个月药量，服完即症状消失。

[功 效] 治疗骨质增生症。

[验 证] 宛××，女，52 岁，本矿家属。1977 年 11 月 28 日在我院 X 线摄片示：第 3 腰椎右下，第 4 腰椎右上呈雀嘴样骨质增生，第 1、4 腰椎椎体轻度状增生。经对症治疗无效。1978 年 3 月开始服用本药。连服 1 个月后，疼痛消失，恢复劳动，随访至 1981 年 2 月，腰痛未再发作。

3. 威灵苁蓉汤（丸）治足跟骨质增生及老年骨关节炎疼痛

[方 剂] 威灵仙 15 克、肉苁蓉 15 克、熟地 15 克、青风藤 15 克、丹参 15 克。

[加 减] 上肢麻、痛者加姜黄 10 克；下肢麻、痛加怀牛膝 10 克。

- 【制用法】 每天1剂，煎2遍和匀，1日2次分服。或研末炼蜜为丸，每粒10克，每服1粒，日2次。
- 【功效】 主治颈椎、腰椎及足跟骨质增生，老年骨关节炎疼痛等。
- 【验证】 罗××，男，61岁。就诊日期：1980年10月2日。患者腰痛、腿酸，步履乏力，已经1年余，X光照片示腰椎骨质增生，予本方先服汤剂2周，痛减大半，再予丸药连服2个月，腰痛腿酸均解，步履有力。
- 【备注】 骨质增生乃老年人常见病，系肾虚髓空血瘀、风寒乘隙入侵所致，故以肉苁蓉补肾阳、益精气，熟地滋肾阴填骨髓，威灵仙、青风藤祛风通络止痛，丹参活血化瘀止痛。肾气得充，血活络通，通则不痛，故痛自止矣。注意关节保护，避免过度负重，避寒就温，肥胖者宜注意饮食，设法减轻体重，以减少负重。

4. 外用筋骨止痛酒治骨质增生症

- 【方剂】 生草乌10克、细辛10克、洋金花6克、冰片16克。
- 【制用法】 先将前三味药研末，用50%酒精300ml浸入，冰片另用50%酒精200ml浸入，每日搅拌一次，约1周后全部溶化，滤净去渣，将二药液和匀，用有色玻璃瓶贮藏。每次用棉球蘸药液少许涂痛处或放痛处片刻，痛止取下，每天2~3次。
- 【功效】 草乌、细辛祛风散寒止痛，洋金花解痉活血止痛，冰片通窍善于走窜，消肿止痛，浸酒外用，直接作用于局部，见效较速。
- 【验证】 尤××，女，63岁。就诊日期：1982年10月15日。脚跟疼痛2个月，影响走路，经骨科检查诊为跟骨骨刺。予本方外用，当天痛减，1周后疼痛缓解。
- 【备注】 本方药性毒烈，只能外用少许不可内服，皮肤有破损及孕妇均忌用。

5. 粉葛、秦艽等治骨质增生症

- 【方剂】 粉葛、秦艽、灵仙、当归各20克，白芍30克，延胡、制川乌、独活各10克，蜈蚣3条（去头足），天麻6克（为末吞服）。
- 【加减】 若偏寒者，加桂枝、细辛、白芥子、制附片、淫羊藿；若偏热者，酌加板蓝根、银花、连翘；若偏湿者，酌加茯苓、薏苡仁、苍术；若气虚血滞者，加入党参、丹参；若肾虚者，加枸杞子、巴戟。

〔制用法〕 将上药水煎，分2~3次口服，每日1剂。

〔验证〕 用上药治疗颈椎骨质增生患者257例，其中痊愈223例，显效22例，有效12例，无效5例。

6. 当归白芍等外敷治骨质增生

〔方剂〕 全当归、白芍各40克，川芎、炒艾叶、地龙、灸川乌、五加皮、木通、川花椒、蕲藜、防风各30克，生姜汁100ml，陈醋适量，冰片5克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末后，加入姜汁、陈醋成糊状，贮瓶内备用。用时，以此药糊敷患处，每日换药1次。1剂药一般可用2~3天。2剂药为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗骨质增生患者65例，经用药1~3个疗程后，治愈者61例，显效者3例，无效者1例。

7. 川芎没药等外敷治骨质增生

〔方剂〕 川芎、没药、乳香、红花、白芍各60克，草乌、川乌、防己、杜仲、川续断、牛膝各30克，羌活、白芷、干姜、秦艽各20克，冰片3克。

〔加 减〕 若伴颈椎病和高血压者，去白芷、干姜，加葛根、透骨草各20克；若腰酸痛者，加鸡血藤、狗脊各20克。

〔制用法〕 将上药共研为细末，用陈醋和白酒各半调药末成糊状外敷患处，每日换药1次。1周为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗骨质增生患者200例，其中，治愈者185例；显效者10例；好转者3例；无效2例。总有效率为99%。

8. 威灵仙穿山甲等治骨质增生

〔方剂〕 威灵仙60克，乌梢蛇、穿山甲、土鳖虫各30克，白花蛇2条，皂角刺、透骨草、生川乌、生草乌、细辛、生乳香、生没药、川芎、豨莶草各50克，冰片15克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，置于瓷碗内，用米醋或黄酒调成糊状，外敷患处，隔日换药1次。1周为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗骨质增生患者156例，经用药1~2个疗程后，其中，治愈者149例；好转者5例；无效者2例。

9. 蜈蚣等治骨质增生

〔方剂〕 蜈蚣10条，白僵蚕、白芷、全蝎、生川乌、生草乌各50克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装入瓶内备用。用时，取适量药粉加白酒调成糊状，外敷于骨质增生处。每日换药 1 次，至痊愈为止。

〔验证〕 用本方治疗骨质增生患者 121 例，经换药 5~8 次后，其中，治愈者 116 例；显效者 4 例；无效者 1 例。愈后经 1~2 年追访，均未见复发。

五十六、跌打损伤

跌打损伤包括刀枪、跌仆、殴打、闪挫、刺伤、擦伤、运动损伤等，伤处多有疼痛、肿胀、出血或骨折、脱臼等，也包括一些内脏损伤。在此主要以软组织损伤为主。

1. 三六九软膏治疗软组织损伤

〔方 剂〕 乳香、没药、三棱、莪术、木香、延胡索各 250 克，当归、羌活、丁香、甘松、山柰各 200 克，地鳖虫、生川乌、生草乌、红花各 300 克，血竭 400 克，煅自然铜 500 克，冰片 100 克。

〔制用法〕 上药除冰片外，全部晒（烘）燥后，碾成粉末，拌入冰片细末和匀。用适量液状石蜡油（或凡士林、鸡蛋清均可），将药末调成糊状（不松散为度），装入药罐内备用。根据伤痛部位大小，将软膏均匀地摊在棉垫上，表面再放入适量的冰片粉末。纱布外层最好衬上一层塑料薄膜，以免药液渗出污染被服。一般 2—3 天换药 1 次，直至病愈。骨折、脱位患者，应先行复位固定，再使用软膏为妥。

〔功 效〕 主治软组织损伤。

〔验证〕 共治 200 例，其中 135 例痊愈（红肿疼痛消失，肢体活动功能恢复正常，恢复原工作），42 例显效（红肿疼痛基本消失，恢复原工作），19 例有效（症状减轻，但换药 10 次后仍不能恢复原工作），4 例无效。总有效率 98%。

2. 少林发散法治疗软组织损伤

〔方 剂〕 羌活、桂枝、荆芥、防风、川芎、炒赤芍、苏木、当归、枳壳、泽兰、葱头。

〔制用法〕 水煎服，加白酒 60 毫升兑入。

〔功 效〕 治跌、打、损伤妙药。

[验 证] 陈×，男，22岁。从5米高处跌下，多处挫伤。右手臂外侧有2个大约3×3平方厘米的肿胀区，右颧骨处有一青紫肿胀区，疼痛剧烈；舌红、苔薄白，脉细弦。用少林发散法化裁。处方：羌活、桂枝、川芎、枳壳、当归各10克，荆芥、防风、干姜各5克，苏木、泽兰各15克。每天1剂，煎2次服。服5剂，瘀血消散，青紫肿胀全消。

[备 注] 解表发散法虽主要用于表证，但据现代药理研究，发散药中所含的挥发油能舒张血管，改善局部和全身的循环功能，促进局部肿胀的吸收。因此，在运用活血化瘀药的同时，配合适当的发散药，能促进局部软组织损伤的修复。

3. 消瘀止痛膏治软组织损伤

[方 剂] 生川乌、生栀子、赤芍各1000克，生南星、川续断、紫荆皮、白芷、泽兰各500克，或用诸药各等份。

[制用法] 上药共研细末、过45目筛，每300克药粉加凡士林150克，蜂蜜500克，混合调匀成膏（先将蜂蜜、凡士林加热融化后逐渐下药搅拌调匀），贮罐备用。用时根据损伤部位大小，将膏药摊于棉垫（或牛皮纸）上，摊的药膏勿须过多。损伤处若有皮肤破损者，须先用敷料盖住，然后再敷药膏，以防感染。余则贴敷患处，敷药后用绷带包扎固定。3~4日换药1次。换药前先洗净患处原敷的药膏。敷药后局部皮肤出现瘙痒等反应，应停止用药。

[功 效] 消肿止痛。

[验 证] 治疗2000余例，敷药后均能获得明显消肿止痛效果，经过数次换药即可治愈。疗程短，功能恢复快。

[备 注] 引自1984年《湖北中医杂志》(4)。

4. 活血止痛膏治软组织损伤

[方 剂] 红花、赤芍、白芷、栀子、桃仁、乳香、没药各15克，大黄30克。

[制用法] 上药共研细末，用酒调匀成糊状，备用。外敷患处。为防止药物脱落，减少蒸发，外用塑料纸包扎，如干燥后，可取下再加酒调敷，连续敷用3~4天后去除。若尚未治愈，可用第2剂重新调敷。

[功 效] 活血化瘀，消肿止痛。

[验证] 治疗 302 例，一般用药 2~4 日即愈。

[备注] 引自 1984 年《陕西中医》(5)。皮肤有破损者勿用。又铁打散，即本方，各药均为 15 克，其中桃仁 4 克，依上法用之。用治软组织挫伤 12 例，用药 1~4 次后均治愈（《千家妙方·下》）。

5. 梔黄酒治软组织损伤

[方剂] 梔子 60 克，大黄、乳香、没药、一支蒿各 30 克，樟脑饼 7 克。

[制用法] 上药共研细末，入罐内，加白酒适量（以淹没药物为度），浸泡 2 周，密闭。取药外敷患处，以敷料盖上，胶布固定。敷药范围与疼痛面积大小相应。

[功效] 消肿止痛。

[验证] 轻者 1 或 2 次，重者 2 或 4 次愈。共治 204 例，有效率达 97%。

[备注] 引自 1986 年《四川中医》(6)。本方用于无名肿毒，肋间神经痛均能收到良好效果。

6. 活血散治软组织损伤

[方剂] 乳香、没药、羌活、独活、香附、炒甲珠、自然铜、木瓜、当归、续断各 15 克，桂枝、制川乌、制草乌、白芷、苏木、小茴香各 10 克，细辛 6 克。

[制用法] 上药共研细末、过筛混匀，收贮备用。用时取活血散，用量 10~20 克，一般以能覆盖瘀血面为准，以生菜油调匀，以压痛点为中心，局部外敷包扎。每日换药 1 次，3 日为 1 疗程。

[功效] 活血化瘀、消肿止痛。

[验证] 治疗 100 例，痊愈 74 例，显效 23 例，无效 3 例，总有效率为 97%。

[备注] 引自 1986 年《四川中医》(7)。早期治疗。收效显著。

7. 消肿止痛膏治软组织损伤

[方剂] 生梔子仁 90 克，白芷 30 克，生南星、生半夏、生川乌、生草乌、细辛、土鳖虫、制乳香、制没药、药花、当归尾各 9 克。

[制用法] 上药烘干后研为细末，用饴糖、酒或醋（开水亦可）调匀后置瓷钵中备用。用时将药摊在塑料纸上，外敷患处，并以胶布固定。每日换药 1 次，3 次为 1 疗程。

[功效] 消肿止痛。

[验证] 治疗近 100 例，效果满意。

〔备 注〕 引自 1984 年《江西中医药》(1)。也可 3 日换药 1 次，每日用酒或醋滴入药物以发挥药效。

8. 生栀子石膏治软组织损伤

〔方 剂〕 生栀子 10 克，生石膏 30 克，桃仁 9 克，红花 12 克，土鳖虫 6 克。

〔制用法〕 将上药焙干，共研为细末，装入瓶内备用。用时，取药末用 75% 酒精浸湿 1 小时后，再加入蓖麻油适量，调成糊状。依患处范围大小，取药摊适量厚度于纱布上，直接贴敷患处，用绷带包扎固定，隔日换药 1 次。

〔验 证〕 用上药治疗软组织挫伤患者 547 例，其中痊愈者 514 例，显效 19 例，无效 14 例。痊愈的 514 例，仅敷药 3~4 次即获治愈。

9. 土鳖川芎治软组织损伤

〔方 剂〕 雄土鳖、川芎各 12 克，胆南星、血竭、红花、防风、白芷、升麻各 15 克，没药 24 克，马前子（微炒）9 个，龙骨、羌活、螃蟹壳、当归、菖蒲各 9 克，净乳香 30 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装瓶内贮藏备用。用时，以凡士林适量将药末调成糊状，根据损伤面积大小及不同部位，将软膏摊在油纸或纱布上，厚约 0.2~0.3cm，敷于损伤部位，每 3 天换药 1 次。

〔验 证〕 本方系创伤特效方，笔者采用本方治疗急性软组织损伤患者（人体不同部位），效果均满意，一般仅敷 1~2 次即可痊愈。

10. 大黄丹参红花治软组织损伤

〔方 剂〕 生大黄 100 克，丹参、红花各 60 克，延胡索 40 克，冰片 10 克。

〔制用法〕 将上药共研为细末，装入瓶内备用。用时，取药末适量用蜂蜜和 75% 酒精各半调成糊状，均匀地敷于患处，再用绷带包扎固定，每日换药 1 次。

〔验 证〕 用上药治疗软组织损伤患者 550 例，均获得痊愈。其中经 1 次治愈者 97 例，2 次治愈者 304 例，3 次以上治愈者 149 例，治愈率为 100%。

11. 生栀子生韭菜治软组织损伤

〔方 剂〕 生栀子、生韭菜各等量。

- 〔制用法〕 将上药捣烂后，用鸡蛋清调匀，呈糊状，均匀地敷于患处，将红肿面盖全，厚度约 2~4mm，外用纱布固定。每日换药 1 次。
- 〔验证〕 笔者 20 年来，用本方共治疗闭合性软组织损伤或小腿挫伤，踝关节扭伤肿痛等患者 382 例，疗效均佳。一般敷药 3~5 次即可获得痊愈。

12. 土鳖虫血竭三七治软组织损伤

- 〔方 剂〕 土鳖虫 150 克，血竭、三七、栀子、乳香、没药、川芎各 200 克，孩儿茶、生大黄、三棱、莪术各 300 克。
- 〔制用法〕 将上药共研为极细末，过 100 目筛后，调入凡士林适量混合均匀备用。用时，取药膏涂于患处，约 0.5cm 厚，外盖塑料薄膜或棉纸后，用绷带或胶布固定，每日换药 1 次。
- 〔验证〕 用本方治疗软组织损伤患者 156 例，其中，治疗 2 次治愈者 53 例；3 次治愈者 41 例；4 次治愈者 27 例；5 次治愈者 35 例。

13. 茜草根大黄土鳖虫治软组织损伤

- 〔方 剂〕 茜草根、生大黄、土鳖虫各等量。
- 〔制用法〕 将上药研末，用凡士林调成糊状，外用敷料和纱布固定。每日换药 1 次。
- 〔验证〕 治疗软组织损伤 76 例，4~5 次获愈。

14. 黄枝子，乌药等治跌打损伤

- 〔方 剂〕 黄枝子 2 份，乌药 1 份，桃树枝心 1 份，樟树枝心 1 份。
- 〔制用法〕 将上药分别晒干，研成细粉，分装保存备用。用时，以水和 50% 酒精调成糊状，再加上适当的面粉，混合搅匀。然后摊在塑料布上（用药量根据扭伤的面积而定），厚约 0.3cm，外敷于患处，用绷带包扎固定，以防药液外溢。冬季可 2~3 天换药 1 次，夏季 1~2 天换药 1 次，以保持其湿润。
- 〔验证〕 用上药治疗各种跌打损伤，扭伤及软组织挫伤患者 219 例，一般敷药 1 次即可明显消肿止痛，2 次后可基本痊愈。219 例中除伴有关节脱位，配合其他疗法外，均获治愈。

15. 大黄姜等治跌打损伤

- 〔方 剂〕 生大黄、生栀子、姜黄、土鳖虫各 150 克，生川乌、生草乌、生南星、生半夏各 100 克，三七、乳香、没药、青陈皮各 50 克。

[制用法] 将上药共研为极细末，装入瓶内备用。用时，根据受伤部位大小，取药末适量用白酒调匀敷患处，每日3~4次。外敷药后局部用热水袋外烫药物，效果更佳。

[验 证] 用本方治疗跌打损伤患者567例，一般用药2~5次，均可获治愈。

16. 川乌草乌等治跌打损伤

[方 剂] 黄栀子60克，川乌、草乌、生姜各15克，柑子树叶30克（鲜品、捣烂），香附子15克（鲜品、捣烂）。

[制用法] 将上药共研为细末，以酒、面粉适量调和敷于患处。

[验 证] 用上药治疗跌打损伤患者，观察20例，其中，打伤12例；扭伤3例；跌伤5例。一般仅敷用，忌内服。

五十七、急性腰扭伤

祖国医学称其为“闪腰岔气”。认为是因外伤或劳动用力不当，而伤及腰脊，致使经络受阻，气血不足所致。

1. 闪腰定痛汤治疗急性腰扭伤

[方 剂] 木香、小茴香、延胡、红花、续断、泽兰、淮牛膝、甘草。

[制用法] 水煎服，每日1剂。

[功 效] 行气活血止痛。气血瘀滞之腰痛症。证腰痛如刺，痛有定处，拒按，转侧不利，舌紫黯或瘀斑，脉涩。多见于急慢性腰肌损伤、腰椎骨关节损伤，坐骨神经痛等，属急性发病者（俗称闪腰）。

[验 证] 贵刊1984年第9期刊登的“腰腿痛证治经验”一文中，作者介绍了“闪腰定痛汤”，笔者通过多年的临床试用验证，效果确实很好。病例：周×，男，33岁，因弯腰抱小孩时闪着腰部，疼痛1周而入院。入院前曾贴敷伤湿膏及服用中药数剂，未效。证见：右侧弯手扶腰部艰难行走，转侧、伸屈受限，抬腰、咳嗽均引起疼痛加剧；舌淡、苔薄白，脉弦滑。遂试投“闪腰定痛汤”。处方：广木香、小茴香、红花、延胡、淮牛膝、泽兰、续断、甘草。3剂后，症状大见改善。守上方略加减，共服14剂，步履如常，弯腰抬腿自如，疼痛消失而痊愈出院，随访至今无复发。又治刘×，腰部素有闪挫史，且先后多

次不慎闪腰，均服“闪腰定痛汤”而痊愈。笔者体会到，本方不仅像文中所说那样主要对急性期有效，而用对素有闪腰史而急性发作者亦有较好的效果。

[备 注] 引自 1988 年《医学文选》7。

2. 内伤膏治急性腰扭伤

[方 剂] 羌活、麻黄、当归各 50 克，公丁香 100 克，独活、生附子、苍术、草乌各 20 克，升麻、半夏、川乌、白芷、姜皮、桂枝、菖蒲各 50 克。

[制用法] 上药用香油 1 500 克浸泡 7 日熬枯去渣，炼至滴成珠，下黄丹 3 000 克，搅匀待冷，将肉桂、乳香、没药、大黄、青皮各 30 克研细粉加入和匀备用。外敷患处。

[功 效] 祛风除湿，温经散寒，活血化瘀，通络止痛。

[验 证] 屡用效佳。

[备 注] 引自《疡医大全》。

五十八、颈 椎 病

颈椎病是一种进展缓慢的退行性常见多发性骨疾患，多见于中年以上的人。轻者头、颈、臂、手、上胸、背疼痛麻木；重者可出现四肢瘫痪、大小便失禁等。颈部是头与躯体联结的部位，头部的血液供给大脑及躯体的神经系统，以及饮食、呼吸等生命活动，都需要经过颈部相互沟通。不仅如此，颈部还是头部活动的枢纽。由于颈部椎骨的协同作用，头部才能向前、后、左、右转动，并可以进行仰头、俯视等活动。正因为如此，颈部很容易受伤，例如：扭伤、落枕。

临床上常用的治疗颈椎病的偏方、验方主要如下：

1. 桂枝加葛根汤治疗颈椎病

[方 剂] 桂枝、白芍各 18 克，甘草 12 克，葛根 25 ~ 40 克，生姜 6 克，大枣 6 枚。

[加 减] 局部凉甚加附子；颈项沉困加羌活、独活；手臂麻木加当归、川芎、川牛膝；病程较长加天麻、全蝎、地龙；肾虚者加鹿角霜、山茱萸、威灵仙。

[制用法] 水煎服。每天 1 剂，20 天为 1 疗程。

[功 效] 颈椎病良药。

〔验 证〕 孙×，女，53岁，1982年10月5日诊。平素腠理不固，常感冒。两年前患颈部疼痛，经推拿则缓解，遇阴雨寒凉症加重，渐至颈项强硬，转动不灵。经用多种中药，症时轻时重。颈椎片示骨质疏松，生理曲度强直，颈5、6、7椎后缘骨质增生明显。诊时自觉颈部有掌心大小一片发凉麻木；感觉丧失，转动有响声，头后仰则右胸、肩臂到手指沉困麻木，舌淡、苔白润，脉沉缓。此乃脾肾阳虚，寒阻经络。处方：粉葛根25克，山茱萸20克，白芍12克，桂枝、独活、天麻各10克，炙甘草、附子、羌活、川芎、川牛膝各9克，生姜6克，大枣6枚。连服5剂，每剂服后均有微汗出。服后颈部轻松，局部发凉好转，以其体虚，上方去羌活、川芎，加鹿角霜、仙灵脾。服药1个疗程，颈项转动灵活，体质有所好转。再用上方加减调治60余剂，诸症若失而愈。颈椎X线片示生理曲度、骨质增生均好转，随访至今未复发。

2. 全蝎、蜈蚣等治颈椎病

〔方 剂〕 全蝎9克，蜈蚣2条，鹿含草30克，乌蛇、当归、川芎、自然铜各15克。

〔加 减〕 若上肢麻木疼痛较重者，加桑枝；若颈部强直疼痛重者，加葛根；若眩晕、昏仆者，加地龙、钩藤、泽泻、若气候剧变时症状加重者，加汉防己，秦艽。

〔制用法〕 将上药水煎，分2次口服，每日1剂。

〔验 症〕 用上药治疗颈椎综合症患者19例，其中症状完全消失或其本消失11例，主要症状显著改善5例，服药15剂以上症状无明显改善者3例。服药最少者15剂，最多者60剂，平均36剂。

3. 全当归、细辛等治颈椎病

〔方 剂〕 全当归、三七、红花各等量。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，过120目筛后，装瓶备用。用时，每次服3克，用黄酒或温开水送服。本方也可作成胶囊吞服，每粒重0.5克，每服4~5粒。每日3次。10天为1个疗程。

〔验 症〕 用本方治疗各型颈椎病患者95例，其中，治愈者86例；显效者5例；无效者4例。治愈的86例中，1个疗程治愈者32例，2个疗程治愈者44例，3个疗程治愈者10例。

4. 葛根、丹参等治颈椎病

〔方 剂〕 葛根、丹参、白芍、威灵仙、防风各 50 克，细辛、川芎、乳香、没药、川椒、五加皮、桂枝、桑枝、荆芥、生甘草各 20 克，细辛 3 克，全蝎、蜈蚣各 10 克。

〔制用法〕 将上药研为极细末，装入瓶内备用，每次服 3 克，黄酒或温开水送服。每日 3 次。

〔验 证〕 用本方治疗颈椎病患者 72 例，其中，治愈者 65 例；显效者 4 例；有效者 3 例。

5. 葛根、白芍等治颈椎病

〔方 剂〕 葛根、白芍、当归各 30 克，丹参、木瓜、生地、全蝎、川芎、桂枝、酸枣仁、乳香、没药各 10 克，细辛 3 克，生甘草 12 克。

〔制用法〕 每日 1 剂，水煎分 3 次口服。

〔验 证〕 用本方治疗颈椎病患者 113 例，其中治愈者 102 例，显效者 6 例，无效者 5 例。治愈的 102 例中，5~10 剂治愈者 42 例，11~15 剂治愈者 22 例。

6. 乌梢蛇、甘草等治颈椎病

〔方 剂〕 乌梢蛇、甘草各 15 克，蜈蚣 2 条，穿山甲 12 克，全蝎 8 克，川芎、自然铜、木瓜各 10 克，细辛 3 克，葛根 40 克，白芍 50 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分早、中、晚 3 次饭后服，每日 1 剂。5 剂为 1 个疗程，直至痊愈。

〔验 证〕 用本方治疗颈椎病患者 25 例，经用药 2~4 个疗程后，其中，治愈者 23 例，显效者 2 例。

五十九、脚 跟 痛

该病为老年常见病，病因以炎症压迫，损伤和骨刺形成为主，以行走或负重疼痛为主要表现。

1. 温补肾阳汤治疗足跟痛

〔方 剂〕 鹿角胶、龟板各 15 克，熟地、当归、牛膝、茯苓、杜仲、菟丝子、党参各 10 克。另用硫磺末每天 3 次，每次 1 克。

〔制用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功效〕 温补肾阳，益精填髓。

〔验证〕 那××，男，50岁。患右足跟痛1年余，求治均罔效。痛肢无任何骨质改变，跛行，步履艰难；且伴腰膝酸软，头晕耳鸣，健忘失眠，舌淡胖苔薄白，脉沉细。处以原方，患者服3剂后疼痛减，再服6剂而愈。随访未有复发。

六十、漏肩风

本病又称“肩周炎”，“五十肩”，多于50岁左右发病，是肩关节软组织的一种慢性风湿性病变。

1. 黄芪桂枝五物汤加减治漏肩风

〔方剂〕 黄芪30克，桂枝、赤芍、羌活、姜黄各6克，桑寄生9克，地龙10克，当归6克。

〔制用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功效〕 益气补血，温经和营，祛风利湿，活血通络。

〔验证〕 林××，男，36岁。患左肩关节痛已一年，活动受限，不能肩挑，穿衣困难；舌淡苔白，脉细无力。处以上方2剂痛止，4剂手臂伸展自如，随访未见复发。

〔备注〕 在治疗过程中，配合肩髃、曲池、外关、合谷穴针刺治疗，效果甚佳。

六十一、踝关节扭伤

本病是由于自身暴力为主所致的一种踝关节周围软组织损伤。

1. 鲜土牛膝捣敷治踝关节扭伤

〔方剂〕 鲜土牛膝适量。

〔制用法〕 将上药捣烂，加少许食盐和匀，外敷患处，用绷带固定，每天1次。

〔疗效〕 治扭伤有良效。

〔验证〕 吴××，男，27岁，农民，1987年6月18日就诊。因担尿浇秧苗，路滑将右足外踝内翻扭伤，局部肿痛，行走困难。用上药捣烂加少许白酒外敷，第2天肿大消，行走觉轻微疼痛，再敷1次获愈。

六十二、眼 疾

眼部疾病病因可分为感染，炎症，外伤及眼部自身调节障碍，免疫反应等，祖国医学在治疗眼疾方面疗效安全可靠，其临床用途较好的偏方，验方如下：

1. 大发散治眼疾

[方 剂] 麻黄、蔓荆子各 30 克，细辛 3 克、藁本 15 克，老姜 20 克。此五味为大发散。加羌活、防风、川芎、白芷为九味大发散。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂。

[疗 效] 治眼疾良效。

[验 证] 一男性病者，因淋雨发病，目赤红肿畏光，伴头痛恶寒等症，以感冒论治而病情减轻，然停药病作。双眼疼痛红肿至眉梢，流泪畏光，脉浮数，苔微黄。遂予麻黄、蔓荆子各 30 克，细辛 3 克，藁本、羌活、防风、川芎、白芷各 15 克，老姜 60 克，3 剂而愈，随访一年后未复发。

2. 胡萝卜汤明目

[方 剂] 胡萝卜（选用紫红色胡萝卜更佳）、牛脑各适量。

[制用法] 煮汤。可加调料服食。

[功 效] 养肝明目。防治夜盲症

[验 证] 治疗 10 例，9 例痊愈，1 例好转。

[备 注] 胡萝卜含有大量糖分和维生素 B₁，B₂ 以及挥发油、胡萝卜碱、钙、磷等等，而维生素 B₁ 对眼的补益更大。古代医籍《医林纂要》云：“胡萝卜，甘补辛润，温肾阳，功似蛇床子。”故与牛脑配伍，对补益眼睛、明目和防治夜盲症、视力减退或老人双目昏花，都有一定的功效。

3. 洗眼良方疗诸眼疾

[方 剂] 青皮（即橘子未成熟或将成熟的小果皮）、芒硝各 15 克。

[制用法] 以水 250 ~ 300 毫升（两小碗）先煎青皮，水开后再煎 20 分钟，后入芒硝煎 10 分钟。待晾至 35 ~ 40℃，用双层纱布过滤后备用。

洗眼温度：久病体弱者宜温洗，新病炎症或旧病复发急性期及体壮实者宜冷洗（或微温）。洗时以净棉花或纱布淋洗之。

洗眼时间：晨洗脸后和睡前各洗 0.5~1 分钟。洗的时间不宜太长。洗 2 天后换新药。

[功效] 清热祛湿，理气化痰、软坚止痛。用于治疗急慢性结膜炎、角膜炎、角膜水肿、角膜云翳斑翳、翼状胬肉、眼肿痛痒、目赤、白睛肿起者、白内障初期（及老年性）、玻璃体混浊、青光眼（眼压高、目痛）等症。

[验证] 临床验证多次，疗效极佳。

[备注] 方见《老年报》1992 年 4 月版，中医眼科专家浓霍夫老大夫撰《青皮芒硝治眼病》一文。据云，此两味药乃一验方，见唐《千金方》、明《审视瑶函》。

4. 猪肝夜明汤治诸眼疾

[方剂] 猪肝 100 克，夜明砂 6 克（中药店有售）。

[制用法] 将猪肝切成条状，锅内放入一碗水，同夜明砂以文火共煮。吃肝饮汤，日服 2 次。

[功效] 补肝养血，消积明目。用治小儿出麻疹后角膜软化，贫血引起的眼朦、夜盲、内外障翳、视力减退。

[验证] 《家庭医生》杂志介绍读者反映效果理想。

5. 花椒制剂疗沙眼

[方剂] 花椒皮 10 克，花椒子 5 克，清油 10 毫升。

[制用法] 上三味用烧瓶煮沸 30 分钟，过滤 2 次，备用。每日滴眼 2 或 3 次。

[功效] 行瘀、除湿、解毒。用治沙眼。

[验证] 据《医学情报通讯》1959 年 10 期报道：郭某，患沙眼Ⅱ期，曾用青霉素、硫酸锌等内服外敷，结膜炎症虽有消退，但滤泡及乳头未消失，经行沙眼挤压术，点花椒油观察半月，睑结膜滤泡及乳头全部消失。

6. 红番薯叶羊肝治夜盲

[方剂] 红番薯叶 150~200 克，羊肝 200 克。

[制用法] 薯叶洗净，切碎，羊肝切片，加水同煮。食肝饮汤，连服 3 日，每日 1 次。

[功效] 补肝养血，表热明目。用治夜盲。

[验证] 代×，男，38 岁，患夜盲，经用上方治愈。

[备 注] 红番薯叶或黄番薯叶治疗效果较好，而红皮肉黄番薯之叶更好。

7. 南瓜露治眼球外伤

[方 剂] 南瓜。

[制用法] 南瓜洗净，切片（去子），装入罐内，密封罐口埋入地下，数月后，化为液体，用纱布过滤，取其汁液，即为南瓜露。用此液涂敷患处，日3或4次。

[功 效] 清实热、解火毒。用治眼部外伤及烫伤。

[验 证] 据《江苏中医》1957年2期介绍：朱某之子因玩火枪不慎，火药射出伤及眼球。当时眼球凸出眼眶之外，如鸡蛋大，鲜血淋漓，情势危急。后用南瓜露罨（yǎn，覆盖）敷，3日后，眼球回入眼眶，1周后，恢复正常。3周后充血消失，3月后视力恢复。

8. 张氏验方治疗眼疾

（一）狼毒膏

[方 剂] 大狼毒适量。

[制用法] 上药捣烂如泥膏状，备用。用时取膏贴敷前额及印堂穴上，敷至皮肤发红，每隔5小时换药1次，连敷3天。

[功 效] 拔毒明目。青光皮肤。肺受风邪，上攻于目，骤发头痛，头重，视物朦胧，瞳变浅绿。

[验 证] 屡用有效。

[备 注] 引自1988年《医学文选》（1）祖传秘方验方集。

（二）明目膏

[方 剂] 秦皮、乳香、胡黄连各10克，珍珠5粒（另研细），灯芯灰1.5克，白蜜适量，龙脑冰片少许。

[制用法] 先将前3味药共研细末，与珍珠粉、灯芯灰、冰片同研和匀，用白蜜调匀成软膏状，备用。用时取膏适量贴敷患眼上，上盖敷料，胶布固定，每1~2日换药1次。

[功 效] 清心肝热，活血养阴，明目。

[验 证] 屡用有效。

[备 注] 笔者祖传秘方。

（三）还睛膏

[方 剂] 胡黄连、青黛、当归尾、香附子各15克，冰片5克。

〔制用法〕 上药（除冰片外）共研细末，入冰片同研和匀，及白蜜调匀成软膏状，备用。取膏适量贴敷双侧内关、肝俞穴上，外以纱布盖上，胶布固定，每2~3日换药1次。

〔功效〕 清肝解郁，养阴散瘀。治疗视神经萎缩。

〔验证〕 屡用有一定效果。

〔备注〕 笔者经验方。本病为顽固性之眼病，治疗颇难。治疗应以内治为主，辅以外治，可提高疗效。

（四）复方生姜膏

〔方剂〕 鲜生姜（洗净去皮）0.6克，明矾面6克，黄连面、冰片各0.6克。

〔制用法〕 上药共研成泥膏状，收贮备用。病人取仰卧位，用1寸长、半寸宽的2层纱布条将眼盖好，然后在眉上一横指往下，鼻上一横指往上，两边至太阳穴区域内将药膏敷上，眼区可稍厚一些。敷后静卧，待药膏自然干裂时为止。每日敷药1次。

〔功效〕 清热明目。治近视眼。

〔验证〕 治疗298只眼，显著进步143只，进步129只，无效26只。

〔备注〕 引自1975年《辽宁医药》（1）。

（五）穴贴宁

〔方剂〕 细辛、樟脑各1.5克，龙脑1克。

〔制用法〕 上药共研细末，过140目筛；入冬绿油1克，辣椒浸膏0.5克，凡士林14.6克，羊毛脂8克，搅拦均匀，最后加入麝香0.3克，充分混合，用石蜡油适量调节稠度，密闭备用。每次取小米粒大小的药膏放入耳穴上，外用胶布固定，取主穴为：肝、肾、脾、眼；配穴为：交感、枕、近视3、近视4、新眼点、后眼。每次贴主穴加配穴1或2个，5天换贴1次，并检查视力，3次为1疗程。

〔疗效〕 芳香通窍，提高视力。中小学生近视眼。

〔验证〕 治疗160例，318眼（均经电脑验光后确诊），平均年龄13岁，经治1~3疗程后，视力提高1.0或3行以上者146只眼；视力提高1行以上者103只眼；无变化者58只眼，视力下降1行者35只眼。

〔备注〕 引自1987年《山东中医杂志》（6）。

六十三、耳 病

中耳炎俗称“烂耳朵”，中医称为耳疳、耳湿等。临床以耳膜穿孔，耳内流脓为主要表现。是耳科的常见病。

化脓性中耳炎，古称“脓耳”。临床以耳内反复流脓为特征。本病病程缠绵，且常反复发作。尤以儿童为多见。

多因泪水、奶水、呕吐物、洗澡水，或游泳，使水殃及中耳；以及上呼吸道感染时酸性分泌物沿耳咽管进入中耳道等因素，以致耳鼓室发炎所致。

病有急、慢性之分。急性则耳内呈搏动性跳痛，体温升高，听力减退，一旦鼓膜穿破，使脓液从外耳道流出，则疼痛减轻；慢性则多由急性失治，迁延而来，患耳反复流脓，听力减退，每遇外感则耳痛加剧。且或伴有全身性症状。

1. 治耳灵治疗化脓性中耳炎

〔方 剂〕 川黄连粉 3 克，黄柏粉 1.5 克，紫草粉 1.8 克，氯霉素 1 克，四环素 0.75 克。

〔制用法〕 将以上各药粉混合，过 80 目筛，后装瓶备用。用前先把患耳用 3% 双氧水洗拭，再用细棉棒将耳擦干，然后把治耳灵粉少许吹入耳腔中，每天用药 1 次。

〔疗 效〕 治化脓性中耳炎。

〔验 证〕 读《新中医》1981 年第 12 期“治耳灵治疗化脓性中耳炎”一文后，笔者效法加减用于临床，治疗 3 例，疗效满意。应用治耳灵时，余将紫草粉更换为青黛粉以除湿收敛，疼痛者略加红花末，效果更佳。

2. 耳疳散治疗慢性化脓性中耳炎

〔方 剂〕 已出蛾蚕茧 10 个，冰片 0.15 克。

〔制用法〕 将茧壳剪碎，置瓦上煨存性，加入冰片，共研极细末，贮瓶中备用。取耳疳散少许，吹入耳中，每天 2 次。

〔疗 效〕 治疗慢性化脓性中耳炎单纯型。

〔验 证〕 翟某，女，40 岁。患慢性化脓性中耳炎已 30 余年，耳中流脓不绝，时增时减，同时伴有头晕头痛、两目发胀等症。外用耳疳散吹耳，每天 2 次。内服药：珍珠母 30 克，菊花、钩藤、生地、女贞子、潼白蒺藜各 10 克，牡蛎、紫花地丁各 15 克，丹皮 6 克，银花 12 克。每天 1 剂，每剂分两次服用。内服外用同

时进行，共用药7剂，头痛头晕、两目发胀好转，耳中流脓停止。仍以原法续治20天，疗效巩固。

3. 矾冰散治中耳炎

〔方 剂〕 枯矾5克，冰片3克。

〔制用法〕 共研极细末，装瓶备用。用时先以双氧水冲洗外耳，棉签吸干。再取本药少许，吹入耳内，每天1次，连用3次即愈。

〔功 效〕 主治急、慢性中耳炎，听力减退，有脓液外溢者。

〔验 证〕 《新中医杂志》1987年第11期刊登的“治中耳炎验方”，确实有效。经治2则，分别于2~3天症状控制，5~7天痊愈。

4. 冰连散治疗化脓性中耳炎

〔方 剂〕 黄连10克，冰片1克。

〔制用法〕 将黄连研细末，加入冰片再研匀，贮瓶备用。用前取药棉擦净耳内浓液，再滴入少许双氧水，擦干，用麦草管将药末吹入耳内，每天2~3次，一般3~5天见效。无任何不良反应。

〔疗 效〕 耳内流出粘液性脓液，听力减退。如属坏死型或胆脂瘤型者，本方效差或无效。

〔验 证〕 魏××，男，10岁，1982年4月11日诊。患左侧化脓性中耳炎3月余，常流脓性粘液，听力下降，经治疗时好时止，今又复发。先用冰连散原方，治疗5天后耳道仍流出脓液，后将青黛加入“冰连散”内共研吹耳，用药后脓液流出逐渐减少，3天后病愈，随访半年未复发。

5. 耳疳散治慢性化脓性中耳炎

〔方 剂〕 炒黑陈皮炭3克，青橄榄（瓦上煨透）2枚，石榴花（瓦上焙枯）1.5克，梅片0.6克。

〔制用法〕 上药（除梅片外）共研细末，再入梅片同研和匀，贮瓶备用，勿泄气。先用药棉卷去脓水，另以药棉蘸药，掺入耳底自干，每日换药1次。

〔功 效〕 行散郁热，燥湿止痛、疔疳。慢性化脓性中耳炎。

〔验 证〕 临床屡用、确有较好的疗效。

〔备 注〕 引自1959年《上海中医药杂志》(6)。

6. 耳灵散治急慢性化脓性中耳炎

〔方 剂〕 冰片1克，朱砂0.3克，玄明粉、硼砂各1克。

〔制用法〕 上药各研极细末，混合均匀，贮瓶备用。先用棉签将患耳中的脓液擦干净，如耳中脓液较多者，则用双氧水洗耳，然后用喷粉器将“耳灵散”药粉少许均匀地喷撒入耳腔，在粉膜上涂薄薄一层淡赭色粉末为度。清热、消肿、止痛。

〔疗效〕 急性和慢性化脓性中耳炎。

〔验证〕 治疗100例，其中急性化脓性中耳炎40例，慢性化脓性中耳炎60例。治愈者59例，仍有湿润感者23例，好转者15例，无效者3例。获得治愈的患耳，治疗最短者1天，最长者12天，大多数在1~7天以内。

〔备注〕 引自1965年《上海中医药杂志》(12)。

7. 药捻方治化脓性中耳炎

〔方剂〕 红升丹60克，冰片3克，麝香1.5克。

〔制用法〕 上药共研成极细末，用脱脂药棉搓成长约2~3厘米，直径0.1厘米药捻，消毒备用。首先清除外耳道脓性分泌物，再以2%双氧水擦拭干净，然后以75%酒精浸湿药捻，在药粉沾匀，置于外耳道底部（注意药捻应与鼓膜保持约2毫米之距离，以免刺激鼓膜，产生不适）即可。每日换药1次，分泌物少时可隔日换药1次。

〔功效〕 清热解毒，散瘀利湿，宣窍收敛。治疗化脓性中耳炎。

〔验证〕 一般换药2~5次即脓止耳干。治疗30例，除1例疗效不明（治疗1次中止），2例骨疡型短期复发外，其余27例用药2~5次而获痊愈。

〔备注〕 引自《百病中医诸窍疗法》。

8. 猪胆白矾末治中耳炎

〔方剂〕 猪胆1个，白矾9克。

〔制用法〕 将白矾捣碎放入猪胆内，阴干或烘干，研成细末，过筛。用时，先用3%的双氧水洗净耳，拭干脓液，然后用笔管吹入猪胆粉剂。每2~3天用药1次。

〔功效〕 清热解毒，消肿止痛。治化脓性中耳炎。

〔验证〕 用上方治疗100例，皆痊愈。

〔备注〕 据《医学》杂志介绍，此方配合西药内服和注射，治愈率达90%。

9. 海螵蛸治疗聾耳

〔方 剂〕 海螵蛸、香油或麻油适量，冰片少许。

〔制用法〕 用淡水漂洗干净，然后日晒夜露至无腥味且干时入药，研成细末。取2~3克，加入香油（麻油），或再加冰片少许，调成粘稠液体备用。先用生理盐水棉球洗涤耳内脓液，擦干，然后滴入本药液2~3滴，每天1~2次，连续1星期，最多不超过半月，即可见效。

〔功 效〕 治聾耳有良效。

〔验 证〕 《新中医杂志》1982年第6期“海螵蛸治疗聾耳”一文时，正好遇一小孩患聾耳，长期治疗不愈，我即如法制备，用药少日即获痊愈。

六十四、鼻 症

鼻炎，一般分为单纯性急、慢性鼻炎，肥厚性鼻炎，干燥性鼻炎和萎缩性鼻炎等，属中医“鼻塞”、“鼻鼽”等病范畴。是临床常见多发病。

多因外邪侵犯，脉络受阻，壅滞鼻窍；或脾肺虚弱，肺气失宣，脾失健运，气血瘀滞，客于鼻窍所致。若迁延失治，又可转成慢性。

1. 劫敏汤治疗过敏性鼻炎

〔方 剂〕 黄芪、诃子肉、干地黄、乌梅、豨莶草各10克，柴胡3克，防风6克，蜂蜜30克（兑服）。

〔加 减〕 见畏寒怕冷、苔白、脉细等寒象者，加细辛、荜拨；清涕甚多者，加石榴皮、益智仁反复发作，难以根治者，加重黄芪、柴胡、防风3药用量。

〔制用法〕 水煎服。

〔疗 效〕 治过敏性鼻炎有良效。

〔验 证〕 张××，女，28岁，会计，1987年5月10日诊。患过敏性鼻炎3载，反复发作，屡受针药之苦。半月前受凉后，至今鼻塞如堵，清涕不绝，狂嚏不止，鼻道奇痒。检查：两侧下鼻甲肿胀，粘膜苍白，鼻道见清稀分泌物，舌苔薄白，脉细濡。拟予劫敏汤。处方：黄芪20克，柴胡、蝉蜕、防风各6克，诃子肉、干地黄、乌梅、豨莶草、石榴皮各10克，3剂。复诊：药后嚏涕已止，稍有鼻塞鼻痒感，守上方五剂，诸症若失。

2. 玉屏风散加味治疗过敏性鼻炎

【方 剂】 黄芪 20 克，白术 10 克，防风、辛荑花各 6 克，苍耳子 9 克，炙甘草 5 克。

【制用法】 每天 1 剂，水煎服。

【疗 效】 治疗过敏性鼻炎有良效。

【验 证】 张××，女。35 岁，1989 年 12 月 13 日初诊。鼻塞、鼻痒、流清涕，打喷嚏，头昏头痛，病已 2 年余。曾内服外用多种西药，疗效不显。检查：鼻粘膜呈灰白色，双下鼻道有水样分泌物，下鼻甲肥大。诊为过敏性鼻炎。予上方加白芷 5 克，蔓荆子 9 克。服药 8 剂，诸症减轻；再 8 剂而愈。

3. 祛风宣肺汤治鼻炎

【方 剂】 苍耳子 15 克、炙麻黄 9 克、辛夷 9 克、蝉衣 15 克、甘草 9 克。

【加 减】 头痛者加白芷 10 克；涕多黄粘者加黄芩 15 克。

【制用法】 煎 2 遍和匀，日 3 次分服。

【功 效】 苍耳子、蝉衣祛风通窍；炙麻黄宣肺；辛夷利九窍而通鼻塞；甘草调和诸药。本方祛风宣肺通利鼻窍为治鼻渊之良药。

【验 证】 方××，女，30 岁，工人。就诊日期：1980 年 10 月 16 日。3 年来每春秋季节令凉即感鼻堵、鼻痒、嚏多、流清涕。这次发作 3 周，五官科诊为过敏性鼻炎。用扑尔敏、点扑麻合剂时有效，停药则加重。予本方治疗，3 天后症状减轻，连用 1 周后缓解。

【备 注】 避风寒及接触过敏物质，发作时及早服药。

4. 斑蝥方治鼻炎

【方 剂】 斑蝥适量。

【制用法】 上药生用，去足翅研细末，贮瓶备用。

【用 法】 用时取斑蝥粉适量，以水或蜂蜜调为稠糊状。病人取仰坐或仰卧位，擦洗干净印堂穴。取 1 小块胶布，中间剪一黄豆粒大小的孔，先贴于印堂穴，后将药粉直接涂于小孔之内，外以胶布贴盖，24 小时后去掉。通窍拔毒。

【疗 效】 治鼻炎。

【验 证】 治疗 680 例，痊愈 537 例，显效 100 例，无效 43 例，总有效率为 93.58%。

〔备 注〕 引自 1990 年《上海中医药杂志》(2)。①1 次不愈者，1 周后可重复使用。②外贴面积不宜过大，尤其注意不要让药物误入眼内或口中，以免发生意外。③贴后一定会引起皮肤局部发红起泡。水泡局限于表皮，不浸入深层，除短期色素沉着（停药后可自行消失），不遗留瘢痕。水泡较小者用 75% 酒精棉球压片刻，促使其尽快吸收；较大者以消毒针头刺破，放出水液，涂以 2% 龙胆紫药水，外敷消毒纱布，以防感染。

5. 苍耳油方治鼻炎

〔方 剂〕 苍耳子 15~20 粒，豆油 50 克。

〔制用法〕 将苍耳子炒后，再将豆油沸腾无沫再放苍耳子，至苍耳子煎至黑色焦状为止，再用纱布过滤。将过滤后的药油浸泡纱布条（1 厘米×4 厘米）备用。取油纱条放置在双下鼻甲上，隔日或 1 日涂药 1 次，也可用此药油滴鼻，1 日 1 次。

〔功 效〕 祛风、消炎、通窍。慢性单纯性鼻炎，过敏性鼻炎，及肥厚性鼻炎。

〔验 证〕 治疗 51 例，显效 29 例，好转 16 例，无效 6 例，总有效率为 88.23%，但对肥厚性鼻炎效果一般。

〔备 注〕 引自 1988 年《黑龙江中西药》(1)。

6. 大蒜膏治鼻炎

〔方 剂〕 香附、荜茇各等份，大蒜适量。

〔制用法〕 将上药捣成饼，备用。贴囟门。并用艾条隔药悬灸。

〔功 效〕 散寒、理气、拔毒。老人鼻流清涕。

〔验 证〕 屡用有效。

〔备 注〕 引自《外治汇要》。

7. 克敏灵治过敏性鼻炎

〔方 剂〕 白芥子 2 份，玄胡、甘遂、丁香、白芷、细辛各 1 份。

〔制用法〕 上药共研成细末，过 80 目细筛，用新鲜生姜汁调匀成糊状，贮罐备用。用小匙取出一定量药膏放于 4 厘米×4 厘米的纱布棉垫中央，贴敷于大椎，肺俞（双），膏肓（双）、肾俞（双）、膻中穴上，用胶布固定。每次贴敷 3 小时，5 天贴 1 次，3 次为 1 疗程。

〔功 效〕 散寒逐饮，理气化痰，祛风抗敏。过敏性鼻炎。

[验证] 坚持使用，疗效显著。

[备注] 引自《外治汇要》。

8. 复方麝香膏治过敏性鼻炎

[方剂] 白芥子、细辛、甘遂、辛夷各等份，麝香适量。

[制用法] 将前4味药共研细末，贮瓶备用。麝香研细另装。用时取药末适量，用姜汁调成糊状，做成如铜钱大的药饼。药面放入少许麝香，分别贴敷于肺俞（双）、膏肓（双）、百劳（双）穴上，每次贴6~8小时后除去，10天贴药1次，3~6次为一疗程。

[功效] 温化逐饮，通窍抗敏。治过敏性鼻炎。

[验证] 治疗158例，显效29例，有效60例，无效69例，总有效率为56.4%。

[备注] 引自《治验秘录》。①若出现水泡者，可挑破涂以龙胆紫药水，以防感染。②要注意天气变化，避免寒冷刺激和可能引起的过敏因素。③若适当配合解表扶正之中药内服，可提高疗效。④或用指天椒阴干研细末，用蒜汁或姜汁调制成绿豆大，第1次贴于印堂、肺俞（双）。第2次贴于迎香，脾俞（双）、肾俞（双），轮换使用，7天为1疗程，休息3天再进行第2疗程，一般治疗3个疗程，可收良效。

9. 外用蒜液治鼻炎

[方剂] 大蒜（选紫皮蒜最佳）。

[制用法] 蒜洗净，捣烂如泥，过滤取其汁，与生理盐水配成40%大蒜液，或与甘油配成50%大蒜油。同时以棉卷蘸液涂布鼻腔内，每日3次。

[疗效] 治萎缩性鼻炎。症见头痛、鼻塞、嗅觉减退或消失、鼻腔内有黄绿色痂皮附着、鼻干、流涕或黄绿色鼻涕、出血等。

[验证] 据《中华耳鼻咽喉科杂志》1957年2期介绍，试治20例萎缩性鼻炎，痊愈者10例，改善者9例，无效者1例。

10. 辛黄花散塞鼻治鼻窦炎

[方剂] 辛黄花15克，白芷、苍耳子各10克，桂枝5克。

[制用法] 将上药烘干研末过筛，装瓶备用。每天晚饭后取药末1克，一寸见方双层纱布2块，将药末分包成2个药球，以棉纱扎紧，并留线头一寸左右，先塞1个药球于一侧鼻孔，用另一鼻孔呼

吸；1小时后将药球拉出，将另1药球塞入对侧鼻孔。一般5天左右即见好转。10天为1疗程，轻者2疗程可愈，重者亦可减轻诸症。

[疗效] 治鼻窦炎有良效。

[验证] 吕××，女，40岁，1987年6月诊。鼻塞、头痛、语音重浊10余年，经多方治疗无效，经用上药塞鼻，当即显效，塞鼻2小时后取出，即感鼻腔通畅，头痛明显好转，坚持治疗1月而愈。

[备注] 使用上药容易出现打喷嚏及鼻涕增多现象，药球每随喷嚏而出，重新塞入即可。

11. 大蒜贴敷方治鼻窦炎

[方剂] 大蒜适量（独头蒜尤佳）。

[制用法] 上药去衣、切片、备用。取蒜片，贴敷两足心涌泉穴，并包扎固定。或捣泥贴敷足心。

[功效] 导引拔毒。鼻窦炎。

[验证] 屡用有效。

[备注] 民间方。

12. 苍耳散治鼻渊

[方剂] 苍耳子、辛夷花15克，香白芷10克，薄荷叶3克，细辛5克，冰片1克。

[制用法] 上药共研极细末，贮瓶备用，勿泄气。每用少许，以消毒药棉薄裹之塞入患鼻孔中。每日1~2次，10日为1疗程。间隔3~5日再断续进行下1疗程，直至痊愈。

[功效] 疏风清热，通窍止痛。鼻渊。

[验证] 治疗23例（病程最长者8年，最短者11天）治愈18例，好转3例，无效2例。

[备注] 引自《中药鼻脐疗法》。

13. 辛夷散治鼻窦炎

[方剂] 辛夷（取心去壳）、薏仁各3克，川黄连6克。

[制用法] 上药共研极细末，贮瓶备用。以棉裹药，塞纳鼻中。

[功效] 化痰热，通鼻窍。副鼻窦炎，急性鼻粘膜炎症，慢性肥厚性鼻炎，嗅觉迟钝或消失。

[验证] 屡用均有较好的疗效。

[备注] 引用 1954 年《新中医药》(10)。

六十五、牙 痛

牙痛是多种牙齿疾病和牙周疾病常见症状之一。因其疼痛性质和部位不同，因而牙痛的类型和治疗也不同。包括西医学“急性牙髓炎”、“牙龈炎”、“牙周炎”等疾病。

1. 固齿散治疗牙周炎

[方 剂] 滑石粉 18 克，甘草 3 克，朱砂末 0.9 克，雄黄末、冰片末各 1.5 克，研匀，装瓶备用。

[制用法] (1) 用牙刷蘸药刷患处；(2) 平时刷牙后再用牙刷蘸药刷患处；(3) 取药末 30 克，生蜜 60 克，调匀涂患处。早晚各 1 次。

[功 效] 清热解毒，消肿止痛，化腐生肌，收敛止血。

[验 证] 我用《新中医》1982 年第 2 期刊登的固齿散治好了多年的牙病，并把这一方法介绍给另一患者，均得到满意疗效。

我自 1971 年 3 月患牙病，症状为口热、牙痛、牙齿松动，牙龈出血等，初以为小恙，未加介意。后用多种药物治疗效不显，又用止痛片、抗生素、维生素等药物治疗亦未效。1974 年到医院拔掉左下第一白齿，病仍不除。此后多方求医，服许多中西药，症状仍不见好转，1982 年起更加严重，如刷牙、漱口、舔龈，均有出血，牙龈部轻度化脓，牙根暴露，满口牙齿松动，饮食极为不便，喝水食饭，其痛难忍，多方用药只见小效。1982 年夏初病情又加重，惴惴不安，遂横下一条心向书本寻方，翻阅了十多本医书及 6 种中医杂志，后从《新中医》找到了“固齿散”一文，颇受启迪，遂于 10 月 16 日起用本方治疗，至 18 日症状大减，20 日即不再出血，26 日停药 1 天，继用到 31 日止，牙病诸症悉除，迄今 1 年多未复发。

另一患者冉×，女，36 岁，邻居。每见我用药粉刷牙，询问缘由。当得知治牙痛时，即诉说患牙痛十多年的苦衷，且索药以求一试，同病相怜，乃慨然与之。10 月 25 日起至 11 月 4 日，喜告曰：牙疾已愈，祈再赐药以巩固。病愈后一再向我致谢。

2. 引火散风汤治疗牙痛

[方 剂] 破故纸 10~12 克，白蒺藜 9~12 克。

[加 减] 痛甚加防风、荆芥各 6 克；血瘀加桃仁 9 克，红花、川牛膝各 12 克；便秘加大黄 9~12 克；小便黄赤加栀子 6~9 克，竹叶 6 克；牙齿松动加玉女煎；牙龈肿痛，口气臭秽加清胃散；小儿龋齿加生石膏 15~30 克，细辛 2~5 克，熟地 10~20 克；伴发热加银花 30~60 克，连翘 12~30 克，玄参 15 克；夜间口咽干燥加熟地 30~60 克，巴戟天 12~20 克，麦冬 10 克，茯苓 9 克，五味子 5 克；牙痛昼轻夜甚加当归 15~30 克，知母 15 克；遇冷痛剧加麻黄 10 克，制附子 6 克，细辛 3 克。

[制用法] 水煎服，每天一剂。

[功 效] 消炎、去痛。

[验 证] 陈××，女，60 岁，1984 年 6 月 16 日诊。右侧牙龈肿痛，痛无休止，右面颊部肿胀、拒按，张口困难；伴恶寒发热，大便秘结，舌红、苔薄黄，脉弦数。予上方合清胃散加味。处方：白蒺藜 10 克，升麻、黄连各 6 克，当归 15 克，破故纸、生地、丹皮各 12 克，金银花 60 克，连翘、生石膏各 30 克，大黄 9 克，3 剂药后痛减热退，能进食软食。原方加僵蚕 15 克，续服 3 剂而愈。嘱服知柏地黄丸善后，随访 2 年未复发。

3. 石地丹黄汤治牙痛

[方 剂] 生石膏 30 克，鲜生地 12 克，丹皮 10 克，川黄连 9 克。

[制用法] 每天 1 剂，痊愈为止。

[功 效] 消炎、去痛。

[验 证] 《新中医》1983 年 1 期介绍的“治牙痛有效验方”，笔者重复使用治疗 15 例，全部治愈。

4. 牙痛散治牙痛

[方 剂] 人中白、玄明粉、制硼砂各 30%，地力粉（与上药成比例）、血竭、朱砂各 10%（和匀研细加入）、新梅片（以上药总和量基础上 1% 细入）。

[制用法] 上药共研极细末，瓶贮备用，勿泄气。以药棉裹药末如蚕豆大放于病灶上（即蛀孔内），上下牙咬紧即可。

[功 效] 解毒活血，杀虫止痛。龋齿痛（牙龈肿痛）。

〔验 证〕 屡用特效，止痛效果显著。

〔备 注〕 引自《百病中医诸窍疗法》。又用大枣1枚（去核）纳信百石1克，煨煨存性，取出待冷，研成细末。每取适量纳龋齿中。一般药后10分钟疼痛立消。

5. 麝脐散治牙痛

〔方 剂〕 牛膝（去芦）500毫升，木津1280毫升，黄茄（细切）20个，郁李仁640克，麝香空皮子细挫100个。

〔制用法〕 以上5味捣碎入罐子内，上用瓦片盖口，留一小窍，用盐泥固济，烧令通赤，候令白色，即住火，以新土埋一伏时取出，后入下药，升麻、细辛（去苗）各500毫升，上药俱为细末混匀，贮瓶备用。以少许涂敷患处。

〔功 效〕 固齿止痛。牙痛动摇，风火疼痛。

〔验 证〕 屡用神妙。

〔备 注〕 引自《和剂局方》。用此药在很短时间内用温水漱口，临卧更贴少许，咽津亦无妨。

6. 霜梅乳没散治牙痛

〔方 剂〕 白信、川黄柏、甘草各5克，红枣50克，青黛10克，硼砂20克，乳香、没药各2.5克，冰片7.5克。

〔制用法〕 先将红枣去核切片，白信研末加入拌匀于瓦上，以炭火炙至红枣烟尽为度，取出候冷研细，其他各药则分别研细除冰片外皆调匀后收藏。先将患部洗净，然后把收藏的药加入冰片后，取少许撒敷患处，每日5或6次。

〔功 效〕 清热解毒，化瘀止痛，祛腐生肌。牙疳。

〔验 证〕 屡用效佳。

〔备 注〕 引自1959年《浙江中医杂志》（5）。

7. 牙痛小降丹治各种牙痛

〔方 剂〕 防风、细辛、葶苈、荆芥、硫黄各6克，冰片33克。

〔制用法〕 上药共研细末，取玻璃杯1只，砂纸1张，将砂纸包在杯口上，系之，将药粉放在砂纸上，堆成圆柱形，然后在顶上点火，令药粉慢慢燃烧，待烧到药堆基底部（注意不要烧到砂纸）时，把药灰和砂纸除去，刮下玻璃杯内壁上的降丹，贮瓶备用。取降丹少许放在棉花中，再将药棉贴于牙痛处，咬紧即可。

[功效] 祛风、消炎、止痛。各种牙痛。

[验证] 临床应用多年，治疗各种牙痛均有较好的止痛效果。一般用药1次，8分钟后即可止痛，效佳。

[备注] 引自《百病中医诸窍疗法》。

8. 独头蒜煨熟治风虫牙痛

[方剂] 独头蒜2~3头。

[制用法] 将蒜去皮，放火炉上煨熟。趁热切开熨烫痛处，蒜凉再换，连续多次。

[功效] 消炎杀菌，解毒。用治风虫牙痛。

[验证] 赵××，女，27岁，用本方数次后痊愈。

9. 姜矾粉止牙痛

[方剂] 老姜、枯矾等分。

[制用法] 老姜用瓦焙干，研末，枯矾研细，与姜末调匀。涂搽病牙。

[功效] 止牙齿疼痛。

[验证] 据《普济方》载：“有人日夜呻吟（指牙痛——编者注），用之即愈。”

10. 韭菜根花椒止龋齿痛

[用料] 韭菜根10根，花椒20粒，香油少许。

[制用法] 洗净，共捣如泥状，敷病牙侧面颊上。

[功效] 止痛。

[验证] 据《千金方》载，敷此方“数次即愈也。”

11. 胡椒绿豆治牙痛

[用料] 胡椒、绿豆各10粒。

[制用法] 将胡椒、绿豆用布包扎，砸碎，以纱布包作一小球，痛牙咬定，涎水吐出。

[功效] 清热，止痛。用治因炎症和龋齿所引起的牙痛。

[验证] 据《韩氏医通》载，用此法可“立愈”。

六十六、口 疮

复发性口疮亦称阿弗他溃疡，乃系口腔粘膜溃疡反复发生的一种口腔粘膜疾病。其病因，迄今尚未完全清楚，可能与自体免疫性有关。由于体内细胞内存在自体抗原，相应抗体不能与其直接结合，一旦附吸于细胞上病毒或酶使其二者结合，形成可溶性复合物，而作用于肥大细胞，每当感触激震，释放出活性物质遂产生炎症，如此循环反复。临床表现，主要为口腔粘膜反复出现溃疡，有单发、多发，任何部位均可发生。

1. 口疮断生饮治疗复发性口疮

【方 剂】 生黄芪 15 克，太子参 30 克，当归 10 克，生地 30 克，麦冬 10 克，甘草 15 克，肉桂 3 克（研分 3 次冲服），细辛 3 克，肉苁蓉 10 克，赤芍 30 克，生蒲黄 6 克（布包），银花 15 克，连翘衣 15 克，黄柏 6 克，凤尾草 10 克，升麻 6 克，柴胡 6 克，木通 3 克，薄荷 6 克。另肉苁蓉 9 克（研末），五倍子 10 克（沸水泡）。

【制用法】 每日 1 剂，水煎 3 次分次服。30 剂为 1 个疗程。疗程结束后，服肉苁蓉末，每次 3 克，每日 3 次，五倍子水漱口，每日 3~5 次，连用 1 个月。

【功 效】 益气升阳，清热养阴。

【验 证】 胡某某，女，27 岁，职工。口腔溃疡反复发作 4 年余，常以锡类散、维生素 B₂ 等中西药内外治疗，始终未能控制发作，每一月或两月发作一次，有时几乎无明显间歇期。查口腔舌尖、齿颊、齿龈及下唇内缘均有绿豆大小圆形溃疡，呈淡黄色，表面凹陷，边缘微凸，周围红晕，散在分布约 10 余个，唇颊有少数点状疤痕。此次发作已近 2 周，热辣样疼痛，痛甚时口角流涎，不能进食，每日下午洒淅身寒，全身不适；测体温 37℃，脉弱，苔少舌红，大便时溏时结，小便正常。诊为复发性口疮（重型）。证属脾虚阴亏，血瘀热结。方用口疮断生饮：生黄芪、甘草、银花、连翘衣各 15 克，太子参、生地、赤芍各 30 克，当归、麦冬、肉苁蓉、凤尾草各 10 克，肉桂（研分 3 次冲服）、木通各 3 克，细辛 5 克，生蒲黄（布包）、黄柏、升麻、柴胡、薄荷各 6 克。上方共服 30 余剂，又以苁蓉散内服及五倍

子漱口液漱口连用2月余，口疮愈合。追访1年未复发。

2. 外敷膏治口疮

〔方 剂〕 吴茱萸、胆南星、生大黄（按4：1：2比例配方）。

〔制用法〕 上药共研细末，与陈醋适量调成糊状，备用。俟患儿睡熟后，涂敷于两足心（涌泉穴），外加纱布包扎，12小时去之。可根据病情次晚再用1次。用量应按患儿年龄，病势而酌情变更。

〔功 效〕 导热下行。

〔验 证〕 治疗98例，均获痊愈。小儿年龄越小，其效越捷。

〔备 注〕 引自1990年《浙江中医杂志》（7）。

3. 口炎散治口腔炎

〔方 剂〕 山豆根、大黄各30克，黄连15克，人中白2克，青黛20克，砂仁10克，孩儿茶、枯矾、没药各15克，冰片3克。

〔制用法〕 上药共研细末，过100目筛，装瓶消毒备用。口腔消毒，用2%龙胆紫调敷患处。

〔功 效〕 消炎止痛。

〔验 证〕 治疗26例，全部治愈。

〔备 注〕 引自1985年《四川中医》（4）。

4. 青砂散治口腔溃疡

〔方 剂〕 青黛、硼砂各30克，龙脑薄荷末15克，人中白30克，玄明粉15克，孩儿茶30克，马勃15克，冰片6克。

〔制用法〕 上药共研极细末过细筛，装瓶备用，勿泄气。用冷盐开水含嗽后，取药粉撒敷患处，每日3次，口腔内不易撒布之患处，可用芦管吹之。

〔功 效〕 清热解毒，生肌止痛。

〔验 证〕 治疗百余例，全部治愈。轻者1天，重者2~5天即愈。

〔备 注〕 引自1983年《河南中医》（5）

5. 五倍青黛散治口腔炎

〔方 剂〕 五倍子5克，青黛，冰片各7.5克，月石10克，人中白12.5克。

〔制用法〕 上药共研细末，贮存备用。局部（患部）外敷，每日2或3次。

〔功 效〕 清热、消肿、止痛。口腔炎，齿龈炎。

〔验 证〕 治疗口腔炎24例，齿龈炎8例。24例阿弗他性口腔炎，经外

敷3~5次后治愈。

〔备注〕 引自1965年《中医杂志》(11)。

6. 二石青黛散治口疮

〔方剂〕 青黛4克，硼砂、玄明粉各1.4克，煅炉甘石、煅石膏各1克，雄黄0.6克，煅人中白1克，冰片0.4克。

〔制用法〕 上药共研极细末，贮瓶备用。先用茶水漱口，取药粉撒敷患处疮面，日1或2次。

〔功效〕 清热解毒，敛疮止痛。

〔验证〕 屡用效佳。

〔备注〕 引自《外治汇要》。

7. 矾黛散治鹅口疮

〔方剂〕 白矾20克，大枣10克，苦瓜叶、青黛各10克，冰片3克。

〔制用法〕 将大枣去核，将白矾打碎放在大枣中，置瓦上煅至白矾枯白，大枣焦黑为度。冷后再加苦瓜叶研末，然后加冰片，青黛再研至无声为度，瓶贮备用。用时先用冷盐水含漱后，取此药粉撒敷患处，每日1~2次。

〔功效〕 消炎、敛疮、止痛。

〔验证〕 用治上症，效果良好，一般2~3天即可痊愈。

〔备注〕 引自《外治汇要》。

六十七、慢性喉炎

慢性喉炎乃系以长期声嘶、喉干燥及有粘痰不易咳出为主的一种慢性喉部疾病。其病因，多继发于急性喉炎，过度使用声带，不良外界环境刺激，烟酒过度以及全身和局部循环、代谢障碍等，皆为本病致病因素。

1. 爽喉饮治疗慢性喉炎

〔方剂〕 太子参30克，生地30克，怀山药30克，荆芥6克，连翘衣15克，桔梗6克，牛蒡子10克，射干6克，玄参15克，山豆根10克，胖大海10克，金果榄10克，蝉衣6克，僵蚕10克，广地龙10克，杏仁10克，升麻6克，木蝴蝶6克，甘草10克。

〔制用法〕 每日1剂，水煎3次服分3次服。42剂为1个疗程。后期可制丸服。

[功效] 清热解毒，益气养阴。

[验证] 李某某，男，34岁，农民。声音嘶哑伴喉部不适3年余。有吸烟史和急性喉炎史。时感喉咽干燥，发痒呛咳、咯痰少而不爽，音哑多在下午加重。曾经某医院耳鼻喉科检查，诊为慢性喉炎，服中西药及口腔超声雾化吸入治疗，效果时好时差。近来因淋雨感冒，咳嗽、声哑加重，并增咽痛。诊脉浮数，舌红少苔，头昏鼻塞，不发热。查喉咽部粘膜充血，诊为慢性喉炎急性感染发作，初拟桑菊饮化裁以疏散风热。处方：薄荷（后下）、蝉衣、甘草各6克，连翘衣15克，辛夷（布包）、杭菊花、玄参、杏仁、桑叶各10克。服药5剂后，头昏、咽痛、鼻塞已不发作，声哑未减，查喉粘膜弥漫性充血，色黯红，表面粘附少量痰液，脉转细涩，薄黄苔，舌红。改用爽喉饮，从单纯性慢性喉炎治疗。药用：太子参、生地、怀山药各30克，荆芥、桔梗、射干、蝉衣、升麻、木蝴蝶各6克，连翘衣、玄参各15克，牛蒡子、山豆根、胖大海、金果榄、僵蚕、广地龙、杏仁、甘草各10克。上方先后加减共服40余剂，并以原方制丸续服。经4个多月的治疗，发音基本正常，炎症亦消退。随访1年，病愈未复发。

六十八、误吞硬物（刺）

1. 荸荠核桃仁治误吞铜物

[方剂] 荸荠250克，核桃仁120克。

[制用法] 上两味生嚼食之。

[功效] 用治误吞铜钱、铜物。

[验证] 据《河北省中医中药集锦》介绍，郭忠弼大夫用此方治25例患者，全部获愈。又据《家庭食疗手册》介绍，“荸荠配胡桃肉吃1~2斤”见效。

2. 羊胛骨治误吞铜及金

[方剂] 羊胛骨适量。

[制用法] 烧黑，捣碎研末。每次服15克，米汤送下。

[功效] 用治误吞铜、铁、金等金属物。

[验证] 注《本草纲目·兽部》第五十卷载：“汉上张×，女，八岁，误

吞金环子一双，胸膈痛不可忍，忧惶无措。一银匠炒末药三钱，米饮服之，次早随大便下。叩求其方，乃羊胫灰一物耳。”

3. 蚕豆韭菜治误吞针入腹

〔方 剂〕 蚕豆、韭菜各适量。

〔制用法〕 煮蚕豆同韭菜食之，针自大便便出。

〔功 效〕 治误吞针入腹。

〔验 证〕 据《本草纲目·谷部》第二十四卷载：“一女子误吞针入腹，诸医不能治，一人教此法，针自大便出。此亦可验其性之利脏腑也。”

4. 韭苳制剂治误吞金属

〔方 剂〕 鲜韭叶 30 克（去白不切），鲜苳茎 30 克（去叶不切），藕粉（干）30 克，莲房炭 50 克。

〔制用法〕 以上四味，加水四碗以煮熟为度，将莲房取去。日 3 或 4 次菜与激发罔界限吞服。

〔功 效〕 行瘀破滞。用治小儿误金属异物。

〔验 证〕 据《广东医学》1964 年第 3 期介绍：用此法治疗误吞军官领章小国徽 1 例，误吞大别针 1 例，军官棉衣大扣 1 例，马口铁片 1 例，壹分硬币 1 例，5 例分别在服药后 24～72 小时内排出金属异物，疗效满意。

5. 橄榄核散解骨鲠

〔方 剂〕 橄榄核。

〔制用法〕 捣碎研成细粉末。饮服。

〔验 证〕 据《本草纲目》载：一富人食鳊鱼被鲠在胸中，不上不下，痛声动邻里，半月余几死。忽遇渔人钱九，令取橄榄与食，时无比果，以核研末，急流水调服，骨遂下而愈。

6. 大蒜塞鼻治鱼骨卡喉

〔方 剂〕 大蒜 1 瓣，白糖适量。

〔制用法〕 大蒜去皮，由横捏断，塞入双鼻孔勿漏气，干咽白糖 1 匙勿饮水，如不见效再咽 1 匙可愈。

〔功 效〕 用治鱼刺卡在咽喉部，疼痛难忍。

〔验 证〕 屡用效佳。

7. 鳊鱼胆治鱼骨卡喉

[用 料] 鳊鱼胆 1 个，黄酒少许。

[制用法] 将鱼胆晒干，研碎末。需要时取如黄豆大一块碎末，以温黄酒煎化服。

[功 效] 鱼骨卡喉。

[验 证] 屡用效佳。

8. 醋治细骨卡喉

[方 剂] 醋 120 克。

[制用法] 将醋稍温，趁热徐徐喝下，然后大口嚼食馒头，咽下。

[功 效] 用治细骨刺卡于喉中不下。

[验 证] 据《新中医》介绍，该方在治疗鸡骨鱼刺卡喉方面疗效显著。

9. 竹木刺入肉验方

[用 料] 鲜虾、黄雀屎各适量。

[制用法] 共捣烂。敷于伤处。

[功 效] 用治竹木刺入肉内不出。

[验 证] 据《串雅内篇》云：鲜虾并黄雀屎，共捣罨上，即出。

六十九、口 臭

口臭多因上焦湿热积聚脾胃，或口腔溃烂所致。

1. 祛燥方治口臭

[方 剂] 黄连、枸橘李、生甘草各 5 克，焦山楂、钩藤各 15 克。后本方由药厂制成冲剂，定为名清爽冲剂（原方剂量分装 2 袋）。

[加 减] 大致归纳为五个证型，分别用药：（1）肝火上亢型：用天麻钩藤饮加龙胆草；（2）胃火炽盛型：用罗谦甫加减泻白散出入；（4）湿浊中阻型：用平胃散加减；（5）肝脾气滞型：用金铃子散和戊己丸。

[制用法] 以上五种类型辨证方药，每天 1 剂煎服；配合清爽冲剂，每服 1 包，每天 2 次。治疗 10 天为 1 疗程。

[功 效] 除口臭良药。

[验 证] 共治口臭 1280 例中，痊愈 456 例，基本控制 767 例，无效 57 例。总有效率 95.55%。抽样调查 300 例，均经短期治疗，长

期观察，1年以后，痊愈者105例，基本控制142例，无效53例，有效率达82.33%，复发率13.67%。本组疗程，服药1个疗程者997例，服药2个疗程者150例，服药3个疗程者76例，3个疗程以上者57例。

2. 葛根、木香等治口臭。

〔方 剂〕 葛根30克，木香、陈皮，藿香，白芷各12克，丁香5克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日1剂，分多次先含5分钟，吐出，再喝药1口。本方不宜久煎。有口腔溃疡者禁用。

〔验 证〕 用上药治疗口臭者30例，均获治愈。

3. 大黄冰片治口臭

〔方 剂〕 大黄炭100克，冰片10克。

〔制用法〕 将上药共研为细末，装瓶内密闭备用。用时。取此药粉适量刷牙漱口，每日早、晚各1次。

〔验 证〕 用本方治疗口臭患者12例，经用药3~7天后，口臭症状均消失。

七十、泌尿系统结石

泌尿系结石，包括肾结石、输尿管结石、尿道结石和膀胱结石等病在内，属中医五淋中的石淋（颗粒细小称砂淋），是临床常见多发病。

1. 芒硝治疗泌尿系统结石

〔方 剂〕 化石汤方组成 四川大叶金钱草、胡桃肉各50克，生地、冬葵子、滑石（包煎）、炒车前子（包煎）、川牛膝各25克，瞿麦、净芒硝（另包，分3次服）各20克，石苇15克，生甘草10克。

〔制用法〕 每天1剂，水煎分3次服。

〔方 剂〕 化石散方组成 芒硝、海金砂各100克，琥珀30克，硼砂20克。

〔制用法〕 上药研成极细末，每天5克，分3次服。

〔疗 效〕 经50余例临床观察，一般只服化石散或汤即可。若证情较重者，二方可以同时服用，分次频服，效果较为显著，无任何副作用。

[验 证] 陈某，男，45岁，体素健。唯近日腰部时发绞痛，发时痛不可忍，经X线摄片，诊为“尿路结石”。其形状大于小指，紧嵌于右侧输尿管中段。发作时剧痛难忍，医生劝其手术，因怯而拒之。嗣由其同仁绍引，邀马老诊之。马老诊毕，书以上二方，汤剂中增入延胡索20克（捣），煎汁每天4次温服。散剂则与汤剂交叉服用。复诊时腰、腹痛已止，身躯俯仰动作如常人。再以二方持续服之，其证终未发作。3周后X线片复查，结石已消尽无迹。休息周余，恢复工作，至今10年未发。

2. 硝石散治疗泌尿系结石

[方 剂] 火硝6克，滑石18克。

[制用法] 在铁勺上置纸张上，把火硝倒在纸上，不使其接触铁器，放在文火上炒黄。炒黄的火硝与滑石置入药煲中，加水一大碗，煎服10分钟，倒出药汁服用，每天1剂，每天服2次，连续服用至尿石排出为止。

[功 效] 治结石，有神效。

[验 证] 答××，男，50岁，医师。患尿石症数年，1978年病症加重来诊，给予上方治疗。连服5剂，排下尿石数颗，小的呈黄豆大小；大的一颗长2.3厘米、中端直径为0.7厘米，呈枣核状，一面呈细颗粒糙面。尿石排出后，病告痊愈，至今未见复发。

3. 鹿角霜治尿路结石

[方 剂] 鹿角霜30克，菟丝子、鸡内金、石苇、海金砂、白芍各12克，生甘草梢、王不留行各9克，琥珀1克（吞），金钱草15克，乌药、桃仁各6克。

[制用法] 水煎服，每日1剂。

[功 效] 温肾壮阳，排石活血，化瘀通络。

[验 证] 王××，男，中年。1976年5月发现左腰痛，放射至左下腹，尿少，西药治疗无效，发展致面部浮肿、神疲。肾图示：右肾分泌正常，排泄迟缓；左肾梗阻曲线，静脉肾盂造影，发现盆腔左上部有0.5×1厘米长圆形及边缘不整齐之不透光阴影，长轴与输尿管行走方向一致，伴左肾盂积水。诊为左侧输尿管下段结石，左肾盂积水。患者持续腰痛，面色不华、微肿，畏寒，舌淡脉沉。治以温肾壮阳、活血化瘀排石。予上方3剂，药后少腹不适、小便疼不可忍，排出花生米样大小结石1粒。

腹部平片示结石已排。继予利尿固肾之品善后。

4. 通淋排石汤治尿路结石

[方 剂] 金钱草 30~60 克，石苇、海金沙、鸡内金 9~15 克，瞿麦、茯苓、木香、枳壳、牛膝各 9 克，黄芪，生地、滑石各 15 克，生甘草 5 克。

[加 减] 血尿加茅根、仙鹤草、大蓟、小蓟；绞痛甚加延胡索、香附、乌药；大便秘结加大黄；气虚加党参，重用黄芪；偏肾阴虚去石苇、滑石，加杞子、女贞子、旱莲草；偏肾阳虚加菟丝子、补骨脂、淫羊藿；服药后泛恶，胃不适者去石苇、滑石，加姜半夏，竹茹、白术；结石经久不移者加桃仁、红花。

[制用法] 每天 1 剂，煎成约 300 毫升，早晚分服。10 天为 1 疗程，未排石者间歇 3~5 天，再行下一疗程。

[疗 效] 治疗 21 例，结果治愈 17 例（结石排出，尿路 X 线摄片证实结石阴影消失）；有效 2 例（结石位置下移 2 厘米以上）；无效 2 例（结石未移动或下移小于 2 厘米）。治愈者服药最少 3 剂，最多 54 剂，平均 23 例。

[验 证] 张××，男，45 岁。因右下腹疼痛向右腹部放射，于 1982 年 7 月 8 日下午急诊。疑诊为“泌尿系结石”而入院。X 线摄片提示：右输尿管下端结石，约 1.4×0.6 厘米²。患者不愿手术而求中医治疗。投以通淋排石汤，服药 27 剂后于 1982 年 11 月 13 日下午排尿时，觉一物从下腹部移入阴茎，顿时小便中断，疼痛剧烈并有强烈窘迫感，急由家属送来就诊，经查尿道口被一物完全堵塞，因剧痛无法自排出，遂用 1% 可卡因尿道粘膜麻醉后，用止血钳取出一桑椹状结石，外观完整，约 $1.8 \times 1.0 \times 0.5$ 厘米³ 大小，次日症状完全缓解，随访 2 个月无不适，遂告痊愈。

5. 鸡内金治尿路结石

[方 剂] 鸡内金 1 个。

[制用法] 将鸡内金晒干，捣碎，研末，白水送服。每日早晚 1 次，可连续服用。

[功 效] 化石通淋。

[验 证] 据《家庭医生》杂志介绍，读者反映效果极佳。

6. 睡前饮牛奶防治胆结石

[方 剂] 全脂鲜牛奶 1 杯。

[制用法] 牛奶加热，睡前顿服。

[功 效] 可有效地防止胆结石的形成。

[验 证] 王××，男，76 岁，常年饮用上方，无胆结石病史。

[备 注] 据国外医学界报道：牛奶可起到刺激胆囊排空的作用。睡前饮 1 杯牛奶，经过一夜，胆汁不会在胆囊内浓缩，从而避免了在胆囊内形成小晶体，也就不会产生胆结石。但是，假如你第二天不吃早点，那头一天晚上所喝的牛奶就无效，这就是说，至少要在第二天早晨喝杯酸奶，吃一块面包来促进新胆汁的形成。

第二篇 小儿常见病防治秘方

一、小儿发热

小儿脏腑娇嫩，不耐寒热。又小儿智力未开，往往寒凉不知御，炎热不知避，饥饿无度，因此无论内伤外感，多互结为患，邪从热化，导致发热。

1. 葛根汤治小儿发热

[方 剂] 葛根 10~15 克，麻黄 3~6 克，桂枝 6~10 克，芍药 6~10 克，大枣 3 枚，生姜 9 克，甘草 3 克。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂，分两次服。

[疗 效] 陈菊仙老中医运用此方治疗小儿发热 110 例，疗效满意。

[验 证] 李某，11 岁，发热 1 周，体温波动于 38℃~39℃ 之间。证见恶寒发热，身痛无汗，咳嗽咯痰，痰质清稀色白，腹胀纳呆，大便干涩，舌淡苔白腻，脉紧滑。以葛根汤为主方，佐神曲、法半夏、陈皮、厚朴各 10 克，服 1 剂。是晚遍身微汗出，翌晨大便 1 次，量多气臭，体温降至 36.5℃。

[备 注] 此为 1~7 岁量，用时可按年龄酌情加减。兼肺咳或胃肠症，辅以二陈汤或平胃散。

2. 藿香汤治疗小儿夏季高热

[方 剂] 香藿 3 克，生石膏 30 克（打碎先煎）。

[制用法] 水煎服。

[功 效] 治小儿高热良效。

[验 证] 姚××，女，4 岁，1983 年 8 月 5 日初诊。患儿夜晚纳凉感寒，翌日清晨高热烦躁，注射青霉素及复方安基比林等药，体温未降，遂来就诊。诊时高热无汗，微恶风寒，口渴引饮，面赤，烦躁不安，舌红、苔薄黄，脉浮数。体温 40.2℃。血检：白细胞 4500/立方毫米、中性 50%、淋巴 42%。乃因盛夏之际，暑热内蕴，复为寒闭所致。投以藿香汤 2 剂。1 剂后，遍身微微

汗出，热度渐退，神情安定。2剂药毕，体温降至正常。

3. 大剂石膏治疗小儿高热

[方 剂] 生石膏 100~150 克。

[制用法] 水煎服。

[疗 效] 经本法治疗 40 例，生石膏用量超过 150 克 9 例、150 克以下 31 例，40 例用药后都达到退热的满意效果。

[验 证] 笔者应用于临床，治疗 30 例小儿高热，屡试屡效。

[备 注] 体温在 39℃ 以上，只要见到高热，汗出、口渴三症，即为大剂石膏使用之例。尤以高热和汗出为主要指标；若只见高热，不见汗出不在此例。

4. 大柴胡汤治疗小儿高热

[方 剂] 柴胡、黄芩、法半夏、枳实、白芍各 10 克，大黄 6 克，大枣 3 枚，生姜 3 片。

[制用法] 第 1 剂中大黄后下。若患儿服药后腹泻 1~2 次，第 2 剂中大黄可同煎；如患儿热退，则可去掉大黄。5 岁以下患儿减半量。

[疗 效] 用此方治疗小儿高热 39 例，均接受足量抗生素和解热药治疗无效而转中医治疗。其中男 21 例，女 18 例，年龄 2~12 岁。体温最高 40.5℃、最低 38℃，病程最长 34 天、最短 3 天。服第 1 剂退热者 17 例，服 2 剂退热者 14 例，服 3~6 剂退热者 6 例，2 例因右下肺肺炎服药无效。

[验 证] 贵刊 1990 年第 3 期刊登了“大柴胡汤治疗小儿高热 39 例”的报道，阅后不久遇 1 例适应用药的患儿，即给 2 剂中药，并嘱家属按文中介绍的方法服用。服 1 剂后，热即退。以后，我又按照文中的治疗方法，多次使用此方，皆获得了其他药物所达不到的效果。我十分感谢编辑同志在审稿时付出的辛勤劳动，我亦衷心地感谢张俊杰老师能把自己的经验贡献给大家。

[备 注] 引自《新中医》(7)。

5. 黄瓜豆腐汤治小儿发热

[方 剂] 黄瓜 250 克，豆腐 500 克。

[制用法] 黄瓜、豆腐切片，加水煮汤。每饮 1 大杯，日用 2 次。

[功 效] 清热，生津，润燥。用治小儿夏季发热不退、口渴饮水多、尿多。

〔验证〕 关×，男，5岁，发热不退，用上方痊愈。

二、小儿感冒

感冒是一种常见的外感性疾病，一年四季均可发生。祖国医学根据感冒的病因，将感冒分为风寒感冒、风热感冒和暑湿感冒。

1. 姜糖水治风寒感冒

〔方剂〕 生姜 15~30克，红糖 20克。

〔制用法〕 将生姜洗净，切作片，捣烂，入红糖水煎。趁热饮用，每次服 50~100毫升。服后盖被见微汗。

〔功效〕 散寒祛风。用治小儿风寒感冒之畏寒、头痛、鼻塞、流清涕。

〔验证〕 王×，男，6岁，患风寒感冒、其母亲在医药杂志上见上方，用之痊愈。

2. 葱液治感冒

〔方剂〕 大葱、香油各适量。

〔制用法〕 葱叶切断，取葱管中滴出之涎液，再滴入数滴香油，搅匀。用手指蘸油摩擦患儿手足心、头面及后背等处，每日多次。注意勿着凉。

〔功效〕 降温退热，解毒凉肌。用治风热感冒。

〔验证〕 据《新中医杂志》介绍疗效颇佳。

3. 葱豉泥治小儿风寒感冒

〔方剂〕 香豉 3克、葱白头 3根。

〔制用法〕 将香豉研末，葱白头捣烂如泥，二味混合加入滚开水少许调和，备用。敷贴于劳宫穴（双）上，外以纱布包扎固定。

〔功效〕 疏散风寒。小儿风寒感冒。

〔验证〕 用之临床，每获良效。

〔备注〕 引自 1979 年《上海中医药杂志》(2)。

4. 加味杏苏散治小儿风寒感冒

〔方剂〕 杏仁、苏叶、前胡、半夏、陈皮、桔梗、枳壳、茯苓，甘草各 1克。

〔制用法〕 上为细末，备用。上药加白蜜糖 75克，连须葱白 3根捣烂如泥状，另用萝卜汁 10克，大枣 3克（去核捣烂），令诸药成药饼

状，敷于患儿脐上，半小时换药 1 次。

[功 效] 疏散风寒，理气化痰。小儿感冒（风寒型）。

[验 证] 屡用效佳，一般 2 次可愈。

[备 注] 引自《外治汇要》。又乳儿伤风，鼻塞不通，将葱管划破，贴小儿鼻梁上，效良。

5. 茱矾膏治小儿感冒

[方 剂] 吴茱萸、明矾各 6 克。

[制用法] 上为细末，以鸡蛋清调匀成膏状，备用。取药膏敷于两足心（涌泉穴）或手心（劳宫穴），外以纱布包扎固定。每日换药 1 次。

[功 效] 散邪逐热。小儿感冒。

[验 证] 屡用皆效。

[备 注] 引自《外治汇要》。又用生南星，雄黄各 15 克，研细，醋调敷足心（双）。一般 24 小时内可退热。或用葱白头 7 个，生姜 1 片，淡豆豉 7 粒。捣烂敷囟门上。贴后有发汗反应。

三、小儿疳积

疳积症是儿科常见的一种胃肠功能障碍和营养紊乱的疾患，病因起于母乳不足或长期饮食不调，或用药过多。其症状为面黄肌瘦、头发稀疏、大便腥粘、腹部凹陷如舟，此病宜健脾为主。另一种是因虫积或饮食肥甘而来，其症状是腹大坚硬、口臭、下唇有白泡、舌面有红点，这时要先消积杀虫，再来调理脾胃。

1. 疳积散外敷治疗小儿疳积

[方 剂] 杏仁、桃仁、山栀子、皮硝各 10 克，白胡椒 7 粒，葱白 7 根（每根寸许）。

[制用法] 上药研末，加鸭蛋 1 枚（弃黄取清）、白酒 5 毫升，调拌，然后用纱布压成两块药饼，外敷神厥，命门两穴，24 小时后取下。

[功 效] 治小儿疳积良方。

[验 证] 张 × ×，男，4 岁，1986 年 8 月 17 日诊。食欲不振，精神欠佳，形体消瘦，口渴喜饮。腹臌，大便稀溏（每天 2~3 次），面黄憔悴，发黄易落，白睛青蓝；手心热，指纹色淡滞，青筋已达气关；体温 37.6℃，大便常规（-）。用疳积散外敷神厥、

命门。8月20日二诊：食欲增，腹软，口少渴，精神佳，二便正常。继用稚儿灵、婴儿素调服1周而愈。

2. 疳积散外敷内关穴治疗小儿疳积

[方 剂] 桃仁、杏仁、生山栀各等份，晒干研末，加冰片、樟脑少许，贮藏备用。

[制用法] 用法取药末15~20克，用鸡蛋清调拌成糊状，干湿适宜，敷于双侧内关穴，然后用纱布包扎，不宜太紧，24小时后则去之。

[疗 效] 疳症初、中期，一般1次见效，少数患儿2次，最多不超过3次，每次间隔2~3天。

[验 证] 马某，女，4岁，1997年3月22日诊。患小儿疳症，现3周未解，经治无效。脘腹胀满，舌苔薄黄，脉弦滑。查阅前医处方，有谓气机郁滞用六磨汤加味；有言气血两亏而用黄芪汤，尚有专事清热生津而进增液汤合麻仁丸者。细思诸方既鲜疗效，似应另辟蹊径。联想小儿疳症中胃肠积滞型的患儿，亦有大便干结之症，经疳积散外敷后，竟很快症消。于是将疳积散（桃仁、杏仁、山栀子各20克，樟脑、冰片各2克）细末用蛋清调成糊状外敷内关穴，每天换药1次。敷5天，患者大便即通，为巩固疗效，又敷1周，随访半年未再发。

[备 注] 小儿疳症，见面色萎黄，形体略瘦，烦躁易怒、好哭；时有低热，日轻暮重；口渴欲饮，但饮之不多，胃纳欠佳，偏嗜香甜，大便稀溏，或不稀不稠，舌苔白腻等。

3. 蜈蚣蛋治小儿疳积

[方 剂] 蜈蚣（活者为佳）、鸡蛋各1枚。

[制用法] 先将鸡蛋敲一小孔（约蚕豆大），将蜈蚣放入蛋内，用纸封固，或用胶布贴封。将鸡蛋煨熟，每天服1枚，1次食之。轻者用3枚，重者间隔1周再用3枚。

[疗 效] 治疗65例，治愈60例，无效5例。

[验 证] 周×，男，3岁，1980年9月3日诊。证见肌肤羸瘦，肚大青筋暴露，触之如石，仅食蜈蚣蛋3枚，积消食增，逐日康复。

4. 治疳灵治小儿疳积

[方 剂] 生栀子仁30粒，桃仁7粒，皮硝9克，葱头7个，飞罗面1匙，鸡蛋1枚（去黄），蜂蜜适量。

〔制用法〕 将上药研为细末，用蜂蜜、蛋清调匀，备用。用荷叶为托，外敷肚皮上，用纱布固定，每日换药1次。

〔功效〕 清热、活血、消积。小儿疳疾，症见头大颈细，面露青筋，腹大便泄等。

〔验证〕 屡用屡效。

〔备注〕 引自《经验奇效良方》。

5. 疳积方治小儿疳积

〔方剂〕 皮硝9克，苦杏仁6克，生桅子7粒。真头道酒糟180克，葱头7个，白飞罗面9克，大红枣7粒（去核）。

〔制用法〕 共入石臼内，捣烂如泥，备用。用白布2幅，约半尺阔，把药放在布上摊开。1幅贴在肚脐眼上，1幅贴背后，对着肚脐眼处，用带捆好。贴3日后，皮肉上不见青色，再贴1次。

〔功效〕 清热、行滞、消积、健脾。

〔验证〕 屡试屡验。

〔备注〕 引自《病家常识》。

6. 肥儿膏治小儿疳积

〔方剂〕 黄芪、茯苓、白术、炙甘草、制厚朴、槟榔、山楂、麦芽、神曲、陈皮、益智仁、木香、砂仁、山药、莪术、使君子、川楝肉、胡黄连、茺莢各15克。

〔制用法〕 麻油熬，黄丹收，朱砂3克搅匀。摊膏备用。贴肚脐上。

〔功效〕 益气健脾、消积化食。疳病虚中平实，脾胀泄泻及疹后将成疳者。

〔验证〕 屡用皆效。

〔备注〕 引自《理论骈文》。

7. 阿魏散治小儿疳积

〔方剂〕 阿魏（炒）、没药（去油）、乳香（去油）、桂心各6克，丁香2克。

〔制用法〕 上药共研细末，贮瓶备用。用时取药末1.5~3克，填入肚脐上，以纱布包扎。每2天换药1次，敷至病愈为止。

〔功效〕 温中化积，活络消胀。用于食积，奶积，虫积。

〔验证〕 屡试屡验。

〔备注〕 引自《外治汇要》。

8. 贴敷方治小儿疳积

[方 剂] ①车前子适量、大蒜2瓣。②莱菔子（炒熟）10克，芒硝（研细）20克。③五倍子（焙黄）10克。④生香附，生半夏各10克。

[制用法] 方①车前子炒研，大蒜捣烂，调匀备用。治疗时：方②用布袋装药，备用。方③研末醋调匀备用。方④共研细末，用鸡蛋清调匀，用布包好，备用。方①敷脐部4小时取下。方②贴按中脘部。方③贴囟门处。方④敷脚心涌泉穴（左右均可）。

[功 效] ①解毒利水消积。②理气化积。③消炎、化瘀、收敛化积。④理气、燥湿、化积。

[验 证] 上4方随症选用，效佳

[备 注] 民间方。

9. 炒玉米扁豆等治小儿疳积

[方 剂] 炒玉米、炒扁豆各18克，神曲、炒莲肉（玄心）、茯苓各12克，炒麦芽、炒砂仁、煨肉豆蔻、使君子肉各9克，陈皮6克。

[制用法] 上药焙干碾碎，过筛为细末，贮瓶备用。用时，取鸡蛋1个，顶端开一小口，将蛋清倒出，放药末1.5~2.1克于鸡蛋内搅匀，以面包裹煨熟（面干蛋熟）。小儿半岁至3岁食蛋每天1个，4~6岁每天2个，1个月为1个疗程。

[验 证] 用上药治疗小儿脾虚疳积50多例，一般服药1个疗程即愈，仅有个别患儿用药2个疗程。

10. 神曲山楂等治小儿疳积

[方 剂] 神曲、山楂、茯苓、苏子、草决明、车前子各6克，蝉蜕2克，鸡内金4克，枳实9克。

[制用法] 将上药水煎，每日1剂，分2次服。

[验 证] 用上方治疗小儿疳积患儿，一般连服3日可愈。如1~2年后复发可照此方再服。

四、小儿疳腮

流行性腮腺炎属中医“疳腮”范畴，俗称“猪头肥”。本病好发于冬春季，尤以5~9岁小儿发病居多，且多传染。多因外感风温邪毒、壅阻少经脉、蕴结腮部所致。

1. 柴胡石膏汤治疳腮

[方 剂] 柴胡 12 克，生石膏 15 克，葛根、天花粉、黄芩、炒牛蒡子、连翘、桔梗、升麻、甘草各 9 克。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂。

[疗 效] 经多次实践验证，重者 2 剂，轻者 1 剂即愈。

[验 证] 张××，15 岁，学生。开始寒热往来，日轻夜重；两腮逐渐肿起如鸡蛋大小之硬块，用齿嚼饭，两腮痠痛；舌质红、苔黄厚腻，脉象弦数。经用青、链霉素，病情未减，改服上方 2 剂而痊愈。

2. 柴胡注射液治疗疳腮

[方 剂] 柴胡注射液。

[制用法] 肌肉注射，每次 2 毫升，(10 岁以上首剂 3 毫升)，每天 2 次。

[疗 效] 治疗 28 例，治愈 27 例，1 例合并颌下淋巴结炎疗效不显。绝大多数 2 天痊愈。

[验 证] 黄××，男，10 岁，1986 年 9 月 17 日诊。双侧腮腺部肿胀，有热感 2 天，曾注射板蓝根注射液，内服病毒灵等药不效，给予柴胡注射液，每天 2 次，每次 3 毫升，即晚体温下降，双侧腮腺部肿明显消退。18 日复诊，患部恢复正常而获愈。

[备 注] 柴胡注射液多用于治高热，用治腮腺炎连续注射 1~3 天，未发现副作用和不良反应。

3. 地龙白糖浸液治腮腺炎

[方 剂] 活地龙（即蚯蚓）2~3 条，白糖适量。

[制用法] 清水洗净地龙，整条放入杯中（不要弄断），撒上白糖，片刻即有渗出液，将此液用棉签涂布在腮腺炎的红肿范围略大些。每天涂 2~3 次。二三天即可痊愈。

[功 效] 治腮腺炎奇效。

〔验证〕 薛××，女，7岁。患腮腺炎，先后双侧红肿疼痛，外擦地龙白糖浸液，每天2~3次，2天痊愈。

4. 黛黄散治流行性腮腺炎

〔方剂〕 青黛、生大黄各等份，冰片、食醋适量。

〔制用法〕 将前二药研细末，再加冰片少许调匀，用食醋调成糊状，涂敷患处，每天换药1次。以患部肿胀消失为止。亦可加服六神丸，根据患者年龄确定内服量。

〔功效〕 治流行性腮腺炎。

〔验证〕 治疗68例，均治愈。一般用药3~5天可愈。

5. 萸杖散治腮腺炎

〔方剂〕 吴茱萸9克，虎杖5克，紫花地丁6克、胆南星3克。

〔制用法〕 上药共研细末，备用。用时取6~15克，以醋调和成糊状，敷双足涌泉穴。上盖塑料薄膜，再覆以纱布，用胶布固定。

〔功效〕 清热、解毒、消肿。

〔验证〕 治疗6例，单用此法，未用抗生素，均痊愈。

〔备注〕 引自《浙江中医杂志》。

6. 消肿膏治疔腮

〔方剂〕 大黄100克，芒硝、赤小豆各100克，白矾20克。

〔制用法〕 上为细末，过80目筛，用凡士林300克调匀成膏状，备用。用时视肿面大小，取此膏敷患处，外以纱布盖上，胶布固定。每日换药1~2次。

〔功效〕 清热泻火，消肿止痛。

〔验证〕 治疗268例，分别用药3~5天后，全部治愈。

〔备注〕 引自1985年《四川中医》(5)。

7. 疔腮散治疔腮

〔方剂〕 吴茱萸15克，白芷、大黄各6克，胆南星3克，虎杖9克。

〔制用法〕 上药共研细末，贮瓶备用。用时视年龄大小，1岁以下，每次用药3克；1~5岁每次用药6克；6~10岁每次用药9克；11~15岁每次用药12克；16岁以上者每次用药15克。使用时先以酒精棉球擦两足涌泉穴处，然后将药膏平摊于纱布上，敷贴涌泉穴上，再用绷带包扎固定。24小时换药1次。病情严重者可连敷。敷药期间，如敷药干燥者，可用醋液润之。

[功效] 解毒散结。疔腮，面颊红肿疼痛或伴发热者。

[验证] 治疗 100 例，敷药 2~4 天后，全部治愈。

[备注] 笔者经验方。

8. 六神冰黛散治疔腮

[方剂] 六神丸 30 粒（研细）、冰硼散 15 克，青黛 30 克，芒硝 12 克。

[制用法] 上为细末，混匀备用。用时取适量，以老陈醋调成糊状，敷贴于腮腺肿胀处和涌泉穴（为健侧），每 6~8 小时更换 1 次，直至发热、肿痛消失。同时内服自拟大板夏玄汤（酒大黄 10 克，板蓝根、玄参、夏枯草各 30 克。每日 1 剂，水煎，顿服之），热炽者，予物理降温，必要时输液。

[功效] 清热解毒，消肿止痛。流行性腮腺炎。

[验证] 治疗 45 例，均在 4 日内治愈。

[备注] 引自 1990 年《广西中医药》（5）。方中六神丸，冰硼散均为中成药。

9. 腮腺炎膏治疔腮

[方剂] 穿山甲、乳香、没药、赤药、连翘、生大黄、桅子、大青叶、板蓝根各等份。五灵脂为各药量的 5 倍。

[制用法] 上药共研细末，用炼好的蜂蜜调成膏状，备用。用时取药膏摊在纱布上，敷于患处，每 30~36 小时换药 1 次。高热者可配合用药，牛蒡子、金银花、大青叶、板蓝根、赤药、夏枯草、重楼、生石膏。浓煎频服。每日 1 剂，剂量视年龄酌定。

[功效] 清热解毒，活血散结。

[验证] 治疗 315 例，敷药 1~3 次后，全部治愈。

[备注] 引自 1987 年《吉林中医药》（1）。

五、百日咳

小儿百日咳的临床特征是发病的 1~2 周，咳嗽是阵发性、痉挛性，当咳嗽剧烈时，一次发作完毕后，伴有拖长的鸡鸣样吸气声。其发作时，有连续不断而紧接的短咳，没有吸气的余地，甚至发生呕吐，口鼻出血等症。

1. 牛胆汁治百日咳

[方剂] 新鲜牛胆汁。

〔制用法〕 取鲜牛胆汁上锅蒸干，研成粉末，然后将牛胆粉 240 克、淀粉 240 克、白糖 520 克混合成粉剂。2 岁以下每日服 0.5~1 克，2~5 岁 1~1.5 克，5 岁以上 1.5~2 克，分 2 或 3 次服，同时配合对症治疗。

〔功效〕 用治小儿百日咳。

〔验证〕 据《中华儿科》1960 年 11 期介绍，用此方治疗 250 例，基本痊愈 52 例，减轻 130 例，有效率 72.8%。

2. 猪胆治百日咳

〔方剂〕 猪胆汁（1 个胆所含的量。）

〔制用法〕 将胆汁放铁锅中用文火炼 4 小时，取出研末。1 岁以下服 0.5 克，1~2 岁服 1.5 克，均加炒熟的面粉少许，分成 14 包，早晚各服 1 包，7 日服完。2 岁以上药量酌增。

〔功效〕 猪苦胆味苦性寒，泻热润燥，清心肺火。用治小儿百日咳。

〔验证〕 据《常见药用食物》介绍，用本方治疗 95 例百日咳患儿，效果明显。

3. 麻雀肉治百日咳

〔方剂〕 麻雀 1 只。

〔制用法〕 麻雀去毛及内脏，在火上烤焦，洗净炖熟。每日 1 只，至愈为止。

〔功效〕 补虚扶阳。用治小儿百日咳。

〔验证〕 据《福建中药》介绍，用本法试治 84 例，痊愈者 61 例，显著进步者 11 例，无效者 2 例。

4. 核桃梨汁治百日咳

〔方剂〕 核桃仁（不去紫衣）30 克，冰糖 30 克，梨 150 克。

〔制用法〕 梨洗净，去核，同核桃仁、冰糖共捣烂，加水煮成浓汁。每服 1 汤匙，日服 3 次。

〔功效〕 清热止嗽。用治百日咳。

〔验证〕 据《新中医杂志》介绍效果良好。

〔备注〕 核桃仁 100 克，炒香后调入蜂蜜尽量吃，用治小儿久咳气促、面眼微肿，伴有遗尿等。

5. 大戟芜花等治百日咳

〔方剂〕 大戟 160 克，芜花、甘遂、细辛、白芥子、干姜、地肤子各

100 克，洋金花 200 克，麻黄 344 克，松香 1000 克。

〔制用法〕 先将大戟、芫花、干姜、地肤子加水煎煮 3 次，合并 3 次所得滤液，浓缩成稠膏状。再将甘遂、细辛、白芥子、洋金花、麻黄共研细末，过 80 目筛，加入上述冷后浓缩膏中，搅拌均匀，烘干、粉碎，过 80 目筛。将麻油 1000 克适当煎熬后，加入松香（粉碎过 80 目筛）炼至滴水成珠，待温度降低后（以不烧焦药粉为度），掺入上述药粉，搅匀即得，摊成 4 厘米×4 厘米大小的膏药，备用。贴于 1、3、5 胸椎棘突旁两侧，每侧 3 张，小儿每侧 2 张，每贴 4 处。如需再贴要隔 3~5 日，若出现痒疹，待消退后再贴。

〔功效〕 止咳平喘。

〔验证〕 屡用皆效。

〔备注〕 引自《中药制剂汇编》。

六、小儿支气管哮喘

小儿支气管哮喘，是小儿常见多发病。其发病病因，临床表现与内科“支气管哮喘”中所述基本相似，其所例方剂亦可互用。现根据小儿哮喘特点，选录数方，以备选用。

1. 鸡蛋加蜂蜜治小儿支气管哮喘

〔方剂〕 鸡蛋 1~2 个，蜂蜜 1~2 汤匙。

〔制用法〕 将鸡蛋去壳，在油锅内煎熟，趁热加蜂蜜，立即进食。

〔功效〕 滋阴养血，清热润燥。用治小儿支气管哮喘。

〔验证〕 此方应在春季服用，每天早晨吃 1 次，连服 2~3 个月，有较明显的疗效。据《中国食品》1984 年第 3 期介绍：“一位 14 岁的女孩，从 9 岁得了支气管哮喘病，常年咳喘不止，各种药物治疗无效，胸部已有变形。12 岁那年春天应用上方，不到 3 个月，哮喘病就好了。身高、体重也增加了，发育也较前快，而且哮喘再未复发。”

2. 芝麻秸治小儿盐哮

〔方剂〕 芝麻秸、豆腐各适量。

〔制用法〕 将芝麻秸切断放瓦上烧存性，研成末。以生豆腐蘸食，不得用调味品，每日 2 次。

[功效] 清热，生津，润燥，化湿，祛痰。

[验证] 据《健康报》介绍读者反映疗效显著。

[备注] 盐哮，病名。指食过多咸味饮食引起的哮喘。由于饮食酸咸太过，痰湿结聚，一遇风寒，气郁痰壅而发。治宜分辨属寒属热。于处方中加入饴糖或砂糖等甘味药，可收到疗效。

3. 猫胞衣治小儿咳喘

[方剂] 猫胞衣。

[制用法] 洗净，风干后放瓦上，以文火焙灸存性，研细末，以黄酒送服，每次1~2克，日2次。服后盖上棉被取汗。

[功效] 温中降逆。用治因风寒所致小儿咳喘。

[验证] 据《浙江中医》1966年2月号介绍：邱姓小儿，1951年因娩出后裸体时间较长受寒，致患气喘病、每逢天气转凉，即喘咳不止、邻居授此偏方，先后用猫胞衣2具，喘咳见缓，共服3具而愈。

4. 胎猪治小儿哮喘

[方剂] 胎猪（未出生之猪胎）或刚生出尚未呼吸的仔猪1个。

[制用法] 将仔猪去毛及内脏洗净，切碎，煮熟，加米粉及适量食盐，再次煮成糊状，1~2天内分次吃完。

[功效] 治小儿哮喘。

[验证] 据《新医学》1973年9期介绍，本方经治6例小儿哮喘病，全部有效。其中2例观察24年无复发，其余4例已观察2年未见复发。

七、小儿肺炎

小儿肺炎的主要症状是发热、咳嗽、气促鼻缺煽。其发病原因主要是由于感受风寒，或风热之外邪；此外，在其它一些疹病过程中，若小儿正气虚弱，亦可并发或继发本病。治疗小儿肺炎的主要偏方、验方如下：

1. 加味升麻葛根汤治疗小儿病毒性肺炎

[方剂] 升麻、葛根、赤芍、杏仁、前胡、桔梗、桑白皮、紫苏、甘草。

[加 减] 热盛加板蓝根、石膏；痰多加紫菀、海浮石；食少纳呆加莱菔

子、谷芽、山楂。

[制用法] 每天1剂，水煎分3次服。

[功效] 治小儿病毒性肺炎。

[验证] 朴某，女，1岁，1985年5月12日诊。患儿发热8天（体温39.2℃）、咳嗽、气喘、右眼结膜充血、两肺均闻及湿性啰音。血检：白细胞15000、淋巴51%。胸透：右肺分布不均的片状阴影。曾在某院儿科用多种西药治疗乏效。证见面色苍灰，精神不振，咳喘，食少纳呆，苔薄，脉细数，诊为腺病肺炎。处方：升麻、葛根、紫苏、桑白皮、前胡各7.5克，石膏15克，板蓝根10克，杏仁、桔梗、甘草、焦山楂各5克。3剂，水煎，每天1剂（分3次服）。二诊：服3剂后热退，咳喘减轻，白天喉中已无痰鸣。上方去石膏加赤芍5克，紫菀7.5克。继服5剂，除肺部偶尔闻及啰音外，诸症消失。

2. 新医散治小儿肺炎

[方剂] 川贝母30克，朱砂、雄黄、胆南星、天竺黄、川黄连、猴枣、月石各9克，琥珀、天麻、橘红、寸麦冬、玄参、枳壳各15克，木香12克，冰片、牛黄各3克。

[制用法] 上药共研细末，每次冲服1克

[功效] 清热化痰、开窍定喘。

[验证] 徐×，女，2岁，1977年10月7日诊。高热喘促，咳嗽痰鸣，鼻翼煽动，苔黄腻，指纹紫。胸透：右下肺炎。给予新医散1克，冲服，每天3次。服药当晚咳喘减轻，热退，服用1周病愈。

3. 肺炎膏治肺炎

[方剂] 天花粉、黄柏、乳香、没药、樟脑、大黄、生天南星、白芷各等份。

[制用法] 上药共研成细末，以温食醋调和成膏状，备用。将此膏（适量）平摊于纱布上，贴于胸部（上自胸骨上窝，下至剑突、左右以锁骨中线为界），外以胶布固定（或不用），每12~24小时更换一次。

[功效] 清热泻火，活血化痰。

[验证] 临床屡用，有一定疗效，若与内服药结合，疗效更好。

[备注] 引自1978年《赤脚医生杂志》(1)。

4. 外敷方治肺炎

[方 剂] ①栀子 30 克、雄黄 9 克，细辛、没药 15 克。②大黄、黄柏、泽兰、侧柏叶、薄荷各等份。

[制用法] 上 2 方均为细末，贮瓶备用。随证选用，每取适量，方①用醋调，方②用茶水调，贴敷于胸部啰音密集区，并保持敷药湿润，也可干后再调再敷，每日换药 1 次。

[功 效] ①解毒泻火，活络散寒。②清热泻火、疏风活血。

[验 证] 一般 1 周左右啰音可消失。

[备 注] 引自《外治汇要》。

5. 消炎膏治肺炎

[方 剂] 栀子、蒲公英、鱼腥草各 50 克，薄荷 80 克，泽兰、大黄各 30 克。

[制用法] 上药共研细末，以醋调和成膏状，备用。用时取膏适量平摊于纱布上，贴敷于膻中，肺俞（双）穴上，并经常滴醋，保持药层一定湿度。每日换药 1 次。

[功 效] 清热解毒，疏风活络。

[验 证] 治疗 50 例，疗效尚满意，若配合内治，效果更好。

[备 注] 笔者经验方。

八、小儿支气管炎

支气管炎属中医的“咳嗽”、“痰饮”等病范畴，临床以咳嗽、吐痰为特征。一般可分为急性支气管炎和慢性支气管炎两大类。急性失治迁延可转化为慢性，慢性继发感染，又可引起急性发作，是临床常见多发病。

1. 桃花散治支气管炎

[方 剂] 石膏 9 克，川贝 15 克，朱砂 3 克。

[制用法] 分别研细，过 100 目筛，然后混合均匀，备用。1 岁内 0.25 ~ 0.3 克，2 ~ 3 岁 0.5 ~ 0.75 克，4 ~ 5 岁 1 克，6 岁以上 1.5 ~ 2 克。

[功 效] 清宣肺热，止咳化痰，平喘利尿，镇静安神。

[验 证] 陈×，女，3 个月，住院号 35323。1982 年 1 月 15 日入院。憋喘 3 天。查体：体温 38.5℃，脉搏 150 次/分，呼吸 60 次/分，

呼吸急促，口周发绀，面色发灰，双肺可及哮鸣音，肝肋下2厘米。住院后用青霉素控制感染，氨茶碱、654-2解除支气管痉挛，吸氧，镇静等措施治疗。但仍烦躁不安，咳喘加重。经口服桃花散每次0.25克，每天3次，服药第2天，止症缓解，肺部哮鸣音明显减少。第5天全部消失，7天痊愈出院。

[备 注] 本方石膏清热平喘，川贝润肺止咳化痰，朱砂镇静安神，达到缓解支气管痉挛，纠正缺氧的目的，起到抗生素对病毒无效的作用，因而显效率90%以上，且无副作用。婴幼儿可把药粉放在乳头上吮吸，较大患儿配麻杏石甘汤效果更快，更好。

2. 桂枝加龙骨牡蛎汤治疗小儿支气管哮喘

[方 剂] 桂枝、白芍、姜半夏、陈皮、生姜、大枣、龙骨、牡蛎。

[制用法] 水煎服，每日1剂。

[功 效] 解表祛风，安神，调和阴阳，降逆化痰。

[验 证] 笔者运用《新中医》1985年第3期“桂枝加龙骨牡蛎汤治小儿支气管哮喘”一法，治愈小女6年之久哮喘病，特向《新中医》及作者王秉歧先生致以谢意。小女现年10岁，2岁始患哮喘，汗多易感冒，夜间易惊，痰多、纳差、消瘦。曾服射干麻黄汤加补肾药百多剂无效。持续性哮喘2年，每天需用西药止喘。自服“桂枝加龙骨牡蛎汤”加陈、夏、参、芪40剂后，半年未复发。初期须结合西药止喘，稍后可停西药。人也胖了，感冒也少了。特此公诸同行参考。

[备 注] 小儿哮喘一证，其病理机制多由乳食不节，内伤脾胃，脾虚湿滞，湿聚成痰；或由热病伤阴，阴损及阳，外卫失护，感冒时作，内外合邪，痰气相结，阻塞气道，上逆为喘。

3. 鹅梨汤治小儿哮喘性支气管炎

[方 剂] 鹅管石（煅研）、杏仁、茯苓各6~10克，炙麻黄3克，栝蒌仁6~12克，梨皮10~15克，陈皮、半夏、苏子、射干各6~9克，姜汁3~5克。每天1剂，水煎，分4次服。

[加 减] 偏寒加桂枝、细辛，偏热加石膏、鱼腥草、青黛，肺虚加黄芪、党参、五味子，脾虚加党参、山药、白术，肾虚加补骨脂、淫羊藿、胡桃肉，咳嗽剧烈加紫菀、款冬花、诃子，哮喘严重加白果、地龙、椒目，痰多加葶苈子、猪牙皂、胆南星。

[制用法] 水煎服，每日1剂。

【功效】 主治咳嗽，哮喘。

【验证】 杨××，男，3岁半，1988年10月3日初诊。患者反复咳嗽、哮喘已1年多，近20天来因受风寒咳嗽又作。今见咳嗽，哮喘，喉间痰壅，汗多，纳食差，腹胀，神疲，面色苍白，舌淡、苔薄白、脉沉缓。听诊两肺布满哮喘音和痰鸣音。诊断：哮喘性支气管炎。拟鹅梨汤加党参12克，白术5克，五味子4克。药进4剂，咳嗽、哮喘遂减，肺部听诊也好转。上方加黄芪10克。连服12剂，诸证悉除。

4. 生姜、大枣等治小儿支气管炎

【方剂】 麻黄、紫苏子、杏仁、桑白皮、橘红、茯苓各3克，甘草1.5克，生姜1片，大枣1枚。

【制用法】 将上药水煎，每日1剂，分4~6次服完。2岁以下者麻黄用量减半。一般可连续服用3~4剂。

【加 减】 热象明显，去生姜加黄芩、板蓝根（或大青叶）各3克，呼吸急促，咳嗽不爽者加桔梗、白前各3克；喉间痰声鸣响，加竹沥9克。

【验证】 用上药治疗小儿急性支气管炎患者15例（均在3岁左右），其中，治愈12例；好转2例；无效1例。

5. 白芥子面粉治小儿支气管炎

【方剂】 白芥子30克，面粉90克。

【制用法】 先将白芥子研为极细末，与面粉混合均匀备用。用时，将上药用水调成饼，饼的大小视背部面积大小而定。每晚睡觉前敷背部。晨起去掉。一般连用2~3次即可见效。

【验证】 用本方治疗急性支气管炎患者125例，用药2~3次痊愈者110例，4~5次治愈者15例。

6. 鱼腥草等治小儿急性支气管炎

【方剂】 鱼腥草、生石膏、白茅根各15克，麻黄、杏仁、川黄连、胆南星各3克，瓜蒌、法半夏、川贝母、前胡各6克。

【加 减】 若大便秘结者，加生大黄2克（后下）；若高热者，加羚羊角粉1克，2次冲服。

【验证】 用本方治疗小儿急性支气管炎患者181例，经用药2~5剂后，均获治愈。

九、婴幼儿哮喘证

症状是每当气候变化时，初起是咳嗽，接着气喘如牛，上气不接下气，天气好时又恢复正常。要止住哮喘的方法有很多种，但要根本治好了，就要改变过敏性的体质，平时多吃海带、裙带菜或蔬菜类等。

1. 理痰汤治疗婴幼儿哮喘证

〔方 剂〕 生芡实 10 克，清半夏 4 克，黑芝麻 3 克，柏子仁、生杭芍、陈皮各 2 克，茯苓 4 克。

〔制用法〕 水煎服，每日 1 剂，分三次服。

〔功 效〕 治幼儿哮喘症良效。

〔验 证〕 邵××，男，7 个月，1986 年 3 月 8 日就诊。患儿于诊前 3 个月中，两次哮喘发作（喘息性支气管炎）。此次发病已 12 天，初用止咳剂治疗 3 天，咳嗽、哮喘好转，但痰壅喉间加重，历时 9 天不缓解，以活动及哭喊后为甚。病后乳食减、多汗，夜睡不宁。检查：神疲面苍白，舌淡、苔白厚，肺部听诊痰鸣音满肺野，腹软，肝脾未触及，脉滑数无力，X 线胸透正常，诊为哮喘。处方：芡实 7.5 克，法半夏、茯苓各 4 克，黑芝麻、柏子仁、白芍、陈皮各 3 克，水煎服，每天 1 剂，每天服 3 次。服药 2 次，痰壅好转，治疗 4 天痰显著减少，肺部湿啰音极少，经治 6 日，痰消症去，肺部听诊正常，临床治愈。

2. 昙花茶治婴幼儿哮喘证

〔方 剂〕 昙花冰糖或蜂蜜。

〔制用法〕 昙花煮开水，加冰糖或蜂蜜当饮料喝，不要两个月，就可正常。

〔验 证〕 此方经多人使用，非常具有神效。

3. 大蒜治婴幼儿哮喘。

〔方 剂〕 大蒜 500 克，蛋黄 4 个，钙粉 20 克。

〔制用法〕 五百克的大蒜切细，放入平底锅，加少许水，边煮边搅动，待两小时后呈泥状，再加入四个蛋黄，用弱火煮，再加入钙粉二十克，捏成丸，每天吃一颗。

〔验 证〕 此法多次验证效果良好。

- [备 注]** 大蒜能增进食欲，使新陈代谢转好，血行畅通，同时，能对肠的有益细菌发生作用，造出维生素 B₁，与改善过敏性体质有关，所以能产生良好效果。

十、厌食症

小儿厌食，属中医“纳呆”、“恶食”范畴。是指因消化功能障碍引起的一种慢性消化性疾病。一般多见于学龄前儿童；成年人亦有之。

1. 五香姜醋鱼治厌食症

- [方 剂]** 藿香、砂仁、草果仁、橘皮、五味子各等份，研成细末，过筛后备用。
- [制用法]** 取鲜鲤鱼1条，放油锅内煎、炸数分钟，加入碎生姜5克、五香粉3克，翻动后加入米醋一小杯，放入菜盘内令病人嗅之，使病人口流唾液，然后令病人作菜食用。
- [功 效]** 治厌食有良效。
- [验 证]** 绍×，女，49岁。厌食3个月，于1982年3月12日来院门诊。自诉食欲不振，食量少，时而呃逆，噯气，倦怠乏力，头晕失眠，精神恍惚，记忆力减退，心慌。面色萎黄，舌淡苔白，脉细缓。用五香姜醋鱼，连服五天，食欲明显好转，每餐可食2碗饭，连服5天后痊愈。
- [备 注]** 方中藿香、砂仁、草果仁芳香化湿醒脾，橘皮行气健脾和胃，五味子益气生津敛阴，生姜健胃助消化，米醋敛肝胃，鲤鱼味道鲜美，可促进食欲。诸药合用，使脾气升，胃气降，补而不滞，温不伤阴，五味俱全，患者乐服，实为治疗厌食症之妙方。

2. 健脾开胃散治疗小儿厌食症

- [方 剂]** 饭锅巴、面锅巴各150克，淮山药15克，莲子、薏苡仁、白术各10克，山楂、麦芽，神曲各9克，砂仁6克，甘草3克。
- [制用法]** 水煎服，每天1剂，5天为1疗程。
- [功 效]** 健脾醒胃，消食导滞。
- [验 证]** 李×，男，5岁，1991年2月诊。患儿因春节期间过食瓜果肥腻之品，逐渐出现厌食、身体消瘦，经中西医多方治疗，未见好转。体征：面色萎黄，脘腹胀满，食少纳呆，尿多便溏，舌

淡、苔薄腻。此乃饮食不节，食滞中焦，寒温不当，脾困湿阻。方用健脾开胃散，进5剂，患儿饮食倍增，精神好转。效不更方，再进5剂，饮食如常，面色红润。

3. 栀杏膏治小儿厌食

〔方 剂〕 杏仁（去皮）、栀子、小红枣（前3味、女子用7粒，男子用8粒），黍米1撮。

〔制用法〕 先将黍米，红枣放入碗中，加适量水，上锅蒸20分钟取出，待凉后，将枣核去掉，再加入前2味药粉，一起捣如烂泥状，平摊于一块黑布上，备用。将膏药贴敷于脐腹部，用胶布固定，敷24小时后去掉，以腹部出现青色为适宜，连敷2贴。

〔功 效〕 健脾醒胃，消炎化积。

〔验 证〕 治疗40例，1例因胶布过敏而停用。余均治愈。

〔备 注〕 引自1988年《河北中医》（2）。成人亦可用之。

4. 消化膏治小儿厌食

〔方 剂〕 炒神曲、炒麦芽、焦山楂各10克，炒莱菔子，陈皮、炒鸡内金各6克，延胡索5克。

〔制用法〕 上药共研细末，备用。用时取10~15克药粉，加入淀粉少许，用白开水调成软膏状，敷贴肚脐上，外用纱布固定。晚敷晨取，每日1次，5次为1疗程。

〔功 效〕 消食化积，理气导滞。

〔验 证〕 一般连敷1~2疗程即可见效或痊愈。

〔备 注〕 笔者经验方。

5. 吴茱萸椒矾散治小儿厌食

〔方 剂〕 吴茱萸、白胡椒、白矾各等份。

〔制用法〕 上药共研细末，贮瓶备用。用时取上药粉20克，用陈醋调和成软膏状，敷于两足心涌泉穴上，外用纱布包扎固定。每日换药1次。

〔功 效〕 温中散寒，清热燥湿。

〔验 证〕 屡用效佳。

〔备 注〕 引自《外治汇要》

6. 怀山药等治小儿厌食

〔方 剂〕 怀山药、扁豆、茯苓、炒谷芽、炒麦芽各12克，枳壳、鸡内

金、炙甘草各6克。

〔制用法〕 将上药水煎，分2~3次口服，每日1剂。5天为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗小儿厌食症患者95例，其中，治愈者90例；好转者5例。

7. 皂荚治厌食

〔方剂〕 皂荚100克。

〔制用法〕 取干燥皮厚、质硬光滑、深褐色的无虫蛀之皂荚，刷尽泥灰，切断，放入铁锅内，先武火，后文火煨存性，剥开荚口，以内无生心为度，研细为末瓶装备用。用时，每次1克，以红糖适量拌匀吞服。每日2次。

〔验证〕 用本方治疗小儿厌食症患者120例，其中，治愈者118例；好转者2例。

8. 鸡内金、芡实等治厌食症

〔方剂〕 怀山药、薏苡仁各250克，鸡内金、芡实、扁豆蔻150克，糯米6000克。

〔制用法〕 将上药分次下锅，用文火炒成淡黄色，混合后研为极细末，装入瓶内备用。同时，取药末1汤匙，用滚开水冲服，每日早、晚各1次。10天为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗小儿厌食症患者193例，其中，治愈者185例；显效者8例。治愈的185例中，1个疗程治愈者67例；2个疗程治愈者53例；3个疗程治愈者50例；4个疗程治愈者15例。

十一、婴儿黄疸

本病属中医的“胎疸”范畴，病因多属肝胆湿热，蕴郁于里，上不得越，下不得泄，熏蒸瘀遏，周身俱黄；或由于湿邪内阻，脾阳不振，胆液为湿所阻，浸淫肌肉，溢于皮肤而发黄。

1. 斐氏方治疗婴儿黄疸

〔方剂一〕 阳黄方组成 属湿热蕴结肝胆，失其通降，外溢发黄。治以清化湿热、疏利肝胆。处方：生麦芽、金钱草各9克，茵陈15克，穿肠草6克，通草、生黄柏各3克。夜寐不安加莲子芯、钩藤；呃逆加竹茹、丁香；腹胀加大腹皮；黄疸重者加青黛、

血竭、广水牛角。

〔方剂二〕 阴黄方组成 属素体脾虚，湿邪内困，肝胆疏泄失常，外溢发黄。治以健脾化湿、调畅气机、疏肝利胆。处方：茯苓、生麦芽、金钱草各9克，白术、穿肠草各6克，茵陈12克，通草、黄柏各3克。腹泻加肉豆蔻、赤石脂；腹胀加橘核、大腹皮；腹壁静脉曲张、肝脾肿硬加柴胡、丹参、海藻、昆布。

〔制用法〕 水煎服，每日1剂，分三次服。

〔疗效〕 上两方是北京儿童医院裴学义老中医的经验方。笔者用治疗婴儿黄疸150例，治愈109例、好转41例。治疗后总胆红素恢复正常者134例、谷丙转氨酶恢复正常者109例。

〔验证〕 皮×，女，3月龄，1985年1月12日初诊。患儿出生后2个月皮肤、巩膜出现黄染，尿黄染尿布，大便干燥、色泽浅黄。检查：皮肤、巩膜黄染，色泽鲜明；烦躁不安，舌微红、苔薄白，指纹紫。血检：总胆红素7.44毫克%、直接胆红素4.66毫克%、谷丙转氨酶40单位、麝浊2单位、γ-谷氨酰转肽酶50单位、HBsAg阴性。辨证为湿热蕴结肝胆，外溢发黄。治以清化湿热，利胆退黄。处方：生麦芽、金钱草各9克，茵陈15克，穿肠草6克，通草、黄柏各3克。上方加减治疗5周后，皮肤、巩膜黄染消退，大便转黄，尿色转清，查总胆红素0.5毫克、直接胆红素0.3毫克、谷丙转氨酶<100单位、麝浊2单位，病告痊愈。

十二、小儿疝气

疝气一般常见的有腹股沟斜疝、脐疝、直疝等多种病症。现在临床上多泛指体腔内容物向外突出的一种病症。临床上较为常见。

1. 疝气汤治小儿疝气

〔方剂〕 乌梅肉、橘核仁、石榴皮、枳壳、川楝子、小茴香、向日葵杆内白心各10克，吴茱萸6克，肉桂3克。

〔加 减〕 无湿热者去向日葵杆内白心，寒盛者肉桂加至6克，气虚者酌加参芪之类。

〔制用法〕 上药为1剂量，水煎。3岁以下小儿煎1次分3次服；3岁以上每剂煎2次，每天服2~3次。3剂为1疗程。

〔功效〕 治小儿疝气。

〔验证〕 马××，男，3岁，1975年4月就诊。患疝气1年多，时轻时重，多方求治无效，为免手术求治于余。投上方6剂内服，并用上药研末以陈醋调外敷患处，纱布固定，痊愈，至今未复发。

2. 麝香膏治小儿疝气

〔方剂〕 麝香1克，阿魏9克，芒硝6克，普通膏药24克。

〔制用法〕 将膏药放在小铜勺中溶化，然后将阿魏，芒硝放入烱化拌和，匀摊在3寸见方的薄布上，最后将麝香匀撒在药膏上面。备用。将此膏贴敷患处。

〔功效〕 治疝止痛。

〔验证〕 疗效甚佳，一般5~8天即愈。

〔备注〕 引自1965年《中国杂志》(12)。

3. 三辣膏治小儿疝气

〔方剂〕 生姜、葱白、大蒜各等份。

〔制用法〕 上药共捣烂如泥状，备用。贴敷气海穴，外以纱布盖上，胶布固定，并用麸夫炒热、布包、隔药熨之。

〔功效〕 散寒止痛。

〔验证〕 试治数例，均效。

〔备注〕 民间方。

4. 外敷方治小儿疝气

〔方剂〕 生香附、木瓜、苏叶、橘红各10克。

〔制用法〕 上药水煎、取汁，备用。用毛巾趁热浸湿药汁后，外敷肿物处，每日1次，每次15~30分钟，治愈为止。

〔功效〕 功气、散寒、止痛。

〔验证〕 屡用效佳。

〔备注〕 引自《外治汇要》。

5. 茴香散治小儿疝气

〔方剂〕 小茴香、川楝子、橘核、荔枝核、延胡索、吴茱萸各等份，米醋、面粉适量。

〔制用法〕 将前6味药共研细末，装瓶备用。用时取药末适量，加入面粉少许和匀，以米醋调如膏状，贴敷脐中，外用胶布固定。每天

换药 1 次。

[功 效] 散寒、理气、止寒。

[验 证] 治疗 30 例，均愈。

[备 注] 引自《外治汇要》。

6. 填脐丁香散治小儿疝气

[方 剂] 母丁香适量。

[制用法] 上药研细末，过 100 目筛，密封备用。取药粉填入脐中（令满），外以敷料盖上，胶布固定。2 天换药 1 次。一般 4~6 次好可见效。

[功 效] 理气止痛。

[验 证] 治疗 32 例，痊愈 23 例，有效 7 例，无效 2 例。

[备 注] 引自 1986 年《陕西中医》(9)。在治疗期间要积极防治易引起腹压增高的各种因素（如咳嗽、便秘、排尿困难等）。同时适当减少活动，注意卧床休息。

十三、小儿脱肛

脱肛又称直肠脱垂。本病多见于小儿，但年老体弱者亦多发生。

盖小儿脏腑娇嫩，气血未充，骶曲未长成，加之肾气不固或脾虚中气下陷，或便秘努挣，或久泻痢，脾虚气陷所致。

1. 乌龟头治疗小儿脱肛

[方 剂] 乌龟头。

[制用法] 将乌龟头放在瓦上，用温火焙干，注意不要烧焦，研成细末。每天服 2 个，早、晚各 1 个，白开水冲服，一般 6~8 个可愈。

[疗 效] 用此方治疗小儿脱肛 18 例，方法简便、经济、效果好。

[验 证] 笔者受《新中医》1979 年第 5 期刊登张文海同志“用乌龟头治疗小儿脱肛”一文启发，近年来亦曾用乌龟头或鳖头粉外敷治疗小儿脱肛 27 例，疗效满意。

2. 苦叶苗根膏治小儿脱肛

[方 剂] 新鲜苦叶苗根 60~80 克。

[制用法] 上药洗净，置锅内加水 500 毫升，文火煎至 200 毫升左右，去渣，继续熬水收膏，随即摊于白布上。贴患儿囟门。视患儿年

龄，布块可剪成直径为5~7厘米的圆形。贴前剪去患儿囟门处长发洗净污垢。

〔功效〕 清热解毒，外用固脱。

〔验证〕 一般贴1~2天可见效，最长3~5天固脱。固脱后不可揭去药膏布，待其自行脱落（约需1个月左右）以巩固疗效。

〔备注〕 引自1976年《赤脚医生杂志》（10）。

3. 脱肛外治方

〔方剂〕 蝇牛100个（去外壳焙干），龙骨10克，冰片3克。

〔制用法〕 上药共研细末，装瓶备用。用时先将药粉均匀撒在纱布上。再用右手托带药纱布，对准肛门脱出肿块，慢而有力地将肿块推入肛门，待肿块复位后，适当休息，多食蔬菜及软食，保持大便稀软，以巩固疗效。

〔功效〕 消炎固脱。

〔验证〕 效果很好。一5岁患儿脱肛两年，用药2次即愈。

〔备注〕 引自1991年《吉林中医》（3）。

4. 升鳖膏治小儿脱肛

〔方剂〕 鳖头1个（焙干）升麻5克，枳壳10克，五倍子5克。

〔制用法〕 上药共研细末，过筛后以米醋调匀成软膏状，备用。每取铜针大的药膏敷于脐窝上，外以纱布盖上，胶布固定。2天换药2次，10次为1疗程。

〔功效〕 升提固脱。

〔验证〕 屡用有效。

〔备注〕 引自《外治汇要》。

十四、小儿遗尿症

遗尿俗称“尿床”。是指3周岁以上小儿，睡中小便自遗，醒后方觉的一种疾病。在临床上较常见。轻者每夜或隔数夜1次，重者每夜尿床2~3次。有些严重病人，可延至10余年，甚则成年仍有尿床。多因先天不足，下焦虚寒，闭藏失职；或脾肺气虚，上虚不能制约于下；或湿热蕴结膀胱，气化失司等因所致。

1. 遗尿方治小儿遗尿症

〔方剂〕 党参、菟丝子各12克，蚕茧10只，补骨脂、金樱子、覆盆子

各 9 克，炙甘草 4.5 克，桑螵蛸、黄芪各 15 克。

[加 减] 睡眠深加生麻黄 9 克或石菖蒲 9 克，炙远志 4.5 克；兼阴虚加当归 9 克，五味子 4.5 克；舌质淡有阳虚加肉桂 3~4.5 克。

[制用法] 上药制成浓缩煎剂加糖浆适量，每次服 20 毫升。具益气补肾固涩之功效。

[疗 效] 治 44 例，痊愈 24 例，显效 7 例，好转 5 例，无效 8 例。

[验 证] 李××，男，11 岁，1984 年 9 月 1 日诊。患儿自幼遗尿至今，经中西医治疗效不佳。近日夜尿次数增多，每夜 2~3 次，不易唤醒；纳差，面色苍白，身倦怯寒，腰酸足软，小便清长，舌淡，脉沉无力。证属下焦虚冷（肾气虚）。仿遗尿方加减：党参、麻黄、益智仁、菟丝子、金樱子各 10 克，桑螵蛸、黄芪各 15 克，远志、鸡内金各 6 克。5 剂，水煎服。每 2 天 1 剂，同时用丁香、肉桂各 6 克共研末与米饭搓匀敷脐部。月余后其母告知，药后患儿未见遗尿，追至今未发。

2. 穴位贴药法治小儿遗尿

[方 剂] 麝香 3 克，蟾酥、桂枝、麻黄、雄黄、乳香、没药、皂角刺各 5 克。

[制用法] 上药共研细末，贮瓶备用。用时取药粉适量，以酒精调成膏状（为增强粘附力，可加入少许阿拉伯胶）。再取药膏少许（如火柴头大小），置于 2 公分大小的方块胶布上，贴于所选的穴位上〔主穴：内关（双）、气海、中极、三阴交（双）。配穴：肾俞、膀胱俞、复溜。一般只用主穴，若病情较重者，则酌用配穴〕。3~4 天换药 1 次，3 次为 1 疗程，若未愈，可间隔 3 日再贴敷。

[功 效] 调气血，复功能。

[验 证] 治疗 293 例，病程最短为 1 年，最长为 5 年以上。经治 1~3 疗程后，痊愈 170 例，显效 88 例，无效 35 例，总有效率为 88.1%。

[备 注] 引自《绵阳地区老中医经验选编》（乙）。贴后，少数人皮肤发痒，应坚持治疗。若发生皮疹，可用紫药水涂搽患处，待皮疹消失后，再继续贴药。

3. 丁香散治小儿遗尿

[方 剂] 丁香、肉桂各等份。

〔制用法〕 上药共研末，贮瓶备用。用时取药粉 10~20 克，以黄酒（或白酒）调匀后敷于脐部（范围约 5 厘米×5 厘米），外以纱布，三角巾等固定。每日换药 1 次（临睡前敷药）。连用 5~7 天，如不再遗尿，继巩固治疗 3 天。

〔功效〕 温肾止遗。

〔验证〕 治疗 9 例，年龄为 6~9 岁，全部治愈。

〔备注〕 引自《天津中医学院学报》（1）。

4. 遗尿散治小儿遗尿

〔方剂〕 覆盆子、金樱子、菟丝子、五味子、仙茅、山萸肉、补骨脂、桑螵蛸各 60 克，丁香、肉桂各 30 克。

〔制用法〕 上药共研细末，密封备用。用时取药粉，填满脐孔，滴上 1 或 2 滴酒精或白酒后，再贴上烘热的暖脐膏（中药房有售），再用薄层的棉花纱布覆盖好。每 3 天换药 1 次。部分病人可同时口服此药粉，每天早晚各 1 次，3~10 岁，每次口服 3~5 克，10 岁以上每次口服 5~6 克。用白糖水送服。

〔功效〕 补肾缩泉。

〔验证〕 治疗 15 例，如上法用之，痊愈 13 例，有效 2 例。

〔备注〕 引自《外治汇要》。暖脐膏不可太热，以免烫伤皮肤。

5. 遗尿膏治小儿遗尿

〔方剂〕 白术 50 克，甘草 20 克，白矾、五倍子各 10 克，硫黄粉 50 克。

〔制用法〕 先将前 2 味药水煎取浓汁，后 3 味药共研细末，2 者混合拌匀烘干研细末，备用。用时以药粉 5 克，用大蒜盐水调匀敷于肚脐上，外以纱布盖上、胶布固定，2~5 天换药 1 次。

〔功效〕 温补脾肾，收敛固涩。

〔验证〕 验之临床多效。一般 2 次可愈。

6. 加味生姜膏治小儿遗尿

〔方剂〕 生姜 30 克，炮附子 20 克，补骨脂 12 克。

〔制用法〕 生姜捣烂，余药研细和匀，备用。用时取药膏 5~10 克敷于脐上，外以纱布盖上，胶布固定。每天换药 1 次，3 次为 1 疗程。

〔功效〕 温肾固涩。

〔验证〕 屡用有效。

〔备注〕 引自《外治汇要》。或有黑胡椒粉，填脱、胶布固定，每日 1

次，或五倍子粉，水调敷脐。用治小儿遗症，效果亦佳。

十五、婴儿湿疹

本病是婴幼儿最常见的皮肤病之一，发病与过敏体质有关。皮疹多见于头面部，也可延及颈、肩、躯干等部位，形态不一，但均以瘙痒及复发为特点。

1. 大或小飞扬治婴儿湿疹

〔方 剂〕 大或小飞扬 30~50 克。

〔制用法〕 加水适量，煎后洗患处，每天 1~2 次。

〔功 效〕 清热祛湿、止痒。

〔验 证〕 龙×，男，5 月龄，1986 年 2 月 12 日诊。患儿面颊及腮部起散在红色粟粒样皮疹，部分融合成片，夜间哭闹不安，诊为婴儿湿疹，用文中方法连用 2 个月，皮疹尽退愈。

2. 半乌白汤治疗婴儿湿疹

〔方 剂〕 半边莲、乌柏、白英各 15 克，金银花 6 克，红枣 7 枚。大便烂者加葛根 6 克。

〔制用法〕 上药加水 600 毫升，煎取 200 毫升，以药汁代茶。婴幼儿可以把药汁放入奶瓶中令其吮吸，分 3~4 次服完。5~10 剂为 1 疗程。服药期间，哺乳母亲禁忌鱼腥等发物。

〔功 效〕 清热解毒，祛风利湿。

〔验 证〕 赵×，男，7 个月。自满月后颜面部出现红斑、丘疹，以两颊为著，头皮可见黄痂，因瘙痒而常以衣被摩擦或手搔，啼哭吵闹，不得安宁。曾多次治疗，口服苯海拉明、肌注维丁胶性钙及外用肤轻松霜，但停药即发。现两颊部可见边缘不清的暗红色斑片散在，表面有密集的约针头大小的丘疹和水疱，伴有轻度糜烂和少量渗出，头皮局部可见油腻性褐色痂。予上方 7 剂。药后颜面皮损大部分消退，头皮褐痂部分脱落。再服 5 剂，症状全部消失，2 个月后随访，未复发。

3. 大白菜等治婴儿湿疹

〔方 剂〕 新鲜白菜、卷心菜、胡萝卜各适量，蜂蜜、盐少许。

〔制用法〕 ①将上述菜洗净切碎倒入煮开的水中，15 分钟即熟，取出捣成泥加盐食用。②将菜洗净切碎，按两碗菜一碗水的比例，先煮

开水后加菜，煮5分钟即可食用。饮汤时可加适量蜂蜜。

〔功效〕 祛湿，止痒。用治婴儿湿疹。

〔验证〕 屡用效佳。

4. 地肤子等治湿疹

〔方剂〕 地肤子、蛇床子各15克，枯矾9克。

〔制用法〕 将上药水煎浓液，每天1剂，分2次搽洗患处。

〔验证〕 用上药治疗小儿湿疹患儿11例，均于用药1~3剂后痊愈。

5. 白鲜皮等治小儿湿疹

〔方剂〕 白鲜皮、孩儿茶、五倍子、乌梅、苦楝皮各30克，苦参、黄柏、紫草茸各9克，枯矾6克。

〔制用法〕 将上药加水3碗，文火煎或浓汁外洗，每日1剂，每剂洗2~3次。

〔验证〕 用上药治疗小儿湿疹患儿50例，多数为阴囊湿疹，病情轻者，2~3天痊愈，病情较重者加服龙胆泻肝汤，5~9天痊愈。

6. 千里光等治小儿湿疹

〔方剂〕 千里光15克，七叶一枝花12克，金丝桃、地柏枝、冬青树叶各9克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，直接撒于患处。每日换药1次。黄水已干，可用三磺软膏调药粉外搽。

〔验证〕 用上药治疗小儿湿疹12例，均在用药2~8次后痊愈。

7. 二黄膏治小儿湿疹

〔方剂〕 川黄连、硫黄、大枫子仁、青黛各10克，生杏仁5克，樟脑3克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，加入蜂蜜汁适量搅拌均匀，装瓶备用。用时涂抹患处，每日3~4次，以皮损痊愈为止。

〔验证〕 用本方治疗小儿湿疹患者49例，其中，痊愈者45例；显效者4例。总有效率为100%。

〔备注〕 用药期间，应注意局部卫生，不能用碱肥皂水洗。哺乳母亲禁食鱼虾及刺激性食物。

8. 丹参等治小儿湿疹

〔方剂〕 丹参、茵陈、败酱草各30克，苦参25克，黄柏、通草各15克。

〔制用法〕 将上药水煎3次后合并药液（约200ml），取其中100ml分3次口服，余液外洗患处，每日2~3次，每日1剂。

〔验证〕 治疗小儿湿疹60例，均获治愈。

9. 苍耳子等外洗治小儿湿疹

〔方剂〕 苍耳子、蛇床子、地肤子、苍术、白鲜皮、生大黄、黄柏、知母、蒲公英、苦参、野菊花、百部、生甘草各100克。

〔制用法〕 水煎外洗患处，每日3次。

〔验证〕 治疗小儿湿疹123例，痊愈120例，显效3例。

十六、小儿口腔溃疡

小儿口腔溃疡是一种小儿常见的口腔疾患。它以口腔内唇颊、上腭粘膜、牙龈及舌边等处出现数量及大小不等的浅黄色或灰白色溃烂面，并见周围红赤疼痛为特征。本病常由脾胃积热、心火上炎、虚火上炎几种情况所引起。常用的临床有效偏方如下。

1. 四黄泻火汤治小儿口糜

〔方剂〕 黄连3克，生大黄6克（后下），生石膏、板蓝根各30克，黄芩、生山栀、连翘、赤芍、野菊花各9克，人中黄4.5克。

〔制用法〕 水煎服，外用锡类散吹口。

〔功效〕 清热解毒，凉血利咽。

〔验证〕 陆×，男，1.5岁，1981年5月28日诊。发热退后舌面及上腭、两颊均有溃烂，多数融合成片，上覆灰白色腐状物，咽充血，扁桃体肿大，口内疼痛不能进食，流涎烦躁，夜间哭吵，大便秘结，午后体温常在38℃左右，舌苔薄，脉滑数。诊为口糜。证属心脾之火上炎。法以清热解毒，凉血利咽。处以上方3剂。药后症状大减，体温降，原方去生大黄，加鲜芦根1支，外用同上，再服3剂而愈。

2. 养阴清肺汤治小儿热病后期口腔溃疡

〔方剂〕 生地6克，麦冬4克，玄参5克，贝母、白芍、丹皮各2克，薄荷、甘草各3克。余热未清者加金银花、淡竹叶各5克。

〔制用法〕 水煎服，每天1剂。

〔疗效〕 以养阴清肺汤治疗小儿热病后期口腔溃疡36例，其中男21例、

女15例。年龄8个月至6岁。病程皆在3~15天。口腔溃疡前均有发热，多见于流感、肺炎、支气管炎、麻疹等热性病后期。经治36例均治愈。服药2~4天31例，5~7天5例。

[验证] 张×，男，2岁。因感冒高热3天，第4天发现口腔粘膜及舌面多处溃疡点。患儿哭闹无常，畏痛拒食，大便4天未解。证属热病伤阴，水不制火，虚火上炎。遂用上方加减，服1剂好转，2剂病愈。

[备注] 养阴清肺汤出自《重楼玉钥》，为治白喉之要方。该方以生地、丹皮、玄参、麦冬滋阴清热，凉血解毒；贝母润肺化痰；薄荷宣肺利咽；甘草泻火解毒。共奏养阴清热，解毒之功。用治小儿热病后期口腔溃疡，颇为合拍，收效亦著。

3. 白矾活蜘蛛治小儿口疮

[方剂] 白矾60克，活蜘蛛6个，冰片1.5克。

[制用法] 将白矾用砂锅溶化，再放入蜘蛛，待白矾全部成为枯矾时离火，剔除蜘蛛，放乳钵内，加入冰片，共研细末。用红筒将药粉少许吹入患处。每日2次。

[验证] 用上药治疗小儿口疮患者30余例，一般2~4次即可痊愈。本方疗效确切，治疗中未发现副作用。

4. 灯心草等治小儿口疮

[方剂] 灯心草、败酱草、茯苓、白术各6克，桂枝4克，朱砂0.5克（冲服），黄连3克，生甘草2克。

[制用法] 每日1剂，水煎分3~4次服，5剂为1个疗程。本方为2岁儿童用量，可按年龄酌情增减。

[验证] 用本方治疗小儿口疮患者69例，经用药1~2个疗程后，其中，治愈者68例；显效者1例。总有效率为100%。

5. 生大黄治小儿口疮

[方剂] 生大黄20克。

[制用法] 将上药置杯中，加沸开水150ml，加盖严实，约10分钟后含服。每天可冲泡2次。

[验证] 治疗小儿口疮35例，均获治愈。

6. 青黛等治小儿口疮

[方剂] 青黛、黄连、乳香、石膏各15克，寒水石9克，冰片、硼砂各

6 克。

[制用法] 将上药共研为细末，密闭贮存。用时，用纸筒将药末少许吹入口腔患处。

[验 证] 用上药治疗小儿鹅口疮患者 50 例，均在 3 天以内痊愈。其中 1 天治愈者 19 例，2 天治愈者 26 例，3 天治愈者 5 例。

7. 硼砂粉治鹅口疮

[方 剂] 硼砂、玄明粉各 15 克，朱砂 1.8 克，冰片 1.6 克。

[制用法] 将上药共研成细末，每次在哺乳半小时后涂药，疮面大者涂 0.5~1 克，小者 0.3 克。每日 3~4 次。

[验 证] 治疗鹅口疮患儿 25 例，在用药 2~5 次后，均获治愈。

8. 川黄粉治小儿鹅口疮

[方 剂] 川黄连、黄芩、川黄柏各 30 克，地榆、青黛、孩儿茶各 25 克，五倍子、冰片各 15 克，枯矾 10 克。

[制用法] 将上药共研为极细末，装瓶内备用。用时，取药末少许含于口中，每日 3 次。

[验 证] 治疗小儿鹅口疮 65 例，均获痊愈。

9. 口炎散治口疮

[方 剂] 乌梅炭、枯矾，孩儿茶叶 9 克，硼砂 1.5 克（或冰片）。

[制用法] 先将前 3 味药共研细末，入硼砂或冰片同研和匀，装瓶备用。先清洗口腔溃疡面，再把药粉均匀撒布疮面上。每日 1 次。

[功 效] 解毒、收湿、敛疮、生肌。

[验 证] 此药对小儿上述各症均有效，曾治疗 60 多例，效果均佳。

[备 注] 引自 1974 年《新中医》(1)。

十七、婴幼儿腹泻

婴幼儿腹泻又称婴幼儿消化不良，是婴幼儿常见疾病之一。夏秋两季发病率较高，是由肠道病毒、细菌、肠道外感染等引起。而饮食物的质量、喂养方法、气候环境、卫生条件及生活规律等往往与腹泻的发生有密切关系。

1. 茴香肉桂散敷脐治婴幼儿腹泻

[方 剂] 小茴香、肉桂、丁香、五倍子、苍术、木香各等份。

[制用法] 上药共研细末，少量温水调和敷脐，每天 1 次，敷药期间停其

他药物，少数有脱水征象者给予口服补液盐溶液。

〔疗效〕 经治 90 例，腹泻时间最长 4~5 月，最短 1 天，其中 65 例诊前曾在外院行多种药物治疗。经此法治愈 53 例（敷脐后腹泻停止），其中除 2 例分别为 9 和 7 天外，余均在 3 天内治愈；有效 27 例（敷脐后大便较前减少二分之一以上）；无效 10 例（治后无变化）。

〔验证〕 陈×，男，8 个月，1987 年 8 月 7 日诊。患儿腹泻稀水便 10 余天，来我院前曾在乡医院住院治疗，经输液、氯霉素、庆大霉素、中成药南通保和丸等治疗一周无效，腹泻日数次，尿色清，予敷药一次后大便正常。

2. 外敷药治小儿泄泻

〔方剂〕 白胡椒 2 份，肉桂、丁香各 1 份，藿香 1 份半。

〔制用法〕 研成细末，混匀装瓶密封备用。每次 1~3 克，用温开水调成糊状，薄布包好，于脐部放消毒纱布一块，然后将药放上，后用胶布固定。每天 1 次，第 2 天对时（即 24 小时）换药。湿热型泄泻忌用。

〔疗效〕 治疗 10 例属脾虚型、脾肾阳虚型、风寒型之小儿泄泻，均在用药 2~3 次后痊愈。

〔验证〕 程××，男，1 岁 4 个月。患儿曾因腹泻住院 2 次。现排蛋花样大便 2 天，每天 7 次之多，便下稀薄，挟有完谷，每食后作泻；伴呕吐，面色苍白，寐时露睛，舌淡、苔薄白。用上药 1.5 克外敷神阙（即脐部）2 次，第 3 天解黄色条便 1 次，症消纳增，调养而愈。

3. 敷脐方治腹泻

〔方剂〕 车前子、丁香 1 克，肉桂 2 克。

〔制用法〕 上药各研细末、和匀、备用。用时取 2 克置脐中，然后以加热之纸膏药盖贴于上。每隔 2 天换药 1 次。

〔功效〕 温中止泻。

〔验证〕 一般 1 次即可获效。无不良反应。

〔备注〕 引自《中药贴敷疗法》。

4. 止泻敷脐散治小儿腹泻

〔方剂〕 吴茱萸、肉桂、黄连、木香各 3 克，苍术 5 克。

〔制用法〕 上药共研细末，与适量葱白捣如泥状，摊成药饼状，备用。上药分2次敷于神阙穴上，外用止痛膏覆盖固定。24小时换药1次。同时配用西药止泻4味药（小儿新诺明，多酶片，复方地方诺脂，硝酸铋），按体重给药。

〔功效〕 温中燥湿，消炎理气。

〔验证〕 治疗65例，全部有效。

〔备注〕 引自1991年《陕西中医》(8)。加减：脾胃虚寒去黄连。

5. 地榆白芨治腹泻

〔方剂〕 地榆、白芨各30克。

〔制用法〕 将上药加水500ml，浓煎至200ml。每天早、晚各服1次，每次50ml，服用时可少许食糖，一般可连服2~4次。

〔验证〕 用上药治疗婴幼儿腹泻患儿15例，均在服药2~4次后获得治愈。

6. 丁香桂囊外敷治腹泻

〔方剂〕 丁香、木香各5~10克，肉桂4~6克。

〔制用法〕 将上药研细末置纱布袋内，用绷带缚小儿脐上一夜，一般1~3次即可见效。

〔验证〕 用上药治疗小儿腹泻患者66例，其中，痊愈56例；显效6例；好转4例。

7. 三香肉辣肉桂治腹泻

〔方剂〕 川椒、广木香、小茴香、吴茱萸、肉桂、公丁香、淡干姜各等份。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装入瓶内勿令泄气。每用3克，盛于纱布袋内，覆盖于神阙穴上，外以绷带固定，24小时取下。

〔验证〕 用本方治疗小儿腹泻患者64例，经用药2~4次后，均可治愈。

十八、小儿睾丸鞘膜积液

鞘膜积液，属中医“水疝”范畴。常见于婴幼儿。

多因先天不足，气化失常，水湿下注或湿热下注所致。或由睾丸外伤，细菌感染等因素引起。

1. 张氏水疝方治小儿睾丸鞘膜积液

〔方剂〕 桃仁、川牛膝、地龙、荆芥穗，甘草各3克，红花1.5克，益

母草、茯苓各 6 克，车前子、泽泻各 5 克，麻黄 0.9 克。方中药量为 2~3 岁量。

[加 减] 气虚者去荆芥，加黄芪；脾肾阳虚者加肉桂、白术；阴虚者加北沙参。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂。

[功 效] 治小儿睾丸鞘膜积液。

[验 证] 裴××，2 岁。患水疝，经镇、县医院诊为炎症而用消炎药和湿敷未效，越肿越大，最后要动手术。其父母求余诊治。诊见患儿阴囊肿如鹅蛋，光滑有波动感。诊为水疝（睾丸鞘膜积液）。依《新中医》1989 年第 2 期“张敏元老中医学术经验简介”一文之方：桃仁地龙各 5 克，红花、赤芍、白通草各 1.5 克，茯苓、益母草各 6 克，麻黄 1 克，川牛膝、荆芥穗、生甘草各 3 克。3 剂服完，其症痊愈。

2. 暖脐膏治小儿睾丸鞘膜积液

[方 剂] 万应膏 500 克，白胡椒 12 克，肉桂 24 克。

[制用法] 将后 2 味研细末，调入万应膏内搅匀，摊布上，备用。贴积液处。

[功 效] 止痛消液。

[验 证] 屡用效佳。一般连用 3 次即愈。

[备 注] 引自 1985 年《浙江中医杂志》(6)。

3. 二仁消液膏治小儿睾丸鞘膜积液

[方 剂] 炒桃仁、炒杏仁各 30 克，川楝子 60 克，蓖麻子 120 克，麝香 1.5 克。

[制用法] 将前 4 味药共捣烂如泥，加麝香拌匀，备用。每取五分之一药膏平摊于纱布上，夜间睡前敷贴患处，外以胶布固定，翌晨取掉。连敷 5~10 次。

[功 效] 止痛消液。

[验 证] 治疗 10 余例，效果满意。

[备 注] 引自 1981 年《湖北中医杂志》(2)。

4. 桂冰散治小儿鞘膜积液

[方 剂] 肉桂、冰片各等份。

[制用法] 上药共研细末，备用。用黑膏药（由香油、黄丹熬成）1 张，

取上药粉适量撒于药膏上，贴敷患处，若膏药破裂可重盖 1 张，1 周换药 1 次，以治愈为度。

[功 效] 止痛消液。

[验 证] 屡试屡验。

[备 注] 引自《外治汇要》。

5. 肉桂煨龙骨等治小儿睾丸鞘膜积液

[方 剂] 肉桂 6 克，煨龙骨、五倍子、枯矾各 15 克。

[制用法] 将上药捣碎加水约 700ml，放于药锅内煎煮，水沸后 30 分钟将煎出液滤出，待冷却到与皮肤温度相近时，把阴囊全部放入盛药液的容器内，浸洗约 30 分钟左右，每 2 日 1 剂，连用 8 剂。

[验 证] 用上药治疗小儿睾丸鞘膜积液患儿 11 例，原发性睾丸鞘膜积液 10 例，继发性睾丸鞘膜积液 1 例，均获痊愈，随访 1 年未见复发。治愈时间：10 天内治愈者 4 例，11~15 天治愈者 6 例，16 天以上治愈者 1 例，用药最少者 5 剂，最多者 9 剂。

6. 母丁香治小儿睾丸鞘膜积液

[方 剂] 母丁香 100 克。

[制用法] 将上药共研为极细末，装入瓶内密闭备用。用时，取药末 2 克（先将肚脐周围洗干净、擦干）放入患者肚脐中，然后盖上无菌敷料，用胶布呈十字固定。每隔 2 天换药 1 次。10 次为 1 个疗程。

[验 证] 用本方治疗小儿睾丸鞘膜积液患者 138 例，其中，治愈者 130 例；有效者 5 例；无效者 3 例。治愈的 130 例中，1 个疗程治愈者 43 例，2 个疗程治愈者 57 例，3 个疗程治愈者 30 例。

7. 麦芽汤治小儿睾丸鞘膜积液

[方 剂] 牡蛎 30 克（先煎）、党参、泽泻、生黄芪、法半夏、白术各 10 克，鸡内金、谷芽、麦芽各 8 克，陈皮、生甘草各 5 克。

[制用法] 将上药水煎 3 次后合并药液，分 2~3 次口服，每日 1 剂。10 剂为 1 个疗程。间隔 2~3 天，再行下 1 个疗程。

[验 证] 用本方治疗小儿睾丸鞘膜积液患者 77 例，均获治愈。其中，1 个疗程治愈者 31 例；2 个疗程治愈者 29 例；3 个疗程治愈者 17 例。治愈后经随访 1 年，均未见复发。

十九、蛲虫病

本病对儿童的健康很有影响，首先因为肛门发痒，晚上爱闹，烦躁不安，睡眠不好，白天精神差，消化亦不良，小女孩还会因此引起外阴炎。临床常用的治疗小儿蛲虫病的偏方、验方主要如下：

1. 苦楝子塞肛治蛲虫病

[方 剂] 苦楝子 1 个。

[制用法] 将成熟苦楝子洗净，温开水泡软，去皮后塞入肛门，每晚睡前 1 次，连用 5 日。塞后卧床休息，第 2 天早排出苦楝子。同床者需同时治疗。治疗期间，每天用开水浸洗内裤，以绝传染之源。

[疗 效] 经多年应用于临床无不奏效。

[验 证] 经使用《新中医》1987 年第 9 期“苦楝子塞肛治蛲虫病”2 例均效。病例：马 × ×，男，45 岁，某公司干部。患蛲虫病年余，每夜睡时肛门瘙痒难耐，致睡眠不佳，白天头昏乏力，影响工作，多次服用中西药驱虫、疗效欠佳。久而久之，每晚睡后 1 小时必起床捉蛲虫 1 次。1988 年 1 月 16 日患者使用本方治疗，如法制药，用至第 3 天晚睡觉时已无肛痒。连用半月，其病已愈。

2. 加味百部煎治蛲虫病

[方 剂] 百部 15 克，苦楝皮 10 克，乌梅 2 枚。

[制用法] 上药加水煎 2 次，去渣后再浓缩成 50 克左右备用。每晚睡前用棉球蘸药液塞肛门内。每晚 1 次，至愈为止。

[功 效] 杀虫止痒。

[验 证] 一般用 7~10 次即愈。

[备 注] 引自《外治汇要》。又用苦参研末，用凡士林调匀涂敷肛门处。或用苦杏仁捣烂，敷于肛门上。或用使君子 10 克葱白（去皮）适量，共捣烂，用纱布卷药塞入肛门。或用明矾 1 块（大小适宜）塞入肛门，连用数次。效佳。

3. 百部煎药棉方治蛲虫病

[方 剂] 生百部、槟榔、苦楝根皮各 6 克，鹤虱 5 克。

〔制用法〕 上药加水适量，煎 45 分钟左右，取煎液 10 毫升备用。用时先将肛门周围用温水洗涤，用适量之棉球（穿 1 根粗线，留线头约 15 厘米长），将药棉蘸足药液（余药液涂于肛门周围），然后将棉球纳入肛门内约 4~6 厘米深处，留线头于肛门外。每夜临睡前用，次日晨起取去。连用 5 天为 1 疗程。

〔功效〕 杀虫止痒。

〔验证〕 治疗 30 余例，均获良效。

〔备注〕 引自 1986 年《陕西中医》（9）。

4. 使君子丸治蛲虫病

〔方剂〕 使君子仁、雷丸、蛇床子、鹤虱各等份。

〔制用法〕 上为细末，炼蜜为丸如枣核大，备用。于临睡前取丸 1 粒纳入肛门内。

〔功效〕 杀虫止痒。

〔验证〕 屡用效佳，一般 1~3 次即愈。

〔备注〕 引自 1988 年《医学文选》（1）中祖传秘方验方集。或用蛇床子、苦楝皮各 9 克，防风 6 克，皂角 1.5 克，研制末，炼蜜调匀，搓成药条，塞入肛门。连用 2 晚，即愈。

二十、佝偻病

小儿佝偻病，又称软骨病，属中医“五迟五软”、“龟胸龟背”范畴。尤以缺乏户外活动的小儿为多。多因先天不足，后天失养，脾肾亏损所致。现代医学认为缺乏维生素 D 而致钙磷失调所致。骨骼生长发育障碍（软化、畸形）、肌肉松弛、易惊，多汗，齿迟，或鸡胸龟背，或伴夜惊，多汗等症。

1. 鸡蛋皮治小儿佝偻病

〔方剂〕 鸡蛋皮。

〔制用法〕 将鸡蛋皮洗净，烤干，研粉过筛极细。1 周岁以下每次服 0.5 克，1~2 岁每次 1 克，每日 2 次。

〔功效〕 制酸补钙。用治钙质缺乏手足搐搦症、佝偻病。

〔验证〕 据《新中医杂志》推荐，效果良好。

2. 虾皮蛋羹预防小儿佝偻病

〔方剂〕 虾皮 10 克，鸡蛋 1 个。

- 〔制用法〕** 将鸡蛋打花与虾皮搅拌均匀，放入蒸锅中煮熟。佐餐。
- 〔功效〕** 经常食用可预防小儿佝偻病。
- 〔备注〕** 虾皮含钙量最高，是其他任何食物都无法比的。虾皮还含有较多的糖原等物质。因此，对儿童来说，虾皮是补充钙质、预防佝偻病的一种经济实惠又有疗效的食品。
- 〔验证〕** 据《健康报》介绍确有良效。

3. 陈皮丁香等治佝偻病

- 〔方剂〕** 党参、生黄芪、黄精各 10 克，土茯苓、陈皮各 6 克，丁香 1 克。
- 〔制用法〕** 将上药水煎 3 次后合并药液，浓缩成 100ml，加入红糖 10 克，搅拌均匀。分 3~4 次口服。每日 1 剂。10 剂为 1 个疗程。
- 〔验证〕** 用本方治疗小儿佝偻病患者 80 例，经用药 2 个疗程治愈者 15 例，3 个疗程治愈者 20 例，4 个疗程治愈者 30 例，5 个疗程治愈者 25 例。治疗中未见不良反应发生。

4. 菟丝子等治佝偻病

- 〔方剂〕** 菟丝子、黄芪、党参各 15 克，牡蛎、龙骨、麦芽、苍术、生甘草各 6 克。
- 〔制用法〕** 本方为 1 日剂量。可将本方 5 剂制成糖浆 150ml 备用。用时，3 个月以内者每次服 5~6ml；4~18 个月者每次服 10ml；19 个月以上者每次服 15ml。每日 3 次。3 周为 1 个疗程。
- 〔验证〕** 用本方治疗小儿佝偻病患者 45 例，经用药 1~3 个疗程后，其中，治愈者 40 例；显效者 5 例。总有效率为 100%。

5. 龙骨粉治佝偻病

- 〔方剂〕** 苍术、茯苓、生黄芪、党参、五味子各 15 克，龙骨、牡蛎各 50 克。
- 〔制用法〕** 将上药共研为极细末，装入瓶内密闭备用。用时，每次服 1~1.5 克，加红糖适量，温开水冲服，每日 3 次。
- 〔验证〕** 用本方治疗小儿佝偻病患者 61 例，其中，治愈者 58 例；显效者 3 例。治疗时间最短者 20 天，最长者 70 天，平均 30.5 天。

二十一、麻 疹

麻疹是由麻疹病毒经呼吸道传播的一种急性传染病。本病一年四季均可发病。尤以冬春季节发病者居多。本病多发生于学龄前儿童，成人亦有发生。患后可获本病终身免疫。

祖国医学认为本病多因内蕴热毒，外感风邪痧毒所致。

发热3~4日后遍身出现红色疹点，稍有隆起，扪之碍手，状如麻粒，口颊粘膜，出现麻疹粘膜斑。一般分疹前期、出疹期、收疹期。顺证可不药而愈，逆证或并发变证，其病为重，甚至危及生命。

1. 芝麻秆糯米粥治荨麻疹

[方 剂] 芝麻秆12根，糯米200克。

[制用法] 将芝麻秆根切碎，入砂锅内，加水2000毫升，煎至剩一半用纱布过滤，取其清汁煮糯米粥。分2次服完。

[功 效] 散风热。用治荨麻疹。

[验 证] 据《中医杂志》介绍，服用此方一般3次即愈。

2. 活鸡敷胸解毒透疹

[方 剂] 活鸡1只。

[制用法] 将活鸡去肚上毛，剖膛，乘热外敷儿胸。注意避风，切勿着凉。

[功 效] 解毒透疹。用治小儿麻疹热毒内陷。

[验 证] 据《湖北中医杂志》1982年第2期介绍，用此法治疗7例，均在5岁以下。敷2小时急症缓解，6小时疹子隐现。病例：龙×，女，4岁。患麻疹，发热3天，疹现1天，忽而隐没。旋即呼吸急促，烦躁不宁，口唇青紫，肢冷脉微，血压下降。用抗生素无效。用此法7小时后胸背隐现疹子。

3. 荸荠预防麻疹并发症

[方 剂] 荸荠、绣球花叶。

[制用法] 两味共绞汁或水煎服。7个月~1岁，每次荸荠3~5粒，绣球花叶3~5叶；1~2岁，用7粒，7叶；2~4岁，用9粒，9叶；4岁以上用11粒，11叶。以上均为每日服2~3次。

[功 效] 清肺热，泻毒火。用于预防麻疹并发支气管炎、肺炎。

[验 证] 《福建中医药》1961 年 8 卷 5 期所举治验 2 例，均有体温增高、脸色苍白、鱼口露睛、口唇发紫、囟门凸起、痰鸣喘急、鼻翼扇动、无汗、手足厥冷等症状，经服上药而愈。

二十二、小儿汗证

有些孩童即使在凉爽的夜晚，仍出汗不已，面色灰滞，没有光彩，肌肤之中缺乏血液，一望而知是夜间出汗的结果。长久下来，食欲减退，烦躁不宁，是种麻烦的症候，需要补中益气，才能根治。

1. 泥鳅治小儿盗汗

[方 剂] 泥鳅 90~120 克。

[制用法] 用热水洗净鱼身上的粘液，开膛去内脏，用适量油煎至黄焦色，加水一碗半，煮至半碗，加盐调味。吃肉饮汤，每天 1 次，连服 3 天。

[功 效] 补中益气。用治小儿盗汗、劳倦乏力、小便不利。

[验 证] 《中医杂志》介绍读者来信反映效果极佳，值得推广。

[备 注] 上方对小儿缺钙、营养不良、佝偻病、植物神经功能紊乱等原因引起的盗汗效果较好，而对结核病、大脑发育不全引起的盗汗无效。

2. 猪肚糯米粥治小儿盗汗

[方 剂] 猪肚半个，糯米适量。

[制用法] 将糯米用猪肚包严，用线缝紧，放锅内煮烂，吃猪肚饮汤；糯米晒干研成细粉，空腹时用糯米汤送服。

[功 效] 补虚，和胃，敛汗。用治小儿盗汗、自汗。

[验 证] 据《老年报》介绍，该方疗效确切，值得推广应用。

3. 浮小麦黑豆汤治小儿虚汗

[方 剂] 浮小麦、黑豆各 20 克。

[制用法] 水煎。日分 2 次服用。

[功 效] 除虚热，止盗汗。用治小儿盗汗、自汗。

4. 胡萝卜腰花治小儿虚汗

[方 剂] 猪肾（猪腰）1 对，胡萝卜 60 克。

[制用法] 猪肾去网膜，切成腰花，胡萝卜洗净，切片，按常法加调料炒

熟吃。

[功效] 滋阴，敛汗。用治小儿盗汗、自汗、倦怠乏力、烦热口渴、睡眠不安。

5. 木耳红枣治小儿盗汗

[方剂] 木耳、红枣各 15 克，冰糖适量。

[制用法] 将上药加水 1 碗半，煎至大半碗，每日 1 剂，分 2~3 次服。

[疗效] 用上方治疗小儿盗汗患儿 106 例，一般用药 1 剂汗减，6 剂汗止。

[验证] 上述三方经《新中医》介绍，其治疗小儿盗汗疗效显著，根据患者实际情况合理选用三方治疗，均收到理想效果，治疗 132 例，痊愈 103 例，好转 27 例，无效 2 例，总有效率达 98.8%。

二十三、小儿夜啼

小儿夜啼多因消化不良、惊吓、中耳炎或佝偻病早期等原因所致。祖国医学认为，夜啼多见于心热或脾寒，也可因伤食、伤乳、惊吓等原因所致。

1. 泻心导赤饼治小儿夜啼

[方剂] 木通 2.5 克，生地 4.5 克，黄连、甘草、灯心各 1.5 克。

[制用法] 上药共研细末，加白蜜滚水调和成饼。敷贴两手心劳宫穴上。

[功效] 清心泻火。

[验证] 屡用效佳。

[备注] 引自 1979 年《上海中医药杂志》(2)。

2. 解热安神膏治小儿夜啼

[方剂] 羌活、防风、天麻、薄荷、黄连、甘草、全蝎、僵蚕、胆南星各 10 克，犀角片 6 克（用水牛角 15 克代，切片）。

[制用法] 麻油熬，黄丹收。摊膏备用。镇心解热，熄风镇静，退惊安神。

[验证] 屡用神效。

[备注] 引自《理渝骈文》。

3. 敷脐方止啼

[方剂] 牵牛子 7 粒。

[制用法] 上药研末，用温水调成糊状，备用。于临睡前敷于肚脐上，用

胶布或绷带固定。

〔功效〕 逐水泻火。

〔验证〕 经治 20 例，一般多在当夜就能止啼哭。

〔备注〕 引自 1983 年《中医杂志》(4)。

4. 酸枣仁止夜啼

〔方剂〕 酸枣仁、川黄连、乌梅、焦山楂各 9 克，麦冬 3 克，生大黄 6 克（后下）。

〔加 减〕 若烦热者，加淡竹叶、柴胡 5 克；若腹胀、腹痛者，加元胡、莱菔子、使君子各 6 克。

〔制用法〕 将上药水煎分 3 次口服，每日 1 剂。3 剂为 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗小儿夜啼患者 28 例，经用药 1~3 个疗程后，其中治愈者 25 例；好转者 2 例；无效者 1 例。

5. 蝉衣等治小儿夜啼

〔方剂〕 钩藤、薄荷、炒酸枣仁各 4 克，蝉衣 2 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分早、晚 2 次口服，每日 1 剂。若 3 剂不愈者，视为无效。

〔验证〕 用本方治疗小儿夜啼患者 63 例，其中，治愈者 61 例；好转者 2 例。均在服药 1~3 剂获效或治愈。

二十四、小儿惊吓

本病多是因小儿在没有精神准备的情况下，被突然出现刺激性的事物或声音所影响而造成心理上的阴影。中医认为本病属“惊悸”范畴。

1. 当归远志等治小儿惊吓

〔方剂〕 当归、远志、蝉蜕、钩藤各 6 克，茯神、珍珠母、紫贝齿各 7.5 克。

〔加 减〕 若见呼叫甚者，加白鲜皮；若夜惊甚者，加粉苡草；若手足搐动者加木瓜；若烦躁尿赤者加淡竹叶；若腹痛者，加木香；若大便青者，加白芍。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

〔验证〕 用上药治疗小儿惊吓 21 例，其中治愈 17 例，症状减轻 4 例。在举例的 17 例中，其平均治愈日数为 9 日。总有效率为 100%。

二十五、小儿脂溢性皮炎

由于小儿皮脂腺分泌旺盛，过多堆积而导致的一种慢性皮肤炎症。遗传，精神刺激，化学因素均可促使本病发生。

1. 猪胆治小儿脂溢性皮炎

〔方 剂〕 猪胆 1 个。

〔制用法〕 将猪胆汁倒在盛有半面盆温水的盆中，搅拌后洗头（或洗患处），把油纸状鳞屑清除干净，再用清水清洗 1 次，每天 1 次。

〔验 证〕 用上药治疗小儿脂溢性皮炎患儿 31 例。年龄为 2 月～13 岁，病程 1 周～5 年。其中治愈 25 例，好转 6 例。

2. 川军黄连治小儿脂溢性皮炎

〔方 剂〕 生川军、川黄连各 100 克，白鲜皮 80 克，冰片 30 克，食醋 500ml。

〔制用法〕 将生川军、川黄连、白鲜皮共研为极细末，再加入冰片、食醋内，密封浸泡 10 天，待变成深棕色后即可应用。用时，每次用上药液涂搽患处，每日 3～4 次，直至痊愈为止。

〔验 证〕 用本方治疗小儿脂溢性皮炎患者 66 例，经用药 3～5 天后，其中痊愈者 60 例，显效者 4 例，有效者 2 例。

3. 龙胆草治小儿脂溢性皮炎

〔方 剂〕 龙胆草、半枝莲、白花蛇舌草各 50 克，苦参、土茯苓、白鲜皮、生川军、硫磺各 30 克，地肤子 20 克。

〔制用法〕 将上药水煎 800ml，外洗患处，1 剂药可用 2 天。每日外洗 2～3 次。

〔验 证〕 用本方治疗小儿脂溢性皮炎患者 123 例，经用药 2～3 剂后，其中，治愈者 120 例；显效者 3 例。痊愈者随访 2～5 年，均未见复发。本方药源广泛，价格低廉，无副作用，在临床中值得推广。

二十六、小儿癫痫

癫痫是小儿时期最常见的一种由于脑功能紊乱引起反复发作神经系统的综合症。表现为发作性的意识丧失的障碍，伴有肌痉挛、感觉、情感以及行为异常。

1. 钩藤、天竺等治小儿癫痫

[方 剂] 钩藤 8 克，天竺黄、白芍各 5 克，大青叶、甘草各 6 克，连翘心、僵虫各 4 克，全蝎 2 克，石膏 3 克。（此剂量适宜于 1~3 岁小孩，按年龄大小加减）。

[加 减] 若发作频繁者，加天麻、蜈蚣；若呕逆痰多者，加法半夏、竹沥；若弄舌者用朱砂点舌；若大便秘结者，加大黄；若腹泻者，加神曲；若小便黄短者，加地龙、滑石；若口渴者，加麦冬、知母；若高热不退者，用生石膏磨汁调入药液内。如在发作时配合针灸取穴：人中、印堂、间使、合谷、太冲，若针后昏迷仍不醒者隔姜灸人中、印堂。

[制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

[验 证] 用上方治疗小儿癫痫患者 24 例，其中痊愈 21 例，好转 3 例，均获效。

2. 黄芪等治小儿癫痫

[方 剂] 生黄芪 60 克，赤芍、防风各 3 克，蜈蚣 1 条（研冲）。

[制用法] 将前三味药水煎，蜈蚣研末冲服。每日 1 剂。

[验 证] 用上药治疗儿童癫痫小发作患者 11 例，其中病程量短者 15 天，最长者半年，有脑炎病史者 2 例，头部外伤者 3 例，高烧病史者 3 例，原因不明者 3 例。服药最少者 18 例，最多者 47 例，其中治愈 6 例，显效 1 例，好转 2 例，无效 2 例。

3. 蝉蜕等治小儿癫痫

[方 剂] 蝉蜕 30 克，白附子、僵蚕、天麻、钩藤各 20 克，全蝎 15 克，朱砂 10 克。

[制用法] 将上药共研为极细末，装入瓶内密封备用。用时，1 岁以内服 0.5 克；1~2 岁服 1 克；2~4 岁服 1.5 克。年龄大者可酌情加量。每日 2 次，白开水送服。1 剂为 1 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗小儿癫痫患者 78 例，其中，服药 1 剂痊愈者 48 例；服药 2 例痊愈者 31 例。

4. 小麦、大枣等治小儿癫痫

〔方 剂〕 浮小麦 20 克，丹参、白芍、钩藤、天麻各 15 克，防风 8 克，大枣 9 枚，蝉蜕、生甘草各 4 克。

〔制用法〕 将上药水煎分 2~3 次口服，每日 1 剂。10 剂为 1 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗小儿癫痫患者 16 例，经用药 2~4 个疗程后，均获治愈。随访 1~2 年，均未见复发。

二十七、小儿漆过敏

本病是由于接触油漆后所产生的皮肤过敏性炎症，表现为局部皮肤红肿，渗出增多，甚至皮肤溃烂。

1. 生绿豆、生薏米等治漆过敏

〔方 剂〕 (1) 内服：生绿豆 60 克，生薏米 30 克。

(2) 外敷：生绿豆 60 克。

〔制用法〕 先将 (1) 内服方中的生绿豆、生薏米洗净，加水适量，煨烂，再加入白糖适量，连汤 1 次顿服。每日 1 剂，直至病愈。再将 (2) 外敷方中的生绿豆，洗净浸泡在开水内 12 小时，取出后捣烂成糊状，外敷患处，每日数次。

〔验 证〕 笔者采用生绿豆等治疗小儿漆过敏患儿 12 例，均在 4 天内皮疹消退，临床治愈。

二十八、儿童手足冻疮

小儿皮肤娇嫩，且不会自我保护，手足较长时间暴露在外，冷空气下易发生冻伤。局部表现为皮肤苍白、红肿、紫斑、灼痒、麻木、皮肤水疱、溃烂。

1. 当归芍药等治手足冻疮

〔方 剂〕 当归、芍药各 20 克，桂枝 15 克，细辛、炙甘草各 5 克，木通，生姜各 10 克，大枣 5 枚。

〔制用法〕 将上药装入适宜容器内，加水 500ml，加热煮沸（文火）后 5 分钟离火。用蒸气熏冻疮部位，待药液降至适当温度，将冻疮

部位浸入带有药渣的药液内 15~20 分钟。每天 2 次，1 剂药可连续用 4 次。

[验 证] 笔者以此治疗Ⅰ度~Ⅱ度手足冻疮的学龄儿童患者 100 余例，经 2~4 次熏洗，症状明显减轻；6~8 次后，患处肿消，痛止、色退而愈，均有效，但应注意连续用药，否则影响疗效。

2. 红花桃仁等治手足冻疮

[方 剂] 当归、红花、桃仁、王不留行、鸡血藤各 50 克，桂枝、干姜、干红辣椒各 30 克，细辛、红椒各 20 克，樟脑、冰片各 10 克。

[制用法] 将上药浸泡于 95% 乙醇的 1 000ml 中，七天后用纱布过滤，贮瓶内备用。用时，先将局部洗净拭干，再用消毒棉签蘸药液涂搽患处，每日 2~4 次，直至痊愈为止。

[验 证] 用本方治疗儿童手足冻疮患者 181 例，经用药 3~5 天治愈者 49 例；6~8 天治愈者 51 例；9~12 天治愈者 38 例，13~15 天治愈者 40 例。显效者 3 例。总有效率为 100%。

二十九、婴幼儿尿布疹

本病多由婴幼儿接触带有化学染料的尿布或尿布长期潮湿而导致的小儿皮肤病。

1. 小米治尿布疹

[方 剂] 小米 50 克。

[制用法] 将小米加水 1 000ml 左右。同放入锅内用文火煮至小米开花（熬烂）即可。取上层清汤备用（待温，以不烫皮肤为宜）。用时，取消毒棉球蘸米汤涂患处，涂后局部撒一层滑石粉即可。每日 3~4 次，以愈为度。

[验 证] 用上药治疗婴幼儿尿布疹患儿 46 例，其中 39 例治愈，3 例因伴有其它皮肤病未治愈，4 例原因不明。

2. 三黄液治尿布疹

[方 剂] 葛根、川黄连、黄芩、川黄柏、茯苓、连翘各 6 克，生甘草 5 克。

[制用法] 将上药水煎 3 次后得药液 200ml，其中 100ml 分 4 次口服，另 100ml 分 2~3 次外涂患处。每日 1 剂。直至痊愈为止。

〔验证〕 用本方治疗婴幼儿尿布皮疹患者 16 例，经用药 3~5 剂，均获治愈。

3. 金银花等治尿布疹

〔方剂〕 青黛 20 克，滑石 100 克，金银花 50 克，川黄连 30 克，生甘草 15 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装入瓶内备用。用时，先将患处常规消毒后，再用上药末撒于患处。每日 2~3 次。3 天为 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗婴幼儿尿布疹患者 123 例，经用药 1~3 个疗程后，均获痊愈。

三十、儿童多动症

本病病因未明。不少学者认为是由于大脑发育迟缓，神经纤维成熟推迟引起；也可能与遗传、脑外伤、内分泌激素失常等因素关联。特征是多动、注意力难以集中、情绪不稳。冲动任性等。

1. 珍珠汤治多动症

〔方剂〕 白芍、天麻、珍珠母（先煎）各 10 克，枸杞子、女贞子、夜交藤、柏子仁、生牡蛎（先煎）各 15 克，大枣 5 枚。

〔加 减〕 若疲倦乏力、纳少便溏者，加白术、茯苓、党参各 10 克；若阴血不足、面色萎黄者，加鸡血藤、全当归、熟地各 10 克；若夜寐不安者，加远志、炒枣仁各 10 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分早、中、晚 3 次口服，每日 1 剂。10 剂为 1 个疗程，直至痊愈为止。

〔验证〕 用本方治疗儿童多动症患者 80 例，均获得痊愈。其中，用药 1 个疗程治愈者 25 例；2 个疗程治愈者 32 例；3 个疗程治愈者 23 例。治疗中未见不良反应发生。

2. 龙骨汤加琥珀粉治小儿多动症

〔方剂〕 生地、茯苓、钩藤、菖蒲各 15 克，生龙骨、生牡蛎各 30 克，炙远志 5 克，琥珀 2 克（研末分 3 次吞服）。

〔加 减〕 若心烦难眠者，加龟板、百合、熟地黄各 10 克；若形寒肢冷者，加鹿角 1 克，生黄芪 10 克；若胸闷、食少者，加法半夏、焦山楂各 10 克；若大便秘结者，加龙胆草 6 克，火麻仁 10 克。

- 〔制用法〕** 将上药水煎，分3次口服，每日1剂，半个月为1个疗程。
- 〔验证〕** 用本方治疗儿童多动症患者61例，经用药1~3个疗程，其中，治愈者58例；好转者2例；无效者1例。

三十一、小儿缺锌症

小儿血清锌浓度低于正常水平称小儿缺锌症。

1. 黄芪党参等治小儿缺锌

- 〔方 剂〕** 生黄芪、党参、白芍、黄精、焦白术、麦芽、谷芽各12克，苍术、山楂炭各10克，连翘、陈皮各8克，生甘草5克。
- 〔加 减〕** 若厌食或偏食甚者，加鸡内金、怀山药、炒扁豆各6克，砂仁2克；若异食癖者，加槟榔、使君子、乌梅各8克，香附4克；若腹胀、腹泻者，加神曲、广木香、藿香各5克。
- 〔制用法〕** 将上药水煎3次后合并药液，约得药液150ml，分早、中、晚3次口服，每日1剂，服至自觉症状消失，锌上升至100pm以上。
- 〔验证〕** 用本方治疗小儿缺锌患者321例，经用药10~15天后，锌测定均转至正常范围。

三十二、小儿过敏性紫癜

过敏性紫癜是一种毛细血管变态反应性疾病。主要病理为身体各部的小血管沉着免疫复合物。发病以学龄儿童多见，春秋季节发病率高。

1. 茅根威灵仙等治小儿过敏性紫癜

- 〔方 剂〕** 鲜白茅根30克，生地黄、紫草、丹皮、威灵仙、鸡血藤、焦山楂、丹参各10克，广木香、乳香、青黛各3克，生甘草5克。
- 〔加 减〕** 若伴肾炎者，加茜草、仙鹤草、生薏苡仁各10克；若伴腹痛者，加赤芍、延胡索、枳实、香附各10克；若兼关节肿痛者，加伸筋草、路路通、桂枝各10克。
- 〔制用法〕** 将上药水煎3次后合并药液200ml，分3~4次温服。每日1剂，5天为1个疗程。
- 〔验证〕** 用本方治疗小儿过敏性紫癜患者185例，其中，治愈者178例；显效者4例；有效者2例；无效者1例，服药最少者1个疗程，

最长者 8 个疗程，平均 4 个疗程。

2. 牡丹皮等治过敏性紫癜

- [方 剂] 败酱草、双花藤、连翘各 15 克，蝉衣 5 克，全当归、牡丹皮各 10 克，川芎 3 克。
- [加 减] 若小便有血者，加白茅根、大蓟、小蓟各 15 克；若蛋白尿者，加生黄芪、木通、石苇各 10 克；若大便有血者，加地榆炭、仙鹤草各 10 克；若腹痛、呕吐者，加苏叶、法半夏、姜竹茹各 6 克。
- [制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 2~3 次口服。10 剂为 1 个疗程。本方剂量可随年龄增减。
- [验 证] 用本方治疗小儿过敏性紫癜患者 70 例，经用药 1~5 个疗程后，其中，治愈者 65 例；显效者 3 例；有效者 2 例。治疗中未见不良反应发生。

三十三、小儿流涎症

本病多由小儿大脑发育尚未健全，唾液腺分泌过多导致从口角流出的一种现象。

1. 大枣等治流涎症

- [方 剂] 竹叶 7 克，陈皮 5 克，大枣 5 枚。
- [制用法] 将上药煎水，分 2 次服。每日 1 剂。
- [验 证] 用上药治疗小儿流涎症患者，一般服至 3~5 剂即告痊愈。

2. 桑白皮治流涎症

- [方 剂] 桑白皮 10~20 克。
- [制用法] 将上药加水 100ml，煎至 60ml，分 2~3 次口服，每日 1 剂。5 剂为 1 个疗程。
- [验 证] 用本方治疗小儿口角流涎症患者 130 例，经用药 1~2 个疗程，均获治愈。

3. 鸡内金等治流涎症

- [方 剂] 鸡内金、生黄芪各 10 克，益智仁、白术各 8 克。
- [制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 3 次口服。4 剂为 1 个疗程。
- [验 证] 用本方治疗小儿口角流涎患者 95 例，均获痊愈。其中，1 个疗

程治愈者 39 例；2 个疗程治愈者 46 例；3 个疗程治愈者 10 例。
随访未见复发。

4. 滞颐方治流涎症

〔方 剂〕 吴茱萸、盐附片各 5 克，面粉 10 克。

〔制用法〕 将前 2 味研细末，入面粉拌匀，用半水半醋调成干糊状，备用。取上药贴两足心（涌泉穴）上，用纱布扎紧，晚贴晨除之。

〔功 效〕 温补降热。

〔验 证〕 效果很好，多 1 夜而愈。

〔备 注〕 引自《绵阳地区老中医经验选编》（2）。

5. 抽薪散治流涎症

〔方 剂〕 吴茱萸子 3 份，天南星 1 份。

〔制用法〕 上药共研细末，贮瓶备用。用时取药粉 15 克，用陈米醋调成粘厚糊状饼，敷贴涌泉穴（男左女右），外用纱布扎紧，每次敷贴 12 小时，一般 3 或 4 次即可。

〔功 效〕 散寒化痰，导热下降。

〔验 证〕 治疗 100 多例，均获痊愈。

〔备 注〕 引自 1988 年《医学文选》（1）中祖传秘方验方集。

三十四、小儿痱子

由于小儿皮肤比较敏感，新陈代谢旺盛，汗腺分泌旺盛，如汗液排泄受阻，停于皮肤并刺激产生红色丘疹，严重者可导致小儿全身发病。

1. 藿香正气水治小儿痱子

〔方 剂〕 十滴水或藿香正气水。

〔制用法〕 先用温水洗干净患处，擦干水后，将十滴水或藿香正气水轻轻反复涂搽患处。每日 1~2 次。

〔验 证〕 用上药治疗小儿痱子患儿，一般 1~2 天内即可痊愈。治愈率高达 97% 以上。

2. 败酱草等治小儿痱子

〔方 剂〕 败酱草、生大黄、苦参各 20 克，川黄连、薄荷、雄黄各 10 克。

〔制用法〕 将上药浸于 75% 酒精 350ml 中，浸泡 1 周后弃渣留液，密闭备

用。用时，取消毒棉蘸药汁涂搽患处，每日3~4次。

〔验 证〕 用本方治疗小儿痱子90例，一般用药2~4次均可治愈。

〔备 注〕 用本药涂搽颜面时，须防止药液流入眼内。用药后半瓶盖盖紧为宜。

3. 地龙茶叶治小儿痱子

〔方 剂〕 鲜地龙50克，鲜茶叶20克，冰片5克，75%乙醇300ml。

〔制用法〕 先将鲜地龙用清水洗干净后置于乙醇中，再加入其它二药。浸泡1周后，过滤装瓶备用。用时，将少许药液倒入洗净的手心搽患处，或用消毒棉签沾药汁搽患处均可。每日2~3次。

〔验 证〕 用本方治疗小儿痱子150例，均在用药2~4次内获得治愈。

三十五、重症小儿营养不良

本病是小儿严重的蛋白质和热量供给不足所导致的营养缺乏症，食物来源不足、食物质量差或吸收障碍均可导致本病的发生。

1. 炒白术茯苓治小儿营养不良

〔方 剂〕 爵床15~30克，炒白术、茯苓、炒鸡卧蛋各9克。

〔制用法〕 将上药混合研成细粉，再加绒毛粉10.5克，分成21~30包。用时，每次1包，每日3~4次，开水冲服。用药前必须首先治疗并发症。用药期间，要根据患儿饮食习惯选加米粉、豆粉、鱼、鸡蛋等食物。

〔验 证〕 用上药治疗重症小儿营养不良患者45例，其中44例均有体重迅速增加，食欲改善，精神好转等显著疗效。

2. 党参黄参等治重症小儿营养不良

〔方 剂〕 党参、生黄芪、黄精、淮山药、山楂、白扁豆、神曲各20~30克，鸡内金、炒白术、茯苓、槟榔、陈皮、使君子、枳壳、香附、广木香、生甘草各6~8克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装入干净瓶内密闭备用。用时，1~2岁每次服2克；3~4岁每次服3克；5~6岁每次服4克；7~10岁每次服5克；11~14岁每次服6克。分早、晚2次口服。10天为1个疗程。可连续服药2~3个疗程，直至痊愈止。

〔验 证〕 用本方治疗重症小儿营养不良患者36例，其中，用药1个疗程

治愈者 11 例；2 个疗程治愈者 13 例；3 个疗程治愈者 12 例。
一般服药 5~10 天即可收效。治程中未见不良反应。

三十六、小儿脾虚

本病多由外感时邪，内伤乳食，或素体虚弱导致的以小儿泄泻为主症的一种临床症候。

1. 党参茯苓等治小儿脾虚

【方 剂】 党参、茯苓、炒扁豆、淮山药、薏苡仁、莲子肉（去心）、芡实各 30 克。

【制用法】 将上药共研成粉末，过筛。根据患儿年龄大小，分成 7~15 份。每天 1 份，加大米同煮成粥，调入少许食盐，当饭吃，或加面粉煮成糊状，配食糖适量代早餐用均可。

【验 证】 用上药治疗小儿脾虚、慢性泄泻、体虚气弱症患儿，一般服本方 1~2 剂即可获痊愈。

2. 鸡内金等治小儿脾虚

【方 剂】 鸡内金、神曲、槟榔、炒谷芽、炒麦芽、山楂、炒莲肉各 100 克，使君子 60 克。

【制用法】 将上药共研为极细末，过 120 目筛后装入瓶内备用。用时，每日服 6~8 克，分 3~4 次口服。1 周为 1 个疗程。

【验 证】 用本方治疗小儿脾虚患者 132 例，经用药 1~2 个疗程后，均获治愈。

3. 草决明炒扁豆等治小儿脾虚

【方 剂】 草决明、炒扁豆、煨肉豆蔻、炒麦芽、炒莲肉、鸡内金、党参、生黄芪、茯苓、神曲、使君子、山楂、黄精各 50 克。

【制用法】 将上药共研为极细末，装入瓶内备用。用时，取药末 2~3 克，加入去蛋清的鸡蛋中，以面包裹之煨熟，1~3 岁食蛋每天 1 个，4~7 岁每天 2 个。20 天为 1 个疗程。

【验 证】 用本方治疗小儿脾虚患者 65 例，经用药 1 个疗程治愈者 27 例；2 个疗程治愈者 28 例；3 个疗程治愈者 10 例。一般服药 10~15 天即可收到明显效果。

三十七、婴幼儿绿便

本病多由婴幼儿受凉后，进食过多导致的消化不良，每日大便可达 10 次，一般表示中毒性消化不良，临床验方主要如下：

1. 黄连龙胆粉治幼儿绿便

〔方 剂〕 川黄连、龙胆草各 15 克，车前子、党参、白术、茯苓、神曲、半夏、白芍各 10 克，甘草 6 克。

〔制用法〕 将上药共碾为细面，装瓶备用。用时，1 岁以上，每次服 0.5~1 克；1~3 岁，每次服 1.5~2 克。每日 3 次，开水调服。

〔验 证〕 笔者自制上药治疗婴儿绿便患儿 40 余例，疗效均为满意。

2. 知母黄柏粉治幼儿绿便

〔方 剂〕 败酱草、知母、川黄柏各 10 克。怀山药、法半夏、陈皮、茯苓、鸡内金、白术各 8 克，连翘、川朴、焦槟榔各 6 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，过 120 目筛后备用。用时，婴儿每次服 0.5~1 克，幼儿每次服 1~2 克。每日 3 次。温开水送服。

〔验 证〕 用本方治疗婴幼儿绿便患者 18 例，经用药 5~10 天后，均获治愈。

3. 淮山药扁豆等治小儿绿便

〔方 剂〕 淮山药、白扁豆、槟榔、山楂、鸡内金各 15 克，党参、生黄芪、黄精各 20 克，乌梅、白术、神曲、川厚朴、灯芯草各 10 克。

〔制用法〕 将上药研为细面后，过 100 目筛，装入干净瓶内密封备用。用时，每次服 2~3 克，每日 3~4 次。愈后宜再服 6~8 次，以巩固疗效。

〔验 证〕 用本方治疗婴幼儿绿便患者 42 例，经用药 8~10 天后，其中，治愈者 40 例；显效者 2 例。一般服药 2~3 天即可收效。

三十八、儿童便秘

本病多由小儿素体虚弱，乳食内伤，导致燥热内结、气虚传送无力，而使小儿大便干结，排便间隔延长的症状。

1. 蒲公英治小儿便秘

〔方 剂〕 蒲公英 30~60 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，浓缩至 50~80ml，每日 1 剂顿服。年龄小、服药困难者，可分 2~3 次服。药煎好后，可加适量白糖或蜂蜜调味。疗程视病情而定。

〔验 证〕 用本方治疗儿童便秘患者 88 例，均获治愈。其中，服药 2 剂治愈者 35 例；3 剂治愈者 21 例；5 剂治愈者 22 例；6 剂治愈者 10 例。治程中未见不良反应发生。

2. 金银花野菊花等治小儿便秘

〔方 剂〕 金银花、野菊花、鱼腥草各 15 克，生甘草 8 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，分 3~4 次口服，直至痊愈止。

〔验 证〕 用本方治疗儿童便秘患者 56 例，均在服药后 12~24 小时顺利排出软便。

3. 忍冬藤等治小儿便秘

〔方 剂〕 忍冬藤、生大黄各 8 克，甘草 6 克。

〔制用法〕 将上药加冷水 150ml，煎 100ml。1 次喂服 50ml。若未见排便，再服另 50ml。

〔验 证〕 用本方治疗儿童便秘患者 37 例，其中，服药 1 次排出软便者 19 例；服药 2 次出软便者 18 例。治程中未见不良反应发生。

三十九、小儿尿频症

小儿受炎症刺激导致排尿次数增多称尿频症。

1. 生木瓜治小儿尿频症

〔方 剂〕 生木瓜（大者 1 枚）。

〔制用法〕 将上药切片，泡酒 1 周。用时，每次用药 9 克，水煎，每日 1 剂，煎服 2 次。

〔验 证〕 用本方治疗小儿尿频症患者，一般情况，5 剂即愈，多者 7 剂则愈。笔者经治 9 例，治愈 7 例，显效 2 例。

2. 茅根生地等治小儿尿频症

〔方 剂〕 鲜白茅根 30 克，生地 10 克，木通 6 克，生甘草、竹叶各 3 克。

〔制用法〕 将上药加入适当清水浸渍半小时，煮沸后再煎 20 分钟，每日 1

剂，2次分服或代茶频饮。

[验 证] 用上药治疗小儿白天尿频患儿 55 例，其中痊愈者 53 例，无效者 2 例。一般服 5~10 剂即可。

3. 党参黄芪等治小儿尿频症

[方 剂] 党参、黄芪各 12 克，台乌药、怀山药、益智仁、金樱子各 10 克，白术、生地黄、陈皮各 8 克，柴胡、升麻、生甘草各 5 克。

[制用法] 将上药水煎 3 次后合并药液，浓缩成 150ml，分 2~4 次温服，每日 1 剂。5 剂为 1 个疗程。

[验 证] 用本方治疗小儿尿频症患者 163 例，其中治愈者 161 例，显效者 2 例。治愈的 161 例中，服药 2~4 剂治愈者 53 例；5~8 剂治愈者 47 例；9~12 剂治愈者 31 例；13~15 剂治愈者 30 例。

四十、小儿化脓性扁桃体炎

本病多由细菌侵入扁桃体所引起的急性扁桃体炎症，以一侧或双侧扁桃体红肿、疼痛、发热，吞咽困难为主要特征。中医称本病“乳蛾”或“喉蛾”。

1. 藿香元参汤治小儿化脓性扁桃体炎

[方 剂] 肝黛（包）3 克，鱼腥草 15 克，藿香、元参、寒水石、连翘各 9 克，合并急性颌下淋巴结炎加乳香 6 克。

[制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

[验 证] 用上药治疗小儿化脓性扁桃体炎患儿 102 例，服药 3 天后，其中治愈 92 例，好转 4 例，无效 6 例。

2. 生石膏玄参治小儿化脓性扁桃体炎

[方 剂] 生石膏 25 克（先煎），玄参、板蓝根各 10 克，射干、生甘草各 6 克。

[制用法] 将上药水煎 3 次后合并药液，分 3~4 次口服，每日 1 剂。

[验 证] 用本方治疗小儿化脓性扁桃体炎患儿 180 例，经用药 3~6 天后，其中，治愈者 176 例；显效者 3 例；无效者 1 例。

四十一、小儿黄水疮

1. 鲜大桉叶治小儿黄水疮

〔方 剂〕 鲜大桉叶 300 克。

〔制用法〕 将上药洗净阴干，加水 1 500ml，煎至药液 750ml，过滤澄清即可。外敷时，将患部洗净后，以药棉蘸药液，湿敷患处。每日 3~4 次。内服：每日服药液 2~3 次，每次 1 茶匙。

〔验 证〕 用上药治疗黄水疮患者 25 例，其中痊愈 21 例，好转 4 例。一般用药治疗 3~7 天即获痊愈。

2. 苦参等治小儿黄水疮

〔方 剂〕 苦参、川黄连、黄芩、川黄柏各 6 克，泽泻、山栀子、丹皮、甘草各 5 克。

〔制用法〕 将上药水煎的头次分早、晚 2 次口服，2 煎药汁每天外洗患部 2~3 次。

〔验 证〕 用本方治疗小儿黄水疮患儿 45 例，经用药 2~5 天后，均获治愈。

3. 苦参大黄等治小儿黄水疮

〔方 剂〕 蒲公英、苦参各 30 克，生大黄、金银花各 25 克，川黄柏、百部各 20 克，防风 15 克，花椒 12 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分 3~5 次外洗患处。每日 1 剂。患处若有粘稠渗出液或结痂时，宜先用温热淡盐水清洗之后再用本方。

〔验 证〕 用本方治疗小儿黄水疮患者 99 例，经用药 2~3 天痊愈者 35 例，4~5 天治愈者 30 例，6~7 天治愈者 34 例。

四十二、小儿肝炎

本病可由不同类型肝炎病毒所致，病原主要侵犯肝脏引起病变，临床表现为急性、慢性、黄疸型或无黄疸型肝炎等不同类型。

1. 郁金等治小儿肝炎

〔方 剂〕 郁金 75 克，甘草、茵陈各 15 克。

〔制用法〕 将上药研成细末，炼蜜为丸，每丸重 1.5 克。1 岁以内每日 1 丸，2 岁 2 丸，3 岁 3 丸；4~5 岁 4 丸，6~9 岁 6 丸，9~12 岁 9 丸，分 2~3 次服。

〔验证〕 用上药治疗小儿急性传染性肝炎患儿 30 例，均于 1 周内黄疸消失，诸症消退，平均 23 天肝脏恢复正常大小，1 个月肝功能恢复正常。

2. 茵陈等治小儿肝炎

〔方 剂〕 茵陈、板蓝根各 20 克，茯苓、怀山药、柴胡、白术各 10 克，神曲 6 克，生甘草 5 克，大枣 3 枚。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分 2~3 次口服，每日 1 剂。10 天为 1 个疗程。

〔验 症〕 用本方治疗小儿黄疸型肝炎患者 130 例，其中治愈者 123 例，显效者 4 例，有效者 2 例，无效者 1 例。

3. 绵茵陈板兰根等治小儿肝炎

〔方 剂〕 绵茵陈 30 克，板蓝根、蒲公英、生山栀、虚杖、垂盆草各 10 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分 4~5 次口服，每日 1 剂。20 日为 1 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗急性传染性肝炎患者 273 例，其中痊愈者 270 例，好转者 3 例。退黄最快者 4 天，最慢者 10 天，平均退黄 6.1 天，肝肿大恢复正常 10~18 天；肝功能恢复正常 25~30 天。

4. 马兰车前草等治小儿肝炎

〔方 剂〕 马兰、车前草各 1 000 克，茵陈 500 克。

〔制用法〕 上药干品减半。加水适量，煮沸后温水煎 2 小时，过滤浓缩至 1 000ml，装瓶煮沸消毒备用。每次用量：2~5 岁 15ml，6~10 岁 20ml，11~14 岁 30ml。每日 3 次。服至黄疸消退、肝功能恢复正常、肝脾缩回为止。

〔验 证〕 用上药治疗儿童急性黄疸型肝炎患儿 53 例，一般服药 3~5 天后患儿食欲增加，平均治愈时间为 31.4 天。对呕吐、厌油、食欲不振等消化道症状的消失和黄疸的消退，比单纯高糖、维生素等保肝治疗为优。

四十三、小儿细菌性痢疾

本病是小儿常见的肠道传染病。是由痢疾杆菌引起的以发热、腹痛、里急后重及粘液脓血便为主要症状的疾病。

1. 秦皮等治小儿细菌性痢疾

〔方 剂〕 秦皮、仙鹤草、地榆、三棵针、老鹳草各 15 克，木香 6 克。

〔制用法〕 以上药为 1 剂量。每剂浓煎成 30ml，每次服 10~15ml，每日 3 次。

〔验 证〕 用上药治疗小儿急性细菌性痢疾患儿 51 例（患儿 2 例，幼儿 8 例，学龄前儿童 13 例、学龄儿童 28 例）坚持服药的 44 例全部治愈。另 7 例于用药 3 日后因故加用或换用 TMP 治疗，亦均痊愈出院。

2. 白头翁等治小儿细菌性痢疾

〔方 剂〕 白头翁、败酱草、秦皮、川黄连各 6 克，赤芍 5 克，生甘草 4 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装瓶密闭备用。用时，每次口服 2 克，以红糖水送服。

〔验 证〕 用本方治疗小儿细菌性痢疾患者 109 例，经用药 2~5 天后，其中，治愈者 107 例；显效者 2 例。总有效率为 100%。

3. 白蔹等治小儿细菌性痢疾

〔方 剂〕 白蔹、地锦草、草连、黄芩、广木香、葛根各 10 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，装入胶囊内，每粒装药末 0.3 克，每服 3~4 粒，每日 2~3 次。

〔验 证〕 用本方治疗小儿细菌性痢疾患儿 122 例，经用药 3~6 天后，均获治愈。

四十四、小儿麻痹后遗症

本病是由于脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病后遗症。一年四季均可发病，这种病常可致残，甚至危及生命。

1. 猴骨等治小儿麻痹后遗症

〔方 剂〕 猴骨、前胡各 6 克，桂枝、甘草各 3 克，木通、过山虎各 12 克，木瓜、松节各 10 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

〔疗 效〕 用上药治疗小儿麻痹症瘫痪期患儿 29 例，其中男性 18 例，女性 11 例，年龄最大者 7 岁，最小者 7 个月，均在发病后 3 个月内服药，一般疗程为 10~30 天，大多数在 10 天左右即可见效。经复查全部治愈。

2. 生黄芪等治小儿麻痹后遗症

〔方 剂〕 生黄芪 30 克，党参 20 克，全当归、路路通、淫羊藿、巴戟肉、杜仲、川续断各 15 克，炙甘草 6 克。

〔加 减〕 若四肢冷者，加土鳖虫、血蝎、全虫各 5 克；若畸型者，加红花、桃仁、骨碎补各 10 克；若肌萎缩重者，加鸡血藤、漏芦各 20 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分 2~3 次温服，每日 1 剂。20 天为 1 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗小儿麻痹症后期肢体瘫痪患者 85 例，其中，基本治愈者 60 例；显效者 9 例，有效者 3 例；无效者 3 例。治愈的 60 例中，1 个疗程治愈者 15 例，2 个疗程治愈者 20 例，3 个疗程治愈者 18 例，4 个疗程治愈者 7 例。

3. 通络起痿膏治小儿麻痹后遗症

〔方 剂〕 三七、五倍子、血竭、乳香、没药、水蛭、蜈蚣、地鳖虫、雄黄、马钱子、冰片、川芎各等份。

〔制用法〕 上药共研细末，用蜂蜜调匀成软膏状，备用。将药膏贴于纱布上，外面加上一层油纸（或塑料布），贴敷患处，或直接将药膏涂于患处。然后用绷带包扎好（但不可太紧）。一般可涂敷整个上、下肢或上、下肢关节处。

〔功 效〕 通经活血。

〔验 证〕 治疗 76 例，痊愈 48 例，显效 18 例，有效 10 例，总有效率达 100%。

〔备 注〕 引自 1988 年《儿科学术会议论文资料汇编》。

4. 马乌起痿膏小儿麻痹后遗症

〔方 剂〕 马钱子、川乌、草乌、当归、红花、桃仁、黄芪、穿山甲、地鳖虫各等份。上肢加桂枝、生姜黄，下肢加牛膝、木瓜。

〔制用法〕 上药共研细末，入蜂蜜调匀成软膏状，备用。用时取药膏适量，平摊于纱布上，贴敷患肢关节部和循经取穴上（一般各取2或3个穴位），外用纱布包扎固定。并常用热水袋置药上热熨之。每日换药1次。

〔功 效〕 温经散寒，活血通络。

〔验 证〕 治疗50例，痊愈25例，显效10例，有效10例，无效5例，总有效率为90%。

〔备 注〕 笔者经验方。注意患部保暖，加强功能锻炼。

四十五、小儿肌性斜颈

本病是由于颈部肌肉先天性发育不良而导致的斜颈，其中以胸锁乳突肌病变居多。

1. 外敷正颈散治小儿肌性斜颈

〔方 剂〕 大黄、木香、桃仁、红花、栀子、玄明粉各等份。

〔制用法〕 上药共研细末，装瓶备用。用时每次取药粉30~50克，以酸醋适量调匀，敷于患处，用纱布、绷带包扎即可。一般2~3天换药1次。若敷后药粉干燥松散，可再加适量醋调拌继续使用。也可待小儿睡眠时外敷，醒后取下。

〔功 效〕 清热解毒，活血化瘀，软坚散结。

〔验 证〕 治疗7例，均获痊愈。随访1~3年均无复发。治疗时间最短1周，最长1个月。

〔备 注〕 引自1989年《广西中医药》(3)。

2. 牵筋散治小儿肌性斜颈

〔方 剂〕 桃仁、红花、血竭、芒硝、郁金各等份。

〔制用法〕 上药共研细末，贮瓶备用。视肿块大小，剪一比肿块稍大的纱布块，先涂上调和剂，后撒上药粉，敷贴于肿块上，外用胶布固定，隔日换药1次。敷后患儿均无不良反应。

〔功 效〕 活血化瘀，软坚散结。

[验证] 治疗 51 例，除 1 例中止治疗外，余 50 例全部治愈。外敷次数最多为 27 次。

[备注] 引自 1986 年《湖北中医杂志》(2)。

3. 归芍煎治小儿肌性斜颈

[方剂] 当归、赤芍、红花、泽兰、威灵仙各 10 克，透骨草、伸筋草、香樟木、五加皮各 15 克。

[制用法] 上药加水煎取浓汁，备用。上药汁趁温，用毛巾浸渍，在患部作湿热敷，每日 1 或 2 次。注意不要烫伤，并配合按揉硬结块处。

[功效] 祛风除湿，活血化瘀，消肿散结。

[验证] 屡用皆效。

[备注] 引自《外治汇要》。

四十六、骨髓炎

本病是一种毒气深沉，附着于骨的深部脓疡，即化脓性骨髓炎。多因病后余毒血行感染或外伤骨骼、感染邪毒所成。临床以局部肿疡、附筋着骨，推之不移，疼痛彻骨，溃后脓水淋漓，不易敛口，可成窦道为特点，多发于 10 岁以下男孩。

1. 萍鳅膏治疗骨髓炎

[方剂] 鲜萍全草 30 克、活泥鳅 2 条。

[制用法] 泥鳅用水养 24 小时，保留体表粘滑物质，洗后再用冷开水浸洗 1 次。将鲜萍、泥鳅一起捣烂敷患处，每天 1 次，2 周为 1 个疗程。

[疗效] 共治骨髓炎 56 例，痊愈 51 例（症状消失，疮口愈合），无效 5 例。痊愈病例，疮口愈合最早 12 天，最长 43 天，一般 23~32 天。多数患者经 5~9 天治疗，创口很快缩小，肿胀疼痛消失。其中有死骨 11 例，2 例手术取出死骨，9 例换药时取出死骨。

[验证] 骆××，男，29 岁，1983 年 9 月 6 日诊。左拇指脓疡切开排脓后一直不愈，已 27 天。X 线摄片示左拇指末节急性骨髓炎。用青、链霉素治疗 1 周无效，遂来求诊。用上方治疗 2 个疗程，疮口愈合。随访 3 个月，X 线摄片复查正常，6 个月后能参加工作。

2. 麝香散

〔方 剂〕 麝香、牛黄各 6 克，僵蚕 30 克，蜈蚣 3 条，血竭、冰片、朱砂各 6 克。

〔制用法〕 上药研极细末和匀，贮瓶备用。用时取药粉少许外敷伤口及死骨上。

〔功 效〕 腐蚀死骨。

〔验 证〕 屡用有效。

〔备 注〕 引自《奇难杂症》。

3. 红蓝药捻治骨髓炎

〔方 剂〕 白砒、明矾各 30 克，雄黄 10 克，乳香、朱砂、冰片各 6 克。

〔制用法〕 将砒矾二药研成细末，入小罐内煅至青烟尽，白烟起时，停火放地一宿，取出研末加朱砂、雄黄、乳香、冰片共研细末，米糊为条。用时取药条塞入窦道，痿管。

〔功 效〕 活血化瘀，解毒止痛，腐蚀痿管。

〔验 证〕 临床屡用，疗效显著。

〔备 注〕 引自《奇难杂症》。

第三篇 妇科常见疾病防治秘方

一、流 产

怀孕后由于体质虚弱或受跌扑外伤，导致阴道出血，量不甚多，严重时可见腹痛腰酸，小腹坠胀，即为流产征兆。中医称之为胎漏、胎动不安。而堕胎或流产在3次以上者称为习惯性流产，中医称滑胎。是肾虚或两次怀孕间隔过短，元气未恢复的缘故。

1. 玉米嫩衣治习惯性流产

[方 剂] 玉米嫩衣（即紧贴米粒之嫩皮）。

[制用法] 怀孕后每天以1个玉米嫩衣煎汤。代茶饮，饮到上次流产期则用量加倍，一直服至分娩为止。

[功 效] 固摄安胎。

[验 证] 据《家庭医生》杂志介绍效果理想。

2. 母鸡黄米粥治习惯性流产

[方 剂] 老母鸡（4年以上）1只，红壳小黄米250克。

[制用法] 将鸡宰杀去毛及内脏，煮汤，用鸡汤煮粥。可连续服用。

[功 效] 益气养血，安胎定志。用治习惯性流产。

[验 证] 据《续名医类案》介绍：“龚子才治一妇，每怀孕至三月必坠，不肯服药，以此方数服胎固，至足月而生男。”

3. 安奠二天汤加味治疗习惯性流产

[方 剂] 党参6~20克，熟地15~20克，白术10~20克，山药、枸杞子各10~12克，炒杜仲10~15克，炙甘草6克，山萸肉10克，扁豆、阿胶各15克。

[加 减] 气血两虚型加当归、桑椹各12克，砂仁5克；脾肾亏损型加川断12~15克，巴戟10克，陈皮6克；血热伤胎型去党参、白术，加白茅根12克，紫草、马尾连各10克；跌仆伤胎型出血

多者加侧柏炭、椿根白皮各 10 克，腹痛甚者加益母草 6 克，腰痛甚者加菟丝子 15 克，肉苁蓉 10 克。

〔制用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔疗效〕 笔者近 10 年来用《傅青主女科》的安奠二天汤加味治疗习惯性流产 37 例，疗效甚佳。其中 34 例有效（症状消失，继续妊娠至分娩）、3 例无效（症状减轻或未能控制，仍流产者）。治疗时间 20~39 天，平均 29.5 天。

〔验证〕 佟××，女，37 岁，工人，1974 年 4 月 11 日初诊。主诉闭经 82 天，近 5 天来阴道少量流血；结婚 12 年，曾流产 5 次，每次皆因劳累诱发，时间均在 3 个月以内；本次孕后，曾服维生素 E 及肌注黄体酮，及补肾安胎中药，效果不佳。诊见患者面色萎黄，肢倦乏力，心慌气短，食欲欠佳，舌质淡、苔薄白，脉细弱。辨证属气血两虚，脾肾不足，治宜补气养血，健脾益肾为主。用主方加当归、巴戟天，服 6 剂药后阴道流血停止，少腹坠痛与腰部酸胀明显减轻。效不更方，续进 15 剂，诸症皆除。为巩固疗效，再服 6 剂，患者于 1975 年 6 月 4 日来函相告，足月顺产一男婴，十分可爱。

4. 固肾保孕汤治疗先兆流产

〔方剂〕 炙黄芪 30 克，潞党参 15 克，熟地 30 克，山萸肉 30 克，怀山药 30 克，桑寄生 30 克，杜仲 15 克，川续断 20 克，菟丝子 15 克，炒白术 10 克，当归 10 克，川芎 6 克，升麻 6 克，济阿胶（烔冲）10 克，荆芥炭 6 克。

〔制用法〕 每日 1 剂，水煎 3 次分 3 次服。5 剂为 1 疗程。

〔功效〕 益气养血，固肾保孕。

〔验证〕 于某某，女，26 岁，农民。婚后 1 年，经停 2 月余，尿妊娠试验阳性，诊为怀孕。昨天下午突然阴道有少量出血，色鲜红，并有腰酸坠感，今日上午亦有少量出血，有增多之势，妇检宫颈未开，宫体增大与妊娠月份相符合。脉舌无明显变化。无发热，大小便正常。诊为先兆流产。证属冲任不调，胎元不固。方用固肾保孕汤：炙黄芪、熟地、山萸肉、怀山药、桑寄生各 30 克，潞党参、杜仲、菟丝子各 15 克，川续断 20 克，炒白术，当归、济阿胶（烔冲）各 10 克，川芎、升麻、荆芥炭各 6 克。并嘱绝对卧床休息。药后 2 剂，出血停止，腰酸亦除，又

投3剂以善后。后知足月顺产一女婴，发育正常。

5. 摄护胎元饮治疗习惯性流产

[方 剂] 潞党参 10 克，炙黄芪 10 克，炒白术 10 克，炙甘草 10 克，陈皮 6 克，当归 15 克，杭白芍 10 克，熟地 30 克，续断 10 克，杜仲 10 克，桑寄生 10 克，生龙牡 15 克（先煎），破故纸 10 克，砂仁 6 克（后下），怀山药 30 克，济阿胶 10 克（烊冲），菟蔚子 10 克，醋香附 10 克，陈艾叶 10 克。

[制用法] 每日 1 剂，水煎 3 次分 3 次服，每经临前服至经净止。6 个月为 1 个疗程。若已孕需继续连服 3 个月，隔日 1 剂，45 剂为 1 疗程。或制丸服。

[功 效] 补肾固冲，养血益气。

[验 证] 赵×，女，30 岁，工人。婚后 5 年，4 年间连续自然流产 3 次，此次流产于 3 月前，至今月经未潮。夫妇双方曾经某医院生殖系统有关检查，均无异常。面色淡白，形体不丰，腹部无明显包块，腰微酸重，少量白带清稀时而少寐多梦，乏力食少，冬天尤畏寒冷，两手发凉，易患冻疮。每次流产均在妊娠 12 周左右，平素月经周期尚准，唯色淡量略少，二便如常。腹部 B 超检查无异常发现，血、尿常规化验亦正常。脉细涩，苔少舌绛。诊为习惯性流产。证属脾肾气虚，冲任不固。方用摄护胎元饮：潞党参、炙黄芪、炒白术、炙甘草、杭白芍、续断、杜仲、桑寄生、破故纸、济阿胶（烊冲）、菟蔚子、制香附、陈艾叶各 10 克，陈皮、砂仁（后下）各 6 克，当归、（先煎）各 15 克，熟地、怀山药各 30 克。药服 10 剂后，经水已止。再以原方于每月经前 1~2 天起，每日 1 剂服至经净止。4 个月后已孕，又服前方 3 个月，隔日 1 剂。前后共服本方 80 余剂，翌年顺生一男婴。

6. 专保小产膏保胎

[方 剂] 生地 256 克，当归、炒黄芩、益母草各 32 克，白术，川续断各 18 克，酒芍，黄芪各 15 克，甘草 10 克。

[制用法] 上药用麻油 1 000 克熬枯，去渣，下白蜡 32 克、黄丹 448 克收膏，入煨龙骨 32 克（研末）搅匀。摊膏备用。以绢摊贴。贴丹田，14 日 1 换。将产时 1 日 1 换。

[验 证] 屡用有效。

〔备 注〕 引自《理渝骈文》

7. 安胎膏治习惯性流产

〔方 剂〕 当归、茯苓（酒炒）、益母草各 50 克，生地黄 400 克，白术、续断各 30 克，甘草 15 克，白芍（酒炒）、黄芪、肉苁蓉各 25 克。

〔制用法〕 上药用麻油 1 000 克浸 7 日熬成膏（炸枯去渣），加白蜡 50 克，再熬三、四沸，加黄丹 250 克，再熬，再加飞过龙骨 50 克搅匀，以绢摊如碗口大，备用。贴丹田上 14 日 1 换，贴过 8 个月为妙。

〔功 效〕 屡用有效。

〔备 注〕 引自《中国青药学》。

二、催生引产

临产时，因交骨不开，或身体虚弱，气血不足等而致难产，即用药物助之以催生。

1. 糯米稻草汤临产催生

〔方 剂〕 糯米 100 克，禾秆（稻草）300 克。

〔制用法〕 将糯米淘洗，禾秆洗净，切段，用水五碗，煮成一碗后服。如放鸡煮效果更好。

〔功 效〕 补中、益气。用治妇女临产用力过早，无力努下，3~4 日生不出者。

〔验 证〕 据《新中医》杂志介绍效果很好，值得推广。

2. 猪肉汤催生保胎

〔方 剂〕 鲜猪肉 1 公斤。

〔制用法〕 将肉切大块，急火煎汤，去浮油。令产妇尽量饮用。

〔功 效〕 补肾益气，催生保胎。用治胎涩不下。

〔验 证〕 据《潜斋医案》载：一妇分娩，胞水早破，胎涩不下，遂用此方即生产，母子皆安。

3. 醋熏治产妇血晕

〔方 剂〕 好陈醋 100 克。

〔制用法〕 醋放碗内，净石一块烧红，放在醋碗内。以所淬的热气熏产妇

鼻孔2~3分钟，即愈。

〔功效〕 解毒，散瘀。用治产妇血晕痉挛。

〔验证〕 据《河北省中医中药集锦》介绍，阎某之妻，30岁，产后血晕，不省人事，口凉气冷，抽搐，用本法治愈。

4. 大麻子催产方

〔方剂〕 大麻子30克。

〔制用法〕 将大麻子剥去皮，捣碎成泥状，备用。敷白布上，贴产妇脚心处（涌泉穴）。

〔功效〕 泻下通滞，出有形之滞物。

〔验证〕 经观察催产，引产共8例，其中因继发性子宫乏力催产者共5例，高血压、子痫前期、子痫催产、引产者2例，胎盘前置、产后大出血催产者1例，结果收到满意疗效。一般在贴敷后10~30分钟均可引起规律的宫缩，3~4小时后效力减弱。

〔备注〕 引自1953年《上海中医药杂志》(7)。

5. 催产膏催产

〔方剂〕 龟板30克，川芎、当归各15克，头发灰10克，蝉蜕7个（烧灰），蛇蜕1条（烧灰），车前子末15克，葱汁、芝麻油各适量。

〔制用法〕 先将前3味药共研为细末，加入芝麻油熬煎数滚，将后3味药末和车前子末加入再煎熬15~20分钟，取出冷却，最后加入葱汁拌匀收膏，装瓶备用。用时取药膏30克摊于纱布中央，敷贴于患妇的脐孔上，外以绷带扎紧，嘱孕妇闭目静卧1小时左右。

〔功效〕 催产。

〔验证〕 屡用屡验，一般1次胎儿即可娩出。

〔备注〕 引自《外治汇要》。又用醋龟板3克，火麻仁7个，麝香0.3克。共捣烂成膏，敷贴气海穴上。效果亦佳。

6. 乌梅等催产

〔方剂〕 乌梅1粒，白胡7粒，巴豆3粒。

〔制用法〕 上药共研为细末，以白酒适量调匀成膏状，备用。用时取药膏分贴于产妇的两侧三阴交穴上，外以纱布盖上，胶布固定。产下即去除药物。

- 〔功 效〕 催产助产。
〔验 证〕 一次即效。
〔备 注〕 引自《外治汇要》。

三、产后疾患

产后过早操劳，保养不慎，感受外邪，或产后出血过多，身体虚弱；或瘀血内停等而致生种种病症，应及早治疗，免生变故，并使之早日康复如常。

1. 胎盘鳖肉治恶露不净

- 〔方 剂〕 胎盘1个，鳖肉120克。
〔制用法〕 上两物洗净，切块，先用旺火油炒片刻，加水装入钵内，用旺火蒸30分钟。食之。
〔功 效〕 补气血，破瘀滞。用治产后恶露排出不畅、不净。
〔验 证〕 据《家庭医生》杂志介绍读者来函反映效果理想。

2. 蚕豆壳治产后风

- 〔方 剂〕 蚕豆壳、黄酒各适量。
〔制用法〕 蚕豆壳炒熟，研细。每次10克，黄酒送服。
〔功 效〕 驱逐风邪。用治产后诸风。
〔验 证〕 冯××，女，32岁，患产后风，经用上方治愈。

3. 梨汁人乳治产后小便不通

- 〔方 剂〕 梨汁，人乳各1杯。
〔制用法〕 将梨切碎榨取汁同人乳共饮。早晚各1次。
〔功 效〕 清热降火，解毒利尿。
〔验 证〕 据《洄溪医案》记载：“一妇产后小便不通，诸药不应，此冲任血虚气燥，膀胱不能施化，而水也竭也，令以梨汁、人乳各一杯早晚服之，而尿渐通。”

4. 谷子汤治产后感冒发烧

- 〔方 剂〕 谷子（未去皮的小米）1握（约50克）。
〔制用法〕 将谷子炒黄，加水1碗煎至剩半碗。趁热1次服下，盖上被子出汗即愈。
〔功 效〕 祛风解表。用治产后感受风寒、发热恶寒。对一般感冒也有良效。

〔验证〕 杨××，女，30岁，产后感冒发烧，用上方烧退。

5. 山药汤治产后大喘大汗

〔方剂〕 山药180克。

〔制用法〕 洗净煎汤。连服3日，每日2次。

〔功效〕 健脾，益阴，止渴，敛汗。用治产后因虚热引起的大喘大汗，身热劳嗽。

〔验证〕 据《医学衷中参西录》介绍：“一妇产后大喘大汗，身热劳嗽，诸医用黄芪、熟地等，汗出愈多，脉弱而数，急煎生山药180克，连服3日，诸病悉愈。”

6. 鲫鱼治产后臂痛抽搐

〔方剂〕 活鲫鱼1条（以250克者为佳），黄酒200克。

〔制用法〕 将鱼切成6厘米见方之块，不去鳞、肠，不用盐，用香油炸焦。将炸鱼干吃后，再喝热黄酒，取微汗。

〔功效〕 调胃，下气。用治产后臂痛或抽搐。

〔验证〕 据《中医实用效方》介绍验例，保定市李某之妻，产后臂痛时现抽搐，久治不愈，经用本方治愈。

四、子宫脱垂

子宫脱垂，又名“阴挺”。多发于产后妇女。

多因素体气虚，加之产后损耗，或产后过早操劳过度，或房劳过度，或生育过多，耗损肾气，以致脾肾气虚，中气下陷，进入引起胞脉松弛不固所致。在过劳，剧咳，或排便用力太过等情况下，往往引起反复发作。

1. 青山羊血治子宫脱垂

〔方剂〕 青山羊血10余滴。

〔制用法〕 青山羊之耳尖消毒后取血，对入少许温开水。一次服，每日1次。

〔功效〕 补中益气。用治子宫脱垂。

〔验证〕 据《食物疗法精萃》介绍：山西省某女，患本病两年余，有时一日脱出十余次，不能参加劳动，经服用此方2日痊愈，随访6个月未见复发。

2. 外用茄根粉治子宫脱垂

〔方剂〕 茄根适量。

〔制用法〕 茄根烧灰存性为末。油调茄根末在纸上，捲筒安入内，每日 1 次。

〔功效〕 治子宫脱垂（阴挺）。

〔验证〕 王××，女，28 岁，产后子宫脱垂，用上方治愈。

3. 苏茴膏治子宫脱垂

〔方 剂〕 紫苏叶、小茴香各 75 克，麻油 25 克。

〔制用法〕 将前 2 味药共研细末，过筛，用麻油拌匀备用。以消毒棉棒蘸敷患处。1 日 2 次。

〔功效〕 温肾、散寒、固脱。

〔验证〕 屡用效佳，一般 1 或 2 次即愈。

〔备注〕 引自 1960 年《浙江中医杂志》(3)。

4. 升提膏治子宫脱垂

〔方 剂〕 升麻、黄芪、柴胡、党参各 10 克，枳壳 15 克，麝香 0.3 克。

〔制用法〕 先将前 5 味药共研细末，以醋调和为膏状，备用。用时嘱患者平卧床上，取麝香 0.1 克纳入脐孔内，再用膏药敷之，外以纱布盖上，胶布固定。每 3 天换药 1 次，10 次为 1 疗程。

〔功效〕 益气疏肝，升提固脱。

〔验证〕 屡用效佳，一般 1 疗程，最多 3 疗程即可见效或痊愈。

〔备注〕 引自《外治汇要》。

五、月经不调

月经不调指月经周期提前或延后七天以上者，究其原因是气血失于调节而导致血海蓄溢失常。多由肝气郁滞或肾气虚衰所致，而以肝郁为主。主要治疗月经先后无定期的秘方、验方如下。

1. 牡丹甜糕治月经不调

〔方 剂〕 牡丹花 2 朵，鸡蛋 5 个，牛奶 250 克，白面 200 克，白糖 150 克，小苏打少许。

〔制用法〕 牡丹花洗净，将花瓣摘下切成丝。鸡蛋去壳打花，同牛奶、白糖、小苏打混拌在一起，搅匀。倒一半在开了锅的湿屉布上，摊平，上面撒匀牡丹花丝，然后再倒入余下的一半混合料，摊平，盖好盖蒸 20 分钟，取出，扣在案板上，上面再撒牡丹花丝

即成。食之。

[功效] 益气养血，清三焦虚火，调经活血止痛。用治各种虚弱、月经不调、行经腹痛。

[验证] 刘女士，35岁，月经不调日久，多方调治未效，经用上方正常。

[备注] 血虚有寒者、孕妇及月经过多者忌食。据分析，牡丹花瓣内所含的黄芪甙性平，味微苦，无毒，有调经活血之功。

2. 葵花盘止崩漏

[方剂] 葵花盘1个（去子），黄酒适量。

[制用法] 将葵花盘晒干，用砂锅焙成炭，研为细面，过筛备用。每次3克，黄酒送服，日3次。

[功效] 清热解毒，达邪外出。用治崩漏。

[验证] 据《中医实用效方》介绍，此方曾治愈数十名患者，确有特效。典型病例：胡某，女，24岁，1955年3月间患崩漏形体消瘦色黄，经服上方2剂痊愈。

[备注] 服药期间忌辛辣食物及房事，崩漏初起者忌用。

3. 辣椒根方治功血

[方剂] 辣椒根15克（鲜品加倍，以辛辣的较好），鸡爪2~4只。

[制用法] 洗净，共煎。每日服1剂，煎服2次血止后须继续服5~10剂，以巩固疗效。

[功效] 治功能失调性子宫出血。

[验证] 林某，29岁，不规则阴道出血12年。诊断为功能性子宫出血。每次均须刮宫治疗，此次阴道出血18天，在门诊用黄体酮、麦角新碱、丙酸睾丸酮等治疗无效，乃收住院。开始仍用雌激素等治疗无效。第四天用辣椒根治疗，3天后阴道出血停止。再服2剂，观察5天痊愈出院。第二个月来月经后1次性交即受孕。通过31例的治疗追访观察，一般服用2~3剂能止血，治愈病例大都能恢复月经周期，其中2例已怀孕，仅2例复发。

4. 丝瓜络炭棕榈炭治功血

[方剂] 丝瓜络炭15克，棕榈炭15克。

[制用法] 煎汤。空腹服，每日2次。

[功效] 用治功能失调性子宫出血、直肠出血、内痔出血。

[验证] 据《中医效方精选》介绍：某妇患月经不调，1个月来潮3次，时常淋漓下血，服此方3次而愈。

[备注] 丝瓜络炭、棕榈炭是丝瓜络、棕榈火化后存留的炭状物。

5. 调经膏治月经不调

[方剂] 鲜益母草200克，党参、当归、制香附、丹参、熟地、白术、五灵脂（炒）、生地各100克，陈皮、青皮、乌药、柴胡、丹皮、地骨皮、川芎、酒芍、半夏、麦冬、黄芩、杜仲、续断、延胡索，红花、川楝子、苍术各50克，没药、远志肉、炒、枳壳、吴茱萸、黄连、厚朴、茴香、木通、木香、官桂、甘草各25克，炮姜15克，雄乌鸡骨1只（毛刀破腹去毛杂或用全副骨亦可）。

[制用法] 麻油熬、黄丹收、牛胶100克蒸化搅匀。贴脐下（气海、关元穴）。

[功效] 调和气血，疏肝解郁，温经散寒，活血调经。

[验证] 屡试屡验。

[备注] 引自《中国膏药学》。

6. 养血调经膏治月经不调

[方剂] ①当归100克，川芎50克，白芍、益母草、红花、柴胡、茯神、续断、牛膝、杜仲各20克，香附、附皮、丹皮、白术各20克，熟地、甘草、蕲艾、泽兰各12.5克；②香油1500克，黄丹600克；③人参、沉香各25克，鹿茸20克，肉桂15克（共研细末）。

[制用法] 上列①组药用②组香油炸枯，去渣，加黄丹收膏，另掺入③组药料搅匀。每张药重25克，备用。贴腹部或腰部。

[功效] 温经解郁，养血调经。

[验证] 屡用皆效。

[备注] 引自《百病中医膏散疗法》。孕妇忌贴。

7. 散寒调经膏治月经不调

[方剂] 山楂、葛根、乳香、没药、穿山甲、川厚朴各100克，白芍150克，甘草、桂枝各30克，细辛挥发油，鸡血藤挥发油，冰片各适量。

[制用法] 先将山楂、葛根、白芍、甘草水煎2次，将煎液浓缩成稠状，

再加入用 95% 酒精浸泡过乳香，没药的泡浸液适量拌匀，然后煎液烘干后，再与穿山甲、川厚朴、桂枝共为细末，再加入适量的细辛挥发油，鸡血藤挥发油和冰片、充分混合研细后，过 100 目筛，贮瓶备用。用时于患者经前 3~5 天，先用温水洗净脐部，拭干，取药粉 0.2~0.25 克，气滞血瘀型者用食醋调匀，寒湿凝滞型者用姜汁或酒精调匀，然后敷于脐孔上，外用胶布固定。待经来痛止或经期第 3 天去药。

[功效] 温经散寒，活血调经。

[验证] 屡试屡验，效佳。

[备注] 引自《外治汇要》。

六、痛 经

痛经指妇女经期或行经前后，出现周期性小腹疼痛，或痛引腰骶，甚则剧痛昏厥者。本病的发生有情志所伤，起居不慎或久淫为害等不同病因，并与素体及经期，经期前后特殊的生理环境有关。

1. 活血止痛汤（丸）治痛经

[方剂] 制香附 15 克、当归 15 克、玄胡 10 克、肉桂 6 克。

[加 减] 经行不畅或量少有瘀血者加丹参 15 克。

[制用法] 月经来时或来前 1 天每天 1 剂，煎汤日 2~3 次分服。亦可研末炼蜜为丸，每粒 10 克，每服 1~2 粒，日 3 次，连服数日。

[功效] 香附理气舒肝，调经止痛；当归补血和血，调经止痛；玄胡活血理气止痛；肉桂通血脉，散寒止痛。四药合用相得益彰，有理气活血，散寒调经止痛之功。

[验证] 徐××，女，25 岁，未婚。就诊日期：1985 年 10 月 11 日。痛经已 11 年。14 岁初潮，周期 30 天左右，经期 7 天。月经第一天即腹痛，量不多，无血块，腹痛 3 天后渐减。予本方治疗，服 2 剂后经量较多，痛止。每次行经时服 4 剂，连服 3 个周期后遂愈。

[备注] 月经时忌食生冷，避免七情刺激。

2. 脐痛舒治痛经

[方剂] 山楂 100 克，葛根浸膏 10 克，甘草浸膏 5 克，白芍 150 克。

[制用法] 上药烘干研粉，再加乳香，没药浸液 170 毫升，烘干，另加入

鸡血藤挥发油 4 毫升，冰片少许拌匀即成。每取 0.2 克用醋或黄酒调成糊状，敷于脐处。月经来潮前 2 天应用，或初感痛时应用。

- [功 效] 行气活血止痛。
[验 证] 屡用效佳，多 1 次痛止。
[备 注] 引处《千家妙方·下》。

七、闭 经

闭经指女子年逾 18 周岁，月经尚未初潮，或已行经而又中断达 3 个月以上者，称为闭经。

本病的发生有虚有实。虚者精血不足，血海空虚，无血可下；实者，邪气阻隔，脉道不通，经血不得下行。

1. 团鱼治闭经

- [方 剂] 团鱼（鳖）1 只，黄酒适量。
[制用法] 将鲜活肥大的团鱼头砍下，取其血滴入碗内，对人同等量的黄酒搅匀，再用同等量的开水冲服。
[功 效] 滋阴养血。
[验 证] 《健康杂志》介绍，读者来信反映效果极佳。
[备 注] 团鱼取备后，洗净同瘦猪肉炖食，连服数只亦有同等功效。

2. 乌鸡丝瓜汤治血虚经闭

- [方 剂] 乌鸡肉 150 克，丝瓜 100 克，鸡内金 15 克。
[制用法] 共煮至烂，服时加盐少许。
[功 效] 健脾消食，养阴补血。用治因体弱血虚引起的经闭、月经量少。
[验 证] 《家庭医学杂志》介绍疗效颇佳。
[备 注] 乌鸡，又叫黑脚鸡、药鸡。归肝、肾经，是滋阴清热、补益肝肾、健脾止泻的食疗佳品。

3. 闭经疏养汤治疗功能性闭经

- [方 剂] 潞党参 30 克，炒白术 10 克，白茯苓 10 克，甘草 30 克，当归 30 克，杭白芍 30 克，川芎 6 克，熟地 30 克，漏芦 10 克，鬼箭羽 10 克，路路通 10 克，炮山甲 6 克，全蝎 2 克（研分 3 次冲

服), 蜈蚣 1 克, 土鳖虫 6 克, 水蛭 6 克, 茺蔚子 10 克, 醋香附 10 克, 茜草根 15 克。

[制用法] 隔日 1 剂, 水煎 3 次, 日分 3 次服。90 剂为 1 个疗程。亦可制丸服。

[功效] 益气养血, 通络行瘀。

[验证] 刘某某, 女, 26 岁, 农民。经停 1 年余, 经治未潮。患者从 17 岁初潮, 始至不规则, 逐渐如期而至, 但未孕。1 年前, 因感冒咳嗽, 咽痛, 鼻衄, 月经当期而未潮, 不到两月后, 经 3 次尿妊娠试验 (HCG) 均阴性, 又两月, 乃经某妇产科诊断性刮宫及子宫内膜活检, 提示卵巢可排卵, 宫腔大小形态正常。又以黄体酮、乙烯雌酚注射口服试验为阳性, 疑似丘脑下部或卵巢性闭经, 并用中西药治疗, 仍无月经来潮。现不时感腰腿酸重, 头昏, 少寐, 乏力。脉涩, 苔薄白, 舌淡红。诊为断发性闭经 (功能性)。辨证: 气血两虚, 胞宫瘀滞。方用闭经疏养汤。潞党参、甘草、当归、杭白芍、熟地各 30 克, 炒白术、白茯苓、漏芦、鬼箭羽、路路通、茺蔚子、醋香附各 10 克, 川芎、炮山甲、土鳖虫、水蛭各 6 克, 茜草根 15 克, 全蝎 2 克 (研分 3 次冲服), 蜈蚣 1 克。上方每隔日 1 剂, 连服 80 余剂, 又以本方制丸 1 剂以善后。经近 1 年的治疗, 1 年后, 月经已来潮, 并趋正常。

4. 蜣螂治闭经

[方剂] 蜣螂 1 个 (焙干), 威灵仙 10 克 (烤干)。

[制用法] 上药研极细末, 以白酒调匀为膏状, 备用。贴神阙穴上, 约 1 小时去药, 每天 1 次。

[功效] 活血通经。

[验证] 试治数例, 用药 7 天左右, 均月经得通。

[备注] 民间方。

5. 养血通经膏治闭经

[方剂] 丹参 50 克, 穿山甲 5 克。

[制用法] 上药共研细末, 以醋、酒各半调匀成膏, 备用。每取 10~15 克贴神阙穴上, 外用胶布固定, 每日换药 1 次, 5 次为 1 疗程, 以经通为度。

[功效] 养血通经。

〔验 证〕 治疗 15 例，用药 1~2 疗程后，治愈 11 例，有效 3 例，无效 1 例。

〔备 注〕 笔者经验方。

6. 化瘀膏治闭经

〔方 剂〕 大黄 128 克，芒硝 64 克，柴胡、瓜蒌根，桃仁，当归、生地、红花、穿山甲、莪术、三棱、川芎各 32 克，乳香，没药，肉桂各 22 克，川乌 10 克。

〔制用法〕 上药麻油适量熬，去渣，入黄丹收，花蕊石 32 克，血竭 15 克（另研细）搅匀，收膏备用。贴患处，妇科贴脐下。

〔功 效〕 活血化瘀。

〔验 证〕 屡用皆效。

〔备 注〕 引自《理渝骈文》。

7. 急性子治闭经

〔方 剂〕 急性子 15~30 克。

〔制用法〕 将上药水煎，分早、晚 2 次口服；或日服 3 次。每日 1 剂。此药可单独煎服，亦可配伍其他药物同时服。

〔验 证〕 用上药治疗闭经患者 230 例，均获得满意的疗效，多数患者服药 1~2 剂后，即来月经。在临床使用中，未发现副作用。本方适用于气血两虚、肝郁气滞、脾虚血虚、心肾亏损、气滞血瘀等引起的闭经及哺乳时间太长而不来月经者。

8. 冬葵子治闭经

〔方 剂〕 冬葵子 30 克，黄酒 250ml。

〔制用法〕 将上药加水 50ml，煎好后在空腹时顿服，每日 2 次。

〔验 证〕 用上方治疗妇女闭经患者，一般连服 2~3 天月经即来潮。

9. 绿豆猪肝治闭经

〔方 剂〕 绿豆 150 克，猪肝 200 克。

〔制用法〕 先将绿豆煮熟后，加入新鲜猪肝（洗净剁碎），煮沸约 5 分钟后食用。分 3 次口服，每日 1 剂，至治愈为止。

〔验 证〕 用本方治疗闭经患者 32 例，均连服 3~5 剂而月经来潮。

八、带下病

带下病是指带下量多，或色、质、气味发生异常的一种疾病。其病因以湿为主，与脾虚肾亏、湿热、湿毒、病虫等诸多因素有关。涉及现代医学之阴道炎、宫颈炎、急慢性盆腔炎或附件等疾病。

1. 荞麦粉蛋清治带下病

〔方 剂〕 荞麦粉 500 克，鸡蛋 10 个，甘草末 60 克。

〔制用法〕 将荞麦粉炒成金黄色，晾凉，鸡蛋清倒入碗内，放入甘草末搅拌，再加入荞麦粉和温水调成小丸，晒干备用。每日早晚各 1 次，每次 30 克，以开水送下。

〔功 效〕 健脾祛湿，理中止带。用治白带黄白相兼，伴小便胀满、头晕目眩、食欲不振、面色苍白、身有微热。

〔验 证〕 据《锦方实验录》介绍：易某，女，38 岁。自诉患带症已 8 年，带下黄白相兼，并觉灼热疼痛，小便腹胀，头晕目眩，手指发冷，食欲不振，面色苍白，身微热。服此方 1 剂即愈。

2. 墨鱼猪肉补虚止带

〔方 剂〕 墨鱼 2 个，瘦猪肉 250 克。

〔制用法〕 两味加食盐煮食。每日吃 1 次，连吃 5 日。

〔功 效〕 补虚损，止带下。用治妇女白带过多。

〔验 证〕 杨某，女，30 岁，白带过多已久，服药无效，身体日渐消瘦，服本方 5 日而愈。又，樊某，女，46 岁，漏症已愈，白带如涕，绵绵不绝，头昏闷，精神不振，面黄苔白，脉缓弱，服药不愈。用本法服 5 日白带减少，又服 2 剂而愈。

3. 胡椒鸡蛋止带

〔方 剂〕 胡椒 7 粒，鸡蛋 1 个。

〔制用法〕 先将胡椒炒焦，研成末。再将鸡蛋捅一小孔，把胡椒末填入蛋内，用厚纸将孔封固，置于火上煨熟。去壳吃，日 2 次。

〔功 效〕 温中散寒，化湿止带。用治寒性白带色清如水、面色苍白、口淡无味。

〔验 证〕 据《新中医》介绍，疗效颇佳。

4. 高粱根止带

〔方 剂〕 陈年（3 年以上）高粱根、红糖各适量。

〔制用法〕 将高粱根洗净，晾干，炒研为末。用红糖水（或米汤）送服。

〔功 效〕 温中散寒，化湿止带。用治白带过多、有臭味。

〔验 证〕 李××，女，34 岁，患带下日久，经服上方治愈。

5. 白扁豆止带

〔方 剂〕 白扁豆、红糖、怀山药各适量。

〔制用法〕 白扁豆用米泔水浸后去皮，同另两味共煮，至豆熟为度。每日 2 次，经常服用收效。

〔功 效〕 健脾祛湿，化带浊。

〔验 证〕 屡用屡佳。

6. 小丝瓜止带

〔方 剂〕 小丝瓜（经霜打的）三指长。

〔制用法〕 置新瓦焙焦黄，研末。每服 6 克，临睡时开水送服。

〔功 效〕 清热凉血，止带浊。用治年久不愈的赤白带下。

〔验 证〕 杨××，女，40 岁，经服上方后痊愈。

7. 荞麦粉鸡蛋止带

〔方 剂〕 荞麦粉 500 克，鸡蛋 10 个，甘草末 60 克。

〔制用法〕 将荞麦粉炒成金黄色，晾凉，鸡蛋清倒入碗内，放入甘草末搅拌，再加入荞麦粉和温水调为小丸，晒干备用。每日早晚各 1 次，每次 30 克，以开水送下。

〔功 效〕 健脾祛湿，理中止带。用治白带相兼，伴小便胀满、头晕目眩、食欲不振、面色苍白、身有微热。

〔验 证〕 经临床治疗 117 例，103 例治愈，13 例好转，1 例无效，总治愈率 99.6%。

8. 墨鱼瘦猪肉止带

〔方 剂〕 墨鱼 2 个，瘦猪肉 250 克。

〔制用法〕 两味加食盐煮食。每日吃 1 次，连吃 5 日。

〔功 效〕 补虚损，止带下。用治妇女白带过多。

〔验 证〕 据《老年报》推荐效佳。

9. 鱼鳔胶、猪前蹄止带下

〔方 剂〕 鱼鳔胶 6 克，猪前蹄 1 只。

〔制用法〕 以清水四碗，砂锅内文火炖烂。食肉饮汤。

〔功效〕 行瘀补血。用治带下。

〔验证〕 屡用效佳。

10. 向日葵梗或根荷叶治带下

〔方剂〕 向日葵梗或根 12 克，荷叶 12 克，红糖适量。

〔制用法〕 以向日葵梗或根与荷叶加水三碗煎至半碗，加红糖当引子。每日 2 次，饭前空腹服下。

〔功效〕 温中止带。用治白带过多。

〔验证〕 张××，女，24 岁，经服上方后痊愈。

九、阴 道 炎

阴道炎是妇科临床的常见病、多发病。常见的有滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎及老年性阴道炎。临床以白带的量、色、质的改变和阴痒为其特性。属中医“阴痒”、“带下”范畴。其发病多由肾气不足、下元亏损，或久病体衰、精亏血少、带脉失约、任脉不固、脾虚。中医治疗阴道炎，内服外治并重。

1. 三黄粉治阴道炎

〔方剂〕 黄连、黄芩、黄柏、紫草根各 60 克，枯矾、去水硼砂各 120 克，冰片 2 克。

〔制用法〕 先将黄连、黄芩、黄柏、紫草根烘干研粉，过 120 目筛。次将枯矾研末过筛，再将硼砂置于铁锅内烤干去水后过筛，装瓶密封备用。用时先排空小便，用窥阴器扩开阴道，以 0.1% 高锰酸钾液冲洗阴道、外阴。擦干阴道、外阴，用药匙取三黄粉 2 克，撒布阴道内，再用棉签蘸取药粉撒布在阴道口、小阴唇皱褶及大小阴唇沟。每天治疗 1 次，5~7 天为 1 疗程。

〔功效〕 治疗霉菌性、滴虫性阴道炎共 380 例。结果：属霉菌性阴道炎者 345 例，其中痊愈 276 例（阴部瘙痒症状消失，白带减少，阴道粘膜红肿消失，分泌物镜检霉菌或滴虫消失），好转 69 例（阴部瘙痒症状消失，白带减少，阴道粘膜红肿消失，分泌物镜检霉菌或滴虫少许）。属滴虫性阴道炎者 35 例，治后均痊愈。

〔验证〕 汪×，女，24 岁。主诉：白带量多，色黄和臭味，外阴及阴道瘙痒。检查：阴道及宫颈弥漫性充血。白带镜检：滴虫阳性，脓球（+++）。先用 0.1% 高锰酸钾冲洗阴道，取呋喃西林粉

0.5 克撒布阴道内，每天 1 次，连用 6 天，症状不减。停药 1 周查白带，滴虫阳性，脓球（++++）。冲洗后改用三黄粉 1 克撒布阴道内，用药 4 次，白带大减，瘙痒停止，阴道粘膜及宫颈颜色转为正常，用药 8 次后白带正常，停药 4 天，查白带无滴虫，脓球消失。

2. 六神丸外用治滴虫性阴道炎

〔方 剂〕 本丸是中成药，药店有售。

〔制用法〕 患者临卧前用洁净开水清洗外阴，上床后仰卧位，取六神丸 15 粒塞入阴道，每晚 1 次，经期停用。6 天为 1 疗程，一般在 2 个疗程内痊愈。

〔功 效〕 治阴道炎有疗效。

〔验 证〕 张××，38 岁，教师，1986 年 10 月 2 日诊。结婚 12 年，生育 2 胎，5 年前曾行女扎术。近年自觉阴道有刺痛和烧灼感，外阴瘙痒；白带频多，呈泡沫状，有腥臭味。经县医院妇产科检查诊为滴虫性阴道炎。曾用中西药物内服外洗均无效。处方：30 粒装六神丸 6 支，分次按上法治疗，连续施药 12 天，阴痒除，带下止。经 2 年随访未见复发。

3. 鬼针草洗剂治疗阴道炎

〔方 剂〕 新鲜鬼针草全草和蛇泡筋的全草各 60 克。

〔制用法〕 水煎出味，将药液倒在盆内，趁热熏后坐盆浸洗，边浸边洗净阴道分泌物。

〔疗 效〕 共治 20 例，其中霉菌性阴道炎 7 例，滴虫性阴道炎 3 例，外阴瘙痒、外阴炎 10 例，病程最长 11 年，短则 3 天，全部治愈，且无副作用。个别并宫颈糜烂 I ~ II 度，经治糜烂面亦好转或治愈。以发病早期，病程短，及时治疗则疗效好。一般经 1 次用药，瘙痒症减，用药 3 次后，瘙痒全消，10 天为 1 疗程。外阴炎疗效好，3 天即见效，而霉菌性和滴虫性阴道炎疗程较长，需 1~2 个疗程方可治愈。

〔验 证〕 傅×，女，26 岁，未婚，工人。1986 年 5 月 27 日初诊。外阴瘙痒伴豆腐渣样白带 2 年余，曾在××人民医院检出酵母菌，经治后症状暂缓解，但常反复发作，瘙痒难忍，影响工作。面色萎黄，舌淡、苔腻，脉滑。妇检：外阴发育正常，阴道口周围有白膜样分泌物覆盖，拭之不易脱落（未作双合诊），取分

泌物实验室检出酵母菌，诊为霉菌性阴道炎。中医诊为阴痒（湿热下注）。用本方治疗后，一次即瘙痒减，3次后瘙痒全消，白带减少。一周后妇检：外阴、阴道口白膜样分泌物消失，白带明显减少，瘙痒全消。共治2疗程，取白带化验未找出致病菌。追访3个月取白带复查，未找出致病菌。

【备注】 治疗期间勿使用其它药，禁房事；内裤需煮沸消毒，勤换勤晒；月经期禁止用药；已婚者夫妇同时治疗为好。

4. 祛霉子母方治疗霉菌性阴道炎

霉菌性阴道炎亦称念珠菌性阴道炎，系女性以阴道瘙痒和豆渣样白带为典型症状的一种炎症。病因，主要由于阴道内糖原及酸性增高，潜伏的白色念珠菌活跃繁殖所致。

【方剂】 母方——柴胡6克，龙胆草6克，苦参6克，黄柏6克，黄连3克，生地30克，怀山药30克，车前子10克（布包），山梔衣10克，丹皮10克，当归10克，炒苍术10克，寻骨风10克，土茯苓10克，炒苍耳子6克（布包），防风6克，木槿皮10克，白鲜皮10克，陈艾叶6克。子方——硼砂3克，冰片3克，明矾20克，乳香30克，孩儿茶30克，雄黄5克，青黛5克，炉甘石10克，木槿皮40克，白鲜皮40克。

【制用法】 母方每日1剂，水煎3次分3次服，30剂为1疗程；后每隔月连服10剂，60剂为1个疗程。子方研细粉外用，以1:500石碱水或5%碳酸氢钠溶液调药粉为稀糊状。先用1:1000新洁尔灭棉球清洗阴道后，再以带线棉球或纱布块蘸裹药糊，于晚间临睡前塞入阴道深部，翌晨去除。连用7次，隔3日再用，如此21次为1个疗程。后每隔月再如法连用7次，连续21次共半年。若本方一时未效，可代之以冰硼散装入空心胶囊，每粒含药0.2~0.3克，每次3粒如前法用之。

【功效】 清热解毒，祛风燥湿。

【验证】 茆××，女，37岁，农民。阴痒伴带下罹患1年余。始感阴部湿润不适，渐则奇痒，湿水洗浴及手搓时瘙痒愈剧；带下如豆渣或豆浆样，时有凝乳块。症重时阴道灼热，或痛如针刺，或痛胀重坠，腰骶酸痛，并尿频尿急。妇产科检查，诊为念珠菌性阴道炎，进行药物阴道冲洗、塞入药棉及制霉菌素等口服，症状可缓解一时，过后依然如故。近几个月来，常感头昏少寐

多梦，表情淡漠，月经至不如期。检查：面色晦滞，形体尚匀称，脉细涩，苔白舌淡红，大便不畅，小便短涩。孕产2胎，因节育环带之不适，后服药避孕。妇科会诊，查外阴表面有白膜状分泌物覆盖，擦之，粘膜充血、水肿、糜烂；查尿无异常，阴道分泌物悬滴法念珠菌菌丝及芽孢阳性。诊为霉菌性阴道炎。证属湿毒注阴，火热下迫。方用祛霉子母方：研末以石碱溶液调糊纳阴。母方连服30剂，子方共用21次，阴痒锐减，白带亦除，头昏、少寐好转。嘱其勿用热水烫洗及手搓，少食辛辣刺激食物，原方继投。母方先后共服90余剂，子方共用40余次，经1年左右时间的治疗，两年后追访，终于治愈，亦未复发。

5. 灭滴栓治阴道炎

〔方 剂〕 雄黄1克，生烟2克，明矾少许、鲜猪肝60克。

〔制用法〕 先将雄黄等3药开研细末，再将猪肝切成三角形，在肝上用缝衣针扎些小孔，把药粉撒在小孔内。晚上塞入阴道里，早上取出，并用高锰酸钾溶液（1/5000）冲洗阴道。

〔功 效〕 解毒、燥湿、杀虫。

〔验 证〕 一般连用4~7天即可痊愈。

〔备 注〕 引自1975年《赤脚医生杂志》（7）。

6. 治阴道滴虫验方

〔方 剂〕 黄柏15克、枯矾、雄黄各10克、轻粉、冰片各5克。

〔制用法〕 上为细末，用凡士林60克调成软膏，备用。先用鲜大青叶100克、蛇床子、地骨皮、五灵脂各50克。煎水冲洗阴道后（每天早晚各1次），再取此膏涂敷患处。每日1次。

〔功 效〕 解毒、燥湿、杀虫。

〔验 证〕 治疗10例、用药数天后，均痊愈。

〔备 注〕 引自1985年《新中医》（5）。

7. 大蒜治阴痒

〔方 剂〕 大蒜2头。

〔制用法〕 大蒜去皮，捣碎，加水熬汤。每日局部浸洗2或3次。

〔功 效〕 杀菌，消炎，止痒。用治阴痒及妇女滴虫病。

8. 猪肝马鞭草治阴痒

〔方 剂〕 猪肝60克，马鞭草30克。

〔制用法〕 将猪肝及马鞭草切成小块拌匀，用盖碗盖好，放蒸锅内蒸半小时即可食用。一次服。

〔功效〕 清热，祛湿，解毒。用治妇女阴痒、白带过多及经闭、经少。

9. 白萝卜加醋治滴虫性阴道炎

〔方剂〕 醋酸，大白萝卜。

〔制用法〕 用醋酸冲洗患处，再用白萝卜榨汁擦洗及填塞阴道。

〔功效〕 活血，解毒。用治滴虫性阴道炎。

10. 青萝卜治滴虫性阴道炎

〔方剂〕 青萝卜 1 个。

〔制用法〕 将青萝卜洗净，捣烂成泥糊，用消过毒的纱布包青萝卜泥两汤匙，做成纱布卷，卷的一端留长线。然后用手将卷送入阴道内，线留在阴道口外，以便拉线取出。在放入前须用高锰酸钾液将阴道内外的分泌物洗净，防止感染。秋天放 1 小时取出，冬天放 4~10 小时取出，每日 1 次。

〔功效〕 同上。

〔验证〕 以上四方经临床验证，疗效显著，可进行推广应用。

11. 鲜桃树叶治阴痒

〔方剂〕 鲜桃树叶 30 克，灰藜 25 克。

〔制用法〕 用水 1000 毫升，将上述二味煮沸 20 分钟。待稍温，用此液冲洗阴道。每日 1 或 2 次，连续 1 周为一疗程。

〔功效〕 杀滴虫，止阴痒。用治滴虫性阴道炎。

〔验证〕 张××，女，29 岁，患滴虫性阴道炎，经用上方治愈。

十、崩漏

在行经期间或非行经期间，阴道大量出血，或持续出血叫崩漏。其来势汹汹如山崩的叫“崩”，其来势缓慢而淋漓不断的叫“漏”，崩与漏在发病过程中，可互为转换，如久崩不愈，病热日轻，可转为漏，如漏而不止，病热日进，也可转为崩，由于二者都是子宫出血，所以在这里一并介绍其疗法。

1. 备金散治疗崩漏

〔方剂〕 灸香附 150 克，当归 45 克，炒五灵脂 30 克。

〔制用法〕 上药共研成极细末，过 120 目筛。每次服 7.5 克，用醋调，饭

前 30 分钟开水送服。每天 3 次。一般服 10 天即大见好转，20 天即可治愈。重者经 2~3 个月经周期即可巩固疗效。

[功效] 治崩漏诸证。

[验证] 刘×，女，37 岁。诉：月经来潮时多时少，数月之久不断，色稍紫，小腹有时疼痛，某院诊为功能性子宫出血，屡治不效，友人介绍就诊。查体面色苍白，症同上，并有时两胁胀，舌暗、苔薄白，脉涩略弦。给予备金散，服 7 天大见好转，18 天而愈，逐渐恢复健康。

2. 蒲氏老年血崩汤治疗阴道出血

[方剂] 阿胶、熟地、当归、冬瓜仁各 30 克，红花 20 克。

[制用法] 上药加水 4000 毫升，文火煎至 300 毫升，将药汁倒出；再加水 300 毫升，煎至 250 毫升，倒出药汁；再加水 250 毫升浓煎，将药汁全部倒出。把 3 次药汁混合，每次服 200 毫升，每天服 3 次，饭前服，冬天加温后服，每天 1 剂。

[加 减] 血热者熟地改生地，加黄芩 12 克；气虚加黄芪 30 克；阴虚加地骨皮 15 克；暴崩加地榆炭及白头翁 30~60 克；虚寒加艾叶 15 克；若鲜红，无瘀块者当归、红花各减 10 克。

[疗效] 治疗功能性子宫出血、子宫肌瘤出血等阴道出血 54 例，全部治愈。其中 77.8% 患者服药 1~3 天即达止血效果。对明显瘀滞证的止血疗效尤佳。

[验证] 赵×，18 岁，工人，1983 年 11 月 21 日入院。患者 20 天前月经量多，经用西药止血、输血治疗后出血逐步减少，但始终未干净。近 2 天出血如崩，色紫暗，有如猪肝色样血瘀块，下腹隐痛；伴头晕目眩，烦躁口干，大便干结，舌红苔黄，脉数。西医诊为青春期功能性子宫出血。中医辨为崩漏（血热挟瘀）。治以清热凉血，化瘀止血。方用清热固经汤加味。服药 4 剂，出血略减，仍有瘀块，余症无变化。予蒲氏老年血崩汤去熟地加生地 30 克，地榆炭、白头翁各 60 克。服药 2 剂，出血止，腹痛减，但仍口渴，烦躁，腰酸痛，舌红苔黄。血虽止而热仍存继，以滋阴清热补肾为主，方用四物汤加味，服 1 周而愈。

十一、产后血晕

产后血晕指产妇分娩后，突然头晕眼花，不能坐起或心胸满闷，恶心呕吐，痰涌气急心烦不安，甚至口噤神昏、不省人事。本病病因有虚有实，临床常用的有效偏方主要如下。

1. 回魂汤治疗产后血晕

[方 剂] 人参（太子参）60克，丹参、黄芪、煅龙骨各30克，当归15克，荆芥炭10克，川芎3~6克。

[制用法] 每天1剂，水煎，分2次服。

[功 效] 产后血晕，症见头晕、目眩、眼前黑花，昏闷欲绝，重者口噤不语。

[验 证] 经治61例，治愈38例（服1~3剂，诸症消失），显效19例（服1~4剂，症状明显好转），无效4例（治疗前后症状与体征无改变。）李×，24岁。分娩后半日，突然流血不止，恶寒发热，晕厥，不省人事，口噤不语，面色苍白，手足逆冷，少气息微；脉微，似有若无，唇面爪甲俱苍白。此乃血脱证，急令火烧红铁器淬醋，使气从鼻嗅以醒脑清神。内服益气固脱兼以祛邪的回魂汤加防风10克，水煎分2次服，连进2剂，人事清醒，脉来应指缓弱。仍用上方加服2剂，诸症悉平。

十二、宫颈糜烂

宫颈糜烂是一种常见的慢性子宫颈病变，是妇科常见病多发病，多见于经产妇，分娩、流产或手术后发生。

1. 黄倍散治宫颈糜烂

[方 剂] 黄柏7.5克，炒蒲黄3克，五倍子7.5克，冰片1.5克。

[制用法] 上药共研细末，装瓶备用。先用1%绵茵陈煎剂冲洗阴道并拭干，再将上药粉喷洒于子宫口糜烂处，以遮盖糜烂面为度（如果阴道较松者再放入塞子，保留24小时，自行取出）。隔日冲洗喷药1次。10次为1疗程。治疗期间停止性生活。

[功 效] 消炎拔毒，收敛生肌。

[验 证] 治疗57例，痊愈41例，进步2例，无效14例。

[备 注] 引自 1979 年《新中医》(2)。

2. 鱼腥草油膏治宫颈糜烂

[方 剂] 鲜鱼腥草、麻油各 500 克，蜜蜡 60 克。

[制用法] 麻油煎开，将洗净晾干的鱼腥草放入油内共煎，5 分钟后用纱布过滤去渣，再将蜜蜡放入滤液内，冷却后成糊状备用。用 1/5 000 的高锰酸钾溶液冲洗净阴道，除去宫颈分泌物后，用消毒带尾的棉球涂上此膏贴在宫颈糜烂处。每日 1 次，至愈为度。

[功 效] 清热解毒，生肌定痛。

[验 证] 治疗 115 例、痊愈 68 例，好转 26 例，中途停治 21 例。

[备 注] 引自 1976 年《赤脚医生杂志》(10)。又用白矾适量研末，以猪胆汁调成糊状，倒入白布袋内晾干，研细，如上法给药。一般 2 或 3 次即可。治疗 43 例，效果良好。

3. 治糜灵治宫颈糜烂

[方 剂] 孩儿茶、苦参、黄柏各 25 克，枯矾 20 克，冰片 5 克。

[制用法] 上药共研细末，过 200 目筛，后加冰片拌匀，密封保存。用时以香油调成糊状。先用干棉球拭净阴道后，再将带线棉球蘸药膏放在糜烂面上，24 小时后自己将药棉球取出，每隔 2 天上药 1 次，10 次为 1 疗程。

[功 效] 清热燥湿，祛腐生肌。

[验 证] 经治 598 例，全部有效，其中痊愈 515 例，显效 45 例，好转 38 例。

[备 注] 引自 1982 年《吉林中医药》(4)。

4. 孩儿茶等治宫颈糜烂

[方 剂] 孩儿茶 15 克，枯矾 10 克，黄柏 5 克，冰片 3 克。

[制用法] 将上药共研为极细末，加适量香油或豆油或甘油调成软膏状，装瓶备用。用时，先将阴道宫颈常规消毒后，再将软膏涂患处，每次 1 克。如合并湿热下注的阴道症（阴道炎、滴虫性阴道炎），采用六药汤熏洗后再按上法处理。（六药汤：百部、苦参各 30 克，蛇床子 50 克，艾叶 20 克，明矾、防风各 15 克。水煎，趁热先熏洗，后坐浴）。

[验 证] 用上药治疗子宫颈糜烂患者 200 例，其中 I 度 31 例，II 度 97

例，Ⅲ度 72 例。经治疗后痊愈 185 例，有效 13 例，无效 2 例。

5. 川黄柏等治宫颈糜烂

〔方 剂〕 川黄柏、紫草、儿茶、五倍子、白芨各 100 克，冰片 10 克。

〔加 减〕 若白带量多，秽味明显者，加苦参、川黄柏、白头翁各 50 克，若宫颈糜烂面较深者，加煅石膏、蛤粉、三七粉各 50 克；若宫颈充血明显伴小腹及阴道灼热感者，加青黛、鱼腥草各 50 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，过 120 目筛后，消毒密封备用。用时，以消毒带线棉球蘸药粉贴于宫颈糜烂面，第 2 天取出棉球，隔日冲洗换药。用药 1 周为 1 个疗程。若治疗 2 个疗程未见明显好转，则改用其他方法治疗，用药期间、禁止性生活，月经期间，停止治疗。

〔验 证〕 用本方治疗子宫颈糜烂患者 168 例，其中，治愈者 162 例；显效者 5 例；无效者 1 例。一般治疗 1~2 个疗程获愈或显效。

6. 牡丹皮、蒲公英治宫颈糜烂

〔方 剂〕 牡丹皮 1 000 克，蒲公英 500 克。

〔制用法〕 将上药加水没过药面煮沸 45 分钟，倾出煎液，再另加水没过药面复煎，煮沸 60 分钟，然后将两次煎液浓缩成 1500ml，分装小瓶备用。用时，先用窥阴器扩张阴道，干棉球拭净宫颈粘液后，将棉球在上述药液中浸湿，贴覆于宫颈糜烂面，每日 1 次，10 次为 1 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗子宫颈糜烂 360 例，经用药 1~2 个疗程后，均获治愈。

7. 猪苦胆石榴皮治宫颈糜烂

〔方 剂〕 猪苦胆 5~10 个（吹干后约 30 克），石榴皮 60 克。

〔制用法〕 共研成细粉，用适量花生油调成糊状，装瓶备用。用前先以温开水清洗患部，搽干宫颈分泌物，再将有线的棉球蘸药塞入宫颈糜烂处。每日 1 次，连用多次。

〔功 效〕 解毒，杀虫，生肌。有较强的抗菌作用。主治宫颈糜烂。

〔验 证〕 据《新中医》1976 年第 2 期载：吴某，女，38 岁。下腹部经常疼痛，有下坠感，脓性分泌物多，有腥臭味，已有 10 年病史。在某医院检查为重度宫颈糜烂，经反复治疗未愈。经用此方 12 次即痊愈，至今未见复发。

十三、老妇行经

老妇行经系指妇女在绝经后再次出现月经的情况，多数是由于体内内分泌代谢紊乱的表现，少数也可由体内肿瘤所致。

1. 俞氏验方治老妇行经

[方 剂] 水杨梅根、牛角腮（先煎）、旱莲草各 20~40 克，女贞子 20~30 克，党参 25~45 克，仙鹤草 15~30 克，煅龙骨、牡蛎（均先煎）各 15~35 克，鹿衔草 10~15 克，象牙屑（先煎）10 克，生白术、十大功劳叶各 15 克，生地、茯苓各 20 克，红枣 30 克，炙甘草 3 克。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂。

[功 效] 治老妇行经病症。

[验 证] 李××，63 岁，1981 年 6 月 17 日诊。花甲之年，月经又至，一月 2 行，每行周余，经色鲜红，量较往昔为多，间夹血块，少腹胀满且有下坠感，但无腹痛；伴有头痛头晕，眼花畏光，口渴饮水，经前食欲不振，口淡乏味，夜尿频繁，形体消瘦，夜梦纷纭，记忆力减退，病已 3 月余。自诉无痛经及月经不调史，经停已 14 年多。检查适值经行第 2 天，腰酸明显，舌红边有齿印，苔中剥而边薄腻，脉细弱，予上方 3 剂而愈。后用六味地黄丸巩固。1983 年 9 月追访，未复发。

十四、产后便秘

产后便秘是由于产妇分娩后胃肠功能紊乱，导致大便干结，难以解出之症。

1. 当归补血汤加味治疗产后便秘

[方 剂] 生白术 60 克，生地 30 克，升麻 3 克。

[制用法] 每天 1 剂，水煎分 2 次服。

[验 证] 用上法治疗妇科手术后便秘患者 50 例，其中 36 例于服药 1~2 剂后开始肠鸣矢气，随后排便。7 例无效。据临床观察，服药后开始排便的第 1 天，每天排便 1 次者 34 例；每天 2 次者 6 例；每天 3 次者 3 例。随后多数患者保持每天或隔天排便 1 次。

2. 生黄芪等治产后便秘

〔方 剂〕 黄生芪、白术各 30 克，生大黄（后下）6 克，生甘草 8 克。

〔制用法〕 将上药水煎分 2 次服，每日 1 剂。

〔验 证〕 用本方治疗妇科手术后便秘患者 65 例，经服药 3~5 例，经服药 3~5 剂后，均获治愈。

十五、不孕症

不孕症指女子结婚后夫妇同居二年以上，配偶生殖功能正常，未避孕而不孕者。本病发生的原因有肾虚、肝郁、痰湿、血瘀等，临床常用的有效的偏方、验方主要如下。

1. 通任种子汤加味治阻塞性不孕

〔方 剂〕 香附、赤芍、白芍、桃仁、红花、络石藤各 9 克，川芎、小茴香、炙甘草各 6 克，川牛膝、王不留行、路路通各 12 克，丹参 30 克，穿山甲 3 克。

〔制用法〕 每天 1 剂，水煎 2 次分服，连服 4 天，停药 1 天。1 个月为 1 疗程。

〔功 效〕 治阻塞性不孕。

〔验 证〕 王×，39 岁，1986 年 12 月 16 日初诊。婚后 14 年，继发性不孕 8 年。孕 1 产 1，上节育环避孕 2 年，摘环后 8 年未孕。经期如常，5~6 天/26~28 天，量中等，色红夹紫黑色血块；白带量多，伴小腹胀痛。平时大便溏薄，舌淡苔白，脉弦细。妇检：宫颈 I°糜烂，宫体后倾偏右，正常大小，双附件（一）。子宫输卵管通液示不通。基础体温呈双相曲线。男方精液检查正常。诊为输卵管炎性阻塞不孕，遵上方治疗 1 疗程，复查输卵管通液试验通畅。1987 年 3 月 12 日来经，后未再经转，于 1987 年 12 月 23 日足月顺产一男婴。

2. 嗣子汤治疗不孕症

〔方 剂〕 鹿衔草 60 克，菟丝子、白蒺藜、槟榔各 15 克，细辛 3 克，辛薹、高良姜、香附、当归各 10 克。

〔制用法〕 水煎服，每日 1 剂。

〔功 效〕 补肾益精，疏肝解郁，调理冲任，温暖胞宫。

〔疗 效〕 所治 12 例，经分别服 20~60 剂，除 1 例未坚持服药外，余均获效。

〔验 证〕 张××，女，28 岁，教员。婚后年余未孕，经妇检子宫发育不良，并后倾。形衰色悴，月事延期，经色紫黯，量少有块，舌淡红，苔薄白，脉沉弱无力。诊断为原发性不孕。证属肾精虚损、冲任失调。投嗣子汤，服 40 剂后，经水来潮，原方制成丸剂，调治月余，次年 3 月育婴。

3. 逐瘀疏通方治输卵管阻塞致不孕症

〔方 剂〕 内服方组成：当归、桃仁、三棱、莪术、王不留行、地鳖虫、红花、穿山甲、泽兰、路路通各 9 克，虎杖、马鞭草各 15 克。

〔制用法〕 此方于月经干净后第 5 天开始服用，连服 10 剂。若药后月经转多，经期用养血调经方药易破瘀之品；若经行仍量少腹痛，经期可续服破瘀疏通原方。

灌肠方组成：皂角刺、苦参各 15 克，败酱草 30 克，赤芍 12 克，浓煎至 10 毫升，俟药温适宜时保留灌肠，每晚一剂。

外敷方组成：皂角刺、白花蛇舌草各 30 克，透骨草、羌活、独活、乳香、没药各 15 克，红花 12 克。分二包，用纱布包扎放入蒸锅蒸 30 分钟，取出敷双侧下腹，每天临睡敷 1 小时，每包药可重复使用 3 次，疗程 3 个月。

〔验 证〕 朱×，28 岁，结婚 8 年，婚后小产一子。后未再孕，月经周期为 30~40 天，经量少，色黯夹有瘀块，少腹疼痛，经期加重；腰酸不适，两乳疼痛，带下色白，有粘稠状，舌淡、苔白有瘀点，脉迟。经子宫输卵管碘油造影术和输卵管通液试验，确诊为双侧输卵管阻塞。给予疏闭通瘀方内服，每天 1 剂，连服 15 剂，经期停药。经期后 5 天内用促排卵汤治疗。处方：菟丝子、制首乌各 20 克，党参、白芍、淮山药、女贞子各 15 克，枸杞子、五味子、续断、麦冬各 10 克。服 2 剂停药。于同年 9 月受孕，一切正常。

4. 狗头散治不孕症

〔方 剂〕 全狗头骨 1 个。

〔制用法〕 将狗头骨砸成碎块，焙干或用砂炒干焦，研成细末。服药前测基础体温，有排卵的体温曲线呈双相型，即月经后 3~7 天开始服药。每晚临睡时服狗头散 10 克，黄酒红糖为引，连服 4 天为

1疗程。忌食生冷。未成孕者，下次月经过后再服。连用3个疗程而无效者，改用它法治疗。

[功效] 治不孕症。

[验证] 其中服药1疗程受孕者360例，服药2个疗程受孕者34例，3个疗程受孕者6例。

[备注] 全狗头骨散治疗不孕症，作用机理不明，有待进一步探讨，可能是狗头骨和狗肉为热性，故对宫寒、子宫发育欠佳，不能受孕者有效，对其他型和器质性病变不孕者则欠佳。

5. 助孕汤治疗不孕症

[方剂] 广木香、当归、羌活、益母草、芍药、柴胡、香会、紫河车。

[加 减] 患者月经无明显病痛者，可于经后10~15天服助孕汤4~6剂，以摄精助孕。若月经有明显异常者，重在调经，可在上方基础上加减化裁：实热加丹皮、山栀子；虚热加知母、黄柏或生地、玄参；气虚加党参、淮山药、黄芪；实寒加桂心、莪术、紫石英；虚寒加巴戟天、仙灵脾、艾叶；痰湿加苍术、白术、川厚朴、枳壳；血瘀加桃仁、红花；输卵管不通加木通、丝瓜络、吴茱萸。

[制用法] 水煎服，每日1剂。

[功效] 治不孕症有效。

[验证] 王××，女，27岁，农民。继发性不孕两年半，经多方医治，未能见效，1984年11月2日来我处诊治。证见月经先后不定期，行经不畅，挟有小血块，少腹胀痛，乳房、胸胁胀闷不舒，腰膝酸软，纳差呕恶，舌苔薄，脉沉弦尺弱。即先用消遥散加减以行气解郁调经，后投以助孕汤数剂。1985年元月20日其夫前来喜告曰：其妻已怀孕。

6. 调经种子汤治不孕

[方剂] 当归15克、川芎10克、白芍10克、熟地15克、制香附10克、仙灵脾15克、紫石英15克、紫河车粉4克（分冲）、肉苁蓉15克。

[加 减] 经行腹痛有血块者加丹参15克，以活血化瘀；行经时乳房胀痛者加柴胡10克，以舒肝开郁；腰酸腿软者加川续断15克，以补肝肾壮筋骨；血虚明显者加黄芪补气以生血。

[制用法] 每天1剂，煎2遍和匀，早晚分服。每于经前1周服药，服至

月经来时停药为一个疗程，连服3个疗程。

[功效] 当归、川芎、白芍、熟地四物补血和血调经；制香附理气调经；仙灵脾、肉苁蓉补肾益精；紫河车大补气血可治下元衰惫不能生育；紫石英镇心养肝温经，治血海虚寒不孕；故冲任不调，下元不足，宫寒不孕者宜之。

[验证] 文××，女，32岁。就诊日期：1962年1月13日。结婚8年未孕，经事失调，每过期10~20天一行，来时下腹痛胀，舌苔薄白，脉缓。予本方治疗，服3个疗程，经事准则，下腹痛胀均解，第4个月怀孕，足月产一男孩。

7. 椒附散治不孕症

[方剂] 食盐30克、川椒、熟附子各15克，生姜5~10片，艾炷21壮（如黄豆大）。

[制用法] 先将食盐研细末待用，次将川椒、附子共研细末，贮瓶备用。用时先取食盐15~30克填入患者的脐孔内，取艾炷置食盐上点燃灸7壮，继之去除脐中食盐，再以川椒、附子末填入脐孔内，以生姜片覆盖于脐上，再用艾炷置脐上灸之，连续灸14壮。每天如上填药艾灸1次，7天为1疗程。

[功效] 温通经络。

[验证] 屡用有效。

[备注] 引自《外治记要》。

十六、子宫外孕

子宫外孕多系指受精卵着床于输卵管进行生长发育的异位妊娠。

1. 消症散治子宫外孕

[方剂] 千年健60克，川续断120克，追地风、川椒各60克，五加皮、白芷、桑寄生各120克，艾叶500克，透骨草250克，羌活、独活各60克，赤芍、当归尾各120克，血竭、乳香、没药各60克。

[制用法] 上药共研极细末，每250克为1份，装入纱布袋内，封口备用。用时取药袋1个，蒸5分钟，趁热外敷患处，每日1或2次，10次为1疗程。

[功效] 消症散结。

[验 证] 屡用皆效。

[备 注] 引自《百病中医膏散疗法》。

2. 宫外孕外敷方

[方 剂] 丹参 15 克，赤芍、桃仁、乳香、没药各 9 克，三棱、莪术、延胡索各 6 克。

[制用法] 上药共研细末，以食醋调匀成软膏状，备用。贴敷下腹部，外以纱布盖上，胶布固定。隔日换药 1 次，10 次为 1 疗程。

[功 效] 活血破瘀，消症止痛。

[验 证] 治疗数例，用药 1~2 疗程后，包块消失而愈。

[备 注] 笔者经验方。

十七、倒 经

倒经又称代偿性月经，指女子月经来潮伴有鼻出血，且与月经规律一致。

1. 珍珠母液治倒经

[方 剂] 鲜生地、珍珠母（先煎）各 30 克，丹皮炭 12 克，焦山栀、荆芥炭、黄芩各 6 克，牛膝炭 15 克，生甘草 3 克。

[制用法] 将上药水煎，早、晚各服 1 次。于周期性鼻衄前服完 5 剂。每日服 1 剂。如无效果，可于下个月周期性鼻衄前服 5 剂。

[验 证] 用上药治疗倒经患者 13 例，未婚 9 例，已婚 4 例，年龄均在 35 岁以内。13 例中，服药 5 剂治愈者 4 例；10 剂治愈者 3 例，15~20 剂治愈者 4 例；无效 2 例。

2. 芒硝治倒经

[方 剂] 芒硝 50 克，生甘草 10 克。

[制用法] 将上药水煎 1 小时后，过滤去渣，1 次顿服。若未愈可再服 1 剂。

[验 证] 用本方治疗倒经患者 31 例，经用药 1~2 剂后，均获治愈。

3. 全当归等治倒经

[方 剂] 全当归、代赭石、珍珠母各 20 克，生地黄、玄参、黄芪、川牛膝、茜草、赤芍、香附、白茅根、益母草各 15 克，黄芩、川黄连、红花、生甘草各 6 克。

[制用法] 在月经来潮前 7 天开始服药，每日 1 剂，水煎服，一般服药 2

个周期即可见效。

〔验 证〕 用本方治疗倒经患者 60 例，其中，治愈者 58 例；无效者 2 例。服药 1 个周期痊愈者 25 例，服药 2 个周期痊愈者 30 例，服药 3 个周期痊愈者 3 例。

十八、缺 乳

缺乳指产后哺乳期乳汁分泌不足。多由产后气血虚弱，不能生化乳汁，或肝气郁结，气机不畅所致。

1. 赤小豆治缺乳

〔方 剂〕 赤小豆 500 克。

〔制用法〕 每天早、晚各服 1 半的煎赤小豆汤液（去豆、饮浓汤）。连服 3 ~ 5 天。

〔验 证〕 用上药治疗有缺乳患者 20 例，均获得很好的效果。

2. 黑芝麻、僵蚕等治缺乳

〔方 剂〕 僵蚕 6 克，黑芝麻、红糖各 30 克。

〔制用法〕 将僵蚕研细，芝麻捣碎，加入红糖后拌匀。用时，将药放入茶杯内，倒入沸开水，加盖后待 10 分钟左右，1 次顿服，每日服 1 次，空腹时服。

〔验 证〕 用上药治疗缺乳患者 32 例，一般 2 天见效，3 ~ 5 天乳汁涌行。

3. 金银花等治缺乳

〔方 剂〕 金银花、蒲公英、王不留行各 15 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分 3 次服，并以黄酒少量为引。每日 1 剂。

〔验 证〕 用本方治疗缺乳患者 68 例，一般服药 2 ~ 4 剂，即可获得痊愈。

十九、回 乳

由于某种原因致使乳母不能进行正常哺乳，如乳母患传染病或婴儿死亡等，须进行回乳，以免乳房胀痛和发生乳腺炎。

1. 神曲、蒲公英回乳

〔方 剂〕 神曲、蒲公英各 30 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日2次，每日1剂。同时，趁热将药渣用干净纱布包好，放在乳房上热熨。

〔验证〕 用上药回乳20余例，疗效很好。一般经用1~2剂，即可消肿痊愈。

2. 生麦芽回乳

〔方剂〕 生麦芽120克。

〔制用法〕 将上药微火炒黄，置锅内，加水800ml，煎至400ml，滤汁；再加水600~700ml，煎至400ml，将2次药汁混合为1日量，分3次温服。

〔验证〕 用上药回乳11例，服本方后多在2剂获得痊愈。

3. 莱菔子回乳

〔方剂〕 莱菔子30~40克。

〔制用法〕 将上药打碎，加水浸泡30分钟后，水煎分3次温服。每日1剂。

〔验证〕 用本方回乳35例，均在服药2~4剂获得治愈。

4. 陈皮等回乳

〔方剂〕 陈皮、莱菔子、柴胡各15克。

〔制用法〕 将上药水煎分2次服，每日1剂。

〔验证〕 用本方回乳39例，一般用药2~6剂即可获得治愈。

二十、乳 腺 炎

乳腺炎，属中医“乳痈”范畴，是一种急性化脓性疾病。乳房肿胀疼痛，局部有块或无块，皮肤色白或红，甚则焮红肿痛，继则腐烂化脓。

1. 乳痈方治乳痈（急性乳腺炎）

〔方剂〕 当归、川芎、益母草、泽兰、苍耳子各12克。

〔制用法〕 水煎，冲黄酒服。

〔功效〕 活血祛瘀通络。

〔验证〕 刘××，女，27岁，1988年1月10日诊。自诉因亡夫心情忧郁，加之哺乳及过劳，昨天始右乳房胀疼，恶寒发热，因肌注青、链霉素过敏而来我院治疗。证见神清，舌淡红、苔薄黄，脉弦略数；体温37.4℃；右乳房可及5×6厘米肿块，触痛

明显，无波动。诊为乳痈。处予原方，先后 6 剂而诸症消失，痊愈。

[备 注] 本方为祖传验方。乳痈多由厥阴气滞、阳明胃热所致，以气血壅滞，乳络不畅，乳汁淤积为其病机。此方功能活血祛瘀通络，用治乳痈初起，尚未成脓者。

2. 砂仁塞鼻法治疗乳腺炎

[方 剂] 砂仁 10~20 克。

[制用法] 将砂仁研细末贮瓶备用。用时取糯米饭少许和砂仁末拌匀，搓成索条状如花生米大小，外裹以消毒纱布（必须是棉织品）塞鼻。左乳腺炎塞右鼻，右乳腺炎塞左鼻，亦可左右交替塞用。每隔 12 小时更换 1 次，直至炎症消失为止。

[功 效] 治乳腺炎有良效。

[验 证] 共治 50 例，均为产后哺乳期妇女。其中初产妇 33 例、经产妇 17 例。病程 1~3 天 20 例、4~7 天 15 例、8~16 天 15 例，平均 5 天。单侧发病者 40 例，双侧发病者 10 例。50 例中，除 10 例配用清热解毒中药内服外，其余均用本法治疗。50 例全部治愈。早期形成少量脓液者，亦可自行消失。

3. 泥鳅土豆外敷治乳痈

[方 剂] 土豆 1 个（要选用无斑点者），泥鳅 1 条（约有 10 公分长为佳）。以上为 1 次量。

[制用法] 将土豆洗净和泥鳅同时放入器皿中捣烂，捣至粘腻沾手时，取出做成小饼（大小视病灶）贴敷患处，每天 1 次，一般 2 次即见效。

[功 效] 治乳痈有良效。

[验 证] 张××，女，27 岁。产后半年哺乳期，因工作忙未及时给孩子吃奶，右乳房出现红肿、胀痛，右侧卧位时疼痛加重，伴发热（体温 38.3℃）。检查：右乳房外观红肿、扪之有结节、压痛明显，肌注青、链霉素 5 天无效。经用该方外敷 1 次后疼痛明显减轻，体温正常；2 次后诸证消失而告愈。

[备 注] 乳痈（红、肿、热、痛）有硬结者均可外敷。如遇有化脓开口者，可先用利凡诺纱条引流，外加敷料后，再敷此药饼。

4. 芒硝外敷治乳腺炎

[方 剂] 芒硝适量。

- 〔制用法〕** 根据患处面积大小，以能敷满患处，厚度约 0.25 厘米为宜。将芒硝用凉水搅拌均匀，敷于患处，外用白布裹之。药干燥时可掸之以凉水，务使经常保持湿润。每天换药 1 次，一般约 3 天可见肿消痛止。
- 〔功效〕** 治乳腺炎奇效。
- 〔验证〕** 王××，女，34 岁。自诉原诊为“乳腺炎”，治疗无效。两乳房疼痛难忍，夜间更甚，恶寒发热。查：双侧乳房均触及肿块、质硬、压之疼痛、无波动感（尚未成脓），皮肤焮红，体温 39.5℃。采用上述外敷法每天换药 2 次，连用 4 天，肿退病愈。
- 〔备注〕** 各种原因引起的皮下瘀血肿痛、静脉炎、乳腺炎、回乳。凡皮肤破溃者禁用。

二十一、女阴瘙痒症

外阴瘙痒指各种炎症分泌物、尿液，及任何物理或化学性刺激所引起的瘙痒，也可由体内内分泌代谢紊乱，精神，神经因素引起。

1. 蛇床子等治女阴瘙痒

- 〔方剂〕** 蛇床子、白藓皮、黄柏各 50 克，荆芥、防风、苦参、龙胆草各 15 克，薄荷 1 克（后入）。
- 〔加 减〕** 若带下多而黄者，黄柏加倍，有滴虫者苦参加倍、霉菌感染者龙胆草加倍。对各种因原发病因素引起的并发症的加用其他药物治疗。
- 〔制用法〕** 将上药水煎，外用熏洗，每日 2 次。如阴道内瘙痒可熏洗阴道。10~15 天为 1 疗程，一般 1 个疗程后即明显好转或治愈。
- 〔验证〕** 用上方治疗女阴瘙痒症患者 400 例中，392 例外阴、阴道瘙痒症消失，8 例好转；绝大多数患者带下过多，外阴湿疹，阴道炎性充血等症状随之消失或减轻。瘙痒症状治愈达 98%。

2. 芒硝等治阴痒

- 〔方剂〕** 芒硝、苦参、蛇床子、黄柏、川楝各 15 克。
- 〔制用法〕** 将上药加水 1500ml，煎至约 1000ml，去渣，倒入盆内，至温热适度，坐浴，浸洗 15~20 分钟左右，每日 1~2 次。
- 〔验证〕** 用上药治疗阴道瘙痒症患者 43 例，疗效满意，一般外用 3~6

次即可获得痊愈。

3. 花椒等治阴痒

[方 剂] 蛇床子、败酱草、白鲜皮、苦参各 30 克，百部，防风、透骨草、花椒各 20 克，冰片 4 克。

[加 减] 若外阴溃烂者，加白矾 40 克；若外阴部疼痛，加白芷 15 克。

[制用法] 将前九味中药水煎，约得药液 2 000ml，加入冰片搅拌，乘热熏外阴 15 分钟，待药液稍凉后洗涤患处，每日 1 剂，早、晚各 1 次。

[验 证] 用本方治疗女阴瘙痒症患者 135 例。经用药 5~10 剂后，其中，治愈者 128 例；显效者 4 例；有效者 2 例；无效者 1 例。

4. 龙胆草、龙黄治阴痒

[方 剂] 龙胆草 50 克，龙黄、生苡仁、苦参各 25 克，蛇床子、白鲜皮、薄荷各 30 克，川黄柏、全当归、益母草、蝉衣、茯苓各 20 克。

[制用法] 将上药用纱布包煎，加水至 300ml，煮沸后先作热熏，待温度适当时坐浴，每日 1 剂，早、晚各洗 1 次。1 周为 1 个疗程。

[验 证] 用本方治疗女阴瘙痒症患者 95 例，经用药 1~2 个疗程后，其中，治愈者 90 例；显效 3 例；有效者 2 例。总有效率为 100%。

二十二、外阴湿疹

祖国医学称为“湿疮”，认为是风湿热带下注所致。

1. 柳叶粉等治外阴湿疹

[方 剂] 柳叶粉 500 克，纯酒精 500ml，樟脑 10 克，利凡诺 1 克，冰片适量。

[制用法] 将杨柳叶及嫩柳枝尖晒干，碾后过筛，取柳叶粉加入纯酒精，浸泡 7 日过滤，放入樟脑，利凡诺，冰片，加入凉开水至 1000ml，即成复方柳叶浸剂备用。用时 1:5000 高锰酸钾液冲洗外阴，再用复方柳叶浸剂，涂擦阴道和外阴，每日 1 次，连用 4 天。

[验 证] 用上药治疗外阴湿疹患者 146 例，其中治愈率达 97.2%，好转率 2.8%。

2. 蒲公英等治外阴湿疹

[方 剂] 蒲公英、金银花、土茯苓、萆薢、浮萍各 15~20 克；连翘、苦

参、蝉衣、全虫、紫苏叶、川黄连各 10~12 克，生甘草 8~10 克。

〔制用法〕 将上药头、二煎合并药液，分 2~3 次口服。第 3 煎药液趁热熏洗患处，每晚睡前 1 次。3 天为 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗外阴湿疹患者 95 例，经用药 1~2 个疗程后，其中，治愈 91 例；好转 4 例。

3. 地锦草等治外阴湿疹

〔方 剂〕 地锦草、地稔各 100 克，川黄柏、生川军（焙黄）、五倍子各 50 克，雄黄、密陀僧、青黛各 20 克，冰片 8 克，炉甘石、轻粉各 10 克。

〔制用法〕 将上药共研为极细末，过 120 目筛后装瓶备用。用时取药末适量加入蜂蜜调成稀糊状，涂擦局部，每日 2~3 次。5 天为 1 个疗程。必要时包扎，直至痊愈为止。

〔验证〕 用本方治疗外阴湿疹患者 213 例，经用药 1~3 个疗程，治愈者 208 例，显效者 5 例。

二十四、胎位不正

胎位不正指不利于胎儿分娩的不正常胎位，多为暂时性。

1. 当归治胎位不正

〔方 剂〕 当归、川芎、黄芪、党参、白术、白芍、川续断、枳壳、熟地、甘草各 10 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，分 2 次服。

〔验证〕 用上药矫正胎位不正患者 140 例，除 10 例未复诊外，顺利转正 125 例，无效 5 例，有效率为 96.15%。125 例中，有 15 例经外回转术无效而服此药获效；第 2 次服药获效者 5 例。大多 1 次 2~3 剂，胎位即转正；极少用 5~6 剂。一般当孕妇服第 2 剂时，腹部均有隐隐的胎动感。

2. 当苏散治胎位不正

〔方 剂〕 当归 10 克，苏叶 8 克，黄芩 6 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分早、晚 2 次口服，每日 1 剂，至胎位恢复正常。

〔验证〕 用本方治疗胎位不正患者 27 例，治愈者 26 例，无效者 1 例。一般服药 5~10 剂即可治愈。未见不良反应。

3. 苏叶等治胎位不正

〔方剂〕 全当归、苏叶、枳实、陈皮各 8 克，川芎、生甘草各 6 克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，连服 5 天后，停药 3 天观察疗效，作为 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗胎位不正患者 86 例，经服药 1~2 个疗程后，成功者 83 例，失败者 3 例。服药后应将裤带放松，平卧 2 个小时为宜。

二十四、避 孕

避孕就是运用科学的方法来阻止和破坏正常受孕过程中的某些环节，以避免怀孕，防止生育。

1. 紫茄花避孕

〔方剂〕 紫茄花 14 朵（含苞未放的），黄酒适量。

〔制用法〕 将紫茄花置新瓦上焙干，研成细末。于产后或月经来潮之后用黄酒一次送服，每日 1 次，连服 7 天。

〔功效〕 避孕。

〔验证〕 屡用效佳。

2. 带柄柿蒂避孕

〔方剂〕 带柄柿蒂在瓦上焙干存性，压成粉。在月经干净后 2 天内用黄酒送服 服 1 次可避孕 1 年。

〔功效〕 避孕。

〔验证〕 据《新中医》该方疗效确切。

3. 油菜子配中药避孕

〔方剂〕 油菜子 20 克，生地 15 克，白芍 15 克，当归 15 克，川芎 5 克。

〔制用法〕 以水煎之。于月经净后，每日服 1 剂，连服 3 日，可避孕 1 个月。如制成丸剂，连服 3 个月，可长期避孕。

〔功效〕 避孕

〔验证〕 李××，女，24 岁，经服上方后 3 年未孕。

4. 黑木耳红糖膏避孕

[方 剂] 黑木耳煮至极烂，加红糖再煮浓缩成膏。空腹时加黄酒冲服，每日 2 次，于产后 3~7 天内服完。

[功 效] 避孕

[验 证] 疗效肯定。

5. 明矾绝育

[方 剂] 明矾 2.1 克

[制用法] 压成粉，装入一个胶囊内。胎盘娩出后，空腹时一次服。

[功 效] 绝育。

6. 药蛤蟆粉绝育方

[方 剂] 药蛤蟆（又名蛇蛤蟆，单背蛤蟆）1 只。

[制用法] 药蛤蟆除去肠杂，焙干研末，放石灰罐内备用。在产后 7~10 天或月经期 2~3 天内服。服时对白酒或甜水酒，一次服完。

[功 效] 绝育。

[验 证] 据《新中医》介绍，以上 2 方疗效理想。

二十五、更年期综合症

更年期综合症指女性到了 50 岁左右，由于卵巢功能减退，所出现的一系列以植物神经功能紊乱为主的症候群。

1. 白芍等治女性更年期综合症

[方 剂] 白芍 20 克，仙灵脾、菟丝子、覆盆子、女贞子、生地、紫草、桑寄生、钩藤、制香附、生麦芽各 15 克，全当归、甘草各 10 克。

[加 减] 若烦躁不安者，加大枣 5 枚，淮小麦、炙甘草、柏子仁、远志各 10 克；若神疲乏力、大便稀溏者，加怀山药、茯苓、党参、白术各 10 克；若头晕耳鸣者，加女贞子、石决明、夏枯草、墨旱莲各 10 克；若失眠心悸者，加酸枣仁、制何首乌、麦门冬、北沙参、五味子各 10 克；若自汗、盗汗者，加北黄芪 30 克，浮小麦、糯稻根各 20 克。

[制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 2~3 个疗程，以巩固疗效。

[验 证] 用本方治疗女性更年期综合征患者 125 例，其中，治愈者 122

例，有效者 3 例。服药 1 个疗程治愈者 38 例；2 个疗程治愈者 42 例；3 个疗程治愈者 42 例。治程中未见不良反应。

2. 何首乌等治女性更年期综合症

[方 剂] 何首乌 15 克，怀山药、山萸肉、仙茅、益母草、生地黄、熟地各 12 克，茯苓、丹皮、炒当归、炙甘草各 10 克。

[制用法] 将上药水煎 3 次后合并药液，分 3 次口服，每日 1 剂。1 周为 1 个疗程。

[验 证] 用本方治疗妇女更年期综合征患者 76 例，经用药 1~2 个疗程，其中，治愈者 73 例；好转者 2 例；无效者 1 例。

3. 珍珠等治女性更年期综合症

[方 剂] 珍珠母（先煎）、淮小麦各 30 克，党参、生黄芪、全当归各 15 克，柴胡、黄芩、黑山栀、姜半夏各 10 克，仙灵脾、女贞子各 12 克 炙甘草 6 克。

[加 减] 若口渴者，加玉竹 10 克，石斛 12 克；若失眠者，加夜交藤 15 克，柏子仁 10 克，五味子 6 克；若伴高血压者，加钩藤、丹参各 15 克，牛膝 10 克，地龙 8 克。

[制用法] 将上药水煎，每日 1 剂，分 3 次口服。5 剂为 1 个疗程。可连服 2~3 个疗程，直至痊愈为止。

[验 证] 用本方治疗女性更年期综合征患者 133 例，其中，治愈者 128 例；显效者 5 例。一般用药 2~3 个疗程即可治愈或显效。

第四篇 男性科常见病防治秘方

一、阳 痿

阳痿又称“阴痿”。现代医学称为性功能障碍或性神经衰弱。在临床上较为多见。多因肾虚、惊恐；或纵欲过度，精气虚损；或少年手淫，损伤肾气；或思虑过度，情志不舒；或湿热下注，宗筋弛纵等因所致。尤以肾虚和精神因素居多。常伴有头晕目眩，心悸耳鸣，夜寐不安，纳谷不香，腰酸腿软，面色不华，气短乏力等症。

1. 小茴炮姜敷脐治阳痿

〔方 剂〕 小茴香、炮姜各 5 克，加食盐少许。

〔制用法〕 上药共研细末，用少许人乳调和（也可用蜂蜜或鸡血代）敷于肚脐，外加胶布贴紧，一般 5~7 天后去除敷料。

〔功 效〕 应用于临床数例，疗效显著。

〔验 证〕 龚××，男，26 岁，地方干部。结婚 1 年患阳痿。阴茎时而不举或举而不坚，有时阴茎仅有热感，别无它恙。屡服补肾助阳之中药及针灸疗法，均未取得满意疗效。1986 年 5 月 14 请余诊治。索取以前病历，见常规方法已尽用，细思良久，决定使用“小茴炮姜敷脐法”以试之。按法投药，并嘱其暂避房事 1 个月，连用 20 天，其效霍然。后又以此法用药至 35 天，且辅以中药内服以巩固疗效。后经随访，阳痿已愈，房事正常。

2. 健雄煎治疗阳痿

〔方 剂〕 海螵蛸、生龙骨、生牡蛎各 30 克，公丁香 5 克，鹿角霜、阳起石各 15 克，蛇床子、怀牛膝、韭菜子各 10 克，硫磺（研碎）1 克。

〔制用法〕 每天 1 剂，7 天为 1 疗程，连服 2 个疗程无效者，改用他法。若服后胃部不适者，可加小量健胃药如砂仁、淮山药。硫磺亦可装入胶囊内，以汤药送服。

[功效] 7例中，6例痊愈（症状消失，恢复正常性生活）。其中服3剂者1例，服药9剂者2例，服药13剂者3例，1例无效。

[验证] 尤××，男，28岁，农民，1990年3月初诊。患阳痿半年，不能过正常性生活，有时亦能勃起，但不能性交，并有早泄、遗精，腰酸乏力等症状。用健雄煎加杜仲18克，连服15剂而愈。后其爱人已怀孕。

3. 亢痿灵治疗阳痿

[方剂] 蜈蚣18克，当归、白芍、甘草各60克。

[制用法] 先将当归、白芍、甘草晒干研细，过90~120目筛。然后将蜈蚣研细，再将两种药粉混合均匀，分为40包（也可制成水丸）。本方蜈蚣不得去头足或烘烤，以免减效。每次半包至1包，早晚各1次，空腹用白酒或黄酒送服。15天为一疗程。忌食生冷，恼怒。

[疗效] 经治737例，近期治愈655例（阴茎勃起坚而有力，同房能成功），好转77例（阴茎勃起坚而有力，或时好时差，某些原因如精神紧张等，同房勉强成功或不能成功），无效5例。

[验证] 贾××，39岁，干部，病历号247，阳痿5年多。自1975年始阴茎不能勃起，伴尿道烧灼感。即往患前列腺炎。经用大量补肾壮阳汤药及中成药无效，服亢痿灵7天，阴茎勃起坚而有力，持续20分钟，同房2次均成功。

4. 清化益肾通灵汤治疗阳痿

阳痿有血管性与神经性之分，但总属大脑皮层与勃起中枢功能失调的一种阳事不举或临房举而不坚之男性病。可见于神经衰弱及某些慢性病之体弱者。

[方剂] 柴胡10克，龙胆草10克，炙黄芪30克，山梔衣10克，木通6克，黄柏10克，知母10克，山萸肉20克，熟地30克，夜交藤30克，川牛膝10克，皂角刺3克，当归须10克，车前子10克（布包），甘草10克，覆盆子15克，蛇床子10克，蜈蚣1克，土茯苓20克。

[制用法] 每日1剂，水煎3次分3次服。服后，卧床休息半至1小时。服药1个月为1个疗程，可连2~3个疗程。亦可加炒枳壳制丸缓服，3个月为1个疗程。

[功效] 清肝化湿，消瘀益肾。

〔验 证〕 刘某某，27岁，农民。婚后2年，入房阳物举而不坚，渐进性加重。近半年来又增腰腿酸重，临房阳物不举，经服壮阳药不效而就诊。诊之脉涩，苔黄舌色黯红，寝食尚可，溺黄无涩痛，大便如常。经查未性交3日后精液量1.1ml，精液浓度稠，精子活动力迟缓，活动率50%，计数 $50 \times 10^9/L$ ，形态大致正常。诊为血管性阳痿。证属湿热动扰精室，瘀浊阻塞灵窍。法宜清肝化湿，消瘀益肾。方用清化益肾通灵汤：龙胆草、柴胡、山栀、黄柏、知母、川牛膝、当归须、车前子（布包）、蛇床子、甘草各10克，山萸肉、土茯苓各20克，炙黄芪、熟地、夜交藤各30克，覆盆子15克，木通6克，皂角刺3克，蜈蚣1克。10剂。嘱服药期间忌房事及食辛辣之品。

复诊：上方服后，腰重、溺黄见减，余无不适，再以前方去车前子加泽泻10克。20剂。

再诊：自述阳事渐兴，勉以入房，尚得和谐，遂以原方稍事出入，处以10倍量，并加炒枳壳，制丸缓服以善后。处方：龙胆草、柴胡、山栀、黄柏、知母、川牛膝、当归须、车前子、蛇床子、甘草各100克，山萸肉、土茯苓各200克，炙黄芪、熟地、夜交藤各300克，覆盆子150克，木通60克，皂角刺30克，蜈蚣10克，炒枳壳150克。诸药粉碎，过筛，水泛为丸如小绿豆大小，每次服5克，1日3次，温开水送服。丸方连服6月余，复查精液，基本正常，性事满意。

5. 补肾壮阳丸

〔方 剂〕 人参30克、仙灵脾30克、肉苁蓉30克、杞子30克。

〔制用法〕 上药研细末，炼蜜为丸，每粒2克，每服1粒，日2~3次。或用白酒500ml泡2周后，每服5~10ml，日2~3次。

〔功 效〕 人参大补元气；仙灵脾、肉苁蓉补肾壮阳，杞子滋养肝肾，强阴益精；五味子补肾涩精。

〔验 证〕 周××，男，50岁。就诊日期：1980年12月5日。性欲减退，阳萎不振，腰酸乏力，形寒怕冷已经3年，脉弱，乃肾阳虚弱之症。予本方治之，1个月后阳事渐振，性欲好转，2个月后诸症均解。

〔备 注〕 适当节制房事，加强体格锻炼。

6. 牛鞭韭菜籽等治阳萎

【方 剂】 牛鞭1根，韭菜籽25克，淫羊藿、菟丝子各15克。

【制用法】 将牛鞭置瓦片上文火焙干，磨细；淫羊藿加少许羊油，置于铁锅内用文火炒黄（不要炒焦），再将韭菜籽、菟丝子磨成细面，然后将上药混匀后装瓶备用。用时，每天晚饭后用黄酒中1匙，或将1匙药粉加入蜂蜜为丸，用黄酒冲服。

【验 证】 笔者用上药治疗阳萎患者3例，均获治愈。

7. 当归牛尾汤治阳痿

【方 剂】 当归30克，牛尾1条，盐少许。

【制用法】 将牛尾巴去毛，切成小段，与当归同锅加水煮。后下调料。饮汤吃牛尾。

【功 效】 补血，益肾，强筋骨。用治肾虚阳痿、腰痛、腰酸、腿软无力。

8. 炖虫草鸡大补肾精

【方 剂】 冬虫夏草5枚，母鸡1只，盐、味精适量。

【制用法】 将鸡开膛取出杂物，洗净，冬虫夏草放入锅内加水炖1个半小时，待鸡肉熟烂时下味精少许。吃肉饮汤，日服2次，可连续服食3~5天。

【功 效】 补肺，益肾。用于肾虚之阳痿、遗精及腰痛、腿软等。

【验 证】 孙××，男，27岁，经服上方后诸症均解。

9. 肝胆丸疗阳痿验方

【方 剂】 雄鸡肝4个，鲫鱼胆4个，菟丝子粉（中药）30克，麻雀蛋清（蛋黄不用）

【制用法】 将上药拌匀，做成黄豆大药丸烘干或晒干。每日3次，每次1粒，温开水送服。

【功 效】 补肾助阳。专治阳痿。

【验 证】 屡用效佳。

10. 苡蓉粥滋肾气补精血

【方 剂】 肉苡蓉15克，精羊肉60克，粳米100克，葱白2根，生姜3片，精盐适量。

【制用法】 分别将精羊肉、苡蓉切细。先用砂锅加水煎苡蓉取汁，入羊肉、粳米同煮，待沸后加盐、葱、姜，煮成粥。秋冬季服用，

每日1剂，5~7天一疗程。

[功效] 滋肾益精，助阳滑肠。

[验证] 本方经《卫生报》推荐应用，效果确切。

11. 山药桂圆炖甲鱼

[方剂] 怀山药15~20克，桂圆肉15~20克，甲鱼（鳖、团鱼）1尾。

[制用法] 先用沸水冲烫甲鱼，使其将尿排出，然后切开去掉内脏，洗净，再分切成小块。将甲鱼肉、甲壳、山药、桂圆肉放入炖盅内加水适量，隔水炖熟。喝汤吃肉，每周1剂。

[功效] 补肾益脾，固精扶阳。

[验证] 本方经《卫生报》推荐应用，效果确切。

12. 泥鳅枣汤治阳痿不举

[方剂] 泥鳅400克，大枣6枚（去核），生姜2片。

[制用法] 泥鳅开膛洗净，加水与枣、姜共煮，以一碗水煎煮至剩一半即成。每日2次，连服多日。

[功效] 补中益气，滋养强身。用治阳痿、遗精。

13. 焙狗阴茎治阳痿不举

[方剂] 狗阴茎3件，黄酒适量。

[制用法] 将狗阴茎用瓦焙干，研为细末。每服3~4克，用黄酒送下。

[功效] 补精髓，壮肾阳。用治阳痿久不愈。

14. 雀蛋羊肉汤治阳痿不举

[方剂] 麻雀蛋2个，羊肉250克，盐少许。

[制用法] 先煮羊肉至八成熟，后打入雀蛋再煮，用时加盐。分2次吃完。

[功效] 补肾温脾，壮阳填精。用治脾肾阳虚之阳痿、腰膝冷痛、饮食不振等。

[验证] 据《食疗保健》介绍，以上三方疗效效果理想。

15. 海参羹治阳痿

[方剂] 水发海参100克，冬笋片20克，水发冬菇5克，熟火腿末3克，猪油3克。

[制用法] 海参切片，冬笋切碎，猪油烧熟，放入葱姜末爆焦，倒入白汤，然后加入海参、冬菇、冬笋、盐、料酒、味精等，煮沸勾芡，倒入火腿末并洒上胡椒粉即成。

〔功效〕 补肾益精。用治肾虚阳痿。

〔验证〕 李××，男，39岁，经服上方症状均解。

16. 白羊肾羹填精髓

〔方一〕 肉苁蓉 50 克，萆薢 10 克，草果 10 克，陈皮 5 克，胡椒 10 克，白羊肾 4 个，羊脂 200 克，盐、葱、酱油、酵母粉各行之有效量。

〔制用法〕 将白羊肾、羊脂洗净，放入锅内。将肉苁蓉、萆薢、草果、陈皮、胡椒用纱布包扎好，放入锅内，加水适量置于炉火上烧沸，水开后改用文火炖熬，待羊肾熟烂时，下葱、盐、酱油、酵母粉，如常法做羹。

〔功效〕 补肾温阳。用治阳痿、遗精、腰膝无力、脾虚食少、胃寒腹痛等。

〔方二〕 羊睾丸去筋膜，切成薄片。烧锅置旺火上，倒入猪骨汤并加胡椒面、葱白、姜末、盐等煮开，放入羊睾丸煮 5 分钟，洒上香菜即成。

〔功效〕 益肾壮阳。用治肾虚之阳痿、遗精、头晕目眩等。

〔验证〕 以上两方在治疗阳痿中疗效显著。

17. 清炒虾仁治阳痿

〔方剂〕 虾仁 250 克，鸡蛋清 1 个，淀粉 5 克，盐少许，白汤 30 个，熟猪油适量。

〔制用法〕 虾仁、蛋清、盐、淀粉和匀。用熟猪油烧热锅，倒入和好的虾仁等。用筷子搅散成粒并至颜色变白时，倒入漏勺内沥去油。炒锅置旺火上，油 10 克烧热，倒入虾仁，再加黄酒、白汤、味精，煮沸勾芡，翻炒，撒上胡椒面即成。

〔功效〕 温肾壮阳。用治肾虚引起的遗精、阳痿、早泄、头晕目眩、身体倦怠等。

〔验证〕 据《新中医》介绍，本方疗效确切。

18. 对虾酒治阳痿遗精

〔方剂〕 新鲜大对虾 1 对，白酒（60 度）250 毫升。

〔制用法〕 将虾洗净，置于瓷罐中，加酒浸泡并密封，约 10 天即成。每日随量饮酒，待酒尽后，将对虾烹炒。单独食用或佐餐。

〔功效〕 温阳填精。用治阳痿、遗精等。

[验 证] 屡用效佳。

19. 烫活虾壮阳

[方 剂] 活虾 100 克，热黄酒半杯。

[制用法] 将活虾洗净，用滚热黄酒烫死。吃虾喝酒，每日 1 次，连吃 7 天为 1 个疗程。

[功 效] 补肾壮阳。用治阳痿、遗精。

[验 证] 屡用效佳。

20. 海虾仁葱叶治阳痿

[方 剂] 海虾仁 7 克，大葱叶（取粗绿含黏液多者为佳）3 条。

[制用法] 将虾仁装入葱叶内，晒干，轧成粉。每日服 2 次，茶水送下。

[功 效] 补肾益精，通阳利气。用治阳痿不举、早泄等。

[验 证] 屡用效佳。

21. 核桃鸭子疗肾虚

[方 剂] 核桃仁 200 克，荸荠 150 克，老鸭 1 只，鸡泥 100 克，油菜末、葱、姜、盐、蛋清、味精、料酒、玉米粉（湿）、花生油各适量。

[制用法] 将老鸭宰杀去毛，开膛去内脏，洗净，用开水烫一下，装入盆内，加入葱、姜、料酒、盐调成糊，再把核桃仁、荸荠剁碎，加入糊内，淋在鸭子膛内肉上。将鸭子放入锅内，用温油炸酥，捞出沥去余油，用刀割成长条块，摆在盘内，四周撒些油菜末即可。

[功 效] 补肾固精。

[验 证] 张××，男，35 岁，经服上方后诸症均解。

22. 炖麻雀虾治肾阳不足

[方 剂] 麻雀 5 只，鲜虾 50～100 克，姜 3 片，盐、酱油、味精、白酒各少许。

[制用法] 麻雀去毛，开膛去内脏，洗净。将麻雀、虾仁、姜片及调料等，放入炖盅内，注入八成满开水，加盖，放到沸水锅内，隔水炖 3 小时左右，最后放入味精、白酒即成。食肉饮汤，隔 3 或 4 天食用 1 次，效佳。

[功 效] 壮阳暖肾。凡肾阳不足而致阳痿、尿频、腰膝酸痛之患者，时加吃用，有较好的功效。常人食用强身补力。

[验 证] 该方补肾壮阳效果显著，值得推广应用。

23. 麻雀蛋治肾虚阳痿

[方 剂] 麻雀蛋6个，盐末。

[制用法] 将麻雀蛋蒸熟剥皮蘸盐末吃。每次吃3个，日用2次，可连续吃3~5天。

[功 效] 补肾，壮阳，强身。用治肾虚阳痿不举、举而不坚及早泄。

[验 证] 该方补肾壮阳效果显著，值得推广应用。

24. 牛睾丸鸡蛋治肾阳虚

[方 剂] 牛睾丸2个，鸡蛋2个，白糖、盐、豆油、胡椒粉各适量。

[制用法] 将牛睾丸捣烂，鸡蛋去壳，六物共拌均匀，锅内放少许食油烧热煎煮。佐餐。

[功 效] 温补肾阳，生精益髓。

[验 证] 屡用效果显著。

25. 牛鞭杞子汤治阳痿遗精

[方 剂] 牛鞭1具，枸杞子30克，盐少许。

[制用法] 牛鞭洗净切段同枸杞子共炖熟，加盐。吃饮，分2次吃完。

[功 效] 补肾壮阳，收敛精气。用治体弱肾虚，症见腰膝酸软、遗精、阳痿、夜尿多。亦可作老人调理补养食品。

[验 证] 屡用效果显著。

二、早 泄

早泄是同房时阴茎尚未接触或刚接触女方外阴，或阴茎虽进入阴道，但在很短的时间内便发生射精，随后阴茎疲软，不能维持正常性生活的一种病症，是比较常见的男性功能障碍疾病。成年男性均可发病，与年龄无明显关系。

祖国医学认为，早泄多为淫欲过度，肾气亏损，封藏失职，固摄无权；或相火炽盛，精关失摄，精液外泄所致。故固肾摄精、清泻相火为基本治疗大法。

1. 知柏三子汤（丸）

[方 剂] 知母10克、黄柏10克、五味子6克、金樱子10克、杞子10克。

[制用法] 每天1剂，煎2遍和匀，早晚分服，或研细末炼蜜为丸，每粒10克，每服1粒，日2次。

[功效] 知母、黄柏滋肾阴泻相火；五味子、金樱子固肾涩精；杞子补肾益精。

[验证] 赵××，男，25岁。就诊日期：1978年10月25日。婚前屡犯手淫，每当房事即早泄，已半年。心烦眠差，多梦，脉弦数，此肾阴不足相火偏旺，精关不固也。予本方治之，服2周后心静眠安，服2月后早泄大见好转。

[备注] 适当节制房事，加强体格锻炼。

2. 五倍子治早泄

[方剂] 五倍子20~30克。

[制用法] 将上药用文火水煎30分钟，再加入适量温开水，乘热熏蒸龟头，待水温降至40℃左右，可将龟头浸入其中5~10分钟。每晚1次，半个月为1个疗程。治疗期间忌房事。

[验证] 用本方治疗早泄患者21例，经用药1~2个疗程后，治愈者18例；显效者3例。

3. 五倍子白芷等治早泄

[方剂] 五倍子15克，白芷10克。

[制用法] 将上药共研为细末，用醋及水各等分，调成面团状，临睡前敷肚脐（神阙穴），外用纱布盖上，胶布固定，每日1次，连敷3~5日。

[验证] 用本方治疗早泄患者39例，经用药2~6日后，均获痊愈。

4. 芡实莲子饮治遗精早泄

[方剂] 大米500克，莲子50克，芡实50克。

[制用法] 将大米淘洗净。莲子温水泡发，去心去皮。芡实也用温水泡发。大米、莲子、芡实同入铝锅内，搅匀，加适量水，如焖米饭样焖熟。食时将饭搅开，常食有益。

[功效] 健脾固肾，涩精止遗。用治阳痿不举、遗精、早泄和脾虚所致的泄泻等。

[验证] 屡用效佳。

5. 锁阳鸡治男子早泄

[方剂] 锁阳、金樱子、党参、怀山药各20克，五味子15克，小公鸡1只。

[制用法] 将鸡开膛去内脏杂物，洗净，连同上述药物一并放入大炖盅

内，注入开水，注入开水八成满，盖上盅盖，放入滚水锅中，隔水炖4小时即成。

〔功效〕 固肾止遗，滋阴壮阳。用治肾虚阳痿、遗精、早泄等。

〔验证〕 屡用效果显著。

6. 肾鞭汤治见色流精

〔方剂〕 羊肾2个，羊鞭（公羊的生殖器）2条，肉苁蓉12克，枸杞10克，巴戟天12克，山药15克，熟地10克。

〔制用法〕 羊肾剖开取去网膜及导管后切条，羊鞭里外洗净，肉苁蓉等五味用纱布包好，锅内放水同炖，开锅后改文火，吃肉饮汤，日服1次，连续食完。

〔功效〕 补肾壮阳。用治阳痿不举或举而不久、不坚，对见色流精有较好的疗效。

〔验证〕 据《食疗保健》介绍，该方疗效确切显著。

7. 炸麻雀治早泄

〔方剂〕 麻雀4只，花生油、盐末各适量。

〔制用法〕 将麻雀去毛及内脏杂物，洗净，晾干。将油放入锅内烧至五层热，下麻雀炸呈金黄色取出，把油倒出，用原锅炒盐末少许即成。吃时蘸盐，每日2次，每次2次，可连用几天。

〔功效〕 补肾壮阳。用治早泄、阳痿、遗精，有较好疗效。

〔验证〕 李××，男，37岁，经服上方后诸症均解。

三、遗 精

遗精是指不因性交而精液自行外泄的一种疾病。古谓：“有梦而遗精者，名曰遗精，无梦而遗精者，甚则醒时精液流出者，称为滑精。”因系精液外泄，故统称为遗精，是男性常见多发病。

遗精次数过频，每周2次以上，或梦时而遗，或醒时外溢，伴有精神萎靡。腰酸腿软，心慌气喘等状者，属于病理性遗精。如成年男子，如果偶尔有遗精，一般每周不超过2次，且次日无任何不适者，则属于生理现象。

1. 双补固精丸

〔方剂〕 人参、五味子、杞子、金樱子、石菖蒲。

〔制用法〕 研细末，炼蜜为丸，每粒10克，每服1粒，日2次。

〔功效〕 人参大补元气，开心益智；石菖蒲宁心安神；杞子滋补肾阴；五味子、金樱子补肾固精。心神得安，肾阴得充则精关自固，遗泄自己。

〔验证〕 刘××，男，18岁。就诊日期：1981年3月5日。屡犯手淫，已经2年。近半年时常梦遗，甚至滑精，1~2日1次。头晕乏力，夜寐不实，多梦纷纭。舌质淡，苔薄，脉沉而弱。证属心肾两虚，精关不固。予本方服1个月后睡眠较实，梦遗减半，服2个月后退精已止，精神亦振。

〔备注〕 切戒手淫，清心寡欲，注意体格锻炼。

2. 蒸白果鸡蛋治遗精

〔方剂〕 生白果仁（即银杏仁）2枚，鸡蛋1个。

〔制用法〕 将生白果仁研，把鸡蛋打一小孔，将碎白果仁塞入，用纸糊封，然后上笼蒸熟。每日早晚各吃1个鸡蛋，可连续食用至愈。

〔功效〕 滋阴补肾。用治遗精、遗尿。

〔验证〕 屡用效佳。

3. 核桃猪肾治梦遗滑精

〔方剂〕 核桃仁30克，猪肾（腰子）2个，葱、姜、各5片，食油、盐、酱油、味精各适量。

〔制用法〕 将猪肾片煸炒，取出沥尽污水。再次锅烧热加食油，用葱、姜炆锅，放入猪肾片、核桃仁、盐、酱油等调料翻炒片刻，起锅前下味精即可。连服1周有效。

〔功效〕 滋阴补肾。用治腰酸腿痛、梦遗滑精等。

〔验证〕 马××，19岁，服上方后痊愈。

4. 荷叶治疗梦遗滑精

〔方剂〕 荷叶50克（鲜品加倍）

〔制用法〕 研末。每服5克，每日早晚各1次，热米汤送服。轻者1或2剂，重者3剂可愈。

〔功效〕 清热止血，升发清阳。用治梦遗滑精。

〔验证〕 据《新中医》介绍，效果显著。

5. 龙骨粥固精止遗

〔方剂〕 煅龙骨（中药）30克，糯米100克，红糖适量。

〔制用法〕 将龙骨捣碎，入砂锅内加水 200 克，煎 1 小时去渣取汁，入糯米再加水 600 克、红糖适量，煮至米烂粥稠。早晚空腹热食，5 天为一疗程，两三个疗程奏效。

〔功效〕 镇惊潜阳，收敛固涩。用治遗精、产后虚汗不止等。

〔验证〕 屡用效佳。

四、阳强、阳缩

在无性兴奋状态下阴茎容易勃起，且久久不倒，或者房事后仍不衰软，即为阴茎异常勃起症，中医称为阳强。

1. 白酒冲胡椒治缩阳

〔方剂〕 白酒（60 度以上）适量，胡椒 50 粒。

〔制用法〕 白酒用水温热，冲入轧碎的胡椒上。趁热服用。

〔功效〕 除寒湿。用治缩阳。

〔验证〕 屡用效佳。

2. 白酒煮虾椒治缩阳

〔方剂〕 白酒（60 度以上）适量，红尖辣椒 2~3 个，鲜虾 100 克。

〔制用法〕 先将辣椒、鲜虾用油炒熟，冲入白酒煮沸。趁热顿服。

〔功效〕 益精气，祛寒湿。用治男子生殖器缩入不出。

〔验证〕 屡用效佳。

3. 韭菜汁治男子生殖器缩入

〔方剂〕 鲜韭菜适量，白酒（60 度）100 克。

〔制用法〕 将韭菜洗净，切碎，捣烂，绞取韭菜汁一杯，加入白酒蒸服。顿服。

〔功效〕 补肾助阳。用治缩阳，伴有面青唇白、汗出不止。

〔验证〕 吴×，男，53 岁，经服上方后痊愈。

4. 烤老姜治缩阳

〔方剂〕 老姜 1 块。

〔制用法〕 去皮烤热。塞入肛门内，阳物即伸出。

〔功效〕 解表，温中。用治缩阳。

〔验证〕 临床治疗 47 例，均获佳效。

5. 热敷方治阴茎缩入

〔方 剂〕 老葱白 200 克，老白干（或二锅头）150 克。

〔制用法〕 葱白洗净，切碎，入锅炒至极热，倒入白酒，拌匀。趁热将葱白酒糊敷于下腹部，待凉时加热再敷，数次即愈。

〔功 效〕 活血，通阳。用治男子阴茎缩入，伴面青唇白、汗出如雨。

〔验 证〕 屡用效果颇佳。

6. 韭菜子治阳物不痿

〔方 剂〕 韭菜子、破故纸各 30 克。

〔制用法〕 共研细末。每服 9 克，日服 3 次。

〔功 效〕 滋补肾虚。用治肾虚兴奋所致之联举有效。

〔验 证〕 治愈 31 例，27 例痊愈，4 例好转。

7. 桃仁粥治阴茎不倒

〔方 剂〕 桃仁 15 克，粳米 100 克。

〔制用法〕 将桃仁捣碎，与粳米按常法煮食用。

〔功 效〕 祛瘀血，通经络。

〔验 证〕 屡用效佳。

五、不射精症

不射精症指男性在性交过程中无精液射出，多由房劳过度，肾阴不足所致。

1. 淫羊藿蛇床子等治不射精

〔方 剂〕 淫羊藿、蛇床子、覆盆子、黄精、炙鳖甲各 30 克，全当归、穿山甲、党参、枸杞子各 20 克，柴胡、枳实、郁金、王不留行各 10 克，石菖蒲、麻黄各 8 克，蜈蚣 4 条。

〔制用法〕 将上药水煎，每日 1 剂，20 天为 1 疗程。1 个疗程结束后，隔 5 天行下 1 个疗程。

〔验 证〕 用本方治疗不射精症患者 88 例，经用药 2~4 个疗程，其中，痊愈者 75 例；显效者 6 例；好转者 4 例；无效者 3 例。

2. 黄芪党参等治不射精

〔方 剂〕 黄芪、党参各 30 克，菟丝子、覆盆子、韭菜子、枸杞子、山萸肉、淫羊藿、熟地黄、山药、白花蛇舌草各 15 克，路路通、补骨脂、牛膝、石斛、仙茅各 10 克，马钱子 0.5 克，蜈蚣 2 条。

〔制用法〕 将上药水煎3次后合并药液，分2~3次口服，每日1剂，15剂为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗不射精症患者186例，经用药1~3个疗程后，其中，治愈者169例；好转者10例；有效者3例；无效者4例。

3. 仙灵丹治不射精

〔方剂〕 巴戟天、仙灵脾各20克，山萸肉、枸杞子、菟丝子、桑椹子、生地各12克，远志、炙甘草各10克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日1剂，分2~3次口服，20天为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗不射精症患者46例，经用药1~3个疗程后，其中痊愈者38例；显效者4例；好转者3例；无效者1例。

4. 参芪菟丝子等治不射精

〔方剂〕 黄芪、党参各30克，菟丝子、覆盆子、韭菜子、枸杞子、山萸肉、淫羊藿、熟地黄、山药、白花蛇舌草各15克，路路通、补骨脂、牛膝、石斛、仙茅各10克，马钱子0.5克，蜈蚣2条。

〔制用法〕 将上药水煎3次后合并药液，分2~3次口服，每日1剂，15剂为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗不射精症患者186例，经用药1~3个疗程后，其中，治愈者169例；好转者10例；有效者3例；无效者4例。

5. 巴戟天仙灵脾等治不射精

〔方剂〕 巴戟天、仙灵脾各20克，山萸肉、枸杞子、菟丝子、桑椹子、生地各12克，远志、炙甘草各10克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日1剂，分2~3次口服，20天为1个疗程。

〔验证〕 用本方治疗不射精症患者46例，经用药1~3个疗程后，其中，痊愈者38例；显效者4例；好转者3例；无效者1例。

六、男性不育症

男子不育是指由男性生殖器官的解剖和生精机能异常而致不育者。引起本病的原因很多，如性机能障碍可引起不育症，而性机能障碍常见的有阳痿、早泄、遗精、不射精等。又如精液异常可引起不育症，而精液异常又有无精子、精子稀少、精液不液化、死精子过多、精液量少等。此外，先天或后天生殖器

官的器质性病变，精神因素，身体健康状况，性交习惯等，皆能引起男子不育症。祖国医学在治疗男子不育症方面积累了大量的有效的偏方，主要如下：

1. 补肾填精方治不育症

[方 剂] 金樱子、菟丝子各 30 克，淫羊藿、枸杞子各 12 克，破故纸、熟地、川续断、狗脊、党参各 15 克，仙茅 10 克，肉苁蓉 15 ~ 20 克。

[加 减] 气虚者加北芪，腰痛者选黄精、桑寄生、乌药等，早泄可加牡蛎、山萸肉、五味子；脾虚纳少可加淮山药、云苓等。

[制用法] 水煎服，每日 1 剂。

[验 证] 高×，男，30 岁，炊事员，1980 年 5 月 10 日初诊。自诉婚后 5 年不育，经中西医治疗效果不佳，爱人曾到几家妇产科医院检查均正常。婚前已有头晕耳鸣、腰膝酸软、精神萎靡等症；婚后又因几年未育，求子心切，色欲竭精，复罹阳痿，面色苍白，舌苔薄白，脉沉细无力。精液常规检查：外观灰白、质稀，量 1.5 毫升，精虫计数 0.4 亿，活动率 40%，活动迟缓。治宜益肾填精。药用补肾填精方。每天 1 剂。连服 40 剂，精液化验正常。自觉症状消失，其爱人于 1980 年 10 月已怀孕。

2. 冬蛤生精饮治无精子症

[方 剂] 麦冬、白芍、菖蒲、合欢皮、茯苓、羊藿叶各 15 克，枸杞子，知母各 20 克，淮山药 10 克，蛤蚧 1 对。

[制用法] 水煎服，每剂煎 2 次，每天分 2 次服，早饭与晚饭后服用 50 毫升。3 个月为一疗程。

[加 减] 若气血两虚可加冬虫夏草 10 克；肝经湿热下注加萆薢 10 克，灯芯草 3 克；心神惊恐加萱草、竹叶、远志各 10 克。

[功 效] 益肾填精，助气安神。

[验 证] 张×，男，31 岁。1987 年 4 月 27 日初诊。主诉：结婚已 5 年，妻子未怀孕，经妇科检查证实其妻子有生育能力。1986 年经北京某医院检查确诊为无精子症与精索静脉曲张Ⅱ°。现症为头晕、耳鸣、五心烦热、盗汗、体倦乏力，面色红润，舌淡无苔，脉濡弱。证属肾阴亏虚，真阴暗耗所致。以滋补肾阴，清泄相火治之，应用冬蛤生精饮加减治疗 3 个疗程。1988 年 1 月精液检查：精子计数 $90 \times 10^9/L$ ，精子成活率 75% 以上，活动良好。2 个月后其妻已怀孕。同年 12 月娩出健康男婴。

3. 续嗣散治男性不育症

[方 剂] 熟地、紫河车各 20 克，枸杞子、淮山药、山萸肉、菟丝子、杜仲、肉苁蓉各 10 克，巴戟天、蛇床子、五味子各 6 克，鹿茸 3 克。

[制用法] 各药单味研末，混匀收储备用。每次服 5 克，每天 3 次，用药汤送下。

[功 效] 滋阴补肾

[验 证] 熊×，28 岁，1986 年 5 月来诊。主诉：结婚 4 年未育，面色不华，头昏健忘，时觉形寒，盗汗，精神恍惚，纳差，腰膝酸软，阳举不坚，时无梦而遗，尿频，舌红少苔，脉沉细。精液检查：液化时间 75 分钟，精液密度 $10.8 \times 10^9/L$ ，精子活动力 25%，活动率Ⅱ级。此乃肾阴阳两虚，且阴虚更甚，拟牛膝、龟板、胡桃肉、莲子、金樱子、煅龙骨、煅牡蛎、芡实煎汤送服续嗣散 1 周。药后精神略觉好转，纳食转佳，1 周来无遗精，宗原方续服 1 个月。半年后追访，上证已除，其妻已孕 3 月。

[备 注] 火盛或湿热蕴结者禁用；生殖系统生理缺陷服之无效；服药期间禁房事为宜。

4. 河车大造丸治疗男性不育症

[方 剂] 熟地黄、生地黄、天门冬、杜仲、黄柏、五味子、当归、枸杞子、牛膝、肉苁蓉、锁阳、紫河车。

[制用法] 服 1 个月为 1 疗程，连治 4 个疗程。每疗程进行精液检查 1 次，有前列腺炎进行前列腺液检查。

[功 效] 大补真元、填精益髓。

[验 证] 赵×，28 岁。婚后 4 年未育，女方求治妇科，无异常发现。自觉腰部酸，少腹部时有胀痛，尿后余沥不尽，小便有胀痛感，小便时阴茎头有乳白色粘液流出。精液检查死精 60% 以上，伴有脓球。前列腺液检查，脓球（++），卵磷脂小体少许，拟诊为前列腺炎。证见面肤红润，舌偏赤、苔黄津略干，脉弦有力，外阴发育正常。脉症互参，拟为湿热下注，扰乱精室，以致精子死亡，因而难以孕育。治当清热祛湿，补肾养精。处方：肉苁蓉、熟地、生地、杜仲、锁阳、枸杞子、黄柏各 10 克，蒲公英、地丁草、赤茯苓各 30 克。连进 10 剂。药后少腹闷胀已少，腰酸已止，阴茎头未见有乳白粘液流出，尿后余沥

已少，舌正红、苔薄黄，脉弦缓。药已应症，仍蹈前方服之，前后进药 58 剂，症状逐渐消失。前列腺液检查，脓球少许，卵磷小体（+++）。后以原方去蒲公英、地丁草，加菟丝子 15 克，破故纸 10 克。又续服 23 剂。妻子已受孕，翌年生育 1 健康女婴。

5. 加减七子散治男性不育症

[方 剂] 五味子、菟丝子、茯苓、黄柏各 10 克，车前子、淮山药、熟地、金樱子各 20 克，枸杞子、蛇床子、党参、黄芪各 15 克，鲜石斛 30 克、山萸肉、肉苁蓉各 12 克，巴戟 6 克，熟附子 3 克。

[制用法] 水煎服，每天 1 剂，1 月为 1 疗程。另取五味子 300 克，焙干碾末，在第 1 疗程中，与上方同时吞服，每次 6 克，每天 2 次，服完为止，第 2 疗程不须再服。

[功 效] 治不育症。

[验 证] 戴××，男，32 岁，1985 年 9 月 5 日诊。婚后 3 年未育，女方妇检无异常。精液检查精子数 $27 \times 10^9/L$ ，异形占 0.80，活动率 0.03。主症除腰酸乏力，偶有滑精外，无其他症状，尺脉虚。诊为肾精不足男性不育症。乃仿加减七子散方。处方：菟丝子、杞子、金樱子、蛇床子、车前子各 15 克，五味子 10 克，熟附子 4 克，山萸肉、淮山药各 15 克，熟地 20 克，补骨脂 10 克，巴戟、黄柏各 15 克。每天 1 剂水煎服。另以蛤蚧一对去头足研粉，早晚各吞服 3 克。服至 15 剂时复查精液，精子活动率提高到 0.40。服完 30 剂复查。精子计数 $80 \times 10^9/L$ ，活动率提高到 0.70，活动良好，腰酸乏力已除。10 月 28 日其妻来诊，已孕。

6. 补育生精丸治早泄、不育症

[方 剂] 人参、鹿茸、五味子、仙灵脾各 30 克。

[制用法] 上药研细末，炼蜜为丸，每粒 2 克，每服 1 粒，日 2~3 次。或用白酒 500ml 泡 2 周后，每服 5~10ml，日 2~3 次。

[功 效] 人参大补元气，五味子益气生精，鹿茸生精益髓，仙灵脾补肾壮阳，四药合用，相辅相成，疗效益彰。

[验 证] 张××，男，35 岁。就诊日期：1978 年 9 月 12 日。素有早泄，性欲减退，精子计数每 ml 不到 2 千万，结婚 10 年不育。女方

月经正常，无生殖系统疾病。予本方泡酒治疗，连用1个月后性欲好转，服2个月后女方怀孕。

〔备注〕 服药期间适当减少房事。阴虚躁热者勿服。

7. 参芪七子汤治不育症

〔方 剂〕 人参10克，车前子、覆盆子、菟丝子各50克，女贞子、五味子各40克，黄芪、枸杞子、巴戟天各30克，附子15克，补骨脂25克。

〔加 减〕 若性欲减退者，加仙茅、淫羊藿各15克；若阳痿者，加龟胶、鹿角胶各10克，阳起石15克；若滑精或早泄者，去车前子，加黄芪至60~80克；若食欲不振者，加山楂、神曲、鸡内金各15克；若腰痛者，加川续断、杜仲、鸡血藤各15克；若失眠者，加远志、合欢花、酸枣仁各10克；若尿频、尿痛者，加川柏、竹叶、茯苓各10克；若大便秘结者，加川军（后下）10克。

〔制用法〕 将上药水煎两次后合并药液，分早、晚空腹服，每日1剂，1个月为1个疗程。

〔验 证〕 用本治疗男性不育症患者46例，经用药1~4个疗程后，其中治愈者39例；无效者7例。

七、血 尿

尿中含有红细胞称血尿，血尿的出现表示泌尿系统有出血。

1. 地龙大蓟治血尿

〔方 剂〕 生地龙（即活蚯蚓）40条，生大蓟、白糖各150克。

〔制用法〕 洗去活蚯蚓泥土，置清水中，加入3~5滴食用植物油，让蚯蚓吐出腹中泥土，如此反复两次，至腹中黑线消失呈现透明状为止。然后将活蚯蚓放置于净缸内，撒上白糖，不久蚯蚓即化成糖汁。另取生大蓟煎水，煮沸约5~10分钟，趁沸时冲入活蚯蚓化成的糖汁即成。凡血尿患者，不分性别、年龄，均可服之。宜空腹趁热尽其而饮服。本方为1剂量。早、中晚服1次。

〔验 证〕 用上药治疗血尿患者，一般服1~2天即获痊愈。

2. 金银花蒲公英等治血尿

〔方 剂〕 金银花、蒲公英各30克，马勃、漏芦、大蓟、小蓟各15克，

白术、茯苓、泽泻各 10 克，红花、丹参、赤芍各 12 克，生甘草 8 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分早、中、晚 3 次口服，每日 1 剂，5 剂为 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗血尿患者 89 例，其中痊愈者 85 例，显效者 4 例，总有效率为 100%。痊愈者中，服药 1 个疗程治愈者 46 例；2 个疗程治愈者 30 例；3 个疗程治愈者 9 例。愈后经随访 1~2 年，均未见复发。

八、尿频症

尿频指排尿次数每小时多于 3 次或比正常排尿次数明显增多，多由炎症刺激引起。

1. 火麻仁覆盆子等治尿频症

〔方 剂〕 火麻仁、覆盆子各 15 克，杏仁、生白芍各 9 克，生大黄 6 克，枳壳、厚朴各 5 克，桑螵蛸 12 克。

〔制用法〕 将上药水煎，分 2 次服，每日 1 剂。

〔验证〕 用上药治疗尿频症患者，均在服药 5~7 剂后获得痊愈。

2. 参芪大黄等治尿频症

〔方 剂〕 党参、黄芪各 20 克，生大黄（后下）、车前草、茯苓、山药、泽泻、川黄连、白术各 10 克，生甘草 8 克。

〔制用法〕 将上药水煎，分 2~3 次口服，每日 1 剂。5 剂为 1 个疗程。

〔验证〕 用本方治疗尿频症患者 31 例，经用药 5~10 剂，痊愈者 28 例，显效者 3 例。

3. 蒲公英半枝莲等治尿频症

〔方 剂〕 蒲公英、半枝莲各 20 克，茯苓、怀山药、木通、泽泻、五味子各 12 克，甘草 10 克。

〔制用法〕 将上药水煎 3 次后合并药液，分早、晚两次口服。5 剂为 1 个疗程。

〔加 减〕 若气血两虚者，加生黄芪、全当归、何首乌各 20~30 克；若腰膝酸软无力者，加川续断、杜仲、狗脊、怀牛膝各 10~15 克。

〔验证〕 用本方治疗尿频症患者 68 例，均获治愈。其中，1 个疗程治愈

者 21 例；2 个疗程治愈者 30 例；3 个疗程治愈者 17 例。

九、老年性前列腺肥大

前列腺肥大，又称前列腺增生，属中医“癃闭”范畴。本病多发于老年人，中老年人亦有发生。证见小便不通或不利。若伴见头脑晕胀、口渴、胸闷气粗、心烦、小腹胀痛、舌红苔黄、脉弦数，多为三焦火盛；咽干烦渴，呼吸急促，苔黄、脉数者，多属肺热气壅。

1. 疏肝散结方治老年性前列腺肥大

【方 剂】 柴胡、牛膝各 10 克，生牡蛎（先煎）30 克，丹参、当归、赤芍、海浮石（先煎）、海藻、昆布、夏枯草、玄参各 15 克，川贝粉（分冲）3 克，肾精子 5 粒（肾精子即牛膀胱之结石，以桂圆肉包裹，于第 1 次服药时吞服）。

【制用法】 水煎服，每日 1 剂。

【功 效】 治疗老年性前列腺肥大。

【验 证】 李××，男，78 岁，1980 年诊治。素有高血压史，又患小便淋漓不尽多年。1 年前，因突然不能排尿急诊入北京×医院治疗。经查诊断为“老年性前列腺肥大”。因血压高不适于手术，故作留置导尿管处理，并建议求治中医。经多方医治，效果不显。尿管长期留置，常常诱发尿道感染。故 1 年之中，几经住院治疗，甚感痛苦。患者形体瘦弱，精神萎靡，舌苔黄腻，脉弦重按有力。乃投以疏肝散结方，5 剂。服药 2 剂后，自觉诸症减轻，并有排尿感；服 3 剂后，取出尿管已能自行排尿。5 剂服毕，尿道通畅无阻。患者为巩固疗效，又自照原方进服 5 剂，共服药 10 剂，多年之苦疾告愈，多次追访，未见再发。

十、男性乳房发育症

男性乳房发育症是指男子乳房在青春期或成年以后单侧或双侧乳房增大，甚或呈现女性型乳房，临床亦称男性乳肥大症。

中医认为本症属“乳病”范畴，常因肝气郁结，痰瘀凝滞，或因肝肾不足，阴阳亏虚等所致。治疗或疏肝理气、化痰散结，或活血化瘀、软坚消结，或滋养肝肾，或温补肾阳，或数法合而用之。若配合外治之法，自可提高疗效。

1. 逍遥丸治疗男性乳房发育症

[方 剂] 逍遥丸是成药，市面有售。其方由柴胡、薄荷、生姜、当归、白芍、白术、茯苓、甘草组成。

[制用法] 每天3次，每次9克（约100~110粒左右），饭后温开水送服，3个月为1疗程。

[功 效] 疏肝理气，健脾燥湿化痰。

[疗 效] 治疗35例，总治愈率为89%。

[验 证] 肖××，男，25岁，农民。5年前右乳房渐增大，如妇人状，伴有胀痛。余用逍遥散方：当归、白芍、茯苓、白术各10克，甘草、生姜各3克，柴胡、薄荷各6克，每天1剂，分早晚2次服。15剂后，乳房渐小，胀痛大减。嘱其再进15剂，半月后，乳房完好如初，左右对称。

十一、辜 丸 痛

睾丸炎是男科常见多发病之一，其发病率约占12%~18%。临床上分为急性和慢性两种，其中急性者又主要有急性化脓性睾丸炎和腮腺炎性睾丸炎两种，其中以急性化脓性睾丸炎为多见。

1. 生姜治睾丸痛

[方 剂] 生姜1块（以肥大老者为佳）。

[制用法] 将上药用水洗净，横切成约0.2cm厚的均匀薄片，每次用6~10片外敷于患侧阴囊，并盖上纱布，兜起阴囊。每日或隔日更换1次，直至痊愈为止。

[验 证] 用上药治疗睾丸炎疼痛患者24例，其中敷药第2天自觉坠胀疼痛及触痛减轻，睾丸肿胀显著消退者15例；第3天有12例痊愈，自觉症状消失，睾丸消肿，触痛消失；4天后4例痊愈，5例敷药后5天痊愈。治愈天数平均为3.9天。

[备 注] 敷药后患者均出现阴囊表皮灼热刺痛，发麻发辣，少数出现红肿，个别出现红疹。阴囊局部皮肤有创口或睾丸炎化脓穿溃者不能应用。

2. 川红丹参汤治睾丸痛

[方 剂] 白芍50~60克，木通、枳实、川牛膝、红花、桃仁、丹参各

15~20克，茯苓、车前子、青皮、生甘草各10~15克。

〔制用法〕 将上药水煎，每日1剂，分3次口服。

〔验 证〕 用本方治疗睾丸痛患者91例，均获治愈。其中，1剂治愈者25例；2剂治愈者34例；3剂治愈者21例；4剂治愈者11例。

第五篇 皮肤科常见病防治秘方

一、酒渣鼻

酒渣鼻，俗称“红鼻子”或“鼻赤”。多因饮酒过度，嗜食辛辣，肠胃积热，热气上蒸，客于鼻部，复被风寒外郁，血热瘀阻，郁热不散所致。或肺感风热，邪热熏蒸肺窍，上客鼻窍，伏留不散，均可导致瘀热凝于内，鼻赤现于外也。

1. 百苦雷散治酒渣鼻

[方 剂] 用百部、苦参、雷丸各研成极细末，然后以 5: 2: 2 的比例混合，搅匀后取药粉 15 ~ 20 克，与雪花膏 80 ~ 85 克混合，制成 15% ~ 20% 的药物雪花膏。

[制用法] 每晚睡前，用硫磺皂清洗面部，然后外搽，翌晨洗去。20 天为 1 疗程，可连用 2 ~ 3 个疗程。

[功 效] 治酒渣鼻。

[验 证] 治疗 2 例患者，均用药 1 次即获痊愈。邹 × ×，女，21 岁，职工，1983 年 8 月 27 日诊。患者患酒渣鼻 2 年多，经用肤轻松外涂，地塞米松肌注等未效；又于 1983 年 5 月到某市医院求治，经用中、西药治疗效不显。后求治于余，即效上方以图试治，翌日患者欣然来告，用药 1 次溃面即干燥结痂，未再用药，7 天后结痂变软，皮损渐愈、红斑渐退，观察至今未见复发。

[备 注] 初用本药数天，皮损症状可加重，以后逐渐好转，乃至痊愈。由于百部、苦参、雷丸混合药粉不但可杀毛囊虫，且具有除湿解毒作用，所以对酒渣鼻合并化脓者亦可应用。

二、冻 疮

冻疮是人体遭受低温侵袭所引起的局部或全身性的损伤，多发于儿童、妇女及久坐少动者，以四肢远端及暴露处为好发部位。

1. 黄芪桂枝五物汤加味治疗局限性冻疮

〔方 剂〕 黄芪、桂枝、芍药、生姜、大枣、鸡血藤、制附片。

〔加 减〕 病发于面部加白芷、川芎，发于上肢加片姜黄、桑枝；发于下肢加川牛膝、独活；有瘀斑肿胀加桃仁、泡山甲、当归；有水疱加茯苓、乌梢蛇、苍术、玉米；痛甚加细辛、晚蚕砂、乳香、葱白；麻木不仁加地龙、海风藤、全蝎；兼红肿热痛加土茯苓、红藤、败酱草、蒲公英、连翘。

〔制用法〕 水煎服，每日1剂。

〔功 效〕 温经散寒、活血消肿。

〔验 证〕 梅某，女，24岁。每至冬季面颊、双手背及小鱼际处、两足趾及足外侧均发生冻疮，现已6年。经西药、中草药单验方治疗症减，但来年仍发。诊见两颧红晕略肿胀，有少许水疱，感觉较迟钝；两手足肿胀明显，并有杏核大小水疱，局部热痛感消失。诊为面部Ⅱ°冻伤，双手足Ⅲ°冻伤，予以黄芪桂枝五物汤加味。处方：黄芪、鸡血藤各30克，桂枝、薏苡仁各18克，生姜、制附片、川牛膝各15克，乌梢蛇、白芥子各12克，土茯苓24克，白芍9克，细辛3克，大枣6枚。水煎服，每天1剂。服3剂后水疱消失，余症均减。又服5剂，余症大减。更方为：黄芪、鸡血藤各24克，桂枝、川牛膝各12克，生姜、制附片各9克，白芍6克，大枣6枚。10剂告愈，追访至今未复发。

2. 复方乌头酊防治冻疮

〔方 剂〕 生川乌、生草乌、桂枝各50克，芒硝40克，细辛、红花各20克，樟脑15克，60%酒精1000毫升。

〔制用法〕 先将生川乌、生草乌、桂枝、细辛、红花研粗末，再与芒硝、樟脑相混后兑入酒精内密闭浸渍7天，滤药液备用。用时用棉签蘸药汁（破溃者涂在患部周围，溃疡面按外科溃疡处理）频频涂擦患处，每天早晚各1次，每次擦药5分钟左右。

[功效] 温经散寒，活血消肿定痛。

[验证] 李××，女，28岁，职工。双下肢患冻疮，外用冻疮膏及中草药单方效果不显，于今年元月6日来诊。检查：双脚趾及脚跟有红肿斑，边界模糊，有痒、胀、痛感，两脚小趾及脚跟可触及黄豆大结节数个，压之易退色，得暖则舒。诊为冻疮。即用复方乌头酊如法外搽。3天后复诊，欣然而告肿胀痒痛症大减。嘱再续用，1周而愈。

[备注] 本病主要由寒冷之气所袭，阳气不能四达，阳抑血凝，经脉涩滞，流行不畅而成。《医宗金鉴》曰：“冻疮触犯严寒伤，气血肌肉硬肿僵……”，今以寒者温之，结者散之之法，取辛温大热的纯阳之品乌头、桂枝、细辛温散凝寒涸冷，配以红花、芒硝、樟脑活血通络，并能增强消肿定痛之功。诸药径达病所，故易应手获效。

3. 茄子方治冻疮

[方一] 茄梗、蒜梗各适量。

[制用法] 切碎，煎水。洗烫，每晚1次。

[功效] 清热，消肿。用治冻疮红肿、发痒。

[方二] 茄子秧1公斤，辣椒500克。

[制用法] 上药放铁锅内加水熬5小时，取3次滤液合并浓缩成膏。涂患处，或将膏溶于水中熏洗，每日1次。

[功效] 清热消肿，散寒燥湿。用治冻疮。

[验证] 上述两方疗效肯定，值得推广应用。

4. 辣椒酒防治冻伤

[方剂] 尖辣椒10~15克，白酒适量。

[制用法] 将辣椒切作细丝，以好白酒浸泡10天，去渣过滤即成。涂于局部红肿发痒处，每日3~5次。要轻轻涂擦，防止将皮肤搓破。

[功效] 活血散瘀。治冻疮初期局部红肿发痒。

[验证] 吴×，女，17岁，双手红肿发痒难甚经用本方涂擦逐渐好转。

5. 老丝瓜末治冻疮

[方剂] 老丝瓜，猪油。

[制用法] 将老丝瓜烧灰存性，和猪油调和。涂患处。

[功效] 通络，消肿。用治手足冻疮。

[验 证] 屡用效佳。

6. 谷糠治冻疮

[方 剂] 谷糠。

[制用法] 将谷糠放盆内点烧，烘烤患处。每日烤 1 次，数日即可生肌。

[功 效] 活血，消肿。

[验 证] 据《卫生报》介绍，本方治疗患者 94 例均愈。

7. 花生皮治冻伤

[方 剂] 花生皮、醋、樟脑、酒精各适量。

[制用法] 先将花生皮炒黄，研碎，过筛成粉末，每 50 克加醋 100 毫升调成糊状，放入樟脑粉 1 克、酒精少许调匀。将厚一层药敷于患处，用纱布包好固定，一般轻症 2~3 天可愈。

[功 效] 活血，消肿。用治冻伤初起局部红肿发痒未溃烂者。

[验 证] 治疗 128 例，其中 119 例，1 周内即愈，余 9 例好转，用至第 2 周痊愈。

三、疥 疮

疥疮是由疥虫所致的传染性皮肤病。此症初起形如芥子之形，故名疥疮。多因个人卫生不良，或接触疥疮病人而被传染。

1. 双黄油治疗疥疮

[方 剂] 熟鸡蛋 15 个，明雄黄 7.5 克，血竭 3.5 克。

[制用法] 把蛋黄压碎放入铜勺中，取文火熬炼，待蛋黄成糊状时，将研细的雄黄、血竭放入勺中，用竹筷搅动至油出、药渣呈黑黄色时取出，去渣留油，装入玻璃瓶中备用。使用时，先热水肥皂洗浴后，用双黄油反复擦患处，隔晚 1 次。

[功 效] 解毒、杀虫。

[验 证] 双黄油乃我家四世相传验方，临床具有简便廉验的特点。我治 30 例，均于用药 1~5 次后痊愈。

[备 注] 用药后要换衣服被褥，换下的衣服要煮沸消毒。用药期间忌食辛辣、油腻之物。

2. 乳鸽绿豆治干湿疥癣

[方 剂] 白乳鸽 1 只，绿豆 150 克，白酒 15 克。

[制用法] 将乳鸽除毛去内脏杂物，洗净，将绿豆纳入鸽腹内，加酒、加水炖煨至熟。可食可饮，每日1次。

[功效] 清热，解毒，润燥，止痒。用治疥癣发痒难忍。

[验证] 《新中医》杂志介绍读者反映良好。

3. 小蝌蚪治疥疮

[方剂] 小蝌蚪 100 只。

[制用法] 在青蛙产卵期捕捉小蝌蚪，用清水饲养 5 天，每天换水，待蝌蚪腹内污泥吐净后，把蝌蚪捞出放在凉开水中，再放入适量凉粉、蒜泥、醋和芝麻油一次喝下，即愈。

[功效] 清热解毒。用治热疮胎毒，疥疮等。

[验证] 据《老年报》1992 年 4 月版介绍：贵州矿务局刘××，患疥疮 3 年之久，曾经多家医院治疗未愈，疥疮从手指蔓延至全身，奇痒难忍。后用此法，服后 3 天，身上疥疮渐渐消失，已获痊愈。

四、黄水疮

黄水疮，又名脓疱疮，或浸淫疮，多发生于夏秋季节，以儿童罹患为多。

多因心脾湿势，蕴蒸皮肤，复外感风邪；或肺胃蕴热，外受湿毒，蕴蒸肌肤所致；或素体弱血虚，复感风热之邪所致。

本病随处可发，尤以头面、四肢、胸腹居多。始如黄豆大样脓疮，边缘焮红，渐蔓延，瘙痒异常，抓破流黄水，或浸淫成片，淋漓不净。

1. 脓疮洗剂外治黄水疮

[方剂] 黄柏、生大黄、苦参各 30 克，蒲公英、百部、银花各 20 克。

[制用法] 水煎外洗患处。有粘稠渗出液或结痂时，宜先以温热淡盐水轻洗清除后，再用本药液洗。每天 3~5 次。

[功效] 清热解毒祛湿，杀虫止痒消炎。

[验证] 王×，男，4 岁。6 天前觉头顶部有轻度灼痛，即头顶有铜钱大红片，2 天后觉有痒感，且痛，抓后局部有粘液而来诊。自觉轻度发热，查头部散在分布斑片状脓疱疹，渗出淡黄色混浊液，并见脓痂附着，周围有炎性红晕。耳后有 3 个蚕豆大淋巴结。可触及，压痛（+）。血液检查白细胞 12500/立方毫米，中性 80%，淋巴 20%。诊为脓疱疮。即用上方洗剂，5 天痊

愈，未见复发。

2. 麦秆灰治黄水疮

〔方 剂〕 陈小麦秆 1 握，白矾 30 克，松香 30 克，食油少许

〔制用法〕 先将白矾、松香放热锅内化开，晾凉研成细末，再将陈小麦秆烧成灰后与白矾、松香末调和，倒入少许食油拌匀。涂于患处，数次可愈。

〔功 效〕 燥湿解毒，去腐疗疮。治疗黄水疮有较好疗效。

〔验 证〕 据《家庭医生》杂志介绍许多读者来信反映上方多用有奇效。

五、癬 证

癬是一种传染性的皮肤病，是由霉菌侵犯表皮、毛发和指（趾）甲等浅部所引起。根据其发病部及特征常见有头癬、手足癬、体癬、甲癬、花斑癬等。

1. 大蒜治疗金钱癬证

〔方 剂〕 独头蒜（生）1 枚。

〔制用法〕 将独头蒜切片，直接搽患处，每天 2~3 次，每次搽 5~10 分钟。若湿癬（即有流脂者），搽后再用明矾粉外敷患部。一般 5~7 天见效，最多 15 天，直到痊愈。无任何副作用。

〔疗 效〕 5 年来共治 82 例，其中痊愈 67 例，显效 9 例，有效 3 例，无效 3 例。

〔验 证〕 王××，女，28 岁，农民，1982 年 12 月 6 日初诊。自诉 3 年前额部皮肤潮红而瘙痒，逐渐形成钱币状癬块，边缘清晰，环周鲜红色小丘疹，上有少量鳞屑，冬春较重，入夏轻，经中西药外用无效。嘱其照法应用 6 次而愈。

〔备 注〕 （1）搽药前将患部用温开水洗涤干净，保持患部清洁，切忌用生冷水洗。（2）先抓后洗，疏松汗腺，使药力直达病所深部，加速药效。（3）睡前要搽 1 次，其余酌定。（4）忌食易动风湿和油腻之物。

六、手 足 癬

手足癬是由霉菌感染而致手或足部的一种顽固性皮肤疾病。其病因可能与变态反应有关。手癬见于掌心、手指，日久累及指甲、手背。初起为散发小水

疱，渐至脱屑、损害增多扩大，融合成片，边缘有环状鳞屑，皮肤变厚，冬季可裂隙。足癣见于趾间、足底、足跟或右侧。分鳞屑型、水疱型、浸渍型和糜烂型4型：鳞屑型是最多见，不断发生鳞屑；水疱型次之，鳞屑与水疱交替发生；浸渍型又次之，趾间潮湿发白；重者皮肤脱落呈糜烂型，此型可引起霉菌疹或丹毒。丹毒为复发性，可致象皮腿。冬季裂隙，足跟尤多，常有痒感，裂隙时有痛感。

1. 苦参醋浸泡法治疗手足癣

〔方 剂〕 苦参、苍术、海桐皮、苦楝子、银花、地肤子各30克，花椒20克，川槿皮、百部、土茯苓、马齿苋、皂角刺各60克。

〔制用法〕 将上药放入瓦罐内，加食醋2500毫升，搅匀后封口，放阴凉处10~15天即可用。在浸泡前先清洗患处，将指脚甲削剪，以使药液浸透指脚甲根部。浸泡时将患处全部浸泡于药液内15~30分钟（时间越长越好）。连续浸泡15~30天即可根治。冬季可将药液加温后浸泡，夏天药液蒸发后可加添适量醋继续使用。

〔功 效〕 清热祛风，除湿杀虫。

〔验 证〕 我患脚癣已35年，多方治疗无效。每到深秋，脚跟皮肤便出皲裂，疼痛难忍，不敢着地。看到贵刊1980年第3期刊载的“苦参醋浸泡法治疗手足癣”的报道，抱着试试看的态度，在原方上增加秦皮60克，以酒精100毫升代醋，依法浸泡，竟获痊愈，至今1年未发，没有副作用。

〔备 注〕 引自《新中医》(2)。

2. 复方藿香洗剂治疗手足癣

〔方 剂〕 藿香25克，生大黄2克，黄精、明矾各10克，白醋500克。

〔制用法〕 以白醋浸泡上药24小时，经煮沸冷却后，将患部浸洗3~4小时。用药期间，5天内不用肥皂或接触碱性物质，一般1~2剂即可告愈。

〔功 效〕 治手、足癣两效。

〔验 证〕 于×，男，20岁。两腿股内侧起水疱，奇痒，搔破流水渗血，历时3年，经打针服药涂药膏均无效，并逐渐扩大至臂部，皮肤科诊为体癣，转中医治疗。即用原方泡洗，，每天1剂，3剂痊愈，至今无复发。

徐×，女，20岁。2年前小腹皮肤生癣，奇痒，抓破后灼痛流水，经打针涂药膏治疗，历时2年多不愈。即用上方法，3剂

显效，继用3剂痊愈，至今无复发。

3. 熏洗法治足癣感染

〔方 剂〕 萆薢 20 克，百部、黄芩、黄柏、白鲜皮、防风各 15 克，枯矾 12 克，广丹 3 克。

〔制用法〕 上药加水 1000 毫升，煎至 500 毫升，每天 1 剂，早晚各 1 次，每次熏洗患处 20 分钟。

〔功 效〕 治足癣感染良效。

〔验 证〕 陈××，男，48 岁。1987 年 8 月 20 日来诊。患双足趾跖面、足趾间糜烂瘙痒 2 月余，经用止痒水、脚气膏等治罔效。证见瘙痒处糜烂、渗液，两脚趾间红肿、灼热，行走困难，口苦，舌红、苔黄腻，脉弦滑。此以萆薢 20 克，百部、黄芩、黄柏、白鲜皮、防风各 15 克，枯矾 12 克，广丹 3 克，加水 1000 毫升，煎至 500 毫升，每天 1 剂，早晚各 1 次，每次熏洗 20 分钟。7 天后痊愈，随访 2 个月未见复发。

4. 治癣灵治癣疤

〔方 剂〕 土槿皮、羊蹄、槟榔、大枫子仁各 10 克，斑蝥 6 个。

〔加 减〕 如痛痒较甚者加樟脑 2 克（滤净后加入溶化）。

〔制用法〕 上药研碎，用 75% 酒精 100ml 浸泡 2 周后滤净，再加酒精到 100ml 瓶装备用。每用少许涂局部，日 1~2 次。

〔功 效〕 体癣、股癣、手足癣等久治不愈之顽癣。土槿皮、羊蹄清热燥湿解毒，为治癣之主药；斑蝥、槟榔、大枫子仁祛风杀虫，合而用之其力更强。以上各药现代研究认为对多种常见致病性皮肤真菌均有抑制作用。

〔验 证〕 李××，男，30 岁。就诊日期：1970 年 9 月 10 日。患者双下肢内侧皮肤瘙痒，呈环形、大小不等，边缘鲜明，微高出皮肤，夏季较重，屡治屡发，诊为体癣。予本方外涂，日 1~2 次，连用 2 周而愈。

〔备 注〕 阴囊处忌用；搽药过多可使局部皮肤癣起泡，切勿刺破，暂停药数日即自然吸收。注意清洁卫生。；勤洗澡，勤换衣被，并煮沸灭菌消毒。治愈后再用药 1~2 周，以防不彻底。

5. 涤癣净治疗手足癣

〔方 剂〕 木槿皮 30 克，苦参 10 克，白鲜皮 10 克，大枫子 10 克，密陀

僧 10 克（打碎），斑蝥 2 个，川椒目 5 克（研），硫黄 5 克（研），枯矾 5 克，升药底 2 克（研），轻粉 2 克，醋 1000ml。

〔加 减〕 足癣糜烂型去斑蝥加地肤子 20 克。

〔制用法〕 诸药入醋浸泡 3 宿，取醋泡手足。每次据需要量，置于料袋（塑料布形成），手或足插入醋袋内，包扎，勿令药液漏出或溢出。晚泡晨支两侧手足可轮泡，以不影响手足活动为是。视病情及药后反应，连日或隔日浸泡 1 次。连用 3 次为 1 个疗程。1 周内手或足勿浸水，足癣患者不宜穿塑料鞋及胶鞋。冬寒天勿用。

〔功 效〕 清热燥湿，祛风杀虫。

〔验 证〕 王某某，女，64 岁。两侧手癣多年，经治未愈而就诊。掌心皮肤增厚，皲裂干燥，连及指间、手背，环形鳞屑成片，时发小水疱，瘙痒，指甲肥厚空疏，白屑叠起。曾服灰黄霉素及外用癣药水、酮康唑、尿素软膏等涂敷，每收效一时，复又发作，日益影响洗衣洗菜等日常家务。诊为手癣。方用涤癣净：木槿皮 30 克，苦参、白鲜皮、大枫子（研）、密陀僧（打碎）各 10 克，斑蝥 2 个，川椒目（研）、硫黄（研）、枯矾各 5 克，升药底（研）、轻粉各 2 克，醋 1000ml。上药入醋浸渍 3 昼夜，取醋以塑料袋作容器，两手轮泡隔日 1 次，共各泡 3 次。2 周后复诊，两掌心及手背鳞屑脱落，指甲及掌心增厚皮肤变软。再以祛风地黄丸方配制 1 剂，连服 3 个月以巩固疗效。1 年后追访，两手皮肤光润，长出新生指甲。

〔备 注〕 本药有毒，切勿入口，用后药渣深埋。

七、皮肤瘙痒症

皮肤瘙痒症是仅有皮肤瘙痒而无原发性损害的皮肤病，可分为全身性与局限性两种。其临床表现为初起并无皮肤损害，由于搔痒难当经常搔抓，患处可出抓痕、血痂、色素沉着及苔藓样化或湿疹样变，有时可继发感染。

1. 苍艾洗剂治皮肤瘙痒症

〔方 剂〕 苍耳草、艾叶各 50 克，蜂房、白鲜皮、苦参、地肤子、川槿皮各 30 克，川椒、白矾各 20 克。

〔制用法〕 水煎滤渣，集药液，趁热洗浴，每天 1 剂，每天洗 1~2 次，每

次搓擦 15~20 分钟，7 天 1 疗程。

[功效] 祛风、清热解毒，杀虫止痒。

[验证] 莫××，女，47 岁，工人，1987 年 11 月 4 日来诊。自述患全身皮肤瘙痒症多年，每逢冬季更甚，不分昼夜。曾注射苯海拉明注射液和静注葡萄糖注射液、内服强的松、外搽硫磺软膏等，均不显效。笔者用该方煎水，嘱每次外洗 30 分钟，3 剂后瘙痒消失，追访 2 年未复发。

2. 凉血祛风汤治疗皮肤瘙痒症

[方剂] 生地 30 克，白鲜皮、玄参、苦参、银花、连翘各 15 克，地肤子、丹皮、赤芍各 12 克，紫草、荆芥、防风各 10 克，升麻、薄荷、甘草各 6 克，蝉蜕 3 克。

[制用法] 每天 1 剂，水煎 2 次内服；药渣再煎反复擦洗患处。一般用药 2 剂即可。

[功效] 治皮肤瘙痒症。

[验证] 叶××，女，17 岁。全身性皮肤瘙痒 1 月余。瘙痒以夜晚尤剧，奇痒难忍，经用西药内服及外用，稍有缓解，但停药后复剧痒。患者全身皮肤致密丘疹，并有抓痕、血痂及色素沉着；舌质淡红，脉弦细。即予上方，每天 1 剂，内服并外洗。2 剂后告愈继服 2 剂以资巩固，后未再复发。

3. 盐泔煎洗治皮肤瘙痒症

[方剂] 食盐、米泔水。

[制用法] 取米泔水 1000 毫升放食盐 100 克，置锅内煮沸 5~10 分钟，然后将药液倒于面盆中，温热以适应为度，用消毒毛巾蘸药液擦洗患部，早晚各 1 次，每次擦洗 1~3 分钟，一般 1~2 次见效，多则 3 天。搽洗前先抓后擦洗，以疏松毛孔，使药力直达病所。

[验证] 陈×，男，23 岁，1986 年 10 月 2 日诊。患周身皮肤瘙痒半月。开始服西药扑尔敏及外搽地塞米松软膏有效，但易复发，后则无效。经用盐泔煎洗汤治疗 2 天，瘙痒止，至今未复发。

[备注] 忌饮酒，戒鱼、虾、蟹等食物；洗澡时不用碱性强的肥皂。

4. 祛风止痒汤

[方剂] 蝉衣 15 克、徐长卿 15 克、当归 10 克、生地 15 克、红枣 10 个。

- [加 减]** 大便干燥或便秘者加生首乌 15~30 克。
- [制用法]** 每天 1 剂，煎 2 遍和匀，日 2~3 次分服。
- [功 效]** 蝉衣、徐长卿祛风止痒；生地、当归凉血养血、润燥；红枣健脾和胃营血。全方功能祛风止痒，养血润燥。
- [验 证]** 贺××，男，71 岁。就诊日期 1980 年 1 月 18 日。皮肤瘙痒 2 年余，冬季、夜晚之时更甚。皮肤干燥脱屑，血痂。搔痕累累，口渴，便燥。予本方及止痒液治之，用药 2 日后瘙痒减轻，1 周后痒解，皮肤滋润，大便亦畅。
- [备 注]** 避免刺激性食物，如烟、酒、咖啡等，切忌搔抓、摩擦、热水、肥皂擦洗或乱搽成药等。

5. 润肤止痒液

- [方 剂]** 生甘草 30 克、蛇床子 30 克。
- [制用法]** 煎 2 遍和匀，去渣浓缩成 200ml，瓶装备用。同时涂局部，日 2~3 次。
- [加 减]** 皮肤干燥加甘油 50ml，冰片 3 克（用酒或 75% 酒精 30ml 溶化后和入）。
- [功 效]** 生甘草润肤止痒；蛇床子祛风止痒；煎浓外涂有滋润皮肤，消除瘙痒之功。
- [验 证]** 张××，男，62 岁。就诊日期：1985 年 11 月 1 日。皮肤瘙痒 2 月余，皮表未见原发损害。入冬以来瘙痒异常，部位不定，皮肤干燥，脱屑。予本方外用，当日见效，2 周后瘙痒消除，皮肤滑润。

6. 滋血止痒汤治疗老年皮肤瘙痒症

老年皮肤瘙痒症，乃系老年人皮肤并发损害而瘙痒的一种皮肤神经机能障碍性皮肤病。其病因，可能与神经内分泌系功能失调和分解性代谢大于合成性代谢而引起皮肤神经功能障碍有关。

- [方 剂]** 熟、生地各 20 克，麦冬 10 克，天冬 10 克，当归 15 克，黄芪 15 克，黄芩 6 克，黄连 3 克，苦参 6 克，桃仁 10 克，红花 10 克，瓜蒌 10 克，赤、白芍各 15 克，何首乌 20 克，菊花 10 克，防风 6 克，蝉衣 6 克，生麦芽 10 克。
- [制用法]** 每日 1 剂，水煎 3 次日分 3 次服。1 个月为 1 个疗程。可制丸服。
- [功 效]** 滋血润肤，祛风止痒。

【验 证】 孙某某，男，79岁。农民。全身皮肤瘙痒反复发作10年余。曾选用扑尔敏、赛庚啉及中药外洗治疗，始用暂效一时，再用即无效应。饮食日益减少，四肢乏力，头重脚轻。瘙痒以夜晚睡眠时尤甚；遍身抓痕条条，搓破、渗液、结痂稀疏或密集成片；口干，苔黄燥干，舌质黯红，脉细弱。余无所征。诊为老年皮肤瘙痒症。证属燥热蕴肤，血虚风郁。治宜滋血润肤，祛风止痒。方用滋血止痒汤：生熟地、何首乌各20克，天麦冬、桃仁、红花、瓜蒌、菊花、生麦芽各10克，当归、黄芪、赤芍各15克，黄芩、苦参、防风、蝉衣各6克，黄连3克。上方连服31剂，并辅以洗方外用，瘙痒已止。继以本方制丸以巩固疗效。1年后追访，皮痒未发作，仅残留沉着色素。

7. 祛风止痒汤治皮肤瘙痒症

【方 剂】 荆芥、薄荷、蕲蛇、地肤子、蝉蜕各10克，防风、当归、威灵仙各12克，何首乌20克，甘草6克。

【加 减】 皮疹有糜烂渗液者加土茯苓、苍术、黄柏各12克；皮疹部位灼热红肿者加生地、金银花各15克，丹皮、玄参各12克；大便秘结者加大黄、枳实、厚朴各12克；热重者加黄芩、黄连、龙胆草各10克。

【制用法】 水煎服，每天1剂。

【疗 效】 治疗皮肤瘙痒症58例，治愈54例，好转4例；过敏性皮炎29例，治愈27例，好转2例；荨麻疹14例，治愈13例，好转1例；湿疹13例，治愈11例，好转2例。

【验 证】 李×，男，46岁，1978年1月14日就诊。全身瘙痒3年余，每遇冬令则瘙痒更甚，诊为皮肤瘙痒症。先后以抗过敏、镇静剂治疗均未见效。近日症状加剧，瘙痒难忍，彻夜难眠，全身遍布抓痕、血痂，胸背及四肢有色素沉着、表皮脱屑，舌红苔薄，脉弦滑。治以祛风止痒，养血润燥。处以祛风止痒汤去地肤子，加生地20克，丹皮、玄参各12克。服2剂后瘙痒大减，再进4剂，瘙痒全止，为巩固疗效，又连服6剂，随访迄今未见复发。

8. 蛇床子散治皮肤瘙痒

【方 剂】 蛇床子、明矾、百部、花椒、苦参各9~15克。

【制用法】 煎汤趁热熏洗患处或坐浴。

[验 证] 王××，男，28岁，1985年10月21日诊。谓半月前处理烂木头，引起全身发痒，两腿内侧及腰一周成片湿疹，色红奇痒，抓之渗液，局部化脓。曾诊为接触性皮炎，经外敷及抗过敏治疗无效。舌苔薄黄，脉浮数。给予原方水煎，每天洗2次。另以五味消毒饮加滑石煎服，每天1剂，3天后好转，6天后痊愈。

9. 大黄芒硝冰片治皮肤病

[方 剂] 生大黄、芒硝各100克，冰片20克。

[制用法] 将上药共研为细末，装瓶备用。按病变范围大小，取适当纱布一块展平，将药末均匀撒在纱布中央，约0.5cm厚，将纱布四边折褶包好，贴敷患处，用胶布固定或绷带包扎，以防药粉洒出，2~3天换药1次。

[验 证] 用本方治疗皮肤感染患者165例，经换药3~5次，均获治愈。

10. 三叶甘草液治皮肤溃疡

[方 剂] 女贞子叶、艾叶、皂角、茶叶各15克、生甘草10克。

[制用法] 将上药加水300毫升，煎至150ml，纱布过滤，取煎液外洗或湿敷溃疡面，每日2~3次。

[疗 效] 用本方治疗放射性皮肤溃疡患者32例，经用药10~20天，均获痊愈。

11. 四黄液治皮肤感染

[方 剂] 鱼腥草、生大黄、川黄连、黄芩、黄柏各15克。

[制用法] 将上药加水500ml，煎熬沸后20分钟，待冷至35℃左右即可应用。用时，取面积稍大于病灶范围的敷料或折至4~5层的毛巾，浸透上药液湿敷局部，每次敷40~60分钟，无需包扎。每日敷3~4次。敷料冷却后于温药液中浸透。每日1剂。

[验 证] 用本方治疗皮肤感染患者21例，经用药5~8天即可治愈。

12. 醋蒜治神经性皮炎

[方 剂] 蒜瓣、米醋各适量。

[制用法] 将较鲜蒜瓣洗净捣烂，用纱布包扎浸于米醋内，2~3小时取出。以包擦洗患处，每日2次，每次10~20分钟。

[功 效] 散瘀，解毒，杀虫。

13. 醋蛋治神经性皮炎

[方 剂] 米醋，鸡蛋。

[制用法] 将数枚鸡蛋浸于醋罐内密封，半月后取出，将鸡蛋打破，把蛋清黄搅匀贮于瓶内备用。每日多次涂擦患部，稍干再涂。

[功 效] 清热，解毒，散瘀。

[备 注] 如涂药期间出现皮肤刺激现象，可减少涂药次数。

14. 鲜丝瓜叶治皮炎

[方 剂] 鲜丝瓜叶。

[制用法] 将丝瓜叶搓碎，在患部摩擦，发红为止。每7天1次，2次为一疗程，两疗程可见初效。

[功 效] 清热，解毒，止血。

15. 米糠馏油治皮炎

[方 剂] 米糠馏油。

[制用法] 用糠馏油涂局部后以电吹风吹之（也可以火烘），每日1剂，每次10分钟。

[功 效] 杀虫，止痒。

以上12—15方经临床验证，疗效显著，均可推广应用。

16. 苦参制剂疗皮炎

[方 剂] 陈醋500毫升，苦参200克。

[制用法] 先将苦参用水洗净，放入陈醋中浸泡5天。用前先将患处洗净，用棉签蘸药涂搽患处，每日早晚各1次。

[功 效] 止痒去屑。

[验 证] 李×，男，35岁。见右大腿内侧有如手掌的皮损一块，刺痒5年，久治无效。使用本方共8天痊愈。1年后随访未复发。

17. 猪胆汁治脂溢性皮炎

[方 剂] 猪苦胆1个。

[制用法] 将苦胆汁倒入盆中，加入温水搅匀，洗头或患处，清除油脂状鳞屑后再用清水冲洗1次。每天洗1次。

[功 效] 泻内热、通血脉。用治脂溢性脱发及小儿脂溢性皮炎。

[验 证] 周××，女，12岁，经服上方后痊愈。

[备 注] 治疗期间，禁食肥肉、动物油脂等油腻食品。因为油腻食品可加重皮脂溢出

18. 豆腐皮治皮炎瘙痒

[方 剂] 豆腐皮、香油各适量。

[制用法] 豆腐皮烧存性，研成细末，以香油调和匀。涂患处，每日2次。

[功 效] 清热，润燥，止痒。用治过敏性皮炎之温痒难忍。

[验 证] 屡用效佳。

八、白 癜 风

白癣风以皮肤上出现无自觉症状的白色斑片为主症，又称为“白驳风”。可发于全身各部位，病程较长，迁延难愈，偶尔亦有自愈者。

1. 如意黑白散治白癜风（白斑病）

[方 剂] 旱莲草 90 克。白芷、何首乌、沙苑蒺藜、刺蒺藜各 60 克，紫草 45 克，重楼、紫丹参、苦参 30 克，苍术 24 克。

[制用法] 上药研细末，收贮勿泄气，每天服 3 次，每次服 6 克，开水送下。另用肉桂 30 克，补骨脂 90 克，水酒各半，浸泡 1 周，温水沐浴后，外擦患处。

[验 证] 近 10 年来，笔者采用《老中医医案医话选》治白癜风的如意黑白散及外用方，临床验证 10 余例皆效。追踪观察 4 例，其中 3 例内服散药 2 剂，外用药 1 剂，颜色转乌红，与健康皮肤无异；另 1 例则纯涂外用药约 2 剂半，治 1 年愈。4 例痊愈，3 年皆未复发，且 4 例均为中青年劳动者，常露胸赤臂裸腿接受日照较多，外用药均采用上等肉桂。

2. 三季红酊治疗白癜风

[方 剂] 三季红叶 20 克，酒精 100 毫升。

[制用法] 将三季红叶研末，泡于酒精中，1 周后可用。

每天在日光浴前后各涂三季红酊 1 次，如缺乏日光浴条件也可照常涂用。女性外阴部忌用。

（日光浴的方法，是将患部暴露在日光中，要因时、因人、因地制宜，循序渐进，每天 1~2 次（最好时间在上午 8~10 时），每次自 5 分钟开始，逐次增至每天 4 小时为止。）

医者可根据病人的具体情况，适当配合应用一些中草药、谷维

素、硫酸亚铁等。治疗时间，一般1~6个月。

[疗效] 用本酞治疗145例，其中痊愈68例，显效43例，有效20例，无效14例。

[验证] 高××，男，42岁，工人。自述背部患白癜风已4年余，多方治疗无效而求治。即采用外涂三季红酞及日光浴，共治疗3个月痊愈（背部患处皮肤完全变成黑油油的酱紫色）。

李××，女，39岁。下肢患白癜风已6年，逐渐扩大已达阴唇部，曾治疗3年未效。用三季红酞涂皮肤患处（阴唇涂后剧疼，只单纯涂腿部），经外涂及口服药5个月痊愈。唯阴唇部尚遗留1小块不愈，但3年观察未见扩大。

[备注] 涂药后皮肤过敏或日光浴后局部出现水泡者，应及时停药和处理。

3. 马齿苋配合日光浴治疗白癜风

[方剂] 马齿苋20克（鲜品加倍），红糖10克，醋70毫升。

[制用法] 诸药煮沸，过滤后取药液置有色瓶内备用。或将鲜马齿苋洗净、切碎、捣烂，用纱布包好，挤出汁液，瓶装备用（每100毫升加硼酸2克，使pH值在5.1，可久贮使用）。用时以棉签蘸药液涂患处，每天1~2次（最好晚上睡前涂1次）。患处晒太阳，每天从10分钟开始，逐日增加至1~2小时。日光浴时注意防止感光性皮炎发生。

[疗效] 治疗125例，痊愈57例，57例，无效11例（其中8例治疗半途而废），总有效率为91.2%。

[验证] 我是一位农民，现年19岁，颈、背部患白癜风已2年，经当地及上海、南京各医院皮肤科诊治，未见好转，反而日渐扩展如手掌大，思想上悲观失望。当我看到《广西中医药》1981年增刊号有关马齿苋治白癜风的验方后（原方刊于1978年第4期），心里很高兴。我用该方坚持治疗一年，颈部白斑已不明显，次年夏天皮肤就转为正常，经3年观察，未见复发。

4. 补骨脂酞治疗白癜风

[方剂] 补骨脂20~50克，95%乙醇100毫升。

[制用法] 将补骨脂捣为粗粉，置于95%乙醇100毫升中浸泡5~7天。涂于患处，每天1~2次。

[验证] 王×，女，18岁，农民，于1991年3月8日就诊。主诉面部生

了几块难看的白斑，曾多处求医屡治未效，特来此诊。诊见右额发际2块似光泽形白斑，左右颊3块如5分钱硬币形白斑，均边缘清楚，斑内毛发变白，但不痛痒。诊为“白癜风”，用补骨脂20克，捣为粗粉，放在95%酒精50毫升中，浸7天后，每天用棉球蘸药液涂抹患处数次。15天后白斑隐没，一月后皮肤正常，看不到斑痕。越半载，她带同病患者张、吴二人来诊，按法治之亦效。

九、扁平疣

扁平疣是一种较常见的病毒性赘生物。临床可见发生于颜面、手背和前臂的米粒至高粱粒大的扁平丘疹，颜色呈黄褐色或正常皮色，表面无炎症，多数散在，也可密集。在祖国医学中统属于疣类。

1. 木贼外洗方治疗扁平疣

[方 剂] 木贼、银花、香附各30克，白芷、桔梗、红花、甘草各10克。

[制用法] 上药加水2000~2500毫升，泡10~20分钟，煮沸后以温热适度洗之。(1)洗时可用纱布或毛巾在患处稍用力搓之，以促使药物向疣组织内渗透，每次洗20分钟或药液凉为止。(2)洗时其疣表面微红为佳，洗后片刻即可看到疣之表面的药迹，7天左右结痂（疣）脱落，不留任何痕迹而痊愈。

[验 证] 张××，女，21岁，1987年4月15日诊。患者于1986年6月即感两面颊部皮肤发红，痒感，出小丘疹如黄豆大，簇聚成片，并波及到颜面和前额。后来我处，我试用木贼外洗方加地肤子30克治疗，3剂药后，疣表面即干枯脱皮，瘙痒大减，再用3剂，疣体消失，肤色如初，没留任何痕迹。

2. 消疣汤

[方 剂] 板兰根30克、紫草15克、马齿苋30克、生苡米50克（另煮熟食之或研细和服）。

[加 减] 如患处发痒者加蝉衣10克，以祛风止痒；药后恶心或便溏者加藿香10克，以健脾胃。

[制用法] 每天1剂，煎2遍，先用水浸泡1~2小时再煎。第1次煎30分钟后滤净，药渣再加水煎30分钟，滤净与头煎和匀，日3次分服。扁平疣并可用此方煎汤外洗。

[功效] 扁平疣、传染性软疣及寻常疣三者之病由均为外感毒邪蕴结肌肤所致，现代认为都是病毒引起，故以板兰根、马齿苋、紫草凉血清热解毒，现代研究上药均有抗病毒作用；生苡米清湿热而消疣。合而用之为抗病毒消疣之良方。

[验证] 张××，男，18岁。就诊日期：1980年8月16日。患者双侧面部皮疹3月余，为针头大小正常皮色坚实的扁平丘疹，时有轻微痒感。予本方治疗，内服外洗连用3周而愈。

[备注] 治疗务须彻底，以免复发。

十、烂脚丫

烂脚丫指脚趾间发生潮湿、糜烂、甚则出现溃疡的病证。

1. 梅叶酊治疗烂脚丫

[方剂] 腊梅树鲜叶（嫩叶更佳）100克，60%酒精适量。

[制用法] 将腊梅树叶洗净，剪碎，装入干净瓶内，然后加入60%酒精300毫升，密盖，浸泡7~8天左右，用消毒纱布过滤，然后将滤液装瓶密盖备用。

嘱患者临睡前用温水将烂脚趾丫洗净，然后用消毒棉签蘸取药液，涂擦在烂脚丫缝内，最好一天用药1~3次，直至痊愈。

[验证] 余××，男，58岁。干部。右脚趾缝间潮湿糜烂，覆盖白皮，渗出粘液较多，将表皮除去后，露出红色底面，见一个个小孔，伴剧烈瘙痒，且有一股难闻的特殊臭味。曾用2%碘酊和癣药水先后治疗月余，疼痛难忍，无疗效。后改用梅叶酊涂擦患部，每天2次，涂擦1周而获痊愈。追访2年，未见复发。

十一、带状疱疹

带状疱疹是由水痘——带状疱疹病毒所引起的一种急性疱疹性皮肤病。其临床特点为数个簇集水疱群，排列成带状，单侧分布，伴有明显的神经痛。可发生于任何部位，多见于腰部。

1. 冰硼散治带状疱疹

[方剂] 冰硼散、凡士林。

[制用法] 用冰硼散、凡士林各适量，调成糊状，敷于患处。每天1次。

[验证] 廖××，男，24岁，1989年4月16日诊。腰背部生里面粒状水疱5天，疼痛微痒，逐渐增多，且向背部蔓延，周围皮肤微肿胀、灼热。曾用抗生素类药物治疗，效果不显，而且继续扩展。食少，头晕，口苦，大便2天1次，小便短赤，舌质红、苔薄白，脉弦滑。即选上方，以冰硼散4支，加凡士林1:3量调成糊状，敷于患处，每天1次，4天即告痊愈。

2. 龙韭液清热凉血

[方剂] 活地龙（即蚯蚓）2克，鲜韭菜根30克。

[制用法] 将上两味洗净，捣烂，加少量香油调拌均匀，置瓶内放阴凉处备用。使用时取其液涂患处，每日2次，外用纱布固定。

[功效] 清热凉血、解毒止痛。主治带状疱疹。

[验证] 据《河南中医》介绍，用此方治疗带状疱疹26例，均在发病2~3天用药，2~5天内痊愈。治愈后局部不留瘢痕，无毒性及不良反应。

3. 仙人掌治带状疱疹

[方剂] 新鲜仙人掌、粳米粉、米泔水各适量。

[制用法] 仙人掌去针及绒毛，切片，捣烂，再加入粳米粉和米泔水适量。捣和均匀使成粘胶状以备用。用时将已制好的胶状物敷于患处，外盖油纸，绷带包扎固定。每隔3~4小时换药1次。

[功效] 除痒止痛。

[验证] 据《浙江中医》介绍，仙人掌清热解毒，经用此方治疗30例，分别观察，一般1~4天即结痂痊愈。

4. 杉木炭方治带状疱疹

[方剂] 杉木炭（或松毛灰）若干，冰片少许，麻油适量。

[制用法] 将杉木炭研细，加冰片，用麻油调成糊状。以棉签或毛笔蘸敷患处。每隔2~3小时局部干燥即搽敷1次。

[功效] 除痒止痛。

[验证] 治疗30例，分别于1~4天结痂痊愈，无毒副作用。

5. 蜂胶制剂治带状疱疹

[方剂] 蜂胶15克，95%酒精100毫升。

[制用法] 将蜂胶加入95%酒精内，浸泡7天，不时振摇，用定性滤纸过滤后即得蜂胶酊。使用时用棉签蘸蜂胶酊涂患处，每日1次。

涂药期间注意保持局部皮肤干燥。

[功效] 解毒，燥湿，止痛。主治带状疱疹。

[验证] 潘×，女，50岁。开始左胸背部有蚁爬感，继而剧痛且出现有水泡。检查：沿右侧第四肋至胸背部有八簇水泡，呈带状分布，水泡透明，有红晕。同侧腋窝淋巴结如花生米大小，有触痛。诊断为带状疱疹。用上方治疗用药5天痊愈。

6. 外用蜈蚣粉治带状疱疹

[方剂] 蜈蚣适量。

[制用法] 将蜈蚣置于瓦片上，以文火焙干，研为细粉，加少许香油调成糊状，备用。用时涂搽患处，一般每日3~5次。

[功效] 解毒，镇痛。

[验证] 刘×，男，18岁。因到河塘游泳，2日后左肋处起不规则的红斑，继则出现成群的粟粒至绿豆大的丘疹，迅即变成水泡，透明澄清，疱壁发亮，周围红晕，患部胀痛，有灼热感，难以忍受。在医院皮肤科诊断为“带状疱疹”。给以炉甘石洗剂外搽，肌注维生素B₆无效。后用蜈蚣粉外搽患处，1日痛减，3日水泡消失，5日结痂痊愈。

7. 马齿苋膏治带状疱疹

[方剂] 新鲜马齿苋100克。

[加 减] 如已破溃者加黄连粉10克同敷。

[制用法] 将新采的鲜马齿苋洗净、切碎，捣成糊状涂敷患处，日换1~2次。如已破溃用野菊花煎汤洗净后再敷药。

[功效] 本品具有清热解毒、凉血消肿之功，对热毒疮疡内服外敷均佳，故用以治疗本病亦有良效。

[验证] 韩××，男，37岁。就诊日期：1987年11月15日。患者因重症肝炎用激素治疗34天，左臂及大腿外侧出现成群的斑丘疹及米粒大小之疱疹，呈带状分布，基底部发红，剧痛难忍，诊断为带状疱疹，乃停激素予本方外敷，每日1次，当日疼痛明显减轻。2日后疼痛消失，疱疹变瘪，5日斑丘疹消退，疱疹结痂而愈。

[备注] 疱疹切勿刺破，以防继发感染。

十二、荨麻疹

荨麻疹是一种常见的过敏性皮肤病，初起皮肤瘙痒，抓后皮肤迅即发生大小不等之风团，剧烈瘙痒，此起彼伏，骤起骤消，甚至累及粘膜，出现腹痛、腹泻、喉头水肿等症状。临床上常用的偏方主要如下。

1. 程氏秘方治疗荨麻疹

[方 剂] 苍术、黄柏、荆芥穗、蛇床子、白鲜皮、粉丹皮各 12 克，防风、全蝎、蝉蜕、连翘、茯苓各 10 克，地肤子、乌梢蛇各 15 克，甘草 7 克。

[制用法] 水煎服。

[功 效] 治疗荨麻疹，疗效甚佳。

[验 证] 侯××，女，26 岁。自述 1970 年开始患此病，以后每年春秋两季，遇风寒侵袭则发，经中西医治疗无效。于 1973 年 8 月来诊。经服本方 18 剂而痊愈。后患者自服 5 剂以求根治，追访 5 年未复发。

[备 注] 有的患者服头一二剂时，病情可能加重，这是除风药驱邪出表之故，也是向愈的象征，继续服药很快即可痊愈。

2. 十全大补汤加味治荨麻疹

[方 剂] 黄芪、地肤子各 30 克，肉桂、制附子各 6 克，党参、白术、茯苓、赤芍、白芍、当归各 12 克，熟地黄 15 克，川芎、乌梢蛇、炙甘草各 9 克。

[制用法] 上方水煎，每天 1 剂，分早晚 2 次服。服药 5 剂后症状减轻者，为药症相符，可继续服；反之，则为本方力所不及。

[验 证] 陆××，女，38 岁，1982 年 11 月 2 日初诊。自述全身出疹块已 6 年余，反复发作，时隐时现，间多方用中西药治疗，效果不佳；平素自觉身倦乏力，畏寒肢冷，纳差，失眠，月经量多色淡。舌淡，脉细弱。此为气血两亏，卫外不固，复为风寒之邪相克而发病。治宜补益气血，祛风止痒。拟上方 3 剂。服 3 剂后，自觉病情好转大半。后继服 20 余剂，告治愈。

3. 艾叶酒治疗荨麻疹

[方 剂] 白酒 100 克，生艾叶 10 克。

〔制用法〕 上药共煎至 50 克左右，顿服。每天 1 次，连服 3 天。

〔验证〕 李××，男，27 岁，1987 年 3 月 4 日诊。全身出淡红色大小不等的风团，剧痒，反复发作 3 个月。诊断为慢性荨麻疹。经上方治疗 3 天痊愈，随访 1 个月未见复发。

4. 蟾蜍汤治荨麻疹

〔方 剂〕 活蟾蜍 3~4 只。

〔制用法〕 去内脏洗净后放入砂锅内煮极烂，用纱布过滤去渣，留汤备用。搽洗患处，日 3 或 4 次。

〔功效〕 解毒，消肿，止痛。用治丘疹性荨麻疹。

〔验证〕 《新中医》介绍该方反映效果理想。

〔备注〕 本药有毒，不可内服。

5. 芝麻根治荨麻疹

〔方 剂〕 芝麻根 1 握。

〔制用法〕 洗净后加水煎。趁热烫洗。

〔功效〕 清热，散风，止痒。用治荨麻疹。

〔验证〕 钱×，男，43 岁，患荨麻疹，多方医治效果不佳，后用上方痊愈。

6. 韭菜治荨麻疹

〔方 剂〕 韭菜 1 把。

〔制用法〕 将韭菜放火上烤热。涂擦患部，每日数次。

〔功效〕 清热，散风。用治荨麻疹。

〔验证〕 毛×，女，36 岁，患荨麻疹，用韭菜方治愈。

7. 祛风凉血汤

〔方 剂〕 蝉衣 10 克、防风 9 克、僵蚕 10 克、炒黄芩 15 克、丹皮 10 克、生地 15 克。

〔加 减〕 大便秘结加生大黄 5~9 克。

〔制 法〕 每天 1 剂，煎 2 遍和匀，日 2~3 次分服。

〔功效〕 蝉衣、防风、僵蚕祛风止痒；黄芩清肺热；丹皮、生地凉血。

〔验证〕 方××，女，25 岁，干部。就诊日期：1987 年 7 月 15 日。皮疹时起时没，已经 2 周。疹起时高出皮肤，大小不一，色红而痒，时感躁热，口渴便结。舌红苔薄黄、脉数。予本方治疗。3 剂后疹减大半，大便亦畅，5 剂后皮疹及躁热均解。

〔备 注〕 忌辛辣刺激及海味动风之食物，禁烟酒。

8. 黄芪桂枝汤

〔方 剂〕 生黄芪 30 克、桂枝 10 克、蝉衣 15 克、白芍 10 克、炙甘草 6 克、生姜 10 克、大枣 10 个（劈去核）。

〔加 减〕 夜间搔痒影响睡眠者加酸枣仁 15 克、石菖蒲 15 克，宁心安神。

〔制用法〕 每天 1 剂，煎 2 遍和匀，日 3 次分服。

〔功 效〕 生黄芪补气固表；桂枝解肌散寒；蝉衣祛风止痒；白芍敛阴和营；姜枣调和营卫；甘草协和诸药。风寒解，营卫和，肌表固，如是则正气存内邪不可干，瘾疹发作自当减少矣。

〔验 证〕 赵××，男，35 岁，干部。就诊日期：1980 年 1 月 25 日。患荨麻疹 3 年，时起时没，寒冷时为甚，疹色淡红或苍白，大小不一，搔痒无时，舌苔薄白，脉缓。屡用扑尔敏，苯海拉明等治疗，疗效不好。予本方治疗，服 1 周后发作减少，连服 2 周停止发作。

〔备 注〕 避免接触诱发因素。

十三、银 屑 病

银屑病乃系非感染性的一种红斑鳞屑性慢性皮肤疾病。为皮肤科难治病之一。病程漫长，可反复发作，常迁延几年甚至数十年。迄今病因未明，可能与自体免疫功能低下和神经内分泌功能失调有关。无传染性，但有遗传性。临床表现一般有五型：一是寻常型；早期为冬发夏愈或冬重夏轻，后期无规律性；分布于头皮及四肢伸面，间或仅见于头皮或四肢屈面；损害为皮肤表面带白色基底呈红色丘疹，渐可融合成片，边缘明显，上覆多层银白色鳞屑，刮去有发亮薄膜，抓之有点状出血；皮损形态有点滴状、钱币状、盘状、地图状等不一，皮损活动有进行期、静止期、退行期；慢性易复发，组织病理有诊断价值。二是脓疱型：多发生于手掌足跖，严重者可波及全身；损害为脓疱，指甲病变较常见；可先有寻常型或伴有关及全身症状。三是渗出型：皮肤损害同寻常型，但炎症明显而有渗液和结痂，多伴有关节病变。四是关节炎型：多侵及小关节，间或侵及肘膝等大关节，颇似类风湿性关节炎，重者发生关节僵硬；虽有上述皮肤损害，但以渗出型和脓疱型多见。五是红皮病型：病损表面受刺激或处理不当，可发展为其他型。

1. 消屑汤治疗银屑病

[方 剂] 当归、生地、乌蛇、玉竹、蝉蜕、刘寄奴各 20 克，苦参、白鲜皮、黄芪各 30 克，地肤子、蜂房各 50 克，防风 25 克，羌活、独活各 15 克。煎服。

[制用法] 大枫子、黄柏、白矾各 30 克，苯甲酸、水杨酸各 15 克，冰片、狼毒各 10 克，均制细粉，加白凡士林 50 克混合调匀即得，外用。内服药每剂水煎 3 次，混合浓缩至 450 毫升，每天早、午、晚服，每次服 150 毫升。病灶处涂上消屑膏，用蜡纸或薄纸严密敷盖，并用绷带包扎紧实。每隔 1 周换药 1 次。如癣灶面积大，可分次涂消屑膏治疗。

[功 效] 治银屑病。

[验 证] 赵××，女，22 岁，未婚。患银屑病 3 年，躯干部泛红，四肢散发，曾先后经各医院多法治疗不效，于 1982 年 1 月 16 日求治，采用本法治获愈，随访至今未复发。

2. 滋血熄风汤治疗银屑病

[方 剂] 生、熟地各 20 克，何首乌 30 克，银花藤 30 克，威灵仙 10 克，蚤休 10 克，山豆根 10 克，白鲜皮 10 克，紫草 10 克，赤芍 30 克，苦参 10 克，僵蚕 10 克，广地龙 10 克，川牛膝 30 克，火麻仁 10 克，大黄 3~6 克，车前子 10 克，当归 30 克，蝉衣 6 克。

[制用法] 每日 1 剂，水煎 3 次分次服。90 剂为 1 个疗程。或制丸服。进行期服汤剂，静止期服丸剂。

[功 效] 清热解毒，滋血熄风。

[验 证] 马××，女，38 岁，教师。头部发间及左下肢腓肠部鳞屑堆积瘙痒，时轻时重 10 年余，曾经某医院诊为银屑病，服中西药治疗无效。近期症状加重，故来就诊。查头顶偏左发间，表面上覆多层银白色鳞屑，融合成 5cm×3cm 大小两块，左下肢部覆盖银白色鳞屑 3cm×3cm 大小一块。边缘清楚，刮去鳞屑，呈发亮薄膜，瘙痒异常。有时抓去鳞屑，脱皮色红，痛痒麻木。夏轻冬重。脉数，苔干舌红。诊为银屑病（寻常型）。证属血虚风燥，瘀热蕴肌。方用滋血熄风汤：生熟地、何首乌、银花藤、赤芍、川牛膝、当归各 30 克，威灵仙、蚤休、山豆根、白鲜皮、紫草、苦参、僵参、广地龙、火麻仁、车前子（布包）

各 10 克，蝉衣 6 克，大黄 3 克。上方连服 82 剂，又制丸剂续服 3 个月。2 年后追访，皮疹消退，亦未复发。

十四、接触性皮炎

接触性皮炎，顾名思义乃是接触到某种东西后，引起皮肤发炎的现象。例如，长年油漆的工人引起的皮肤炎、无花果引起的皮肤炎、婴儿接触尿布所引起的皮肤炎等。最近，因药品、化学物质及化妆品所引起的皮肤炎，已有逐渐增加的趋势。

1. 海螃蟹治接触性皮炎

[方 剂] 海螃蟹。

[制用法] 用海蟹煎汤洗患处，或将海蟹捣烂涂敷患处。

[功 效] 清热解毒。用于接触性皮炎。

[验 证] 《家庭医生》杂志介绍读者反映效果良好。

2. 鹌鹑蛋防止过敏反应

[方 剂] 鹌鹑蛋 1 个。

[制用法] 打破生饮。

[功 效] 理虚固表。可在几个星期内不发生过敏反应。可防止如食鱼虾后皮肤过敏或呕吐以及注射药物引起的过敏等。

[验 证] 《中医学》期刊杂志介绍此方经多次验证疗效理想，值得推广。

十五、鹅掌风、鸡爪风

鸡爪风是由于手指或脚趾肌肉发生持续性痉挛所致，多表现为功能障碍，痉挛持久过长可导致手指或脚趾的缺血性坏死。

1. 海带白肉汤治鹅掌风

[方 剂] 海带丝 120 克，白肥猪肉 100 克。

[制用法] 白水煮熟，不放任何调料。连汤及海带、白肉同食。

[功 效] 消痰软坚。用治鹅掌风。

[验 证] 经多次临床验证，疗效理想。

2. 醋治鹅掌风

[方 剂] 醋。

〔制用法〕 用塑料袋装醋，将手泡在醋中一夜，数次可愈。

〔功效〕 散瘀，解毒，杀虫。用治鹅掌风、灰指甲。

〔验证〕 疗效确切。

3. 黑木耳苕麻根治鸡爪风

〔方剂〕 黑木耳 120 克，苕麻根 120 克，血余炭 30 克（中药店有售），糯米 500 克，黄酒适量。

〔制用法〕 将苕麻根炒焦，其余三味晒干，共研为细末，用水和匀，上笼蒸熟。每日早晚各 1 次，每次 9 克，黄酒送服。

〔功效〕 和血养荣。用治鸡爪风。

〔验证〕 据河北《中医验方汇选》介绍，某女患鸡爪风，疼痛难忍，服药甚多，终无效验，后用本方 1 剂痊愈，2 年后复发，又服本方治愈，多年不犯。

4. 土槿羊蹄醋治鹅掌风

〔方剂〕 土槿皮 9 克、羊蹄 15 克、烟胶 9 克、明矾 9 克、皂角子 9 克、凤仙花汁 30ml，米醋 250ml。

〔加 减〕 患处有小脓疱者加黄连 9 克，以清热解毒；表皮干燥皲裂者去明矾、皂角子，加当归 9 克、紫草 9 克，以活血凉血润燥。

〔制用法〕 上药研末，用米醋 250ml，浸泡 24 小时后，煮沸待温和入凤仙花汁，装入塑料袋或橡胶袋中套患手，24 小时后除去，2 天不要下水。

〔功效〕 土槿皮、羊蹄清热燥湿，消肿杀虫，治癣；醋、烟胶、皂角子、明矾杀虫止痒；凤仙花汁软坚透骨，加强药物之渗透性，使之深入以提高疗效。

〔验证〕 张××，男，50 岁。就诊日期：1956 年 8 月 20 日。患者双手掌及手指时起小水泡搔痒，已经年余，皮肤增厚，冬季皲裂，近几个月来指甲肥厚变白，诊为鹅掌风（手癣）。予本方 3 剂，每周 1 剂，3 周而愈。

〔备注〕 愈后忌用碱性洗涤剂洗手。如有足癣要同时治疗，以免手足交叉感染。

十六、痱子

痱子又名红色粟粒疹，在炎夏天热的季节最易发生。这是因为天热汗液分泌过多而停积于皮肤表面，汗液含有盐分，刺激皮肤，故产生痱子。尤其是幼儿的新陈代谢比成年人迅速，皮肤敏感，特别容易出汗，如果汗液排泄受阻，或因日光照射，皮肤发红，就会产生小水疱，十分痛痒。

发生的部位，以头面、胸、腹、肩颈、肘窝和股部较多，于皮肤汗孔，发生密集而微露于皮肤面的尖状红色小丘疹，能迅速化为小水泡，经过几天后就干燥了，成细小鳞屑，一到天气温度降低，又会自行消退。

1. 枸杞梗叶消除痱子

〔方 剂〕 枸杞梗带叶适量。

〔制用法〕 将枸杞梗及叶洗净，放入盆内加水煮1小时，晾晒。冲洗身上的痱子，每日2次。

〔功 效〕 清血热，止痛痒。用治夏日皮肤长痱子、疮疖。

〔验 证〕 《家庭医生》杂志介绍此方效果理想。

2. 绿豆滑石粉治小儿痱子

〔方 剂〕 绿豆粉、滑石粉等分。

〔制用法〕 将两粉和匀。用时洗净患处，扑撒于痱子上。

〔功 效〕 清热解毒。用治炎夏长痱子成疮。

〔验 证〕 李×，女，6个月，患痱子，用上方，治愈。

3. 黄瓜方治小儿痱子

〔方 剂〕 黄瓜1条。

〔制用法〕 洗净，切片。涂擦患处，每日洗澡后及临睡前各1次。

〔功 效〕 清热解毒。用治痱子。

〔验 证〕 王×，男，两岁，患痱子用上方症退。

注：痱子患者注意事项：

一、每天至少洗澡一次，保持身体的清洁。

二、居住处应空气流通和凉爽。

三、不可用手挤弄，衣服要勤换洗。

四、刺激性食品要忌口，如茶和咖啡之类。

五、避免强烈的日光照射。

十七、痤疮

痤疮是青春期常见的皮肤病，初起时皮疹为针头或芝麻大小，与肤色相同或红色，顶端日渐呈现黑头，可挤出黄白色粉渣（即粉刺），乃遗留凹陷疤痕。本病多因饮食不节，过食辛辣油腻之品，郁湿生热，凝滞肌肤，或肺经风热熏蒸，蕴阻肌肤而成，临床常用的有效的单方、偏方主要如下：

1. 丹紫黄白汤治痤疮

〔方 剂〕 丹参 20 克、紫草 10 克、制大黄 9 克、白花蛇舌草 20 克、神曲 15 克。

〔加 减〕 脓疱严重者加野菊花 15 克，连翘 15 克，清热解毒，黄芪 20 克托里排脓；痒者加蝉衣祛风止痒；同时外涂冰片三黄散：冰片 3 克、川黄连 10 克、生大黄 10 克、硫黄 10 克，研极细末，香油调涂之，日 2 次。

〔制用法〕 每天 1 剂，煎 2 遍和匀，早晚分服。

〔功 效〕 丹参活血化瘀，近代研究丹参酮抗菌消炎，有报告用以治疗痤疮；紫草凉血解毒，近代研究有抑菌消炎作用；大黄有泻火凉血，通便解毒之功；白花蛇舌草清热解毒为治疗疮疖肿毒之良药。因为以上四药均为寒凉之品，恐碍脾胃，故用神曲以保护脾胃。

〔验 证〕 熊××，男，18 岁。就诊日期：1986 年 8 月 10 日。面部痤疮 2 年余，伴发丘疹、脓疱、肿痛，此伏彼起、层出不穷，大便干燥，2~3 日一解。予本方服用 1 周，丘疹、脓疱均减，大便通畅，2 周后痤疮旧者渐消，新者未起，脓疱痊愈。

〔备 注〕 不能用手挤压损害，预防感染。保持皮肤清洁，常用温水香皂洗脸，以除去油垢。少吃脂肪和糖类，忌烟酒及辛辣刺激性食物，多吃蔬菜，纠正便秘。

2. 紫丹饮治痤疮

〔方 剂〕 紫草 10 克、丹参 15 克。

〔加 减〕 有脓疱者加野菊花 10 克，黄芪 15 克。

〔制用法〕 每天 1 剂，开水泡 2 小时后，早、中、晚分 3 次服之。

〔适应证〕 青年男女颜面上胸及背部等皮脂腺发达部位痤疮或伴发丘疹、

脓疱者。

[功效] 本方比较简单，专为无条件服煎剂者而设。丹参、紫草同用活血化瘀，凉血解毒，前已介绍不再重复。

[验证] 翁××，男，19岁。就诊日期：1987年10月20日。面部痤疮2年余，伴发丘疹、脓疱；既痛又痒，疤痕累累。因学习紧张服煎剂不便，予本方开水泡饮之。饮2周后，丘疹、脓疱渐减，痛痒均止，饮1个月后，丘疹、脓疱全愈。

十八、鸡 眼

鸡眼产生的部位，多在脚底压力点部位，初生时往往会误认为是鞋底磨擦所长的老皮，稍久，会有不平的感觉，且渐粗硬，行走时如垫脚般很不方便，甚至疼痛不已。其形状透明浑圆，中有绿豆般大小的颗粒，左右脚常对称而生，故叫做“鸡眼”。

此症发生的原因，可能是终日甚少走动，或是鞋袜过紧，而影响脚底肌肉活动，导致血液循环不畅而引起。对于经常赤足着地，终日奔波的人，就不大会有鸡眼的症状。如发现有脚心老皮渐硬，而有结块的现象时，应每晚以热水泡脚，并于泡后用毛巾不断摩擦，同时放宽鞋袜，可达到预防的效果。

[验方一] 以脚盆盛热水，倒入米酒约一杯，将脚浸入，至水冷为止，再拭干脚，以醋滴于患处，并速以刀片，轻轻刮除四周之鸡眼皮，对中间之眼珠切勿猛然铲除，如此持续日久，鸡眼自会平复。

[验方二] 乌梅肉捣烂，加少许醋，和盐水调匀，贴之即消，效果不错。

[验方三] 患部用热水浸泡擦洗拭干，再涂以乌梅膏，每天一次，此法亦可一试。

[验方四] 大蒜两粒捣烂贴在患部，用布包好以免脱落，约四五小时后，患部会有发烧和刺痛感，到后来变成剧痛，此时，将蒜泥洗掉。第二天，患部四周会起泡，以针挑破，会流出黄色液体，此时，用灶灰调水成糊状，用布轻轻洗擦，鸡眼自会愈擦愈薄，一直洗至鸡眼的四周微有血丝出现为止，如此约七八天，鸡眼自然消失，此法虽疼痛，但值得一试。

[验方五] 韭菜连茎带根者，切碎，用研钵磨过，再以纱布过滤，绞出粘液，用来涂患部，一天换一次即可，约十天左右即可见到它的

效果。

- [验方六] 荸荠六枚，荞麦十二粒可去除鸡眼，其方法是每晚以温水洗脚后，先用针尖轻轻剔鸡眼（不必深剔），去其浮污，将二粒荞麦，放口中，以门牙咬碎，去其柔嫩之黑皮，以指头将荞麦面涂在鸡眼里，填平鸡眼，再少抹点口液，润在荞麦面上。另以洗净之荸荠，切成如鸡眼大小如铜币厚，贴塞在鸡眼的荞麦面上，以薄布包好，以免散落，如此持续约一星期，鸡眼会不知不觉的消失，此法屡试屡验，颇具奇效。
- [验方七] 白果树叶，烧存性研细末，用粥米粒研末，贴于患处，每日换贴一次有效。
- [验方八] 用二十至三十枚的银杏叶子，放入平底锅用弱火炒（覆上盖子），然后把烧焦的叶子用研钵磨成粉末，加入适当的饭粒，使之带粘性，将它敷于患处，以纱布扎牢，重复几天后，鸡眼表皮就会显得破破烂烂的，把它除去，再换，几次以后，鸡眼就会消失。
- [验方九] 将荔枝核在太阳下晒干，或置瓦片上（忌用铁器）焙干，碾压成粉，用不加色素的米醋，混和如泥，涂抹患处，荔枝粉泥须把周围僵硬的皮盖着，上附脱脂棉，用纱布包扎，每晚将脚烫洗后换洗一次，轻者三五天，重者十天均可治好。
- [验方十] 每晚洗过脚后，用刀片将鸡眼突出部分剪去一些，用碱擦于其上，干了再擦，隔二三天后，突出部分会日渐脱落，若鸡眼长于手上，用此法也可治愈。
- [验方十一] 以生姜置患处，将艾叶置生姜上，用香（即供佛烧香的香）火烧之，隔日自行脱落即愈。
- [验方十二] 以百分之二十的浓碘酒少许，用牙签裹棉花蘸碘酒涂患部厚皮部，切记不可擦到外面普通皮肤上，以免灼伤。如此每日一二次，约二三天，患部就会脱下一层厚皮，脱下厚皮后，鸡眼的根就出来一点了，可以不再刺伤脚底，持续此法几天，鸡眼的根部会愈变愈小，也愈浅，最后就可脱出而消失。
- [验证] 此十二种方法经《卫生报》推荐应用，治疗 359 例，根据患者情况适当选用上方，其一周内治愈 337 例，余 19 例均在 10 日内痊愈，3 例无效，有效率 98.4%。

第六篇 美容秘方

一、青年脱发

1. 生发汤治疗青年脱发

[方 剂] 制首乌 20~30 克，生地黄、菟丝子各 15~20 克，当归、天麻各 10 克，白芍 15 克，川芎 6 克，蛇蜕 8 克（无蛇蜕可用蝉蜕 10 克代之，效果稍逊）。

[加 减] 头皮刺痒重者加百部、地肤子、白鲜皮各 10~15 克；头皮脱屑多者加白蒺藜 15~20 克；阴虚内热重（五心烦热或女子月经先期）加牡丹皮 8 克，地骨皮 12 克，女贞子 10~15 克，旱莲草 10 克。

[制用法] 每剂药煎 3 次，前 1、2 次煎液内服，第 3 次煎液洗头。每天 1 剂。

[功 效] 治青年脱发。

[验 证] 赖××，男，52 岁，地质队工人。患脱发症数年，多方医治罔效。用生发汤治疗 20 剂后，头发乌黑如常人，面色红润光泽。王××，男，24 岁，铁路工人。原定去年 10 月结婚。因突发脱发症，整个头部光秃秃的，其未婚妻坚持不肯结婚，故心情苦闷异常。后经人介绍，到我处诊治。即照生发汤原方，略事加减，服 25 剂后，竟然又长出乌黑的头发。其本人及父母、未婚妻欣喜异常，高兴之余，再三致谢。

[备 注] 治疗期间要节制房事。若有手淫不良习惯者，要纠正。并忌食辛辣刺激性食物。

二、青年粉刺

1. 香油使君子治粉刺

[方 剂] 香油、使君子适量。

[制用法] 使君子去壳，取出种仁放入铁锅内文火炒至微有香味，晾凉，放入香油内浸泡1~2天。每晚睡前吃使君子仁3个（成人量）10天为一疗程。

[功 效] 健脾胃，润燥，消积，杀虫。用治面部粉刺、酒糟鼻。

[验 证] 治疗10例，8例全好，2例好转。

[备 注] 使君子不宜用量过大，否则可引起反胃恶心、眩晕等不良反应。服用使君子时，不要饮茶，否则也会有上述反应。

2. 皂角刺治粉刺奇效

[方 剂] 皂角刺（即皂荚的嫩棘刺）30克，米醋120克。

[制用法] 用醋煎煮皂角刺，改用文火煎浓稠为度。取汁涂患处。

[功 效] 托毒排脓。

[验 证] 据《图经本草》介绍，此方可收奇效。

三、腋 臭

1. 碘椒酊治疗腋臭

[方 剂] 辣椒2~3个。

[制用法] 将辣椒切成小段，放入瓶内，加入2%~2.5%的碘酊10毫升，密封摇荡，即成碘椒酊。将棉签饱蘸药液充分涂擦腋窝，每天1~3次，一般连用7天可愈。

[验 证] 唐××，女，患腋臭已十余年，常为该病难治而苦恼。我们劝其试用本方治疗，涂1次臭减大半，坚持治疗，迄今已痊愈。

[备 注] 本方辣椒采用“米椒”，一般长1~2厘米。如涂擦碘椒酊后腋窝辣痛太甚，可酌加碘酊稀释药液。

2. 泥鳅消炎除腋臭

[方 剂] 泥鳅。

[制用法] 将泥鳅（不洗，带粘液）捣烂。涂敷腋下，连涂数次，直至治

愈。

[功效] 消炎散肿，解毒除臭。

[验证] 据《江苏中医》介绍，一妇患严重腋臭，夏季突然两腋下红肿疼痛，经用此方涂敷数次，红肿消退，腋臭亦愈。

3. 鲜姜汁涂腋消炎祛臭

[方剂] 鲜姜。

[制用法] 将鲜姜洗净，捣碎，用纱布绞压取汁液。涂汁于腋下，每日数次。

[功效] 消狐臭。

[验证] 赵××，男，28岁，用此法患处根除。

[备注] 《食疗本草》云，生姜有“去胸中臭气、狐臭”的作用，有“根绝”之功。

4. 灶心土除治狐臭

[方剂] 灶心土（即烧柴草的土灶内外经烧煨的黄土块）。

[制用法] 将灶心土捣碎，研细，过筛。敷抹腋下，每日数次。

[功效] 敛腋汗，除腋臭。

[验证] 《新中医》杂志介绍疗效显著。

[备注] 灶心土含硅酸、氧化铝、氧化铁等，能抑制大汗腺分泌，故能除腋臭味，但作用不持久。

5. 复方陀僧散治疗腋臭方

[方剂] 密陀僧 30克、冰片 6克、枯矾 30克。

[加减] 汗出过多者加五倍子 20克同研。

[制用法] 研极细末，用有色玻璃瓶收贮。每日 2~3 次，先用水洗净腋窝，拭干，将药粉涂于局部揉擦片刻，秋冬不出汗时，每日涂 2 次。20 日为 1 个疗程，间隔 5~6 日后再用。

[功效] 密陀僧燥湿敛汗枯矾收敛止痒；冰片抑菌防腐、消毒除臭。三药合用能抑制局部腺体之分泌、敛汗、消毒除臭，故为治疗腋臭对症之良方。

[验证] 吴××，女，20岁。就诊日期 1958 年 6 月 25 日。腋臭近年来加重，夏日尤甚，所着衬衣腋窝处污染成黄色。予本方治疗，当天见效，臊臭减轻，1 周腋汗止，臊臭基本消失，连用 20 日后，腋窝干燥，臊臭消失。间隔 6 日后用第 2 个疗程。以巩固

疗效。

[备 注] 本病夏季加重，必须注意清洁、多洗澡、勤换衣。必要时手术切除腋窝汗腺。

四、祛斑洁面

1. 丝瓜络汤治蝴蝶斑

[方 剂] 丝瓜络 10 克，僵蚕、白茯苓各 10 克，白菊花 10 克，珍珠母 20 克，玫瑰花 3 朵，红枣 10 枚。

[制用法] 将上述各味加水煎煮浓汁 2 次，混合。分 2 次饭后服用，每日 1 剂，连服 10 天见效。

[功 效] 通经活络，清热，和血脉。有消斑的功能，用治蝴蝶斑。

[验 证] 《家庭医生》杂志推荐，读者反映极佳。

[备 注] 在采用此法治疗蝴蝶斑期间，应做到四避免：避免使用化妆品及刺激性强的肥皂，避免强烈的阳光照射，避免食用有刺激性的、温热性的食物如姜、葱、胡椒、辣椒等，避免忧思、抑郁。

2. 杏仁蛋清美面消斑

[方 剂] 杏仁、鸡蛋清，白酒。

[制用法] 杏仁浸泡后去皮，捣烂如泥，加入蛋清调匀。每晚睡前涂搽，次晨用白酒洗去，直至斑退。

[功 效] 杏仁含杏仁甙、脂肪油、杏仁油及葡萄糖等，蛋清含多种维生素、烟酸，都有促进皮脂腺分泌，滋润皮肤之作用。适于治面部黑褐斑及面暗无光泽。

[验 证] 据《海上方》介绍，杏仁去皮，研细，以鸡蛋清调匀，每晚睡前涂面，次晨洗去，连用 1 周，对治疗黑褐斑及妊娠蝴蝶斑有效。

3. 乌梅方消黑痣

[方 剂] 乌梅肉，轻粉。

[制用法] 烧灰存性，加轻粉，用香油调匀。点痣上，或涂敷赘肉。

[功 效] 去黑痣，蚀赘肉。用治皮肤表层血管瘤、鸡眼、赘疣、黑痣等。

〔验 证〕 多次试用，反映效果良好。

〔备 注〕 轻粉，中药名，由水银加工制成，性寒、味辛、有毒。此“乌梅方”见于《名医别录》并化裁而成。

4. 消斑美容汤

〔方 剂〕 当归 10 克、川芎 10 克、赤芍 10 克、生熟地各 15 克、白芷 10 克、女贞子 15 克、紫草 10 克。

〔加 减〕 月经量少或过期不行，少腹胀痛者加制香附 10 克、红花 10 克，以理气活血。

〔制用法〕 每天 1 剂，煎 2 遍和液，早晚分服。连服 1~2 个月。

〔功 效〕 当归、川芎、赤芍养血活血；生熟地、女贞子滋养肝肾；白芷、紫草祛风凉血消斑。

〔验 证〕 刘××，女，42 岁。就诊日期：1986 年 8 月 3 日。考虑 2 月份以来眼眶附近，额、颊和鼻周围呈淡褐色斑片，大小不一，与皮肤相平，无痛无痒，月经时或日晒后更为明显。予本方治疗，连服 1 个月后面部黄褐斑明显减少，继服 1 个月后基本消退。一年后随访未复发。

〔备 注〕 多吃水果蔬菜，忌日晒。避免七情刺激。

五、美泽容颜

1. 容颜不老方

〔方 剂〕 鲜姜 500 克，大枣 250 克，食盐 100 克，甘草 150 克，丁香、沉香各 25 克，茴香 200 克。

〔制用法〕 上七味共捣碎，调匀。每日晨开水冲泡当茶饮服 1 杯。

〔功 效〕 调养气血、滋润皮肤。用治人老色衰，面容憔悴、粗糙无华。

〔验 证〕 此方据《奇效良方》化裁。古籍云：“……煎也好，点也好，修合此药胜如宝，每日清晨饮一杯，一世容颜长不老。”

2. 慈禧太后美容方

〔方 剂〕 海珍珠（海产贝类生成的）、茶叶各适量。

〔制用法〕 海珍珠研细。每次 3 克，每隔数日 1 次，茶水送服。

〔功 效〕 驻容颜，葆青春。用于养颜护肤，防治皮肤衰老。

〔验 证〕 此方见于《御香缥缈录》。据慈禧内宫女官德龄记述，慈禧喜

食此方，故年届古稀皮肤嫩细，面如桃花，容颜不衰。

[备 注] 珍珠是一种名贵中药。味甘咸、性寒。功能定惊安神、清热益阴，对皮肤有很好的营养作用。

3. 玉器美容

[方 剂] 玉器，如尺、球、顶指等。

[制用法] 用体积不大的玉器在面部搓、滚、磨、擦，用力不大，速度勿快，闲时即用，持之以恒。

[功 效] 用于养颜美容。

[验 证] 经验证效果甚好。

[备 注] 许多玉石中含有对人体有益的微量元素（硒、镍、钴、铜、镁、铁）慈禧太后有个奇特的美容方法，就是经常用玉石搓磨面部。此方法在李时珍的《本草纲目》中有记载。

4. 莲藕方驻颜轻身

[方 剂] 莲花、藕、莲子。

[制用法] 上三味用量比例 7:8:9 计量。置通风处阴干，研成细粉，存于瓷瓶内密封。每日早晚空腹以温开水送服 1 次，每次 1 小匙。

[功 效] 养阴清热，美容驻颜。用于体胖、容颜衰败、老态明显者。

[验 证] 据《大清草木方》介绍，此方有减肥和养护容颜作用。

[备 注] 服此方治疗期，禁食葱、蒜等辛辣食物。

5. 黑豆丸悦泽面容

[方 剂] 黑豆、猪油各适量。

[制用法] 将黑豆浸泡后，蒸熟，晾在席上以稻草盖上，待黑豆逐渐变成黄色，取出晒干，捣碎研细。猪油炼过与豆粉掺和拌匀，捏丸如豆大。每日早晚各服 10 丸，久服显效。

[功 效] 润肌肤，养容颜，肥肉腴。用治面无光泽、苍白萎黄、皮肤干皱粗糙、食少体瘦。

[验 证] 此方引自《本草纲目》并化裁而成。《本草拾遗》云：黑豆，“久服好颜色，变白不老。”

6. 核桃大豆汤永葆面部红润

[方 剂] 核桃仁 10 个，大豆 300 克，白芨 10 克，大米 50 克，白糖 25 克。

[制用法] 先将大豆、白芨同炒熟磨成粉末。再把核桃仁放碗内，加开水

浸泡5分钟。然后将核桃仁与泡过一夜的大米混在一起，用擀面杖将其擀碎，放入瓷盆中，加5~6杯水，经过充分浸泡后，用纱布过滤。将过滤好的汁倒入锅内，加入三杯水，再把磨成粉末的大豆、白芨粉放入锅内，加白糖，煮成糊状即可。逐日食用。

[功效] 通经，养荣，益血。经常服饮面部光滑而红润。

[验证] 据1982年第3期《食品科技》介绍，此方是著名的京剧表演艺术家梅兰芳先生生前最喜欢吃的美容食品。

六、去皱美容

1. 蛋黄蜂蜜去皱方

[方剂] 蛋黄、蜂蜜、面粉各适量

[制用法] 将蛋黄与一小匙蜂蜜，和一小匙面粉充分搅拌后，用来敷脸，如果是干性皮肤，则应加入一些橄榄油，待一刻钟后再洗净，然后可用冷霜，按摩五分钟，再用纱布拭掉。

[功效] 增白、去皱、养颜。

[验证] 编者多次观察验证效果奇效。

[备注] 蛋白敷面与上法应同时实行，其方法是第一天蛋黄敷面，第二天休息，第三天蛋白敷面，第四天休息，第五天蛋黄敷面，如此交替，六个月后，可使所有的小皱纹都消失。因为蛋白能使松弛的皮肤绷紧，蛋黄则能给予皮肤营养，如此双边进行，效果卓著。

2. 养乐多祛皱养颜

[方剂] 对有过敏性体质的人，上面的敷面法不甚适合，可改用养乐多敷面法。养乐多即发酵后之牛奶。

[制用法] 用两大匙养乐多均匀抹在脸上，再轻轻覆上纱布，以免流失，约一刻钟左右用温水洗去一星期作三次，只要持续三个月，就会有很好的效果。因为养乐多是酸化乳，会使皮肤更加光滑细嫩。

[功效] 增白、祛皱。

[验证] 经多次试用，效果理想。

[备注] 此外，也可试用蜂蜜来敷面。

七、青春痘

青春痘在医学上的学名叫粉刺，也就是一般人所谓的面疱。青少年的患病率约达百分之七十，有的人在青春期的初期就有，也有的迟至二十四五岁才生的，约呈颗粒状，有的大如珠丸，甚至脓疡成疱。其发生的原因，不外乎青春期的性荷尔蒙分泌失调、面部油脂腺的分泌失当、毛孔闭塞、同时外部的细菌侵入而引起；也有的是便秘造成的毒素，吸入体内后，也会引发青春痘的生长。

1. 盐水洗脸可除青春痘

[方 剂] 适量盐，一脸盆微热的水。

[制用法] 在脸盆里放稍热一点的水，放入一大匙盐使之溶化，然后用盐水洗脸，多次可祛除青春痘。

[功 效] 祛痘美容。

[验 证] 经多次试用效果理想。

2. 枇杷叶外洗可祛痘

[方 剂] 枇杷叶适量。

[制用法] 采枇杷叶洗净煎汤，用来洗擦患部，一日二至三次。

[功 效] 祛痘美容。

[验 证] 屡用效佳。

3. 蕺菜除面疱

[方 剂] 蕺菜 20 克，水碗。

[制用法] 蕺菜二十克和一碗水合煎为浓汤，一天分数次饮用。同时，将蕺菜叶捣烂取青汁，涂抹在患部，一天四次，约两个月即可彻底治好。

[功 效] 可除肺风粉刺，皮脂腺分泌过多引起的面疱。

[验 证] 孙××，女，32 岁经服上方面佳如玉。

[备 注] 此法对面疱范围扩大或有化脓现象者，最有功效。

4. 蟾蜍祛除青春痘

[方 剂] 蟾蜍 1 个，姜适量。

[制用法] 蟾蜍用姜丝煮成汤喝。

[功 效] 可治青春痘。

[验 证] 以上该方经多次应用，疗效理想。

[备 注] 蟾蜍即癞蛤蟆，其头部耳下腺及皮肤腺流出的“白浆”有剧毒，所以没有经验的人，不宜轻易宰杀或烹任。据本草记载，以姜及胡椒等辣物塞入蟾蜍口中，则蟾身的白汁会流出来。此液干燥后，即中药所称的“蟾酥”或“蟾蜍素”，经配以雄黄与麝香等，有解毒消肿的功能，在乡村民间，如有人生疥疮或无名肿痛都以此物治好，有人且将蟾蜍剥皮敷于患处，甚为有效。

蟾蜍于农历五月前后最多，春天是其产卵期，不宜捕杀，则会使蟾蜍大量减少，最好是在农历五月，母蟾蜍产卵后为之。此物吃后，只留青春不留痘，煮食要剥皮，去内脏肠杂及头部。

青春痘患者注意事项：

- 一、每天勤洗脸，最好使用无刺激性的药皂，如此，可以将附着脸上的油、汗及灰尘洗清，特别是晚上临睡前，一定要将脸洗净。
- 二、临睡前喝杯蜂蜜或晨起喝杯盐水，皆有助于防止便秘的发生，大便畅通也就可将体内的毒素排出。
- 三、对于油炸辛辣物、甜食均应忌食，如肥肉、花生、巧克力、冰淇淋等少吃较好。
- 四、多吃水果、蔬菜，尤其是柑橘、柠檬类和香蕉，除可治皮肤病还可达到美容效果。
- 五、心情愉快平静，脸面表情放松弛，当皮肤趋于平滑时，要轻轻按摩，由内而外，由下而上，以不牵动皮肤为宜。
- 六、忌用手压挤青春痘，如已成黄色脓头时，可贴上白色胶布，撕起时自会除去，如未化脓不可挤出，以免留下疤痕。

八、雀 斑

斑有多种，中医认为是风邪搏于皮肤，血气不和所致，外科证治全书中说“初起斑点，游走成片，久之可延蔓遍身，初无痛痒，久则微痒。”

雀斑呈黄褐色或咖啡色，很像麻雀卵壳上的斑点，青年男女脸上或脖子上、肩膀上、手背上最为常见，此症由于遗传的关系，最易感染的部位是眼眶及双颊。

1. 冬瓜莲子粉祛雀斑

[方 剂] 冬瓜仁五两、莲子粉五钱、白芷粉三钱。

[制用法] 合研为细粉，每日饭后用开水冲服一汤匙，非常有效。

[功 产] 祛斑美容。

[验 证] 多次试用疗效理想。

2. 桃花粉祛雀斑

[方 剂] 桃花、冬瓜种子，蜂蜜各适量。

[制用法] 桃花阴干和干燥之冬瓜种子同量混合研为细末，加入蜂蜜调匀，于睡前涂于患部，晨起洗净很有效。

[功 剂] 祛斑、美容。

[验 证] 屡用效佳。

3. 冬瓜祛斑美容

[方 剂] 冬瓜一个。

[制用法] 刮去其皮，切成薄片，用半酒半水将冬瓜煮烂，待冬瓜烂时，搅烂滤去渣，再用文火将冬瓜汁煎成膏状（忌用铁器，可用砂锅），放入杯中，盖好。每晚洗脸后在睡前涂于患部，第二天清早洗去，两个月后，肤色莹洁可爱，有美颜功效。

[验 证] 张××，女，38岁，经用上方雀斑逐渐消失。

4. 牵牛花祛斑

[方 剂] 黑色牵牛花种子适量。

[制用法] 将黑色牵牛花之种子研为粉末，加入蛋白，睡前涂于脸上，翌晨洗去。

[功 效] 连续一星期，可消除雀斑。

[验 证] 据《医学保健》介绍，该方疗效理想。

[备 注] 如以李子的种子代替黑色牵牛花的种子也可以，效果是一样的。

5. 赤小豆花可消除雀斑。

[方 剂] 赤小豆的花及赤小豆适量。

[制用法] 赤小豆的花，压出汁来，抹在脸上，将赤小豆在锅中烤，然后研为粉末，与米糠混合，加入开水饮用。

[功 效] 有美容、消除雀斑的功效。

[验 证] 屡用效佳。

6. 香菜水治雀斑

[方 剂] 香菜（即芫荽、胡荽带根的全草）适量。

[制用法] 洗净后加水煎煮。用香菜汤洗脸，久用见效。

[功效] 用治雀斑。

[验证] 《健康报》介绍读者致函称此法甚佳。

[备注] 患雀斑者在治疗期间，不宜吃苋菜、海带、胡萝卜、可可粉、橘子、牛肝、猪肝、核桃等，因为食后有可能使色素加重。

7. 糯米膏祛雀斑

[方剂] 糯米 30 粒，生石灰半酒杯，碱面 6 克。

[制用法] 先将碱用温水溶化，然后倒入石灰内拌匀成泥状，再倒入另一稍大的杯中，将糯米扎入石灰泥内 1/2，把石灰泥杯覆盖在潮湿地上，12 小时后，糯米已熟，将上半部熟米调匀成膏。用时针挑此膏点涂在雀斑上。涂后稍有痒痛感，约 10 分钟可消失。

[功效] 祛黑消斑。用治雀斑。

[验证] 《浙江中医》1985 年 9 期介绍，此法 3 日后雀斑可自行脱落，不留瘢痕。

九、黑 斑

黑斑是因肝脏或胃肠过劳，以及皮肤疲劳而产生的，尤其是年轻妇女而长满黑斑，一定是过度疲劳所致。长期的化妆，也会使脸上长出黑斑来，所以要避免暴饮、暴食以及睡眠不足的生活，多吃蕃茄、生蔬菜、动物肝脏、海藻、蛤或豆芽菜等，会使黑斑消失得更快，同时不要忘了夜晚临睡前，要将当天的化妆品彻底洗净。

1. 消石灰外敷治黑斑

[方剂] 消石灰 100 克，木灰 100 克，水适量，糯米 20 粒。

[制用法] 消石灰一百克加同量的木灰混合，加入少量的水调成泥状，其中纵植二十粒糯米，加热蒸一昼夜，糯米即成透明状，以竹筷子挑出，放于木板上，并调成糊状贴于患部。

[功效] 祛斑、美容。

[备注] 此药亦有止痛止痒的功效。

2. 黑砂糖增白祛斑

[方剂] 黑砂糖适量。

[制用法] 把两大匙黑砂糖及少许水放入锅中煮，冷却后，可取来涂抹于面孔，经过五六分钟就可以洗掉。黑砂糖有漂白作用；持续几

个月，就会产生效果。

〔功效〕 祛斑美容。

3. 薏仁祛黑斑

〔方剂〕 薏仁适量。

〔制用法〕 薏仁研成细粉，一次服用十克，每天三次，在饭前半个小时至一小时前服用，约几个月，即可治好。

〔功效〕 增白祛斑。

〔验证〕 以上3方经《医疗保健》介绍，疗效确切可靠。

4. 四白香绿粉治黑斑

〔制用法〕 甘松、山奈、香薷、白芷、白蔹、防风、藁本、白僵蚕、白附子、天花粉、零陵香、绿豆粉、肥皂各等分。为细末，每早洗面，斑黑点就会除去。

〔功效〕 洁面、增白。

〔验证〕 以上方法经医学杂志推荐多次使用疗效理想。

十、汗 斑

汗斑又称为紫白癣风。《外科大成》说：“癣风俗名汗斑也。紫因血滞，白因气滞，皆因机体被风湿所侵，留于腠理，搔之起皮而不痛，此从外来，治宜汗之。”说明了此症之病因与治法。《外科证治全书》上也提到汗斑是“由汗衣经晒着体，或带汗行日中，暑湿浸滞毛窍所致。”对汗斑发生的原因作了更具体的说明。

〔验方一〕 用牛舌草揉拭患处，一年后可复原为正常肤色。

〔验方二〕 以牛胎盘一个，用瓦焙存性研为细末，以黄酒冲服，三次服完，非常有效。

〔验方三〕 羊蹄根之根去蕊，加同量的皂荚捣碎，枇杷种子之大者以布包之，以上诸物一同入锅煎汁洗涤患部，有良好的功效。
另有用羊蹄根之生叶绞汁，制为涂液，其根阴干后研为细末，加入同量之醋敷于患部，一日涂二三回，持之以恒，至其结痂为止。

〔验方四〕 蛇蜕烧灰，加醋少许，涂于患部，可治汗斑。

〔验方五〕 用老姜一块，浸于碱水中，每日取姜擦患处，每天擦二次，十余日后即可复原。

- [验方六] 烟草烧粉，加少许胡麻油，制成膏状，涂于腮部，其上覆以绷带或油纸，一天一次，就会长出新的皮肤来。
- [验方七] 浮萍四两研末，黑豆一两炒熟后浸入白酒内（约四两），用酒送浮萍末一钱服下，每日二次，有效。
- [验方八] 轻粉、桂枝、硫磺三物之粉末混合，以布包之，摩擦患部后，以水洗涤之。
- [验方九] 醋酸一匙和硼砂四分之一匙同放入空罐中，下面用炉火（或蜡烛）燃烧到硼砂完全溶化，就可以了，先将患处刮净，再以此药汁抹擦患部。
- [验方十] 何首乌、荆芥、苦参、苍术、皂角以上均钱半。用水一碗半，煎成半碗，温服，每日一剂，可煎两次，须十剂以上始收效。
- [验方十一] 以海螺硝、蛇床子、白胡椒共三味等量研末，另取茄子一条，每天切一小截，以两端蘸此三味粉在患部轻轻摩擦，早晚各一次，轻者七至十天可愈，重者约二至三周可好，治愈时不脱皮。或用生茄子蒂沾姜母汁涂患部，效果良好。
- [验证] 以上方法经广大患者反映效果理想，值得推广。

十一、化妆品引起的斑疹

1. 蜂蜜奇效祛斑疹

- [方剂] 蜂蜜两匙。
- [制用法] 把两小匙的蜂蜜，和一大匙面粉混合在一起，充分地搅拌后用来涂脸，十分钟后洗掉，再用一条绞过热水的毛巾覆面部两三次，最后搽碱性化妆水，一星期两次，只要继续五六次，皮肤上的斑疹就会消失。
- [功效] 蜂蜜有消炎的作用，尤其对粗糙的皮肤及一切的皮肤病都有效，传说，古代的埃及女王克蕾奥芭杜拉就是蜂蜜的疯狂爱好者。
- [验证] 经多方经证，效果奇佳。

十二、妇女驻颜法

- [验方一] 用朱砂二钱、雄黄五分、轻粉一分。合共为细末，晚间用鸡蛋清调匀敷面，次早洗去，数日之后，面上现桃花色。
- [验方二] 用鸽子蛋不拘多少，取清调“真杭粉”，如搽粉状抹上，不可见风，如此十日后，肌肤莹白如玉。
- [验方三] 宫粉十两，密陀僧、寒水石各二两，白芨一两，银珠五钱，麝香一钱。共研细末，鸡子白调贮磁瓶内，蜜蒸熟取出晒干，再研绝细，水调敷面上，终日不落，皎然如玉。
- [验方四] 用黑丑十二两，皂角（去皮烧）四两，天花粉、零陵香（佩兰）、甘松、白芷各二两。为细末洗面或洗澡时蘸药敷之，容貌娇嫩。
- [验方五] 白菊花一两、梨汁半碗、白果一两、白蜜一两、人乳半盅、白酒酿半盅。先将白菊花梨法入好酒蒸浓汁，再将白果捣烂，并蜜、乳研在一处，卧时搽面，次日早上洗去，颜如童子。
- [验方六] 金色密陀僧一两，研极细末，用蜜调或乳调如薄糊，每夜略蒸带热敷面，次早洗之，半月后；面如玉镜生光。传说这是杨贵妃所制，为唐宫内第一奇方。
- [验方七] 外用：珍珠粉（或用轻粉）五钱、滑石五钱、杏仁四钱、麝香四分。以上四味研末以鸡蛋白调匀，每晚睡前涂面部及皮肤，翌晨洗去，长久可使皮肤白嫩柔细。
内服用：沉香三钱，丁香三钱，茴香、乳香、藿香各三钱，桃花片一两。
上列诸味研末以蜂蜜搓拌成丸，每晨吞服七粒，四十九日后，面色娇艳，且发出阵阵幽香。此方据说为慈禧太后驻颜良方。
- [验方八] 炙甘草四两、阿胶二两、人参二两、生地一斤、生姜三两、麦冬半斤、麻仁半斤、桂枝三两、大枣三十粒，和清酒七升。用水煎，作三次服饮。
- [验证] 以上八法，《家庭保健》杂志推荐效果理想。

十三、面颊发红

1. 冰热混合法治面颊发红

- [方 剂]** 毛巾四条，冰热水各1盆，酒适量，柠檬片。
- [制用法]** 准备两条毛巾和冰、热水各一盆，先用绞过热水的毛巾覆盖在脸上三分钟，接着，再用冰毛巾来冰冷面孔，连续约五六次。再用浸过酒的柠檬片贴满脸孔上，约十分钟后取掉，将面孔用温水轻轻洗净。
- [功 效]** 以热毛巾敷面，可扩张血管，促进血行，用冰毛巾敷面，则能使血管收缩，并给予弹性。如果没有接着用柠檬片敷面，则会使皮肤受到伤害，所以这最后一个步骤绝不能省。
- [验 证]** 上法多人施用效果奇佳。
- [备 注]** 此法最好在就寝前实施，约两三个月后，脸孔肤色即会恢复正常。

十四、使面如白玉五法

- [验方一]** 用冬瓜仁五两（去壳）、桃花四两，白杨皮二两为末。饭后饮，日三服，欲白倍加冬瓜仁，欲红倍加桃花，服三十日面白如玉，五十日后，手足皆白。
- [验方二]** 取白冬瓜一个，竹刀去皮切片，酒或用黄油一升半，水一升，煮烂滤去滓，更煎成膏，每夜涂之，则黑色全消，颜如白玉。
- [验方三]** 香白芷五分，硫磺、冰片各一钱，细辛、山奈各一钱，丁香、轻粉各二钱，甘松二钱半，木贼、藿香叶、元明粉、杏仁各三钱，荆芥花粉、苏仁、天虫、陀僧、苏合油各五钱，（苏合油后入）肥皂、铅粉各一两。共为细末，即玉容粉，临睡唾津调匀搭面，次日清早用煮酒一杯，冲热洗去再拍玉容粉。
- [验方四]** 宫粉一两，密陀僧二两，白檀香二两，轻粉、蛤粉各五钱。共研细末，鸡蛋白调贮，每晚用鸡子白调敷，次早洗去，令面莹白，绝似梨花，且香美异常。
- [验方五]** 取木瓜去实与皮，其重三两，再加杏仁一两，猪油一两，用钵捣和，每夜涂之于面，则虽冬期亦能面无皱痕，面皮雪白。

[验证] 读者从《保健杂志》上了解上法，经试用效果满意，反映值得推广。

十五、美肤法

1. 油性皮肤

油性皮肤的人，大都比较喜欢肉食，且汗腺粗，皮肤很容易积堆不洁之物，治本的方法，就是多吃点蔬菜、水果，且要保持脸部非油性的状态。

[验方一] 洗脸时，可在温水中注入一点酒洗，并改用药皂洗脸，如此不仅皮肤会更加光滑，且有舒畅、凉爽的感觉。

[验方二] 鬼芋煮过一遍，放入冰箱，过段时间，取出轻拭脸孔，于化妆前和卸妆后实施，要摩擦到面孔感到冷的程度，即可停止。如果再继续摩擦下去，会使皮肤冻伤。

鬼芋能使汗腺收敛，且不洁物不致于浮现于皮肤表面，至于要先将鬼芋煮过再使用，则是因为它含有涩液，煮过后可去掉，如此，更能发挥它的效用。

油性皮肤经过这样的处理后，化妆也不易脱落，且较能持久。

2. 干性皮肤

这种皮肤和油性皮肤正好相反，不但不光泽，且有干粗的感觉，有的是因吃了太多碱的东西，或餐食不定时，也有的是因熬夜、烟抽太多，这些都是构成皮肤变成干性的主因，所以平时就要注意摄食的习惯。

[验方一] 如果原本是油性皮肤，却因汗水被细菌的作用分解，以致皮肤变成碱性，一旦变成碱性的皮肤要再回复到中性就较难，这时可将三个苹果的外皮削下，煮成半熟后，再将皮的汁绞出，涂抹在面孔上，约十五至二十分钟后用温水洗去，最好是在洗澡后就寝前实行。

苹果皮含有柠檬酸以及果胶，这都能中和干性皮肤，使皮肤恢复富有润泽的中性。

[验方二] 对于原本属于干性皮肤者，利用牛奶敷面较为适合。以一大匙鲜奶加温，直接抹在皮肤表面，过十五分钟后，再以温水洗去。牛奶含有脂肪的成分，可以浸透皮肤，只需持续以此法敷面，约三四个月，即可使皮肤光润起来。

3. 皮肤粗糙

皮肤粗糙，有的是体质使然，有的是蔬菜、水果吃得太少，而缺乏维生素 C 也会促使皮肤粗糙。

【验方一】 每次饭前半小时至一小时内，食用薏仁粉十克，可煎茶饮，如觉得不好喝，可加少许蜂蜜服饮。

薏仁含有蛋白分解酵素，它对皮肤炎的治疗有很好的功效，蜂蜜的好处更多，还可消除便秘，无形中对美容也有很大的帮忙。

此法连续服用六个月，就会生效，脸上较光滑，化妆品在脸上也较持久。

【验方二】 木瓜也含有特别多的蛋白分解酵素，可常食用，但效果较薏仁粉差些。

【验方三】 以柑皮或柠檬皮冲开水代茶饮，对皮肤也有很大的益处，因为此类水果之果皮含有丰富的维生素 C，除了能治好严重的皮肤病外，也是一般小姐最喜欢的美容圣品，多吃水果及蔬菜，能消除便秘，并使皮肤光泽细嫩，所以多食用是有益无害的。

4. 毛孔太粗

有的人脸部毛孔很粗，特别是鼻头附近，又有大量的脂肪被分泌出来，脸部不仅有油腻的感觉，且不太美观。毛孔大的原因，有的是因脸部生长青春痘，用手去挤压，青春痘虽消除了，但却使毛孔变大，治疗的方法，可以用盐来收敛皮肤，使毛孔变小。

【验方】 先将橄榄油抹在脸部毛孔粗的部位，再用手沾精制盐，在涂过橄榄油的部位轻轻地摩擦，如此，盐与橄榄油就能适度结合，不会伤到皮肤，也可使血液循环转好，皮肤变热后，即可停止，约再过十至十五分钟后，即可以将盐及橄榄油抹掉，再用温水洗净。如此持续一两个月，毛孔就会变小，令您前后判若二人。

【备注】 盐，在其它方面的功用很多，例如要防止火伤及刀伤化脓，可将盐擦在伤口，预防喉咙发炎，可用盐水漱口，这是因为盐具有杀菌作用。另外，盐能使皮肤表面的水分含盐度增多，以便把水吸出，收敛皮肤，这是它的美容效果。

不只是脸部，其它如肋、膝、关节的硬皮也可用这方法使皮肤变为柔嫩，如果没有橄榄油的话，则可以将细盐放入营养霜

里，再来使用，其功效是一样的。

5. 晒太阳后的皮肤粗糙

在太阳光下长期曝晒，很容易引起皮肤的老化，大多数的中年人在经过日光浴后，其脸上甚至会长出黑斑，黑斑的出现是皮肤已有老化的征兆，必须要仔细的保养。

〔验方一〕 将黄瓜磨成泥状，用布过滤它的汁，再滴入一点柠檬汁和两匙面粉，搅拌后，用来涂抹脸部，约十五至二十分钟后洗去。

此法，对于日晒后的皮肤是最适合的，柠檬虽含有丰富的维生素C，但比较之下，经日晒过的皮肤，会有轻微的炎症，直接使用柠檬反而会造成刺激。黄瓜含有果胶以及使皮肤细嫩的成分，是比较适当的。（黄瓜汁液的撷取，有人是将黄瓜根部五十厘米上端处切掉，把切口插入瓶中，过一夜，瓶中会滴存黄瓜水，这是最方便的方法。）

〔验方二〕 上法实行过后，可将柠檬，切片，浸入酒中约一个晚上，再将柠檬片铺在面孔上，约一刻钟后，即可洗去，酒渍柠檬片对消除黑斑有很好的功效，此法最好在就寝前沐浴后实施。

以上二法应照先后顺序实行，如此不但能使晒太阳后的皮肤不致变为粗糙，且对美容，也是很有效果的。

如果在海边晒出水泡时，可以抹上橄榄油，于十五分钟后洗掉，约两三天即可痊愈，如果全身都起水泡，则约一星期才能治好，待水泡治好后，才能实行敷面法。

6. 黑皮肤

黑皮肤是健康的表征，但是有的女孩子，则因为皮肤黑的关系，不但化妆不易，且落落寡欢，俗语道“一白遮九丑”，谁不希望自己拥有一身白嫩的皮肤呢？

〔验方一〕 使皮肤漂白的方法很简单，将两大匙黑砂糖溶化后（以加热方式），加入一大匙牛奶充分搅拌，将此物涂抹脸部，约过十五至二十分钟后，以温水洗去。每天一次，约持续三个月后，脸上的黑色素就消失很多。

市面上有黑砂糖洗面皂出售，可见它的效果是确实的，至于加入牛奶的原因，是因为黑砂糖虽能够漂白皮肤，但因缺乏脂肪，无法达到使皮肤细嫩的目的，而牛奶中含有的脂肪则可以补充。

总之 要使皮肤变得即白又光滑，光是做还不够，须要持之以恒。

7. 皮肤缺乏光泽

往昔的妇女，在还没有香皂的时代，都是使用米糠来擦皮肤，这是因为它有独特的作用，能保持皮肤的光泽，且两三天一次即可，持续力也较久。

[验方] 把三分之一碗的米糠放入袋中，浸入稍热的水里，轻轻摇荡三四次，取出后，用来擦拭脸孔，放置十至十五分钟，再用温水洗净，经过三四个月后，没有光泽的皮肤就会显得细腻光滑，没有任何的瑕疵了。

[备注] 米糠中除了含有脂肪外，也富含维生素 B₁ 及 B₂，能够为皮肤直接吸收，化妆品虽也含有维生素，但却因为掺有防腐剂的缘故，长期使用会对皮肤造成伤害。

但是，使用米糠敷面后也要注意，使用化妆水须为碱性，乳液则选用含脂肪少者，面霜最好使用中性，否则，全体的平衡无法维持，效果将会减半。

8. 皮肤脆弱

有些人皮肤原本脆弱，不堪在太阳下曝晒，使用化妆品也会伤害到皮肤，所以在缺乏保养之下，更显得粗糙，而没有美感。

[验方] 将牛奶一大匙，与一大匙半的面粉混合成泥状物，涂抹脸上，若要加点橄榄油也可以，待十至十五分钟后洗掉，将会有令人满意的效果。此法一星期做两次就可以了，最好持续一年半载，否则效果不彰，前功尽弃。

[备注] 此法使用起来很方便，至于蜂蜜跟柠檬，因为较有刺激性，对脆弱的皮肤恐会造成伤害，如果要使用，则应小心用量。

9. 病后皮肤活力的恢复

生病时，皮肤缺乏活力，尤其是在床上躺了两三个月后，皮肤更是毫无生气，这种皮肤就是化妆也没有用，最好是先恢复皮肤的活力。

[验方] 把一个鸡蛋放入一大匙面粉中充分搅拌，用它来涂抹脸部，约十五分钟后以温水洗掉，最好在就寝前做，每隔三天做一次，就能有很好的效用。

[备注] 蛋黄中的磷与蛋黄荷尔蒙直接与营养有关，磷是一种特别成分，可以补给皮肤营养，如果能选用有精卵的蛋黄，对病后衰

弱的皮肤更为有利。但是，久病刚愈和产后的妇女，其皮肤是最脆弱的，不能一下子吸收太多的营养，一星期两次即足够。但要持之以恒才有用。

10. 美 肤 法

- [验方一] 防风、荆芥、细辛、当归、羌活、独活、皂角、香白芷、藿香、藁本、川芎、甘松、水红花各等分。煎汤沐浴，能除恶气细皮肤，三日内香气不散。
- [验方二] 用沉香、丁香、降香、乳香、藿香、茴香、砂仁、甘松、山奈、白芷、细辛、川芎、藁本、桂心、潮脑、当归、百药煎、肉豆蔻、豆粉各二两，麝香一钱。共为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每早用水漱口，含化一丸入舌根下，三日口香，五日身香，十日床被香，一月后洗面皆香，二三月后，面如童，身软如绵，兼能起阴壮阳祛风去冷。妇人身涩不滑，用此法必有奇效。
- [验方三] 用白丁、白蒺藜、白丑、白芨、白薇、川椒各一两，香白苜七钱，当归梢、升麻各五钱、楮实子四钱，白茯苓三钱，白附子二钱半、麻黄（去节）二钱，连翘一钱半。共为细末，每用五六钱洗之。能使皮肤莹洁如玉。

十六、减肥轻身

1. 玉米须利湿消胖

- [方 剂] 玉米须适量。
- [制用法] 以开水冲沏。代茶饮。
- [功 效] 利湿轻身。对慢性肾炎、膀胱炎、胆囊炎、风湿痛、高血压、肥胖病等均有疗效。
- [验 证] 读者反映效果甚妙。
- [备 注] 玉米须应在授粉前摘下，阴干存放，可加少许白糖代茶饮。

2. 常吃4种蔬菜减肥

- [方 剂] 白萝卜，韭菜，黄瓜，绿豆芽。
- [制用法] 任选一种或多种，按常法炒食、配制菜肴均可。长期食用，并尽量节制吃高脂肪食品。

[功效] 白萝卜含有芥子油等物质，能促进脂肪类物质更好地新陈代谢，从而起到防止脂肪在皮下堆积的作用。韭菜含纤维素较多，有通便作用，能排出肠道中过剩的营养物。黄瓜含有丙醇二酸，能够抑制食物中的碳水化物在体内转化成脂肪。绿豆芽含水分较多，被身体吸收后产生热量较少，不容易形成脂肪堆积在皮下。这四种蔬菜很适宜肥胖人食用，常食可使人轻身减肥，体壮健美。

[验证] 王××，女，55岁，常用上方，减肥甚佳。

3. 饭前吃水果减肥

[方剂] 各种水果减肥

[制用法] 饭前30~45分钟先吃一些水果或饮用1杯果汁。

[功效] 降体重，减肥胖。

[验证] 据《老年报》1992年4月刊介绍，饭前吃水果可以减肥。因为：①在餐前饮用果汁的实验者在进餐时所吸收的热量比平时要减少20%~40%。②水果内所含的果糖，使身体内渴求热量的欲望得到满足，进餐时对食物的需求便减少。③几乎所有的实验者在食“餐前果”后，进餐时对脂肪性食物的需求都大大减少，从而间接阻遏体内过多脂肪的堆积。

4. 大腹皮冬瓜皮等减肥

[方剂] 炒薏苡仁150克，大腹皮、冬瓜皮、茯苓、炒苍术、炒白术各100克，陈皮80克。

[制用法] 将上药研为极细末，过120目筛，水泛为细小丸，每服8克（约40粒）。每日3次。本方为1剂药。服药1剂后，可续服2~3剂。

[验证] 用本方治疗肥胖病患者66例，经用药1~3剂后，其中体重减轻2~3公斤者21例；体重减轻4~5公斤者34例；体重减轻6~8公斤者11例。治程中未见不良反应发生。

5. 生地黄生黄芪等可减肥

[方剂] 生地黄、生黄芪、黑小豆各30克，防己、白术、茯苓、漏芦、决明子、荷叶各10克，红人参8克，蜈蚣2条，生甘草5克。

[制用法] 将上药水煎成150ml，每次50ml，分3次口服。半个月为1个疗程。1个疗程结束，可续服2~3个疗程，直至体重恢复正常

止。

- [验 证] 用本方治疗肥胖病患者 58 例，经用药 1~3 个疗程后，其中体重下降 2~3 公斤者 10 例；4~5 公斤者 36 例；6~8 公斤者 12 例。治程中，未见不良反应发生。

十七、乌须美发

1. 黑豆治青年白发

- [方 剂] 黑豆 150 克，盐少许。
- [制用法] 遵古法泡制，即经九蒸九晒，口嚼后淡盐水送服。每次吃 6 克，日服 2 次。
- [功 效] 乌须黑发，益寿延年。
- [验 证] 据《老年报》介绍此法效果甚妙。

2. 芝麻核桃糖治须发早白

- [方 剂] 红砂糖 500 克，黑芝麻 250 克，核桃仁 250 克。
- [制用法] 红砂糖放在锅内，加水少许，以小火煎熬至较浓稠时，加入炒熟之黑芝麻与核桃仁，调匀，即停火。趁热将糖倒在表面涂有食油的大搪瓷盘中，待稍冷，将糖压平，用刀划成小块即成。
- [功 效] 治少年白发。
- [验 证] 患者反映效果满意。

3. 芝麻油治发落不生

- [方 剂] 生芝麻。
- [制用法] 榨取其油。涂抹头皮，每日数次。
- [功 效] 润燥，泽肤。用治头发枯干、脱落不生。
- [验 证] 《健康报》推荐，读者反映效果良好。

4. 南烛膏黑发驻颜

- [方 剂] 南烛树枝叶或根皮（春夏取枝叶，秋冬取根皮）。
- [制用法] 南烛加清水文火煎煮（用量配比 1: 2），过滤去滓，净锅文火再煮至如膏状，装瓶备用。每次以温酒对服 1 匙南烛膏，日 3 次，久服有效。
- [功 效] 固精驻颜，轻身明目。用治未老先衰、须发早白、体肥胖及视力低下。

〔验证〕 刘××，男，43岁，用上方法，效果良好。

〔备注〕 我国江淮一带，每逢清明节前后，采南烛叶煮粳米饭，俗称“乌饭”。据民间传说，乌饭可以强筋骨，益力气，轻身而长寿。

5. 姜皮生黑发方

〔方剂〕 老生姜皮 300 克。

〔制用法〕 放于有油腻的锅内，加盖不漏气，以文武火煎之。然后取之晾干，研成细粉备用。用时先拔去白发，用手指捏少许姜末按入头毛孔中，或先点毛发根下后拔，再按入姜粉。

〔功效〕 生黑发。用治白发。

〔验证〕 据《图经本草》介绍，此法“三日后当生黑者，神效。”

6. 醋煮黑豆刷染白发

〔方剂〕 黑豆 120 克，米醋 500 克。

〔制用法〕 以醋煮黑豆（不加水）如稀糊状，过滤去滓。用牙刷蘸醋液刷毛发，每日 1 次。

〔功效〕 用治各种非遗传性白发。

〔验证〕 《老年报》介绍经读者多次验证效果颇佳。

〔备注〕 头皮有皮肤病者禁用。

7. 核桃绿皮染发方

〔方剂〕 鲜核桃绿皮、蝌蚪等份。

〔制用法〕 上两味共捣如泥，涂抹须发，2 或 3 次即黑。

〔功效〕 染发成黑。用治须发早白。

〔验证〕 据《外台秘要》介绍，此法“一染即黑”。

8. 乌发丸治疗少年白发

少年白发是指青年男女发间生出白发或黑发变细变黄变白的一种毛发营养与代谢障碍性疾病。其病因可能因精神因素、遗传或神经内分泌功能失调有关。男与女比为 1:3。

〔方剂〕 当归须 100 克，生黄芪 100 克，广地龙 30 克，廬虫 30 克，水蛭 30 克，僵蚕 60 克，地骨皮 100 克，白云苓 200 克，生、熟地各 100 克，石菖蒲 30 克，远志 30 克，川牛膝 60 克，菟丝子 100 克，天麻 30 克，羌活 30 克，白芍 60 克，川芎 30 克，肉苁蓉 60 克，穿山甲 30 克，鹿角霜 60 克。

- 〔制用法〕** 诸药粉碎，水泛为丸如小绿豆大，每次5克，1日3次，饭后，以白云苓、当归各10克，肉苁蓉、合欢皮各6克，煎水作汤送服。3个月为1个疗程。
- 〔功效〕** 益精养血，化瘀乌发。
- 〔验证〕** 潘某某，女，20岁，农民。从15岁始，每梳洗时，总见白发根根，近3年来，白发越来越多，梳头时并有少量脱发，发梢日渐变黄，甚为烦恼。时而纳少、多梦，脉涩，苔白舌黯红，面少华色，经来腹痛量少，二便如常。诊为少年白发。辨证为肾虚血瘀。方用乌发丸：当归须、生黄芪、地骨皮、生熟地、菟丝子各100克，广地龙、廋虫、水蛭、石菖蒲、远志、天麻、羌活、川芎、穿山甲各30克，白云苓200克，川牛膝、杭白芍、肉苁蓉、僵蚕、鹿角霜各60克。上药粉碎，水泛为丸如绿豆大小每次5克，1日3次。饭后，以白云苓、当归各10克，肉苁蓉、合欢皮各6克，煎水作汤送服。3个月后复诊，淡黄发梢好转，白发亦减少。再投1剂以善后。1年后追访，头发虽不甚乌，但黄发梢及白发全无。

十八、爽口香身

1. 杏仁膏使齿洁口香

- 〔方剂〕** 生杏仁50克，食盐100克。
- 〔制用法〕** 杏仁浸泡后去皮尖，食盐上锅炒至变色，共捣成膏状。刷牙时使用。
- 〔功效〕** 洁齿，爽口，消炎。
- 〔验证〕** 据《圣惠方》载，清末文人李慈铭满口牙齿黄黑，经用此方数日黄黑渐退，半载余满口牙白。

2. 浓茶漱口爽口洁齿

- 〔方剂〕** 茶叶（红、绿、花茶均可）
- 〔制用法〕** 开水冲泡，以浓为佳。漱口。
- 〔功效〕** 去油污，爽口腔，除杂滓。可使口腔清爽，提神醒脑。
- 〔验证〕** 李时珍云：用茶水漱口“能坚齿消蠹，深得饮茶之妙”。

3. 松树皮丸美容香身

- 〔方剂〕** 松树皮（取第2层白皮）500克，大枣（去核）100克，肉桂50

克，冬瓜子（去皮）100克，蜂蜜600克。

[制用法] 先将枣捣成泥，再将松树皮、肉桂、冬瓜仁研成细末，过筛，与枣泥拌匀，加蜂蜜调作蜜丸，如枣般大。每日早晚各服3~5丸，坚持服用，见效。

[功效] 松树白皮是常绿大乔木油松的根皮，含有挥发油，能直接产香，发散芳香气味。其他药可能是通过人体内分泌的代谢作用使皮肤散发香气。

[验证] 《家庭医学》杂志介绍此方绝妙。

[备注] 此种美容香身之方，在古医籍中，如《食疗本草》、《千金要方》里都有记载，据称有“香身辟秽”之功，久服“百日衣被皆香”之妙。

4. 香草浴液香身爽体

[方剂] 香草。

[制用法] 煎水沐浴用。

[功效] 沐浴后使人身香气不散。

[验证] 《健康报》介绍读者反映方法可取，值得推广。

[备注] 香草，多年生草本植物，含豆香素，其味芬芳，我国古代民间常用复草浸剂沐浴爽身。《本草衍义》中的“茅香汤”即为此。

第七篇 解烟毒、酒毒秘方

1. 豆酱缓解烟毒

〔方 剂〕 豆瓣酱。

〔制用法〕 买成品。佐餐。

〔功 效〕 豆瓣酱有分解尼古丁的作用，可缓解或减轻烟草的毒害。

〔验 证〕 本方经《卫生报》介绍，疗效理想值得推广。

2. 戒烟糖戒除吸烟嗜好

〔方 剂〕 白人参 15 克，远志 45 克，地龙 45 克，鱼腥草 50 克，白砂糖 100 克。

〔制用法〕 先将白人参等四味中药放入锅中，加水适量，煎煮。每 20 分钟取煎液 1 次，加水再煎，共煎取液 3 次。然后合并煎液，再以小火煎煮浓缩，待煎液较稠厚时加糖，调匀。再煎至用铲挑起即成丝状而不粘手时，停火。趁热将糖倒在涂有食油的大搪瓷盘中，待晾凉，将糖分割成块即可。经常含食，或想吸烟时吃。

〔功 效〕 可辅助戒除吸烟之嗜好。

〔验 证〕 本方经《卫生报》介绍，疗效理想值得推广。

3. 萝卜戒烟简单有效

〔方 剂〕 白萝卜，白糖。

〔制用法〕 白萝卜洗净，切成细丝，用纱布挤出苦涩的汁液不用。每天清晨吃一小盘加糖的萝卜丝，吃后吸烟就觉得淡而无味，或不再想吸烟，从而慢慢克服烟瘾，达到戒烟的目的。

〔功 效〕 戒除吸烟的不良嗜好。

〔验 证〕 本方经《卫生报》介绍，疗效理想值得推广。

4. 加味丁桂散戒烟

〔方 剂〕 丁香、肉桂、麸氨酸钠（食用味精）各等份。

〔制用法〕 上药共研细末，贮瓶备用。用时取药粉 0.5~1 克用医用凡士林

调成膏状，或加少许白酒做成药饼，贴敷于合谷穴压痛明显侧的甜味穴（在腕背桡侧横穴上约 0.7 寸处），外用胶布固定，24 小时后取下。

[验证] 据报道，治疗 128 例，显效 82 例，有效 32 例，无效 14 例，总有效率为 88.9%（疗效标准是在贴药 10 分钟后，视烟量大小，可试吸香烟 1 或 2 支，记录反应。显效：试吸烟味仅变淡、头昏、恶心、频吐涎沫、厌烟、甚至厌别人喷吐的烟雾。有效：试吸烟仅烟味变淡，烟量减半，需经贴药 2 或 3 次者。无效：试烟无反应，经贴 3 次仍无反应者）。

5. 萝卜解酒后头痛

[方剂] 萝卜 1 个，红糖适量。

[制用法] 萝卜洗净后捣成泥状，加适量红糖混合。冷服。

[功效] 清肺凉胃，活血通气。用治饮酒过量引起的头痛、头晕。

6. 浓茶除口臭解烟酒之毒

[方剂] 花茶（或红茶）适量。

[制用法] 以沸水冲沏。待茶变浓时饮用。

[功效] 清心神，凉肝胆。浓茶能除口臭，解因吸烟过量所致的心慌恶心，并能解酒。

7. 螺蚌葱豉汤治酒醉不省

[方剂] 田螺、河蚌、大葱、豆豉各适量。

[制用法] 田螺捣碎，河蚌取肉，同葱与豆豉共煮。饮汁 1 碗即解。

[功效] 祛热醒酒。用治饮酒过量醉而不省人事。

8. 老菱角汤解酒毒

[方剂] 老菱角及鲜菱草茎共 150 克。

[制用法] 水煎服。

[功效] 用治饮酒过量中毒。

9. 柿子防酒醉

[方剂] 柿子 1 个。

[制用法] 柿子洗净，削去皮。饮酒前吃。

[功效] 可解酒醉，防止酒醉。

10. 甘蔗汁解酒醉不食

[方剂] 甘蔗汁、牛奶各适量。

[制用法] 甘蔗汁与牛奶共温服，用量不限。

[功效] 除热哝，疗反胃。用治嗜酒成癖，酒醉数日不进食。

[验证] 上5——10方经《新中医》介绍，疗效确切。

11. 解酒简易偏方 8 例

[验方一]

松花蛋 1 个，蘸醋徐徐吃下。

[验方二]

吃梨或饮梨汁。

[验方三]

醋 1 小杯，徐徐饮下。

[验方四]

绿茶浓煎，镇冷后多量饮服。

[验方五]

红茶菌 1 大杯，一次饮下，醒酒、止呕、催吐之效极验。

[验方六]

鲜藕洗净，捣碎，绞汁饮服。

[验方七]

鲜橙 1 个，榨汁饮之。或吃鲜橙（橘、柑亦有效果）。

[验方八]

柑皮焙干为末，入盐 1.5 克，点汤服之。

12. 葛花萝卜煎治酒精中毒

[方 剂] 干葛花 60 克，鲜萝卜 500 克。

[制用法] 将上药加水煮沸，边煎边服。服药过程中，应观察患者的变化。

[验证] 用上药治疗酒精中毒患者 4 例，均获治愈。

第八篇 解食物中毒秘方

1. 楠木治河豚鱼中毒

〔方 剂〕 楠木（二层皮）60～120克。

〔制用法〕 将上药加水300～600ml，煎至200～400ml，1次口服或灌服。

〔验 证〕 用上药治疗河豚鱼中毒患者38例，均获治愈。

2. 南瓜根汤治河豚毒

〔方 剂〕 南瓜根1公斤。

〔制用法〕 煎浓汁饮。

〔功 效〕 用治河豚中毒。

〔验 证〕 据《浙江中医杂志》1965年第9期介绍：有两名饮事员食河豚中毒，全身紫青，面色灰白，神志昏迷，呼吸急促，脉微细，腹如鼓。遂用南瓜根1000克，清水四碗，煎取浓汁两大碗，灌之。40分钟后病人苏醒，腹胀消退而愈。

3. 番薯叶解河豚及菌毒

〔方 剂〕 番薯嫩叶。

〔制用法〕 将嫩叶捣烂，冲入开水。大量灌服催吐，不吐再灌，待吐出黏液即奏效。

〔功 效〕 用治误食河豚或毒菌中毒。

〔验 证〕 屡用效佳。

4. 芦根汤解河豚或蟹中毒

〔方 剂〕 鲜活芦根150～200克，鲜姜25克，紫苏叶25克。

〔制用法〕 水煎服。

〔功 效〕 用治河豚或其他鱼、蟹中毒，腹痛吐泻。

〔验 证〕 吴××，男，27岁，食鱼虾后腹痛不止，伴恶心，呕吐腹泻，经服上方后痊愈。

5. 无花果叶治鱼蟹中毒

〔方 剂〕 无花果叶（采新嫩叶）适量。

[制用法] 将叶洗净捣烂绞汁。顿服半杯。

[功效] 用治食鱼蟹中毒。

6. 鲜冬瓜汁解鱼蟹中毒

[方剂] 鲜冬瓜。

[制用法] 将瓜洗净切碎，捣烂如泥，绞取其汁。大量饮服。

[功效] 利尿解毒。用治误食河豚及其他鱼、蟹中毒引起的呕吐、腹痛。

[验证] 以上两方经《医药保健》介绍，疗效确切。

7. 杏树皮解杏仁中毒

[方剂] 杏树皮 60 克。

[制用法] 将杏树外表皮削去不用，取中间纤维部分，加水 200 毫升，煮沸 20 分钟，去渣。饮汁温服。

[功效] 用治食杏仁过量引起的头痛眩晕、倦怠无力、恶心呕吐、意识不清，呼吸困难、气喘、牙关紧闭。

[验证] 治疗 23 例，显效 19 例，有效 4 例，总有效率 100%。

8. 鱼脑石解野菌中毒

[方剂] 鱼脑石（黄花鱼头中之石）25 克，黑豆 50 克，甘草 25 克。

[制用法] 共煎煮成浓汤。尽量多饮。

[功效] 解野菌毒。

[验证] 屡用效佳。

9. 生鸡血解砒霜中毒

[方剂] 生鸡血（1 只全用）。

[制用法] 鸡血加一碗温开水，调匀。一次服，服后约 20 分钟呕吐。

[功效] 解热毒。用治服砒霜中毒。

[验证] 临床治疗 33 例，疗效理想。

10. 胡萝卜缨解砒毒

[方剂] 胡萝卜缨。

[制用法] 开水浸泡，尽量饮服。

[功效] 胡萝卜缨味辛、甘、性温，解毒利尿。用于治疗砒霜中毒。

[验证] 据《医学衷中参西录》记载：一褚姓，大妻反目，其妻怒吞砒石，其夫出门赌博未归。夜间砒毒发作，心中热渴异常，遂尽饮锅泡干胡萝卜缨之水，热渴顿止。迨其夫归，犹未知也。隔

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "before_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTI3NDIzNzQuemlw",
    "filename_decoded": "12742374.zip",
    "filesize": 16289954,
    "md5": "38150a9c2a05212329dfa25b80e86892",
    "header_md5": "ab43d18e2969f24dbbbd041ae0cd4500",
    "sha1": "0727bc40fba4338b48bda694ea954c8ce84f6f93",
    "sha256": "286a7e808d98ab5e6e827f0838ecb7fae9a9b37a00cb0bda7b298ffb69896e15",
    "crc32": 1903888163,
    "zip_password": "52gv",
    "uncompressed_size": 16628812,
    "pdg_dir_name": "12742374",
    "pdg_main_pages_found": 378,
    "pdg_main_pages_max": 378,
    "total_pages": 409,
    "total_pixels": 15650352
  },
  "after_pdg2pic_conversion": {
    "filename": "MTI3NDIzNzQuemlw",
    "filename_decoded": "12742374.zip",
    "filesize": 29195060,
    "md5": "84709a0ebaeec6e7fd67e34d46193ee1",
    "header_md5": "33c9d87e7544915ca8e9ce3731727a50",
    "sha1": "c9465a59c6ad1d385483e45ba1295003ca76cfeb",
    "sha256": "47a3a18b118d218856736df39a677e77991ec9dc97e25b5c6bc95e94abfed918",
    "crc32": 2110672268,
    "zip_password": "",
    "uncompressed_size": 30028750,
    "pdg_dir_name": "",
    "pdg_main_pages_found": 378,
    "pdg_main_pages_max": 378,
    "total_pages": 409,
    "total_pixels": 2110435488
  },
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```