الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المركز الولائي سوق أهراس

السنة الدراسية: 2026/2027 المستوى: سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي ورياضيات

فرض المراقبة الذاتية رقم 01

التمرين 1: كثيرات الحدود (06 نقاط)

نعتبر كثير الحدود P المعرّف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.

1. تحقّق أن 3 جذر لكثير الحدود $P(x)$.
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (x-3)(ax^2 + bx + c)$.
3. حُلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$.
4. ادرس إشارة $P(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي x ، ثم استنتج حلول المتراجحة: $P(x) \leqslant 0$.
5. استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المعادلة: $2x^6 - 3x^4 - 11x^2 + 6 = 0$.

التمرين 2: الدوال: التفكيك واتجاه التغير والتناظر (06 نقاط)

I. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = (x-2)^2 - 1$.
2. عيّن دالتين مرجعيتين أو تآلفيتين u و v بحيث: $f = v \circ u$.
3. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f على كل من المجالين $]-\infty; 2]$ و $[2; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
4. بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $x = 2$ محور تناظر للمنحنى (C_f).

II. h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ: $h(x) = \dfrac{2x-5}{x-3}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني.

1. تحقّق أنه من أجل كل $x \neq 3$: $h(x) = 2 + \dfrac{1}{x-3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر h على كل من المجالين $]-\infty; 3[$ و $]3; +\infty[$.
2. بيّن أن النقطة $\Omega(3; 2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_h).

التمرين 3: الاحتمالات (08 نقاط)

يحتوي كيس على 5 كريات متماثلة لا نفرّق بينها باللمس ، تحمل الأرقام: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 2. نسحب عشوائياً كريتين من الكيس على التوالي ودون إرجاع ، ونسجّل الرقمين المحصل عليهما.

1. مثّل مجموعة الإمكانيات بجدول ذي مدخلين ، ثم عيّن عددها.

2. احسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:

(أ) A: «مجموع الرقمين يساوي 3».

(ب) B: «الكريتان تحملان نفس الرقم».

(جـ) C: «إحدى الكريتين على الأقل تحمل الرقم 0».

(د) $A \cup C$.

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع الرقمين المسجلين.

(أ) عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ ، والتباين $V(X)$ ، والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

4. يدفع لاعب m دينار للمشاركة في اللعبة ، ويتحصل على $10X$ دينار. ليكن G ربحه الجبري.
عبّر عن $E(G)$ بدلالة m ، ثم عيّن قيمة m التي تجعل اللعبة عادلة.

بالتوفيق

الحل النموذجي وسلم التنقيط

حل التمرين 1

1. $P(3)=2(27)-3(9)-11(3)+6=54-27-33+6=0$ ، إذن 3 جذر لـ $P(x)$. **(0,5)**

2. بالنشر: $(x-3)(ax^2+bx+c)=ax^3+(b-3a)x^2+(c-3b)x-3c$.
بالمطابقة مع $P(x)$: $a=2$ ؛ $b-3a=-3$ ومنه $b=3$ ؛ $c-3b=-11$ ومنه $c=-2$ ؛ والتحقق: $-3c=6$.
إذن: $P(x)=(x-3)\left(2x^2+3x-2\right)$ **(1,5)**

3. $P(x)=0$ معناه $x-3=0$ أو $2x^2+3x-2=0$.
$\Delta=3^2-4(2)(-2)=25$ ، $x_1=\dfrac{-3-5}{4}=-2$ ، $x_2=\dfrac{-3+5}{4}=\dfrac{1}{2}$.
مجموعة الحلول: $S=\left\{-2;\frac{1}{2};3\right\}$ **(1)**

4. $P(x)=(x-3)(x+2)(2x-1)$:

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$2x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

حلول المتراجحة $P(x)\leqslant 0$: $S=]-\infty;-2]\cup\left[\frac{1}{2};3\right]$ **(1,5)**

5. نضع $X=x^2$ $(X\geqslant 0)$ فتصبح المعادلة $2X^3-3X^2-11X+6=0$ أي $P(X)=0$.
ومنه $X=-2$ (مرفوض لأن $X\geqslant 0$) أو $X=\frac{1}{2}$ أو $X=3$.
$x^2=\frac{1}{2}$ معناه $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ ؛ $x^2=3$ معناه $x=\pm\sqrt{3}$.
مجموعة الحلول: $S=\left\{-\sqrt{3};-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2};\sqrt{3}\right\}$ **(1,5)**

حل التمرين 2

I.

1. $f(x)=x^2-4x+3=(x-2)^2-1=x^2-4x+4-1$ **(0,5)**

2. نضع $u(x)=x-2$ و $v(x)=x^2-1$ ، فيكون: $v\big(u(x)\big)=(x-2)^2-1=f(x)$ ، أي $f=v\circ u$ **(1)**

3. **على** $]-\infty;2]$: u **متزايدة** و $u(x)\in]-\infty;0]$ ، و v **متناقصة** على $]-\infty;0]$ ، إذن f **متناقصة** على $]-\infty;2]$.
على $[2;+\infty[$: u **متزايدة** و $u(x)\in[0;+\infty[$ ، و v **متزايدة** على $[0;+\infty[$ ، إذن f **متزايدة** على $[2;+\infty[$.
$f(2)=-1$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	-1	$\nearrow$	

(1,5)

4. من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $(4-x) \in \mathbb{R}$ و $f(4-x) = (4-x-2)^2-1 = (2-x)^2-1 = (x-2)^2-1 = f(x)$.
إذن $f(2\times 2-x) = f(x)$ ، والمستقيم $x=2$ محور تناظر لـ (C_f). **(1)**

II.

1. $2+\dfrac{1}{x-3} = \dfrac{2(x-3)+1}{x-3} = \dfrac{2x-5}{x-3} = h(x)$.
$h = w\circ g$ مع $g(x) = x-3$ (متزايدة) و $w(X) = 2+\dfrac{1}{X}$ (متناقصة على كل من $]0;+\infty[$ و $]-\infty;0[$).
إذن h متناقصة على كل من المجالين $]3;+\infty[$ و $]-\infty;3[$. **(1)**

2. من أجل كل $x \neq 3$: $(6-x) \neq 3$ و $h(6-x)+h(x) = 2+\dfrac{1}{3-x}+2+\dfrac{1}{x-3} = 4 = 2\times 2$.
إذن $h(2\times 3-x)+h(x) = 2\times 2$ والنقطة $\Omega(3;2)$ مركز تناظر لـ (C_h). **(1)**

حل التمرين 3

1. نرمز للكريات بـ: 0 ، 1_a ، 1_b ، 2_a ، 2_b. السحب على التوالي دون إرجاع: الترتيب مهم ولا تكرار ، فنشطب القطرة في كل خانة نكتب مجموع الرقمين (قيمة X):

I\II	0	1_a	1_b	2_a	2_b
0	$\times$	1	1	2	2
1_a	1	$\times$	2	3	3
1_b	1	2	$\times$	3	3
2_a	2	3	3	$\times$	4
2_b	2	3	3	4	$\times$

عدد الإمكانيات: $5\times 4 = 20$ ، وهي متساوية الاحتمال. (البرتقالي: الحادثة A ، الأخضر: الحادثة C.) **(1,5)**

2.

(أ) A: الخانات البرتقالية: 8 ، إذن $P(A) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ **(0,5)**

(ب) B: الثنائيات $(1_a;1_b)$ ، $(1_b;1_a)$ ، $(2_a;2_b)$ ، $(2_b;2_a)$: $P(B) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ **(0,5)**

(جـ) C: الخانات الخضراء: 8 ، إذن $P(C) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ **(0,5)**

(د) $A\cap C = \varnothing$ (مع الرقم 0 لا يتجاوز المجموع 2) ، إذن $P(A\cup C) = P(A)+P(C)-P(A\cap C)$
$\frac{2}{5}+\frac{2}{5}-0 = \frac{4}{5}$ **(1)**

3.

(أ) القيم الممكنة: $X \in \{1;2;3;4\}$. بعدّ الحالات: $P(X=1)=\frac{4}{20}$ ، $P(X=2)=\frac{6}{20}$ ، $P(X=3)=\frac{8}{20}$ ، $P(X=4)=\frac{2}{20}$:

x_i	1	2	3	4	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$	1

(1,5)

(ب) $E(X)=1\times\frac{1}{5}+2\times\frac{3}{10}+3\times\frac{2}{5}+4\times\frac{1}{10}=\frac{2+6+12+4}{10}=\frac{12}{5}=2,4$ **(0,5)**

$V(X)=\sum x_i^2P(X=x_i)-\big(E(X)\big)^2=\frac{2+12+36+16}{10}-\left(\frac{12}{5}\right)^2=\frac{33}{5}-\frac{144}{25}=\frac{21}{25}=0,84$

$\sigma(X)=\sqrt{V(X)}=\frac{\sqrt{21}}{5}\approx 0,92$ **(1)**

4. $G=10X-m$ ، ومنه $E(G)=10E(X)-m=24-m$.

اللعبة عادلة معناه $E(G)=0$ ، أي $m=24$ دينار. **(1)**

سلم التنقيط

التمرين	س1	س2	س3	س4	س5	المجموع
الأول	0,5	1,5	1	1,5	1,5	06
الثاني	I: $0,5+1+1,5+1$ II: $1+1$					06
الثالث	1,5	2,5	3	1	–	08
المجموع						20