الدالة اللوغاريتمية النيبيرية

ملخص بأمثلة محلولة خطوة بخطوة وتمارين من نمط البكالوريا

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

محتوى الملخص

1. التعريف: الدالة الأصلية لمقلوب x
2. الخواص الجبرية
3. تبسيط عبارات لوغاريتمية
4. المعادلات اللوغاريتمية
5. معادلات من الدرجة الثانية في $\ln x$
6. المتراجحات اللوغاريتمية
7. النهايات والنهايات الشهيرة
8. المشتقات ، الدالة $\ln u$
9. دراسة الدالة $\ln$ وتمثيلها
10. اللوغاريتم العشري وذو الأساس a
11. تطبيقات اقتصادية
12. أمثلة من بكالوريا تسيير واقتصاد
13. مثال شامل من نمط البكالوريا
14. خلاصة الطرائق

تنبيه حول الترتيب

في شعبة تسيير واقتصاد تُدرس الدالة اللوغاريتمية **قبل** الدالة الأسية: نعرّفها انطلاقًا من الدوال الأصلية ، ولا نستعمل الدالة الأسية في هذا الدرس.

1. التعريف: الدالة الأصلية لمقلوب x

تعريف

الدالة $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ مستمرة على $]0;+\infty[$ ، فهي تقبل دوالًا أصلية عليه.

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية ، ونرمز لها بـ $\ln$ ، هي **الدالة الأصلية للدالة** $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ **على** $]0;+\infty[$ **والتي تنعدم عند** 1: من أجل كل $x > 0$:

$$\ln 1 = 0 \quad ; \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

نتائج مباشرة

- مجموعة تعريف $\ln$ هي $]0;+\infty[$ ، و $\ln$ قابلة للاشتقاق (إذن مستمرة) عليها.
- $(\ln x)' = \dfrac{1}{x} > 0$: الدالة $\ln$ **متزايدة تمامًا** على $]0;+\infty[$.

- العدد $e \approx 2{,}718$ هو العدد الذي يحقق $\ln e = 1$.
- إشارة $\ln x$: $\ln x < 0$ إذا كان $0 < x < 1$ ؛ $\ln 1 = 0$ ؛ $\ln x > 0$ إذا كان $x > 1$.

بالآلة الحاسبة

$\ln 2 \approx 0{,}69$ ؛ $\ln 3 \approx 1{,}10$ ؛ $\ln \frac{1}{2} \approx -0{,}69$ ؛ $\ln 10 \approx 2{,}30$.

2. الخواص الجبرية

من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تمامًا a و b ، وكل عدد صحيح n

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$
$\ln \frac{1}{a} = -\ln a$	$\ln a^n = n \ln a$
$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$	$\ln e^n = n$

برهان الخاصية الأساسية

نثبت $a > 0$ ونضع $h(x) = \ln(ax) - \ln x$ على $]0;+\infty[$: $h'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = 0$ ، إذن h ثابتة ، و $h(1) = \ln a$.
ومنه $\ln(ax) = \ln a + \ln x$.

نتائج: المقارنة

من أجل $a > 0$ و $b > 0$ (لأن $\ln$ متزايدة تمامًا):

$$\ln a < \ln b \iff a < b \qquad \ln a = \ln b \iff a = b$$

ومن أجل كل عدد حقيقي k: $k = k \ln e = \ln e^k$ ، إذن $\ln x = k \iff x = e^k$.

3. تبسيط عبارات لوغاريتمية

كتابة عدد بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$

نحلل الأعداد إلى جداء عوامل أولية ، ثم نطبق $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ و $\ln a^n = n \ln a$.

اكتب بدلالة $\ln 2$ و $\ln 3$

- $\ln 18 = \ln(2 \times 3^2) = \ln 2 + 2\ln 3$.
- $\ln \dfrac{16}{9} = \ln 2^4 - \ln 3^2 = 4\ln 2 - 2\ln 3$.
- $\ln \sqrt{12} = \dfrac{1}{2}\ln(2^2 \times 3) = \ln 2 + \dfrac{1}{2}\ln 3$.
- $A = \ln 12 - \ln 3 + \ln \dfrac{1}{4} = \ln \dfrac{12}{3 \times 4} = \ln 1 = 0$.

أعداد فيها e

- $\ln e^3 = 3$ ؛ $\ln \dfrac{1}{e} = -\ln e = -1$ ؛ $\ln \sqrt{e} = \dfrac{1}{2}\ln e = \dfrac{1}{2}$.
- $B = \ln(e^2\sqrt{e}) = \ln e^2 + \ln \sqrt{e} = 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$.
- $C = \ln\left(\sqrt{5}+1\right) + \ln\left(\sqrt{5}-1\right) = \ln(5-1) = \ln 4 = 2\ln 2$.

4. المعادلات اللوغاريتمية

حل معادلة لوغاريتمية

1. نعيّن مجموعة الحلول الممكنة D (العبارات داخل $\ln$ موجبة تمامًا).
2. نكتب المعادلة على الشكل $\ln A = \ln B$ (أي $A = B$) ، أو $\ln A = k$ (أي $A = e^k$).
3. نحتفظ بالحلول التي تنتمي إلى D.

حل في $\mathbb{R}$

1. $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$: D : $2x-1>0$ و $x+3>0$ ، أي $D = \left]\dfrac{1}{2}; +\infty\right[$.

$2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4 \in D$; $S = \{4\}$

2. $\ln(3x-2)=0$: $D=\left]\frac{2}{3};+\infty\right[$

$$\ln(3x-2)=\ln 1 \;\Rightarrow\; 3x-2=1 \;\Rightarrow\; x=1\in D \quad ; \quad S=\{1\}$$

3. $\ln(x+1)=4$: $D=]-1;+\infty[$

$$\ln(x+1)=\ln e^4 \;\Rightarrow\; x+1=e^4 \;\Rightarrow\; x=e^4-1\in D \quad ; \quad S=\{e^4-1\}$$

4. $\ln x+\ln(x-1)=\ln 6$: $D=]1;+\infty[$

$$\ln\big(x(x-1)\big)=\ln 6 \;\Rightarrow\; x^2-x-6=0 \;\Rightarrow\; (x-3)(x+2)=0$$

$x=3\in D$ أو $x=-2\notin D$ ، إذن $S=\{3\}$.

5. **(بكالوريا 2018)** $\ln(x+2)+\ln(8-x)=\ln 16$: $D=]-2;8[$

$$(x+2)(8-x)=16 \;\Rightarrow\; -x^2+6x+16=16 \;\Rightarrow\; x(6-x)=0$$

$x=0$ أو $x=6$ ، وكلاهما في D: $S=\{0;6\}$.

6. **(بكالوريا 2016)** $(2x-4)\ln x=0$: $D=]0;+\infty[$ جداء معدوم:

$$2x-4=0 \;\Rightarrow\; x=2 \quad ; \quad \ln x=0 \;\Rightarrow\; x=1 \quad ; \quad S=\{1;2\}$$

ملاحظة

$\ln x+\ln(x-1)$ و $\ln\big(x(x-1)\big)$ ليستا لهما نفس مجموعة التعريف: نعيّن D من المعادلة الأصلية **قبل** أي تحويل.

5. معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية في $\ln x$

المعادلة $a(\ln x)^2+b\ln x+c=0$

1. $D=]0;+\infty[$ ، ونضع $X=\ln x$ فنحصل على $aX^2+bX+c=0$.
2. نحسب $\Delta=b^2-4ac$ ونعيّن X_1 و X_2 (إذا كان $\Delta\geqslant 0$).
3. نرجع إلى x: $\ln x=X_1$ يعطي $x=e^{X_1}$ ، و $\ln x=X_2$ يعطي $x=e^{X_2}$.

حل في $\mathbb{R}$

1. **(بكالوريا 2010)** $(\ln x)^2+2\ln x-3=0$: نضع $X=\ln x$:

$$X^2+2X-3=0\;;\;\Delta=4+12=16\;;\;X_1=\frac{-2-4}{2}=-3\;;\;X_2=\frac{-2+4}{2}=1$$

$\ln x = -3$ يعطي $x = e^{-3}$ ، و $\ln x = 1$ يعطي $x = e$: $S = \{e^{-3}; e\}$.

2. $(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$:

$$\Delta = 9 - 8 = 1 \; ; \; X_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \; ; \; X_2 = \frac{3+1}{2} = 2$$

$x = e$ أو $x = e^2$: $S = \{e; e^2\}$.

3. $2(\ln x)^2 - \ln x - 1 = 0$: $2X^2 - X - 1 = 0$:

$$\Delta = 1 + 8 = 9 \; ; \; X_1 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2} \; ; \; X_2 = \frac{1+3}{4} = 1$$

$x = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$ أو $x = e$: $S = \left\{\frac{1}{\sqrt{e}}; e\right\}$.

4. $(\ln x)^2 - 4 = 0$: $(\ln x - 2)(\ln x + 2) = 0$ ، إذن $\ln x = 2$ أو $\ln x = -2$: $S = \{e^{-2}; e^2\}$.

5. $(\ln x)^2 + \ln x = 0$: $\ln x\,(\ln x + 1) = 0$ ، إذن $\ln x = 0$ أو $\ln x = -1$: $S = \left\{\frac{1}{e}; 1\right\}$.

6. $(\ln x)^2 + \ln x + 1 = 0$: $X^2 + X + 1 = 0$ ، $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: $S = \varnothing$.

متراجحات (بكالوريا 2010)

1. $2\ln x + 2 \geqslant 0$: $\ln x \geqslant -1 = \ln e^{-1}$ ، إذن $x \geqslant \frac{1}{e}$: $S = \left[\frac{1}{e}; +\infty\right[$.

2. $(\ln x)^2 + 2\ln x - 3 \leqslant 0$: نحلل: $(\ln x + 3)(\ln x - 1) \leqslant 0$.

x	0		e^{-3}		e		$+\infty$
$\ln x + 3$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$\ln x - 1$	‖	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$(\ln x+3)(\ln x-1)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S = [e^{-3}; e]$.

6. المتراجحات اللوغاريتمية

حل متراجحة لوغاريتمية

نعيّن D ، ثم نستعمل $A < B \iff \ln A < \ln B$ لأن $\ln$ متزايدة تمامًا. مجموعة الحلول S هي تقاطع D مع حلول المتراجحة الناتجة.

حل في $\mathbb{R}$

1. $\ln(2x-1) \leqslant 0$: $D = \left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$

$$\ln(2x-1) \leqslant \ln 1 \Rightarrow 2x-1 \leqslant 1 \Rightarrow x \leqslant 1 \quad ; \quad S = \left]\frac{1}{2}; 1\right]$$

2. $\ln(x+2) > \ln(3-x)$: $D =]-2; 3[$

$$x+2 > 3-x \Rightarrow x > \frac{1}{2} \quad ; \quad S = \left]\frac{1}{2}; 3\right[$$

3. $\ln x \geqslant 1$: $\ln x \geqslant \ln e \Rightarrow x \geqslant e$ ، $S = [e; +\infty[$.

4. $\ln x < -1$: $\ln x < \ln e^{-1} \Rightarrow 0 < x < \frac{1}{e}$ ، $S = \left]0; \frac{1}{e}\right[$.

5. $(\ln x)^2 - \ln x > 0$: $D =]0; +\infty[$ ، نحلل: $\ln x\,(\ln x - 1) > 0$.

x	0		1		e		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$	0	$+$	⋮	$+$	
$\ln x - 1$	‖	$-$	⋮	$-$	0	$+$	
$\ln x(\ln x - 1)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S =]0; 1[\cup]e; +\infty[$.

7. النهايات والنهايات الشهيرة

نهايات مرجعية

$\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$	$\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$	$\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$
(العدد المشتق للدالة $\ln$ عند 1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x-1} = 1$	

رفع حالة عدم التعيين

عند $+\infty$: نخرج x عاملًا مشتركًا لتظهر $\dfrac{\ln x}{x}$. عند 0^+: نُظهر $x\ln x$.

احسب النهايات

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x)$: حالة عدم تعيين ، نكتب: $x-\ln x = x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\ln x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right) = 1\end{cases}$

2. لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+}(x-\ln x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+} x = 0 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty\end{cases}$

3. نكتب: $\dfrac{2+\ln x}{x} = \dfrac{2}{x} + \dfrac{\ln x}{x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\ln x}{x} = 0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x} = 0\end{cases}$

4. لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2+\ln x}{x} = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}(2+\ln x) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to 0^+} x = 0^+\end{cases}$

5. لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+}(x\ln x - x + 1) = 1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0 \\ \lim\limits_{x\to 0^+}(-x+1) = 1\end{cases}$

6. نكتب: $\dfrac{\ln x}{x+1} = \dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{x+1}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x+1} = 0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1} = 1\end{cases}$

7. لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(2x+1)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{X\to+\infty}\ln X=+\infty\end{cases}$

8. لدينا: $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}^+}\ln(2x+1)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}^+}(2x+1)=0^+\\ \lim\limits_{X\to0^+}\ln X=-\infty\end{cases}$

8. المشتقات ، الدالة $\ln u$

خاصية

- $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$ على $]0;+\infty[$.
- إذا كانت u قابلة للاشتقاق وموجبة تمامًا على مجال I فإن: $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$.
- للدالتين u و $\ln u$ نفس اتجاه التغير على I.

احسب المشتقة


1. $f(x)=x-1-\ln x$: $f'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}$.
2. $g(x)=x\ln x-x$: $g'(x)=\ln x+x\times\dfrac{1}{x}-1=\ln x$.
3. $h(x)=\dfrac{\ln x}{x}$: $h'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\times x-\ln x}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.
4. $k(x)=(\ln x)^2$: $k'(x)=2\ln x\times\dfrac{1}{x}=\dfrac{2\ln x}{x}$.
5. $m(x)=\ln(x^2+1)$ على $\mathbb{R}$ $(x^2+1>0)$: $m'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$.
6. $p(x)=\ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$ على $]1;+\infty[$: $u'(x)=\dfrac{2}{(x+1)^2}$

$$p'(x)=\frac{u'(x)}{u(x)}=\frac{2}{(x+1)^2}\times\frac{x+1}{x-1}=\frac{2}{x^2-1}$$

اتجاه تغير $\ln u$

$f(x)=\ln(6-3x)$ على $]-\infty;2[$: الدالة $u(x)=6-3x$ موجبة تمامًا ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;2[$.
إذن f متناقصة تمامًا على $]-\infty;2[$.

9. دراسة الدالة ln وتمثيلها البياني



- $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$: محور التراتيب مقارب عمودي.
- $\lim\limits_{x\to +\infty} \ln x = +\infty$.
- المماس عند $(1;0)$: $y = x - 1$ ، والمنحنى تحته: $\ln x \leqslant x - 1$.
- $\ln e = 1$: النقطة $(e;1)$.

x	0		1		$+\infty$
$\frac{1}{x}$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	‖ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

10. اللوغاريتم العشري واللوغاريتم ذو الأساس a

تعريف

- $a > 0$ و $a \neq 1$: اللوغاريتم ذو الأساس a: $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$ على $]0;+\infty[$.
- اللوغاريتم العشري: $a = 10$: $\log x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$.

خاصية

للدالة $\log_a$ نفس الخواص الجبرية للدالة ln ، و $\log_a a = 1$ ، $\log_a a^n = n$. وبالخصوص $\log 10^n = n$.

مثال

- $\log 1000 = \log 10^3 = 3$ ؛ $\log 0{,}01 = \log 10^{-2} = -2$ ؛ $\log_2 8 = \dfrac{\ln 2^3}{\ln 2} = 3$.
- $\log x = 2 \iff x = 10^2 = 100$.

11. تطبيقات اقتصادية

إيداع بفائدة مركبة

نودع مبلغ $C_0 = 100000$ DA في بنك بفائدة مركبة سنوية $5\,\%$ ، فيصبح المبلغ بعد n سنة: $C_n = C_0 \times 1{,}05^n$.
بعد كم سنة يتضاعف المبلغ؟

$$C_n \geqslant 2C_0 \;\Rightarrow\; 1{,}05^n \geqslant 2 \;\Rightarrow\; n\ln 1{,}05 \geqslant \ln 2 \;\Rightarrow\; n \geqslant \frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}21$$

إذن يتضاعف المبلغ ابتداءً من السنة 15.

الربح

مؤسسة تنتج x آلاف قطعة $(1 \leqslant x \leqslant 10)$ ، والربح بملايين الدينارات: $B(x) = -x + 6\ln x + 2$.

$$B'(x) = -1 + \frac{6}{x} = \frac{6-x}{x}$$

$B'(x) > 0$ على $[1;6[$ و $B'(x) < 0$ على $]6;10]$: يكون الربح أعظميًا من أجل $x = 6$ (أي 6000 قطعة) ، وقيمته:

$$B(6) = -6 + 6\ln 6 + 2 = 6\ln 6 - 4 \approx 6{,}75$$

أي حوالي 6,75 مليون دينار.

12. أمثلة من بكالوريا تسيير واقتصاد

نهايات

1. (2014) $f(x) = x - 1 - \dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty}(x-1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x} = 0 \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to0^+}(x-1) = -1 \\ \lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln x}{x} = \lim\limits_{x\to0^+}\ln x \times \dfrac{1}{x} = -\infty \end{cases}$

2. (2016) $f(x) = \dfrac{x\ln x}{x+1}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = 0$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to0^+} x\ln x = 0 \\ \lim\limits_{x\to0^+}(x+1) = 1 \end{cases}$

نكتب: $f(x)=\ln x\times\dfrac{x}{x+1}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=1\end{cases}$

3. **(2016)** $f(x)=(2x-4)\ln x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^+}(2x-4)=-4\\ \lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-4)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty\end{cases}$

4. **(2016)** $g(x)=-4+2x+2x\ln x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=-4$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^+}(-4+2x)=-4\\ \lim\limits_{x\to0^+}2x\ln x=0\end{cases}$

5. **(2013)** $f(x)=3-x-\dfrac{2}{x}+\ln x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^+}(3-x)=3\\ \lim\limits_{x\to0^+}\left(-\dfrac{2}{x}\right)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty\end{cases}$

6. **(2018)** $f(x)=\ln(x+2)+\ln(8-x)-\ln 16$ على $]-2;8[$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-2^+}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-2^+}\ln(x+2)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-2^+}\ln(8-x)=\ln 10\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to8^-}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to8^-}\ln(x+2)=\ln 10\\ \lim\limits_{x\to8^-}\ln(8-x)=-\infty\end{cases}$

7. **(2015)** $f(x)=-x+1+3\ln(x+1)$ على $]-1;+\infty[$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1^+}(-x+1)=2\\ \lim\limits_{x\to-1^+}3\ln(x+1)=-\infty\end{cases}$

عند $+\infty$ حالة عدم تعيين ، نكتب: $f(x)=(x+1)\left(-1+3\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\right)+2$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(-1+3\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}\right)=-1\end{cases}$

مشتقات

1. **(2010)** $f(x) = (\ln x)^2 + 2\ln x - 3$:

$$f'(x) = 2\ln x \times \frac{1}{x} + \frac{2}{x} = \frac{2(\ln x + 1)}{x}$$

2. **(2014)** $f(x) = x - 1 - \dfrac{\ln x}{x}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{-g(x)}{x^2}$$

حيث $g(x) = 1 - x^2 - \ln x$.

3. **(2017)** $f(x) = x + 1 - \dfrac{3\ln x}{x}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{3(1 - \ln x)}{x^2} = \frac{x^2 - 3 + 3\ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

حيث $g(x) = x^2 + 3\ln x - 3$.

4. **(2016)** $f(x) = \dfrac{x\ln x}{x+1}$:

$$f'(x) = \frac{(\ln x + 1)(x+1) - x\ln x}{(x+1)^2} = \frac{x + 1 + \ln x}{(x+1)^2} = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

حيث $g(x) = x + 1 + \ln x$.

5. **(2016)** $f(x) = (2x - 4)\ln x$:

$$f'(x) = 2\ln x + \frac{2x - 4}{x} = \frac{2x\ln x + 2x - 4}{x} = \frac{g(x)}{x}$$

حيث $g(x) = -4 + 2x(1 + \ln x)$.

6. **(2012)** $f(x) = 3x + 1 - 2x\ln x$:

$$f'(x) = 3 - \left(2\ln x + 2x \times \frac{1}{x}\right) = 1 - 2\ln x$$

$f'(x) = 0$ يعني $\ln x = \dfrac{1}{2}$ ، أي $x = \sqrt{e}$.

7. **(2015)** $f(x) = -x + 1 + 3\ln(x+1)$:

$$f'(x) = -1 + \frac{3}{x+1} = \frac{2 - x}{x+1}$$

8. **(2018)** $f(x) = \ln(x+2) + \ln(8-x) - \ln 16$:

$$f'(x) = \frac{1}{x+2} + \frac{-1}{8-x} = \frac{8 - x - (x+2)}{(x+2)(8-x)} = \frac{-2x + 6}{(x+2)(-x+8)}$$

9. **(2017)** $h(x) = \dfrac{1}{2}(\ln x)^2$: $h'(x) = \dfrac{1}{2} \times 2\ln x \times \dfrac{1}{x} = \dfrac{\ln x}{x}$ دالة h أصلية لـ $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x}$.

13. مثال شامل من نمط البكالوريا

تمرين محلول 1

I. g الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^2-1+\ln x$.

1. ادرس اتجاه تغير g ، واحسب $g(1)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1-\dfrac{\ln x}{x}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني.

2. احسب $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

3. بيّن أن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

4. بيّن أن المستقيم (Δ): $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي.

5. ارسم (Δ) و (C_f).

حل التمرين 1

1. $g'(x)=2x+\dfrac{1}{x}>0$ على $]0;+\infty[$: g متزايدة تمامًا ، و $g(1)=1-1+0=0$.

x	0		1		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

2.

لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0^+}(x+1)=1\\ \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x\times\dfrac{1}{x}=-\infty\end{cases}$$

إذن محور التراتيب مقارب عمودي لـ (C_f).

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0\end{cases}$$

3.

$$f'(x)=1-\frac{\frac{1}{x}\times x-\ln x}{x^2}=1-\frac{1-\ln x}{x^2}=\frac{x^2-1+\ln x}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ ، و $f(1)=1+1-0=2$:


x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$+\infty$	$\searrow$ 2	$\nearrow$	$+\infty$

4. $f(x)-(x+1)=-\dfrac{\ln x}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

إشارة $-\dfrac{\ln x}{x}$ عكس إشارة $\ln x$ ، وتنعدم عند $x=1$ $\big(f(1)=2\big)$:

x	0		1		$+\infty$
$-\frac{\ln x}{x}$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;2)$	(C_f) تحت (Δ)	

5. التمثيل البياني:



14. خلاصة الطرائق

الطريقة	المطلوب
نحلل الأعداد إلى عوامل أولية ونطبق $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ و $\ln a^n = n\ln a$.	تبسيط عبارة
نعيّن D ، نكتب $\ln A = \ln B$ أو $\ln A = k = \ln e^k$ ، ونحتفظ بالحلول في D.	حل معادلة
نضع $X = \ln x$ فنحصل على معادلة من الدرجة الثانية.	معادلة فيها $(\ln x)^2$
$A < B \iff \ln A < \ln B$ ، ثم نأخذ التقاطع مع D.	حل متراجحة
عند $+\infty$ نُظهر $\dfrac{\ln x}{x}$ ، وعند 0^+ نُظهر $x\ln x$.	رفع حالة عدم التعيين
$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$ مع $u > 0$ ؛ و $\ln u$ لها نفس اتجاه تغير u.	مشتقة $\ln u$
$f(x) - (ax+b) \to 0$ ، والوضع النسبي من إشارة الفرق في جدول.	مقارب مائل ووضع نسبي
$q^n \geqslant k \iff n\ln q \geqslant \ln k$ $(q > 1)$.	عدد السنوات في مسألة فائدة