الاحتمالات

ملخص شامل مع أمثلة وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

محتوى الملخص

1. العدّ: المبدأ الأساسي، القوائم، الترتيبات، التبديلات، التوفيقات، مثلث باسكال ودستور ثنائي الحد.
2. أنواع السحب: في آن واحد، على التوالي بإرجاع، على التوالي دون إرجاع (جدول مقارنة).
3. التجربة العشوائية، قانون الاحتمال، المتغير العشوائي: الأمل الرياضياتي، التباين، الانحراف المعياري.
4. الاحتمال الشرطي، شجرة الاحتمالات، دستور الاحتمالات الكلية (شعبتا رياضيات وعلوم تجريبية).
5. الاستقلالية (شعبتا رياضيات وعلوم تجريبية).
6. نمذجة وضعيات بتجارب مرجعية، والمحاكاة وتلاؤم معطيات مع نموذج متساوي الاحتمال (شعبة علوم تجريبية).
7. تمرينان محلولان، ثم خلاصة الطرائق.

1. العدّ

1.1. المبدأ الأساسي للعدّ والعاملي

المبدأ الأساسي للعدّ

ليكن حدثان: الأول يتحقق بـ n طريقة مختلفة والثاني بـ m طريقة مختلفة.

- **مبدأ الجمع** («أو»): عدد طرق تحقق الأول أو الثاني (دون تداخل) هو $n+m$.
- **مبدأ الضرب** («و»): عدد طرق تحقق الأول ثم الثاني هو $n \times m$.

العاملي

من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 1$ نسمي عاملي n العدد: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$

ونضع اصطلاحًا $0! = 1$.

مثال

$3! = 6$ ، $5! = 120$ ، $6! = 720$ ، $\dfrac{10!}{8!} = 10 \times 9 = 90$.

لاختيار قميص من بين 4 قمصان ثم سروال من بين 3 سراويل: $4 \times 3 = 12$ طريقة.

1.2. القوائم (الترتيب مهم والتكرار ممكن)

القائمة

لتكن E مجموعة منتهية بها n عنصرًا وp عددًا طبيعيًا غير معدوم. نسمي **قائمة** ذات p عنصرًا من E كل متتالية مرتبة من p عنصرًا من E (يمكن أن تتكرر العناصر).

عدد القوائم ذات p عنصرًا من E هو: n^p

مثال

- عدد الرموز السرية المكونة من 3 خانات تُختار من الأرقام $\{2;3;5;9\}$: $4^3 = 64$.
- عدد طرق سحب 4 كريات على التوالي **مع الإرجاع** من كيس به 8 كريات: $8^4 = 4096$.
- عدد طرق الإجابة عشوائيًا على 5 أسئلة من نوع «صحيح/خطأ»: $2^5 = 32$.

1.3. الترتيبات (الترتيب مهم ودون تكرار)

الترتيبة

نسمي **ترتيبة** ذات p عنصرًا من E (حيث $p \leqslant n$) كل قائمة عناصرها متمايزة مثنى مثنى. عددها:

$$A_n^p = n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

(p عاملًا متناقصًا ابتداءً من n).

مثال

- عدد الأعداد ذات 5 أرقام **مختلفة** المكونة من الأرقام $1;2;\ldots;8$: $A_8^5 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 6720$.
- عدد طرق اختيار رئيس ونائبه من قسم به 20 تلميذًا: $A_{20}^2 = 20 \times 19 = 380$.
- عدد طرق جلوس 3 أشخاص على 30 مقعدًا: $A_{30}^3 = 30 \times 29 \times 28 = 24360$.

1.4. التبديلات

التبديلة

في حالة $p = n$، تسمى الترتيبة **تبديلة** لعناصر E. عدد التبديلات هو: $A_n^n = n!$

تبديلات مع عناصر متكررة (معامل الترتيب)

عدد طرق ترتيب n عنصرًا، منها n_1 عنصرًا متماثلًا من نوع أول، وn_2 من نوع ثانٍ، ... ، وn_k من نوع أخير $(n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n)$ هو:

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \cdots \times n_k!}$$

مثال

- عدد طرق جلوس 5 تلاميذ على 5 كراسٍ في صف واحد: $5! = 120$.
- عدد طرق ترتيب 4 كريات في صف: زرقاوان (متماثلتان) وحمراء وصفراء: $\frac{4!}{2! \times 1! \times 1!} = \frac{24}{2} = 12$.
- عدد الكلمات (لها معنى أو لا) المكونة من حروف الكلمة «BAC»: $3! = 6$.

1.5. التوفيقات (الترتيب غير مهم ودون تكرار)

التوفيقة

نسمي **توفيقة** ذات p عنصرًا من E $(0 \leqslant p \leqslant n)$ كل **جزء** من E يحوي p عنصرًا. عددها:

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

خواص التوفيقات

من أجل كل عددين طبيعيين n وp:

- $C_n^0 = C_n^n = 1$ و $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$.
- التناظر: $C_n^p = C_n^{n-p}$ $(0 \leqslant p \leqslant n)$.
- علاقة باسكال: $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ $(1 \leqslant p \leqslant n-1)$.

مثال

- $C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$ ، $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ ، $C_{10}^8 = C_{10}^2 = 45$.

- عدد اللجان ذات 7 تلاميذ من قسم به 20 تلميذًا: $C_{20}^{7} = \dfrac{20!}{7! \times 13!} = 77520$.
- عدد طرق سحب 3 كريات في آن واحد من كيس به 4 كريات بيضاء و5 حمراء: $C_{9}^{3} = 84$.

ملاحظة

على الحاسبة: $n!$ بالزر x!، وA_n^p بالزر nPr، وC_n^p بالزر nCr. مثلًا: 5 nCr 2 = 10 و5 nPr 2 = 20.

1.6. مثلث باسكال ودستور ثنائي الحد

مثلث باسكال

كل عدد في الجدول يساوي مجموع العدد الذي فوقه والعدد الذي على يسار هذا الأخير (علاقة باسكال).

$n\backslash p$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

دستور ثنائي الحد (نيوتن)

من أجل كل عددين حقيقيين a وb ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, a^{n-k}\, b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \cdots + C_n^n b^n$$

مثال

$$\begin{aligned}(x-1)^4 &= C_4^0 x^4 + C_4^1 x^3(-1) + C_4^2 x^2(-1)^2 + C_4^3 x(-1)^3 + C_4^4(-1)^4 \\ &= x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1.\end{aligned}$$

وبأخذ $a = b = 1$: $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$ (عدد أجزاء مجموعة بها n عنصرًا)؛ مثلًا $1+5+10+10+5+1 = 2^5 = 32$.

كيف أختار طريقة العدّ؟

النموذج	الترتيب	التكرار	العدد	أمثلة
قائمة	مهم	ممكن	n^p	أرقام قد تتكرر، رموز سرية، سحب على التوالي بإرجاع
ترتيبة	مهم	غير ممكن	A_n^p	أرقام مختلفة، مهام محددة (رئيس، نائب)، سحب على التوالي دون إرجاع
تبديلة	مهم (الكل)	غير ممكن	$n!$	ترتيب كل العناصر (جلوس، صفوف)
توفيقة	غير مهم	غير ممكن	C_n^p	لجان دون مهام، أجزاء مجموعة، سحب في آن واحد

2. أنواع السحب

ثلاثة أنواع للسحب

يحوي كيس n كرية لا نفرق بينها باللمس، ونسحب منه p كرية:

- **في آن واحد** (دفعة واحدة): النتيجة جزء من p كرية، الترتيب غير مهم: عدد الحالات C_n^p.
- **على التوالي مع الإرجاع**: نعيد الكرية قبل السحب الموالي، النتيجة قائمة: عدد الحالات n^p.
- **على التوالي دون إرجاع**: لا نعيد الكرية، النتيجة ترتيبة: عدد الحالات A_n^p.

جدول مقارنة: كيس به 9 كريات (4 بيضاء و5 حمراء)، نسحب 3 كريات

نوع السحب	الترتيب	$\text{card}\,\Omega$	«نفس اللون»	«بيضاوان بالضبط»
في آن واحد	غير مهم	$C_9^3 = 84$	$C_4^3 + C_5^3 = 14$ $P = \frac{14}{84} = \frac{1}{6}$	$C_4^2 \times C_5^1 = 30$ $P = \frac{30}{84} = \frac{5}{14}$
على التوالي مع الإرجاع	مهم	$9^3 = 729$	$4^3 + 5^3 = 189$ $P = \frac{189}{729} = \frac{7}{27}$	$3 \times 4^2 \times 5 = 240$ $P = \frac{240}{729} = \frac{80}{243}$
على التوالي دون إرجاع	مهم	$A_9^3 = 504$	$A_4^3 + A_5^3 = 84$ $P = \frac{84}{504} = \frac{1}{6}$	$3 \times A_4^2 \times A_5^1 = 180$ $P = \frac{180}{504} = \frac{5}{14}$

ملاحظة

- في السحب على التوالي نضرب في عدد **مواضع** الألوان: «بيضاوان وحمراء» لها $\frac{3!}{2!\,1!} = 3$ ترتيبات ممكنة: BBH ، BHB ، HBB (B: بيضاء، H: حمراء).
- السحب في آن واحد والسحب على التوالي دون إرجاع يعطيان **نفس الاحتمالات** (مثل $\frac{1}{6}$ و$\frac{5}{14}$ أعلاه).
- «على الأقل واحدة» نحسبها بالحادثة العكسية. في السحب في آن واحد، لتكن W: «سحب كرية بيضاء على الأقل»، عكسها $\overline{W}$: «الكريات الثلاث حمراء»، إذن: $P(W) = 1 - \frac{C_5^3}{C_9^3} = 1 - \frac{10}{84} = \frac{37}{42}$.

سحب على التوالي مع الإرجاع

نفس الكيس، نسحب 3 كريات على التوالي مع الإرجاع. احتمال «سحب كرية بيضاء على الأقل»:

$$P = 1 - \frac{5^3}{9^3} = 1 - \frac{125}{729} = \frac{604}{729}.$$

3. قانون الاحتمال والمتغير العشوائي

3.1. المفردات الأساسية

التجربة العشوائية والحوادث

- **التجربة العشوائية**: تجربة نعرف كل نتائجها الممكنة لكن لا يمكن توقع نتيجتها مسبقًا.
- **مجموعة الإمكانيات** Ω (مجموعة المخارج): مجموعة كل النتائج الممكنة.
- **الحادثة**: كل جزء من Ω. **الحادثة الأولية**: تحوي عنصرًا واحدًا.
- **الحادثة الأكيدة**: Ω نفسها. **الحادثة المستحيلة**: المجموعة الخالية $\varnothing$.
- **الحادثة العكسية** $\overline{A}$: تحوي كل عناصر Ω التي لا تنتمي إلى A.
- $A \cap B$ («A وB»): العناصر المشتركة. $A \cup B$ («A أو B»): عناصر A أو B أو كليهما.
- A وB **غير متلائمتين** (متنافيتان) معناه $A \cap B = \varnothing$.

3.2. الاحتمال وخواصه

فرضية تساوي الاحتمال

إذا كانت كل النتائج لها نفس الاحتمال (عبارات مثل: «نرد غير مزيف»، « كريات لا نفرق بينها باللمس»، «عشوائيًا») فإن:

$$P(A) = \frac{\operatorname{card} A}{\operatorname{card} \Omega}$$

حيث $\operatorname{card} A$ عدد عناصر A (الحالات الملائمة) و$\operatorname{card} \Omega$ عدد الحالات الممكنة.

خواص الاحتمال

من أجل كل حادثتين A وB:

- $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$ ، $P(\Omega) = 1$ ، $P(\varnothing) = 0$.
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$، وإذا كانتا غير متلائمتين: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

- إذا كان $A \subset B$ فإن $P(A) \leqslant P(B)$.

مثال

نرمي نردًا غير مزيف وجوهه مرقمة من 1 إلى 6: $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$. لتكن الحادثة $A = \{2;4;6\}$ («الرقم زوجي») والحادثة $B = \{4;5;6\}$ («الرقم أكبر من أو يساوي 4»).

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(A \cap B) = P(\{4;6\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

تحقق: $A \cup B = \{2;4;5;6\}$ و $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ✓.

ملاحظة

في نص التمرين: حرف «و» يعني التقاطع $\cap$، وحرف «أو» يعني الاتحاد $\cup$، و«على الأقل» تُحسب غالبًا بالحادثة العكسية.

3.3. المتغير العشوائي وقانون احتماله

المتغير العشوائي

المتغير العشوائي X دالة تُرفق بكل نتيجة من Ω عددًا حقيقيًا. إذا كانت قيمه $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ فإن **قانون احتماله** هو إعطاء كل احتمال $p_i = P(X = x_i)$، ونلخصه في جدول:

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	المجموع
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	1

مع $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$ (للتحقق دائمًا).

الأمل الرياضياتي، التباين، الانحراف المعياري

- الأمل الرياضياتي: $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i\, p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n$
- التباين: $V(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(x_i - E(X)\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\, x_i^2 - \left(E(X)\right)^2$
- الانحراف المعياري: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

ومن أجل كل عددين حقيقيين a وb:

$$\sigma(aX+b) = |a|\,\sigma(X) \qquad V(aX+b) = a^2\,V(X) \qquad E(aX+b) = a\,E(X) + b$$

تفسير الأمل في لعبة

$E(X)$ هو متوسط الربح الذي يأمله اللاعب بعد تكرار اللعبة مرات كثيرة:

- $E(X)=0$: اللعبة **عادلة**.
- $E(X)>0$: اللعبة **مربحة** (في صالح اللاعب).
- $E(X)<0$: اللعبة **ليست في صالح اللاعب**.

قانون احتمال من سحب في آن واحد

كيس به 4 كريات بيضاء و5 حمراء، نسحب كريتين في آن واحد: $\operatorname{card}\Omega = C_9^2 = 36$. X عدد الكريات البيضاء المسحوبة، قيمه: $0;1;2$

$$P(X=0)=\frac{C_5^2}{36}=\frac{10}{36},\quad P(X=1)=\frac{C_4^1C_5^1}{36}=\frac{20}{36},\quad P(X=2)=\frac{C_4^2}{36}=\frac{6}{36}.$$

x_i	0	1	2	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{5}{18}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{6}$	1

$$E(X)=0\times\frac{10}{36}+1\times\frac{20}{36}+2\times\frac{6}{36}=\frac{32}{36}=\frac{8}{9}$$

$$V(X)=\left(0^2\times\frac{10}{36}+1^2\times\frac{20}{36}+2^2\times\frac{6}{36}\right)-\left(\frac{8}{9}\right)^2=\frac{11}{9}-\frac{64}{81}=\frac{35}{81},\qquad \sigma(X)=\frac{\sqrt{35}}{9}\approx 0{,}66$$

تعيين وسيط مجهول

قانون احتمال متغير عشوائي X حيث $a>0$ و$E(X)=1$:

x_i	-1	0	a	4
$P(X=x_i)$	0,2	0,3	0,4	b

- مجموع الاحتمالات 1: $0{,}2+0{,}3+0{,}4+b=1$ إذن $b=0{,}1$.
- $E(X)=-0{,}2+0+0{,}4a+0{,}4=1$ إذن $0{,}4a=0{,}8$ ومنه $a=2$ (وفعلًا $0<2<4$).
- $V(X)=(1\times0{,}2+0+4\times0{,}4+16\times0{,}1)-1^2=3{,}4-1=2{,}4$ و $\sigma(X)=\sqrt{2{,}4}\approx 1{,}55$.

لعبة

يحوي صندوق 10 كريات: 5 سوداء و3 خضراء و2 حمراء. يسحب لاعب كرية واحدة: يخسر 3 دنانير إذا كانت سوداء، ويربح 2 دينار إذا كانت خضراء، و5 دنانير إذا كانت حمراء. X الربح الجبري:

x_i	-3	2	5	المجموع
$P(X=x_i)$	0,5	0,3	0,2	1

- $E(X)=-1{,}5+0{,}6+1=0{,}1$ وبما أن $E(X)>0$ فاللعبة في صالح اللاعب.

- $V(X) = (9 \times 0{,}5 + 4 \times 0{,}3 + 25 \times 0{,}2) - 0{,}1^2 = 10{,}7 - 0{,}01 = 10{,}69$ و $\sigma(X) \approx 3{,}27$.
- إذا ضاعف المنظم الأرباح وأضاف دينارًا، نضع $Y = 2X + 1$:

$$E(Y) = 2 \times 0{,}1 + 1 = 1{,}2 \qquad V(Y) = 2^2 \times 10{,}69 = 42{,}76$$

4. الاحتمال الشرطي وشجرة الاحتمالات – رياضيات وعلوم تجريبية

4.1. الاحتمال الشرطي

الاحتمال الشرطي

لتكن A حادثة حيث $P(A) \neq 0$. احتمال B **علمًا أن** A محققة هو العدد:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) \qquad \text{ومنه} \qquad P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

ملاحظة

- العبارات «علمًا أن»، «إذا كان»، «من بين ...» تدل على احتمال شرطي.
- لا نخلط بين $P(A \cap B)$ (الحادثتان معًا) و$P_A(B)$ (نحسب داخل A فقط).
- $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$.

مثال


نرمي نردًا غير مزيف. A: «الرقم زوجي» وB: «الرقم أكبر من أو يساوي 4». لدينا $A \cap B = \{4; 6\}$:

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{2}{3}.$$

(من بين الأرقام $4; 5; 6$ يوجد رقمان زوجيان.)

4.2. شجرة الاحتمالات


قواعد الشجرة



- مجموع الاحتمالات على الفروع الخارجة من نفس العقدة يساوي 1.
- احتمال مسار = جداء الاحتمالات على فروعه (يعطي احتمال التقاطع).
- احتمال حادثة = مجموع احتمالات المسارات المؤدية إليها.

سحب على التوالي دون إرجاع

كيس به 5 كريات حمراء (R) و3 خضراء (G). نسحب كريتين على التوالي دون إرجاع.



- $P(R_1\cap G_2)=\frac{5}{8}\times\frac{3}{7}=\frac{15}{56}$.
- $P(G_2)=P(R_1\cap G_2)+P(G_1\cap G_2)=\frac{15}{56}+\frac{6}{56}=\frac{21}{56}=\frac{3}{8}$.

- $P_{G_2}(R_1) = \dfrac{P(R_1 \cap G_2)}{P(G_2)} = \dfrac{15/56}{21/56} = \dfrac{5}{7}$.

تحقق: مجموع احتمالات المسارات $\frac{20+15+15+6}{56} = 1$ ✓.

4.3. دستور الاحتمالات الكلية

تجزئة Ω

نقول إن الحوادث $A_1; A_2; \ldots; A_n$ تشكل **تجزئة** لـ Ω إذا كانت غير خالية، وغير متلائمة مثنى مثنى، واتحادها Ω.
(مثال بسيط: A و$\overline{A}$.)

دستور الاحتمالات الكلية

إذا كانت $A_1; A_2; \ldots; A_n$ تجزئة لـ Ω فإن من أجل كل حادثة B:


$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B)$$

$$P(B) = P(A_1)\,P_{A_1}(B) + P(A_2)\,P_{A_2}(B) + \cdots + P(A_n)\,P_{A_n}(B)$$

وفي حالة A و$\overline{A}$: $P(B) = P(A)\,P_A(B) + P(\overline{A})\,P_{\overline{A}}(B)$.

مصنع بآلتين

ينتج مصنع قطعًا بآلتين: الآلة M_1 تنتج 60% من القطع و3% من إنتاجها معيب، والآلة M_2 تنتج الباقي و5% من إنتاجها معيب. نختار قطعة عشوائيًا. D: «القطعة معيبة».



- حسب دستور الاحتمالات الكلية: $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}03 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}018 + 0{,}02 = 0{,}038$.
- القطعة معيبة، احتمال أن تكون من M_1: $P_D(M_1) = \dfrac{P(M_1 \cap D)}{P(D)} = \dfrac{0{,}018}{0{,}038} = \dfrac{9}{19} \approx 0{,}47$.

- $P(\overline{D}) = 1 - 0{,}038 = 0{,}962$.

5. الاستقلالية – رياضيات وعلوم تجريبية

حادثتان مستقلتان

نقول إن الحادثتين A وB **مستقلتان** إذا كان:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

وإذا كان $P(A) \neq 0$ فهذا يكافئ $P_A(B) = P(B)$: تحقق A لا يغيّر احتمال B.

خاصية

إذا كانت A وB مستقلتين فإن: A و$\overline{B}$ مستقلتان، و$\overline{A}$ وB مستقلتان، و$\overline{A}$ و$\overline{B}$ مستقلتان.

ملاحظة

لا نخلط بين **مستقلتين** $(P(A \cap B) = P(A)P(B))$ و**غير متلائمتين** $(A \cap B = \varnothing)$. حادثتان غير متلائمتين واحتمال كل منهما غير معدوم ليستا مستقلتين أبدًا لأن $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.

مثال

نرمي نردًا غير مزيف، ونعتبر الحوادث: $A = \{2; 4; 6\}$ («رقم زوجي»)، و$B = \{1; 2\}$، و$C = \{4; 5; 6\}$ («رقم أكبر من أو يساوي 4»).

- $P(A \cap B) = P(\{2\}) = \frac{1}{6}$ و$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$: إذن A وB مستقلتان.
- $P(A \cap C) = P(\{4; 6\}) = \frac{1}{3}$ و$P(A) \times P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{3}$: إذن A وC غير مستقلتين.

6. النمذجة والمحاكاة

6.1. نمذجة وضعية بتجربة مرجعية

النمذجة

نمذجة وضعية عشوائية هي تعويضها بتجربة مرجعية بسيطة (سحب كريات من كيس، رمي نرد أو قطعة نقدية) لها **نفس الاحتمالات**، ثم الحساب في هذه التجربة.

- اختيار أشخاص أو قطع «عشوائيًا وفي آن واحد» $\longleftrightarrow$ سحب كريات في آن واحد.
- نسبة مئوية معلومة (مثلًا 20% معيبة) $\longleftrightarrow$ كيس به كريات ملونة بنفس النسبة.

مراقبة الجودة

علبة بها 20 مصباحًا منها 4 معيبة. يأخذ مراقب مصباحين عشوائيًا في آن واحد. **النموذج**: كيس به 4 كريات سوداء (معيب) و16 بيضاء (سليم)، نسحب منه كريتين في آن واحد: $\operatorname{card}\Omega = C_{20}^2 = 190$.

- احتمال ألا يجد أي مصباح معيب: $\dfrac{C_{16}^2}{190} = \dfrac{120}{190} = \dfrac{12}{19}$.
- احتمال أن يجد مصباحًا معيبًا على الأقل: $1 - \dfrac{12}{19} = \dfrac{7}{19} \approx 0{,}37$.

6.2. المحاكاة وتلاؤم معطيات مع نموذج – شعبة علوم تجريبية

المحاكاة

محاكاة تجربة عشوائية هي إنتاج نتائجها بأعداد عشوائية (زر Ran# في الحاسبة، أو الدالة ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) في المجدول) بدل إجرائها فعلًا. عند تكرار المحاكاة تتذبذب التواترات من سلسلة إلى أخرى (**تذبذب العينات**)، وتستقر حول الاحتمال كلما كبر عدد التجارب.

تلاؤم معطيات تجربة واقعية مع نموذج متساوي الاحتمال

تجربة لها k مخرجًا، أجريناها n مرة فحصلنا على التواترات $f_1; f_2; \ldots; f_k$. لنعرف هل تتلاءم مع **النموذج المتساوي الاحتمال** (كل مخرج احتماله $\frac{1}{k}$):

1. نحسب المؤشر: $d^2 = \left(f_1 - \dfrac{1}{k}\right)^2 + \left(f_2 - \dfrac{1}{k}\right)^2 + \cdots + \left(f_k - \dfrac{1}{k}\right)^2$.
2. نحاكي (مثلًا 1000 مرة) سلسلة من n تجربة وفق النموذج المتساوي، ونحسب d^2 لكل سلسلة، ثم نعيّن **العشير التاسع** D_9 لهذه القيم (90% منها أصغر من أو تساوي D_9).
3. القرار: إذا كان $d^2 \leqslant D_9$ نقول إن المعطيات **ملائمة** للنموذج المتساوي (بخطر 10%)، وإذا كان $d^2 > D_9$ نرفض النموذج بخطر 10%.

هل النرد متوازن؟

رمينا نردًا 120 مرة فحصلنا على:

الوجه	1	2	3	4	5	6	المجموع
العدد n_i	15	22	18	25	19	21	120

النموذج المتساوي: $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$، إذن $f_i - \frac{1}{6} = \frac{n_i - 20}{120}$ والفروق $n_i - 20$ هي: $-5; 2; -2; 5; -1; 1$

$$d^2 = \frac{25+4+4+25+1+1}{120^2} = \frac{60}{14400} = \frac{1}{240} \approx 0{,}0042$$

محاكاة 1000 سلسلة من 120 رمية لنرد متوازن أعطت العشير التاسع $D_9 \approx 0{,}0128$، ولدينا:

$$d^2 \approx 0{,}0042 \leqslant D_9 \approx 0{,}0128$$

إذن المعطيات ملائمة لنموذج نرد متوازن بخطر 10%.

7. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

يحتوي كيس على 7 كريات لا نفرق بينها باللمس: 3 كريات حمراء تحمل الأرقام $1; 1; 2$ و4 كريات خضراء تحمل الأرقام $1; 2; 2; 2$. نسحب عشوائيًا 3 كريات **في آن واحد**.

1. ما عدد السحبات الممكنة؟
2. احسب احتمال كل من الحوادث:
   (أ) A: «الكريات الثلاث من نفس اللون».
   (ب) B: «الكريات الثلاث تحمل نفس الرقم».
   (ج) C: «مجموع الأرقام المسجلة يساوي 5».
3. (شعبتا رياضيات وعلوم تجريبية) احسب $P_A(B)$. هل الحادثان A وB مستقلتان؟
4. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكريات الحمراء المسحوبة. عيّن قانون احتمال X ثم احسب $E(X)$ و$V(X)$ و$\sigma(X)$.

حل التمرين 1

1. السحب في آن واحد (الترتيب غير مهم ودون تكرار) إذن عدد السحبات هو عدد التوفيقات: $\text{card}\,\Omega = C_7^3 = \dfrac{7\times 6\times 5}{3!} = 35$.

2.

(أ) نفس اللون: إما 3 حمراء من 3 أو 3 خضراء من 4 (مبدأ الجمع): $P(A) = \dfrac{C_3^3 + C_4^3}{35} = \dfrac{1+4}{35} = \dfrac{1}{7}$.

(ب) الكريات التي تحمل الرقم 1 عددها 3 (حمراوان وخضراء)، والتي تحمل الرقم 2 عددها 4 (حمراء و3 خضراء):

$$P(B) = \frac{C_3^3 + C_4^3}{35} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}.$$

(ج) المجموع 5 مع أرقام من $\{1;2\}$: الإمكانية الوحيدة $2+2+1$، أي كرية من الثلاث التي تحمل 1 وكريتان من الأربع التي تحمل 2 (مبدأ الضرب): $P(C) = \dfrac{C_3^1 \times C_4^2}{35} = \dfrac{3\times 6}{35} = \dfrac{18}{35}$.

3. $A\cap B$: نفس اللون ونفس الرقم. الحمراء $1;1;2$ لا تحمل نفس الرقم، والخضراء: فقط $\{2;2;2\}$، إذن $P(A\cap B) = \dfrac{1}{35}$.

$$P_A(B) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)} = \frac{1/35}{5/35} = \frac{1}{5}$$

و$P(A\cap B) = \dfrac{1}{35} \neq P(A)\times P(B) = \dfrac{1}{7}\times\dfrac{1}{7} = \dfrac{1}{49}$، إذن A وB غير مستقلتين.

4. قيم X: $0;1;2;3$ (عدد الحمراء من بين 3 مسحوبة):

$$P(X=0) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}, \qquad P(X=1) = \frac{C_3^1 C_4^2}{35} = \frac{18}{35},$$
$$P(X=2) = \frac{C_3^2 C_4^1}{35} = \frac{12}{35}, \qquad P(X=3) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}.$$

x_i	0	1	2	3	المجموع
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$	1

$$E(X) = \frac{0\times 4 + 1\times 18 + 2\times 12 + 3\times 1}{35} = \frac{45}{35} = \frac{9}{7}$$

$$V(X) = \frac{0+18+48+9}{35} - \left(\frac{9}{7}\right)^2 = \frac{15}{7} - \frac{81}{49} = \frac{24}{49}, \qquad \sigma(X) = \sqrt{\frac{24}{49}} = \frac{2\sqrt{6}}{7} \approx 0{,}70$$

تمرين محلول 2 – رياضيات وعلوم تجريبية

لدينا صندوقان: U_1 يحوي 3 كريات بيضاء و2 سوداوين، وU_2 يحوي كرية بيضاء و4 سوداء. نرمي نردًا غير مزيف: إذا ظهر 1 أو 2 نسحب كرية من U_1، وإلا نسحب كرية من U_2. نسمي U_1: «السحب من U_1»، U_2: «السحب من U_2»، W: «الكرية المسحوبة بيضاء».


1. أنشئ شجرة الاحتمالات.

2. احسب $P(W)$.

3. الكرية المسحوبة بيضاء، ما احتمال أن تكون من U_1؟

حل التمرين 2

1. $P(U_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ و $P(U_2) = \frac{2}{3}$؛ $P_{U_1}(W) = \frac{3}{5}$ و $P_{U_2}(W) = \frac{1}{5}$:



2. U_1 وU_2 تجزئة لـ Ω، حسب دستور الاحتمالات الكلية: $P(W) = P(U_1)P_{U_1}(W) + P(U_2)P_{U_2}(W) = \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{1}{3}$.

3. المطلوب احتمال شرطي: $P_W(U_1) = \frac{P(U_1 \cap W)}{P(W)} = \frac{3/15}{1/3} = \frac{3}{5}$.

8. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
اختيار طريقة العدّ	الترتيب مهم والتكرار ممكن: n^p الترتيب مهم دون تكرار: A_n^p ترتيب كل العناصر: $n!$ الترتيب غير مهم: C_n^p
عدد السحبات	في آن واحد: C_n^p على التوالي مع الإرجاع: n^p على التوالي دون إرجاع: A_n^p (على التوالي: نضرب في عدد المواضع)
احتمال حادثة	عند تساوي الاحتمال: $P(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}$.
حادثة «على الأقل»	نحسب احتمال العكس: $P(A) = 1 - P(\overline{A})$.
قانون متغير عشوائي	نعيّن القيم x_i، ونحسب كل $P(X = x_i)$، ونرتبها في جدول، ونتحقق أن المجموع 1.
الأمل، التباين، الانحراف	$E(X) = \sum x_i p_i$ $V(X) = \sum p_i x_i^2 - \left(E(X)\right)^2$ $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$
هل اللعبة عادلة؟	نقارن $E(X)$ بالصفر: $0 =$ عادلة، $0 <$ مربحة، $0 >$ ليست في صالح اللاعب.
احتمال شرطي	$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$، أو نقرأ فرع الشجرة مباشرة.
احتمال تقاطع (مسار)	جداء الاحتمالات على المسار: $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
احتمال حادثة في المستوى الثاني	مجموع المسارات المؤدية إلى B: $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$.
«علمًا أن» النتيجة معروفة	نحسب $P(B)$ أولًا ثم $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
إثبات الاستقلالية	نتحقق من $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
نمذجة وضعية بتجربة مرجعية	نعوّض الوضعية بسحب من كيس (أو رمي نرد/قطعة نقدية) له نفس الاحتمالات، ثم نحسب فيه.
تلاؤم معطيات مع نموذج متساوٍ	نحسب $d^2 = \sum \left(f_i - \frac{1}{k}\right)^2$ ونقارنه بـ D_9 للمحاكاة: $d^2 \leqslant D_9$ ملائمة، $d^2 > D_9$ مرفوضة (خطر 10%).

ملاحظة

الأسطر من «احتمال شرطي» إلى «إثبات الاستقلالية» تخص شعبتي رياضيات وعلوم تجريبية فقط (ليست في برنامج تقني رياضي)، وسطر «تلاؤم معطيات» يخص شعبة علوم تجريبية.