
All candidate drivers vs. all network metrics
S >= 10, pooled ecosystems; * q<0.05, ** q<0.01, *** q<0.001 (BH−FDR)
Connectance
Nestedness (z−NODF)
Mean link strength
Mean closeness
Modularity (Q)
Standardised modularity (z−Q)
Latitude −0.29** −0.25** −0.29** −0.14* 0.22** −0.02
Temperature 0.27*** 0.27*** 0.29*** 0.11 −0.23** 0.07
Seasonality −0.31*** −0.20** −0.25*** −0.11 0.28*** 0.03
Climate
Taxon richness 0.45*** 0.69*** 0.83*** −0.01 −0.12* 0.63***
No. prey taxa 0.30*** 0.54*** 0.63*** −0.12* 0.02 0.55***
Prey niche area 0.44*** 0.29*** 0.43*** 0.13* −0.31*** 0.11
No. modules −0.37*** 0.11* −0.10** −0.16*** 0.21*** 0.07
Community
Size ratio 0.07 0.24*** 0.31*** 0.02 −0.01 0.19***
Size max gap −0.10 −0.27*** −0.27*** 0.10 0.01 −0.23***
Omnivory v1 0.10 0.04 0.12* 0.03 −0.07 0.03
Omnivory (FoodSeTroph) −0.12* −0.04 −0.08 −0.08 0.08 −0.03
Omnivory (DietSeTroph) 0.05 0.03 0.07 −0.02 −0.06 −0.09
Fish traits
Lake area −0.04 −0.05 0.09 0.04 0.11 0.19*
Habitat
Std. effect
0.8
0.4
0.0
−0.4
−0.8