

Bệnh viêm phổi trong cộng đồng mức độ trung bình

- ❖ Amoxicilin- Acid clavulanic kết hợp với 1 thuốc nhóm Macrolid (Clindamycin hoặc Azithromycin)
- ❖ Nếu không uống được có thể tiêm tĩnh mạch: Amoxicilin - Acid clavulanic kết hợp với 1 thuốc nhóm Macrolid dùng theo đường tĩnh mạch (Clindamycin hoặc Azithromycin), hoặc Levofloxacin hoặc Moxifloxacin

Chú ý:

- **Giữ nước:** Uống đủ nước và cung cấp đầy đủ chất điện giải cho cơ thể
- **Dùng thuốc hạ sốt/giảm đau:** khi nhiệt độ > 38,5°C bao gồm các loại thuốc như aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB, những loại khác) và acetaminophen (Tylenol, những loại khác).
- **Dùng thuốc theo quy định:** Tuân thủ nghiêm túc toàn bộ quá trình điều trị do bác sĩ kê. Nếu ngừng dùng thuốc quá sớm, vi khuẩn trong phổi có thể tiếp tục nhân lên và khiến viêm phổi tái phát.
- **Nên đến bệnh viện khám lại nếu sau 2 ngày điều trị bệnh không thuyên giảm hoặc có dấu hiệu nặng lên**