中秋吃柚子，這些藥要小心

三高・抗血小板・抗凝血・安眠藥用藥提醒｜高醫內分泌新陳代謝內科 盧子文醫師

為什麼柚子會影響藥？柚子（文旦）和葡萄柚含有「呋喃香豆素」，會讓腸道裡負責分解藥物的酵素（CYP3A4）失效，藥物吸收變多、血中濃度升高，副作用跟著變大。
錯開時間吃沒有用：吃完柚子隔 10 小時，影響還剩一半；隔 24 小時仍剩約 1/4。
研究顯示：喝 250 mL 柚子汁，降血壓藥 felodipine 的血中濃度增加約 4 成（葡萄柚約 1 倍）。不同品種的柚子差異很大，所以我們寧可保守一點。

吃這些藥：中秋期間避免吃柚子、葡萄柚

類別	藥名（學名 / 院內商品名）	吃太多柚子可能出現
降血脂	Simvastatin（維妥力 Vytorin） Lovastatin（理脂 Linicor） Atorvastatin（立普妥 Lipitor；複方：脂脈優 Caduet、優泰脂 Atozet）	肌肉痠痛無力，嚴重時橫紋肌溶解、茶色尿
降血壓（鈣離子阻斷劑）	Felodipine（院內目前無此藥，外院常見商品名：普心寧 Plendil） Nifedipine（壓達能 Atanaal、恆脈循持續錠） Lercanidipine（利壓 Zanidip）	血壓太低、頭暈、臉潮紅、心跳加快、腳踝水腫
抗血小板（心臟支架後常用）	Ticagrelor（百無凝 Brilinta）	出血風險增加（腸胃道、血尿、瘀青）
抗凝血	Apixaban（艾必克凝 Eliquis）	出血風險增加：黑便、血尿、牙齦出血、不明瘀青
安眠 / 鎮靜	Quetiapine（思樂康 Seroquel、美加柔 Megazon、康思寧 Q-pine） Lemborexant（達衛眠 Dayvigo）	藥效變強：頭暈、隔天嗜睡、反應變慢，長輩夜間起床容易跌倒

吃這些藥：淺嚐 1–2 瓣可以，不要大量或喝柚子汁

降血壓	Amlodipine（脈優 Norvasc，影響小）；含 amlodipine 的複方：易安穩 Exforge、舒脈康 Sevikar、優惠脈 / 雙優惠脈 OlsaaCa、倍必康平 Twynsta、諾壓 Amtrel Verapamil（心舒平 Isoptin SR）
抗血小板	Cilostazol（普達 Pletaal） Clopidogrel（保栓通 Plavix、健克栓 Thrombifree、可保栓通 CoPlavix）：方向相反，柚子**可能讓藥效變差**
抗凝血	Rivaroxaban（拜瑞妥 Xarelto）：出血風險增加
安眠 / 鎮靜	Diazepam（煩靜、樂平 Dupin）、Alprazolam（贊安諾 Xanax）、口服 Midazolam（導美睡 Dormicum）、Triazolam（院內目前無此藥）：嗜睡、步態不穩

這些藥幾乎不受柚子影響（但份量仍要控制）

降血脂	Rosuvastatin（冠脂妥 Crestor；複方：脂瑞妥 Cretrol）、Pravastatin（美百樂鎮 Mevalotin）、Pitavastatin（平脂 Zulitor）、Fluvastatin（益脂可 Lescol）、Ezetimibe（怡妥 Ezetrol）
降血壓	單方 ARB / ACEI（如 valsartan、olmesartan、telmisartan、losartan、perindopril）、利尿劑、乙型阻斷劑。**注意：和 amlodipine 合成一顆的複方屬於黃燈**
降血糖	Metformin、DPP-4 抑制劑、SGLT2 抑制劑、磺醯脲類、胰島素：交互作用不是主要問題，**真正要注意的是柚子本身的糖**
抗凝血	Warfarin（可化凝 Cofarin）、Edoxaban（里先安 Lixiana）、Dabigatran（普栓達 Pradaxa）。吃 warfarin 的人要注意的是深綠色蔬菜份量突然改變、蔓越莓、石榴、人參、大蒜和酒
安眠 / 鎮靜	Zolpidem（使蒂諾斯 Stilnox）、Zopiclone（宜眠安 Imovane）、Brotizolam（戀多眠 Lendormin）、Estazolam（悠樂丁 Eurodin）、Lorazepam（樂穩 Lowen）、Clonazepam（利福全 Rivotril）、Trazodone（美舒鬱 Mesyrel）等

糖尿病友：柚子也是水果

- 柚子算水果，**一次吃一份（大約一個拳頭大），不要一次把整顆吃完**
- 當天吃了月餅、烤肉醬，水果要再減量
- 吃完 2 小時可以量血糖，看看自己對柚子的反應
- 有腎臟病的人，請依醫囑避免吃柚子

我們建議這樣做

- 看藥袋上的「學名」對照上表；不確定就帶藥袋問醫師或藥師
- **不要為了吃柚子自行停藥**；真的很想吃，回診時和醫師討論換成不受影響的藥
- 一般甜柳丁（如臍橙）沒有這個問題
- 出現肌肉痠痛無力、茶色尿、頭暈、心悸、腳腫、黑便或不正常出血、白天異常嗜睡 → 停吃柚子並儘快就醫

本單僅列常見藥物，其他藥物（如部分抗心律不整藥、免疫抑制劑、勃起功能障礙藥）也會受影響，請以醫師、藥師個別說明為準。
參考：高醫藥品資料庫食物交互作用註記；Bailey DG, et al. CMAJ 2013;185:309–16；Guo LQ, et al. Curr Drug Metab 2007;8:623–30（柚子汁 × felodipine）；Sullivan DM, et al. Am J Health Syst Pharm 1998;55:1581–3（warfarin）；國民健康署 111 年中秋新聞稿（腎臟病與柚子）。
製作日期：2026-10-12