

Funktionentheorie für das Lehramt (WS 17/18)
Übungsblatt 1

1. Man bestimme jeweils den Konvergenzradius der folgenden Potenzreihen

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^k} z^k, \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!} z^k$$

2. Man bestimme jeweils alle $z \in \mathbb{C}$ mit

- a) $\exp(z) = -2$
- b) $\exp(z) = i$
- c) $\sin(z) = 100$
- d) $\cos(z) = 3i$.

3. Die Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ wird definiert über die Potenzreihe

$$\exp(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k.$$

Man zeige

- a) Der Konvergenzradius dieser Reihe ist $\rho = \infty$.
 - b) Für beliebige $u, v \in \mathbb{C}$ gilt $\exp(u+v) = \exp(u) \exp(v)$.
4. Die trigonometrischen Funktionen $\sin(\cdot)$ und $\cos(\cdot)$ werden im Komplexen definiert über die Potenzreihen

$$\sin(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1} \quad \text{und} \quad \cos(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k}.$$

Man zeige für beliebige $z \in \mathbb{C}$ die Beziehung

- a) $\exp(iz) = \cos(z) + i \sin(z)$
 - b) $\sin(z) = \frac{1}{2i} (\exp(iz) - \exp(-iz))$
 - c) $\cos(z) = \frac{1}{2} (\exp(iz) + \exp(-iz))$.
 - d) $|\cos^2(z) + \sin^2(z)| = 1$
5. Für beliebige komplexe Zahlen $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ beweise man die Additionstheoreme
- a) $\sin(z_1 + z_2) = \sin(z_1) \cos(z_2) + \cos(z_1) \sin(z_2)$
 - b) $\cos(z_1 + z_2) = \cos(z_1) \cos(z_2) - \sin(z_1) \sin(z_2)$.