




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
Thermal cross sections




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
Thermal mubar




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
Thermal ebar




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic for $e = 5.033 \times 10^{-7}$ MeV



O-SIO2-BETA_SG180_BETAQUARTZ @ 1600.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

