GUÍA PARA FAMILIAS · FRUCTOSA

Dieta baja en fructosa

limitar, no eliminar

Algunos niños absorben mal la fructosa, el azúcar de la fruta y de muchos productos. La que no se absorbe llega al colon y da **gases, dolor de tripa o diarrea**. El objetivo no es quitarla del todo, sino encontrar la cantidad que tolera.

1 Las claves

1. **Hasta 4 semanas**
   reducir los alimentos ricos en fructosa y sorbitol
2. **Ver si mejora**
   si no mejora, la dieta no es la solución
3. **Reintroducir**
   un alimento cada vez y en cantidades crecientes, hasta encontrar su límite

Fruta entera, no zumo
una pieza cada vez, repartidas a lo largo del día

Con arroz, pan o pasta
su glucosa ayuda a absorber la fructosa

El azúcar de mesa se tolera
lleva glucosa y fructosa a partes iguales

Leer la etiqueta
fructosa, jarabes y polioles se esconden en muchos productos

2 Alimento a alimento

🟢 Sí · 🟠 Con moderación · 🔴 Mejor evitar

Fruta

- 🟢 Plátano, naranja, kiwi, melón, piña, limón, papaya y arándanos
- 🟠 Fresa, frambuesa, mora, mandarina y aguacate
- 🔴 Manzana, pera, cereza, melocotón, ciruela, nectarina, mango, sandía y uva
  También sus zumos y compotas, y la fruta desecada: pasas, higos, orejones y dátiles

Verdura

- 🟢 Acelga, espinaca, lechuga, calabacín, calabaza, coliflor, zanahoria, puerro, alcachofa y patata
- 🟠 Brócoli, berenjena, judía verde, pepino y setas
- 🔴 Tomate, pimiento rojo y amarillo, y espárragos

Cereales, legumbres y frutos secos

- 🟢 Arroz, pasta, pan, avena, quinoa y maíz. Nueces, avellanas, almendras y castañas
- 🟠 Legumbres, en raciones pequeñas al principio
  Integrales y salvado, según tolere
- 🔴 Cereales con miel, azúcar añadido o fruta desecada

Lácteos, carne, pescado y huevo

- 🟢 Leche, yogur natural, queso y kéfir. Carne, pescado y huevo frescos
- 🔴 Yogures de frutas o sabores, batidos y helados de fruta. Embutidos, patés y surimi con fructosa o sorbitol

Dulces y bebidas

- 🟢 Agua. Azúcar de mesa, sirope de arce y cacao, en poca cantidad
- 🔴 Zumos, refrescos, miel, mermelada, sirope de agave y fruta en almíbar. Chicles, caramelos y productos «sin azúcar»

3 Dónde se esconde

- ✕ **Polioles**
  Empeoran los síntomas. Están en chicles, caramelos y bollería «sin azúcar».
  Sorbitol E-420 · **Manitol E-421** · **Maltitol E-965** · **Lactitol E-966** · **Xilitol E-967** · **Isomaltitol E-953**
- ✕ **Fructosa y jarabes**
  Fructosa, jarabe de glucosa y fructosa, jarabe de maíz o concentrado de zumo en la lista de ingredientes.
- ✕ **Jarabes y medicamentos**
  Muchos llevan sorbitol o fructosa. Pregunta por alternativas.

¿Le sientan mal también la cebolla, el ajo o el trigo? Puede deberse a los fructanos, otro tipo de azúcar. Coméntalo en consulta: es otra dieta distinta.

Habla con tu pediatra

- Antes de empezar: hace falta un diagnóstico y descartar otras causas, como la celiaquía.
- Si ya sigue otras restricciones, come poco o le preocupa su peso: esta dieta puede no estar indicada.
- Si no mejora en 4 semanas o pierde peso.
- Esta guía no sirve para la intolerancia hereditaria a la fructosa (fructosemia), que es otra enfermedad.

Menos fructosa,
no menos variedad.

emmapediatra.com

Dra. Emma López Rubio
Pediatría y Gastroenterología Infantil · Córdoba

Basado en las guías de dieta baja en fructosa de la Asociación Española de Gastroenterología y del Servicio Andaluz de Salud.

Información general. No sustituye la consulta con tu pediatra.
© 2026 Dra. Emma López Rubio. Todos los derechos reservados.