GUÍA PARA FAMILIAS · CELIAQUÍA

La sigilosa enfermedad celiaca

cuando los síntomas no son diarrea,
tripa hinchada y pérdida de peso

En la celiaquía, el gluten hace que las defensas dañen el intestino. Hoy sabemos que el niño con diarrea, tripa hinchada y muy delgado es solo una parte. Muchos tienen **síntomas tan sutiles que pasan desapercibidos**, o ninguno, y por eso muchos casos siguen sin diagnosticar.

1 Sus mil caras

PARECE que está cansado o de mal humor
→ Cansancio e irritabilidad
Sin energía, irritable o con cambios de humor sin un motivo claro.

PARECE que es bajito, como su familia
→ Crece poco
Talla baja, poco aumento de peso o una pubertad que se retrasa.

PARECE una anemia más
→ Falta de hierro que no se corrige
Anemia que vuelve o que no mejora del todo con el tratamiento con hierro.

PARECE estreñimiento o gases
→ Una tripa que se queja
Dolor de tripa que se repite, estreñimiento, gases o tripa hinchada.

PARECE cosa de la boca
→ Llagas y esmalte dental
Aftas que se repiten y manchas o defectos en el esmalte de los dientes.

PARECE un análisis raro
→ Transaminasas altas
Alteración de las pruebas del hígado sin otra explicación.

En adultos también puede manifestarse como infertilidad, abortos de repetición u osteoporosis temprana.

2 A quién buscarla

Aunque no tengan síntomas, conviene hacer el análisis en niños con más riesgo:

- **Padres o hermanos celíacos**
- **Diabetes tipo 1**
- **Enfermedad del tiroides autoinmune**
- **Síndrome de Down, Turner o Williams**
- **Déficit de IgA**
- **Hepatitis autoinmune**

3 Cómo se descubre

1 **Un análisis de sangre**
mide los anticuerpos de la celiaquía, mientras sigue comiendo gluten

2 **Si salen altos**
lo valora la consulta de gastroenterología infantil

3 **Se confirma**
según los niveles, con un segundo análisis o con una biopsia del intestino

4 **Dieta sin gluten**
para toda la vida: es el único tratamiento, y funciona

No quites el gluten antes del análisis
Sin gluten, los anticuerpos bajan y el resultado puede salir normal aunque sea celíaco. Primero el diagnóstico, después la dieta.

Con el diagnóstico, la dieta lo cambia todo. Los síntomas mejoran en semanas y el intestino se recupera en meses. Cómo hacerlo en casa, en «Aprender a comer sin gluten».

Habla con tu pediatra si

- Alguno de estos síntomas dura semanas y no tiene otra explicación.
- Hay un familiar cercano celíaco o tiene alguna de las enfermedades de riesgo.
- Estás pensando en quitarle el gluten: antes, conviene descartar la celiaquía.

Que no se note
no significa que no esté.

emmapediatra.com

Dra. Emma López Rubio
Pediatría y Gastroenterología Infantil · Córdoba

Información general. No sustituye la consulta con tu pediatra.
© 2026 Dra. Emma López Rubio. Todos los derechos reservados.