GUÍA PARA FAMILIAS · ESÓFAGO

¿Se le hace bola?

puede ser una esofagitis eosinofílica

Cuando a un niño **se le hace bola** la comida, muchas veces es porque no tiene hambre, no le gusta o le cuesta masticar ciertas texturas. Pero otras veces es la señal de una **disfagia**, una dificultad real para tragar los sólidos. Una de sus causas es la esofagitis eosinofílica, una enfermedad cada vez más frecuente y todavía poco conocida.

1 Cómo se nota

Bebés y pequeños	**Come mal y vomita** Rechaza la comida, le cuesta pasar a texturas más gruesas, vomita a menudo o gana poco peso.
Edad escolar	**Dolor y ardor** Dolor en la boca del estómago, ardor que no mejora, vómitos o sensación de que la comida no baja.
Adolescentes	**La comida se atasca** Le cuesta tragar la carne o el pan, nota que se queda en el pecho y, a veces, tiene que vomitarla para que pase.

2 Los trucos que esconden

Muchos niños se adaptan sin darse cuenta, y la familia lo toma por manías:

Come muy despacio
siempre es el último en terminar

Bebe con cada bocado
necesita agua para que la comida baje

Trocea mucho
corta en trozos muy pequeños y mastica sin parar

Evita lo duro
deja la carne, el pan o el arroz, y prefiere purés y salsas

3 Qué ocurre

El esófago se inflama
El tubo que lleva la comida al estómago se llena de eosinófilos, unas células de las defensas.

Por una reacción alérgica
Casi siempre a alimentos, como la leche o el trigo. No es una alergia inmediata: no da ronchas.

Va con otras alergias
Es más frecuente en niños con asma, rinitis, dermatitis o alergias a alimentos.

Es crónica
Sin tratamiento, la inflamación puede estrechar el esófago con los años.

4 Cómo se confirma

1. **Una endoscopia**
   con sedación, para ver el esófago y tomar pequeñas muestras
2. **Las biopsias**
   cuentan los eosinófilos: es la única forma de diagnosticarla
3. **Una nueva endoscopia**
   tras el tratamiento, porque sentirse mejor no siempre significa que el esófago esté curado

Los análisis de sangre y las pruebas de alergia no sirven para diagnosticarla ni para saber qué alimento la provoca.

5 Cómo se trata

Jarabes · **Pastillas** · **Dietas específicas**

Existen distintos tipos de tratamiento. Su pediatra indicará cuál es el más adecuado para cada niño y hará el seguimiento.

Si la comida se queda atascada y no baja
Babea, no puede tragar ni su saliva o le duele el pecho: acude a urgencias.

Habla con tu pediatra si

- Tarda mucho en comer, necesita agua con cada bocado o evita la carne y el pan.
- Vomita a menudo, tiene ardor o dolor de estómago que no mejora.
- Rechaza la comida o no gana peso.
- Tiene alergias o asma y además le cuesta tragar.

Comer despacio
no siempre es manía.

emmapediatra.com

Dra. Emma López Rubio
Pediatría y Gastroenterología Infantil · Córdoba

Información general. No sustituye la consulta con tu pediatra.
© 2026 Dra. Emma López Rubio. Todos los derechos reservados.