GUÍA PARA FAMILIAS · LACTOSA

Intolerancia a la lactosa

y cómo comer con menos lactosa

La lactosa es el azúcar de la leche. Para digerirla hace falta una enzima, la lactasa. Cuando falta, la lactosa llega sin digerir al colon y da **gases, tripa hinchada, dolor y diarrea**. No es una alergia: un poco suele sentar bien.

1 Por qué aparece

Después de una gastroenteritis

La tripa tarda un tiempo en recuperarse y digiere peor la lactosa.

PASA EN SEMANAS

En niños mayores

Con los años se fabrica menos lactasa. Es frecuente y no es grave.

SUELE QUEDARSE

Si le sienta bien, no hay que quitarla

La lactosa ayuda a absorber el calcio de la leche, que los huesos necesitan para crecer. Lo «sin lactosa» no es más sano ni más ligero: solo tiene sentido para quien no la digiere.

2 Las claves

Reducir, no eliminar
cada niño tolera una cantidad distinta; se trata de encontrar la suya

Con otros alimentos
la leche sienta mejor en la comida o con cereales que sola y en ayunas

Yogur y queso curado
casi siempre se toleran bien, aunque no sean «sin lactosa»

Cocinar no la quita
hervir, hornear o calentar no cambia la lactosa: una bechamel o unas natillas llevan la de su leche

3 Cuánta lactosa lleva

Vaso de leche 200 ml	10 g
Yogur natural 1 unidad	4–5 g
Helado 1 bola	3 g
Queso fresco 1 tarrina pequeña	2 g
Mantequilla para una tostada	casi 0
Queso curado 2 lonchas	casi 0
Leche sin lactosa 200 ml	casi 0

Cantidades aproximadas. El yogur lleva lactosa, pero sus bacterias ayudan a digerirla: por eso suele sentar mejor que la leche.

4 Alimento a alimento

● Sí ● Con moderación ● Mejor evitar

Leche

- ● Leche sin lactosa
  Tiene el mismo calcio y las mismas proteínas que la normal
- ● Leche normal en poca cantidad, mejor dentro de una comida
- ● Vasos grandes de leche sola, batidos, leche en polvo y leche condensada

Yogur y quesos

- ● Yogur natural y kéfir. Quesos curados y semicurados, como manchego, parmesano, gouda o emmental
- ● Queso fresco, requesón, mozzarella y queso de untar

Mantequilla y nata

- ● Mantequilla, que apenas tiene lactosa
- ● Nata para cocinar o montada

Todo lo demás no lleva lactosa. Fruta, verdura, legumbres, carne, pescado, huevo, arroz, pasta y pan de barra se comen con normalidad.

5 Dónde se esconde

En la lista de ingredientes
Busca estas palabras en productos que no parecen lácteos.

Lactosa · Leche en polvo · Suero de leche · Sólidos lácteos · Nata

Embutidos y fiambres
Jamón cocido, pavo, salchichas y patés suelen llevar lactosa añadida.

Productos preparados
Pan de molde, galletas, purés de sobre, salsas, rebozados y platos precocinados.

Medicamentos
Algunos la llevan como excipiente, casi siempre en cantidad tan pequeña que no da síntomas.

Habla con tu pediatra

- Antes de quitar los lácteos: otras causas dan síntomas parecidos y conviene descartarlas.
- Si es un bebé: la intolerancia a la lactosa es rara a esa edad. No cambies la fórmula sin consultar.
- Si tiene ronchas, vómitos o sangre en las heces: no es intolerancia, puede ser una alergia. La leche sin lactosa no sirve para la alergia.
- Si no mejora al reducir la lactosa o pierde peso.

Menos lactosa,
no menos lácteos.

emmapediatra.com
Dra. Emma López Rubio
Pediatría y Gastroenterología Infantil · Córdoba

Información general. No sustituye la consulta con tu pediatra.
© 2026 Dra. Emma López Rubio. Todos los derechos reservados.