

रक्तदान — संपूर्ण जानकारी गाइड

Blood Donation — Complete Information Guide

पात्रता, प्रक्रिया, ब्लड ग्रुप अनुकूलता, देखभाल और सावधानियाँ — एक जगह पर

तैयार किया गया: BloodBridge

वर्षिय-सूची (Table of Contents)

1. रक्तदान क्या है?
2. रक्तदान के लिए पात्रता (Eligibility)
3. कौन रक्तदान नहीं कर सकता / अस्थायी रूप से टाल दें
4. ब्लड ग्रुप और अनुकूलता चार्ट — कौन किस रक्त दे सकता है
5. रक्तदान की पूरी प्रक्रिया — चरण दर चरण
6. रक्तदान के बाद क्या करें और क्या न करें
7. रक्तदान से जुड़े फायदे
8. रक्त के घटक (Components) — Whole Blood, Plasma, Platelets, RBC
9. कतिनी बार रक्तदान किया जा सकता है
10. आम भ्रान्तियाँ बनाम तथ्य (Myths vs Facts)
11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. रक्तदान क्या है?

रक्तदान एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति अपना रक्त किसी ऐसे मरीज़ की मदद के लिए देता है जिसे सर्जरी, दुर्घटना, कैंसर के इलाज, थैलेसीमिया, प्रसव के दौरान रक्तस्राव या अन्य चिकित्सीय स्थितियों में रक्त की आवश्यकता होती है। एक बार में लगभग 350–450 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, जो शरीर के कुल रक्त का एक छोटा-सा हिस्सा होता है और स्वस्थ शरीर कुछ ही हफ्तों में इसकी पूर्तिकर लेता है।

एक व्यक्ति का रक्तदान 3 लोगों तक की जान बचा सकता है, क्योंकि रक्त को उसके अलग-अलग घटकों (Red Cells, Plasma, Platelets) में बाँटकर अलग-अलग मरीज़ों को दिया जा सकता है।

2. रक्तदान के लिए पात्रता (Eligibility)

मापदंड (Criteria)	आवश्यक सीमा (Requirement)
आयु (Age)	18 से 65 वर्ष
वजन (Weight)	कम से कम 50 किलोग्राम
हीमोग्लोबिन (Hemoglobin)	कम से कम 12.5 g/dL
पल्स रेट (Pulse)	50–100 प्रतिमिनट, नियमिति
ब्लड प्रेशर (BP)	सामान्य सीमा में (लगभग 100–140 / 60–90 mmHg)
शरीर का तापमान	सामान्य (बुखार न हो)
अंतिम रक्तदान के बाद	पुरुष: कम से कम 90 दिन, महिला: कम से कम 120 दिन का अंतराल

इसके अलावा दानकर्ता को सामान्य रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बिना किसी संक्रमण या गंभीर बीमारी के, और पछिले कुछ हफ्तों में कोई बड़ी सर्जरी या टैटू/पियर्सिंग न करवाई हो (नीचे सेक्शन 3 देखें)।

3. कौन रक्तदान नहीं कर सकता / अस्थायी रूप से टालें

स्थायी रूप से रोक (Permanent deferral):

- HIV/AIDS पॉज़िटिव व्यक्ति
- Hepatitis B या Hepatitis C से संक्रमित व्यक्ति
- गंभीर हृदय रोग या कैंसर का इतिहास
- इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति

अस्थायी रोक (Temporary deferral):

- बुखार, सर्दी-जुकाम या कोई सक्रिय संक्रमण — ठीक होने तक
- गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद 6 महीने तक
- पछिले 6 महीनों में टैटू, पयिर्सिंग या एक्जूपंकचर करवाया हो
- पछिले 48 घंटों में शराब का सेवन किया हो
- हाल ही में कोई बड़ी सर्जरी या दांत निकालवाना (कुछ हफ्तों की छूट)
- पछिले 90 दिनों के भीतर पहले ही रक्तदान कर चुके हों (पुरुष) / 120 दिनों (महिला)
- मलेरिया से हाल ही में ठीक हुए हों — 3 महीने की प्रतीक्षा
- एनीमिया (कम हीमोग्लोबिन)

4. ब्लड ग्रुप और अनुकूलता चार्ट

रक्त 4 मुख्य समूहों (A, B, AB, O) और Rh फैक्टर (+ / -) के आधार पर 8 प्रकारों में बंटा होता है। सही मैच के बिना रक्त चढ़ाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हर ट्रांसफ्यूजन से पहले जांच ज़रूरी है।

डोनर (Donor)	कनिहें दे सकता है (Can Donate To)
O-	सभी ग्रुप — O-, O+, A-, A+, B-, B+, AB-, AB+ (यूनिवर्सल डोनर)
O+	O+, A+, B+, AB+
A-	A-, A+, AB-, AB+
A+	A+, AB+
B-	B-, B+, AB-, AB+
B+	B+, AB+
AB-	AB-, AB+
AB+	केवल AB+ (यूनिवर्सल प्लाज़्मा डोनर — प्लाज़्मा सभी को दे सकता है)

O- यूनिवर्सल डोनर है — यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तिको रक्त दे सकता है। AB+ यूनिवर्सल रसीवर है — यह सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है। इसके विपरीत, प्लाज़्मा दान में AB ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि उसके प्लाज़्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती।

कौन किससे रक्त ले सकता है (Recipient चार्ट):

रसीवर (Recipient)	कनिसे ले सकता है (Can Receive From)
O+	O+, O-
O-	केवल O-
A+	A+, A-, O+, O-
A-	A-, O-
B+	B+, B-, O+, O-
B-	B-, O-
AB+	सभी ग्रुप (यूनिवर्सल रसीवर)
AB-	AB-, A-, B-, O-

5. रक्तदान की पूरी प्रक्रिया — चरण दर चरण

चरण 1 — रजिस्ट्रेशन (Registration)

अपना नाम, उम्र, पता और पहचान पत्र (ID proof) के साथ रजिस्टर करें। यह जानकारी रिकॉर्ड और भविष्य में संपर्क के लिए इस्तेमाल होती है।

चरण 2 — मेडिकल स्क्रीनिंग / जांच

एक स्वास्थ्यकर्मी आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, पल्स, तापमान और वजन जांचता है, और एक संक्षिप्त स्वास्थ्य प्रश्नावली भरवाई जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रक्तदान आपके और मरीज़ दोनों के लिए सुरक्षित है।

चरण 3 — वास्तविक रक्तदान (Donation)

आपको आराम से लेटने/बैठने के लिए कहा जाता है। बांह को स्ट्रेप्टाइल किया जाता है और एक नई, डिस्पोजेबल सुई से नस से रक्त लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सामान्यतः केवल 8–10 मिनट लगते हैं, और कुल लगभग 350–450 मिलीलीटर रक्त एकत्र किया जाता है।

चरण 4 — आराम और जलपान (Rest & Refreshment)

रक्तदान के तुरंत बाद 10–15 मिनट आराम करें और हल्का नाश्ता व जूस/पानी लें ताकि शरीर सामान्य महसूस करे और चक्कर न आए।

चरण 5 — प्रमाणपत्र और रिकॉर्ड (Card / Acknowledgment)

अधिकतर रक्तदान केंद्र एक डोनर कार्ड/प्रमाणपत्र देते हैं जिसमें आपका ब्लड ग्रुप, दान की तारीख और अगली पात्रता तिथि दर्ज होती है — इसे संभाल कर रखें।

6. रक्तदान के बाद क्या करें और क्या न करें

क्या करें (Do's):

- अगले 24 घंटों में खूब पानी और तरल पदार्थ पिएँ
- अगले कुछ घंटों तक हल्का और पौष्टिक भोजन लें (आयरन युक्त भोजन बेहतर)
- पट्टी (bandage) को कम से कम 4–6 घंटे तक हटाए बिना रखें
- यदि चिक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत लेट जाएं और पैर ऊँचे रखें

क्या न करें (Don'ts):

- अगले 24 घंटे भारी व्यायाम, दौड़ना या वजन उठाने से बचें
- उस दिनि शराब का सेवन न करें
- जिस बांह से रक्त लिया गया है उससे भारी सामान न उठाएं
- लंबे समय तक धूप में या गर्म जगह पर खड़े न रहें
- धूम्रपान से कम से कम कुछ घंटे बचें

7. रक्तदान से जुड़े फायदे

- किसी की जान बचाने का सीधा और तुरंत असर — एक यूनिट रक्त 3 लोगों तक की मदद कर सकता है
- मुफ्त मनी हेल्थ चेकअप — हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, पल्स आदि की जांच हो जाती है
- नियमित रक्तदान शरीर में आयरन के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है
- नई रक्त कोशिकाओं (red blood cells) के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है
- सामाजिक ज़म्मेदारी और आत्म-संतुष्टि की भावना

8. रक्त के घटक (Blood Components)

घटक (Component)	उपयोग (Used For)	सुरक्षित रखने की अवधि
Whole Blood (संपूर्ण रक्त)	गंभीर रक्तस्राव, दुर्घटना के मामले	लगभग 35 दिनों
Red Blood Cells (RBC)	एनीमिया, सर्जरी, प्रसव में रक्तस्राव	लगभग 42 दिनों
Plasma (प्लाज़्मा)	जलने के मामले, क्लॉटिंग विकार, लिवर फेलियर	1 वर्ष तक (फ्रोज़न)
Platelets (प्लेटलेट्स)	कैंसर के मरीज़, ड्रग्स की मोथेरेपी	केवल 5 दिनों

इसीलिए एक ही रक्तदान से इसके अलग-अलग घटकों को अलग करके कई अलग-अलग मरीज़ों की ज़रूरत पूरी की जा सकती है।

9. कतिनी बार रक्तदान कथिा जा सकता है

दान का प्रकार	न्यूनतम अंतराल
Whole Blood (पुरुष)	90 दनि (लगभग 3 महीने)
Whole Blood (महलिा)	120 दनि (लगभग 4 महीने)
Platelets	7 दनि (वर्ष में अधिकितम ~ 24 बार)
Plasma	28 दनि

यह अंतराल इसलए ज़रूरी है ताकशिरीर को पूरी तरह रक्त की भरपाई (वशिषकर आयरन और लाल रक्त कोशकिओं की) करने का पर्याप्त समय मलि सके, और दानकर्ता को कोई नुकसान न हो।

10. आम भ्रांतयिँ बनाम तथ्य

- ☐ भ्रांतः रक्तदान से कमजोरी आ जाती है और शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है।
- ☐ तथ्य: स्वस्थ व्यक्ति में शरीर कुछ ही हफ्तों में रक्त की पूर्तिकर लेता है; सामान्य आराम और आहार से कोई स्थायी कमजोरी नहीं आती।
- ☐ भ्रांतः रक्तदान से वजन बढ़ता या घटता है।
- ☐ तथ्य: रक्तदान का वजन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता।
- ☐ भ्रांतः शाकाहारी लोग रक्तदान नहीं कर सकते।
- ☐ तथ्य: शाकाहारी लोग भी रक्तदान कर सकते हैं, बशर्ते हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य हो।
- ☐ भ्रांतः डायबटीज़ के मरीज़ रक्तदान नहीं कर सकते।
- ☐ तथ्य: यदि शुगर नियंत्रण में है और कोई अन्य जटिलता नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह पर रक्तदान संभव है।
- ☐ भ्रांतः रक्तदान से संक्रमण (infection) होने का खतरा रहता है।
- ☐ तथ्य: हर दान में एक नई, स्टेराइल, डिस्पोजेबल सुई का ही उपयोग होता है, इसलिए संक्रमण का कोई खतरा नहीं है।

11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: क्या रक्तदान करने में दर्द होता है?

उत्तर: सुई चुभने के समय हल्की चुभन महसूस होती है, जो कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाती है। पूरी प्रक्रिया में कोई बड़ा दर्द नहीं होता।

प्रश्न: रक्तदान में कुल कतिना समय लगता है?

उत्तर: रजसिद्देशन, जांच, दान और आराम मिलाकर पूरी प्रक्रिया में लगभग 30–45 मिनट लगते हैं; असली रक्तदान मात्र 8–10 मिनट का होता है।

प्रश्न: क्या महिलाएं मासिक धर्म (period) के दौरान रक्तदान कर सकती हैं?

उत्तर: यद्विहीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य है और तबयित ठीक है, तो हां — डॉक्टर/स्वास्थ्यकर्मी की सलाह से रक्तदान किया जा सकता है।

प्रश्न: मुझे अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता — क्या मैं फरि भी रक्तदान कर सकता हूं?

उत्तर: हां, रक्तदान केंद्र पर जांच के दौरान ही आपका ब्लड ग्रुप पता लगाया जा सकता है।

प्रश्न: क्या रक्तदान से HIV या अन्य बीमारी हो सकती है?

उत्तर: नहीं। प्रत्येक दान में नई, स्टैराइल और डिसिपोजेबल सुई का प्रयोग होता है, इसलिए ऐसा कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न: अगर मेरा ब्लड ग्रुप दुर्लभ (rare) है, जैसे AB– या O–, तो क्या अलग नियम हैं?

उत्तर: नहीं, पात्रता के नियम सभी ब्लड ग्रुप के लिए समान हैं, लेकिन दुर्लभ ग्रुप वालों को नियमिति रूप से रक्तदान करने के लिए वशिष रूप से प्रोत्साहति किया जाता है क्योंकि उनकी उपलब्धता कम होती है।

यह गाइड केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी संदेह की स्थितिमें हमेशा अपने डॉक्टर या रक्तदान केंद्र के मेडिकल स्टाफ़ से सलाह लें।