La vaccination des bébés

Guide pour les parents Voici les vaccins dont votre bébé a besoin :

À la naissance	НерВ
2 mois	HepB + DTC + VCP13 + Hib + Polio + RV 1-2 mois1
4 mois	HepB ² + DTC + VCP13 + Hib + Polio + RV
6 mois	HepB + DTC + VCP13 + Hib ³ + Polio + RV ⁴ + Grippe ⁵ 6–18 mois ¹ 6–18 mois ¹
12 mois ou plus	ROR + DTC + VCP13 + Hib + Varicelle + HepA ⁶ + Grippe ⁵ 12–15 mois ¹ 15–18 mois ¹ 12–15 mois ¹ 12–15 mois ¹ 12–23 mois ¹

Consultez votre médecin ou votre infirmière pour vous assurer que votre bébé reçoit toutes les vaccinations en temps voulu. Très souvent, on combine les vaccins pour réduire le nombre de piqûres. Demandez bien une carte de vaccination avec les dates des vaccinations de votre bébé. Apportez cette carte à chaque visite.

Voici la liste des maladies contre lesquelles votre bébé sera protégé :

HepB: hépatite B, une maladie grave du foie.

DTC: diphtérie, tétanos, coqueluche.

VCP13: vaccin conjugué antipneumococcique qui protège l'enfant contre une infection grave du sang, des poumons et du cerveau.

Hib: Haemophilus influenzae de type b, une infection grave du cerveau, de la gorge et du sang.

Polio: poliomyélite, une maladie paralysante grave.

RV: infection au rotavirus, une maladie qui donne de graves diarrhées.

Grippe: une infection grave des poumons.

ROR: rougeole, oreillons, rubéole.

HepA: hépatite A, une maladie grave du foie.

Varicelle

Notes relatives au tableau ci-dessus :

- 1. Fourchette d'âge dans laquelle le vaccin doit être donné.
- 2. Selon le vaccin qui est utilisé, votre enfant peut ne pas avoir besoin d'une dose de vaccin contre l'hépatite B à l'âge de 4 mois. Demandez à votre médecin ou à votre infirmière.
- 3. Selon le vaccin qui est utilisé, votre enfant peut ne pas avoir besoin d'une dose de vaccin Hib à l'âge de 6 mois. Demandez à votre médecin ou à votre infirmière.
- 4. Selon le vaccin qui est utilisé, votre enfant peut ne pas avoir besoin d'une dose de vaccin RV à l'âge de 6 mois. Demandez à votre médecin ou à votre infirmière.
- 5. Tous les enfants de plus de 6 mois doivent être vaccinés contre la grippe à l'automne ou en hiver chaque année.
- 6. Votre enfant peut avoir besoin de 2 doses de vaccin HepA données à 6 mois d'intervalle au moins.