五十肩のセルフケア

～ 自宅でできる運動療法 ～

痛くない範囲で、毎日少しずつ動かしましょう

五十肩とは？

正式名称：肩関節周囲炎

肩の周りが炎症を起こし、
動かしにくくなる病気です。

**自然に治ることが多いですが、
放っておくと固まってしまいます。**

なぜ運動が大切？

動かさないと…

痛い → 動かさない
→ 肩が固まる
→ もっと動かない

悪循環に陥ります

少しずつ動かすと…

少し動かす → 柔らかくなる
→ もっと動く
→ 回復が早まる

好循環が生まれます

治療の2つの目標

1

痛みを
悪化させない

2

可動域を
維持・回復させる

運動の前に — まず温めよう

温めてから運動すると、肩が動かしやすくなります

温め方のポイント

蒸しタオル	入浴	ホットパック
電子レンジで 温めたタオルを 肩にあてる	お風呂に ゆっくり浸かって 肩を温める	市販の ホットパックを 肩にあてる

注意：炎症が強い急性期（夜間痛が強い時期）は温めすぎないこと

運動 1

振り子運動（Codman運動）

一番簡単で、痛みが少ない運動です

振り子運動のやり方



1. 前かがみになる

2. 腕をだらんと垂らす

3. 体を揺らして
　腕を振り子のように動かす

振り子運動のポイント



力を入れない！

自分の筋力で上げない

重力と反動で動かす

「力を抜いて、腕をぶらぶらさせるだけでOK」

運動 2

タオル体操（後方ストレッチ）

家にあるタオル1本でできる運動です

タオル体操のやり方

1. 背中でタオルを持つ

2. 健側で上に引く

3. 患側の肩を後ろに伸ばす

タオル体操の効果

内旋可動域の
改善

肩関節拘縮の
改善

背中に手が回しにくい方に特に効果的です

運動 3

壁のぼり運動

壁さえあればどこでもできます

壁のぼり運動のやり方



1. 壁に指をつける

2. 指を少しずつ上へまで

3. 痛くないところ

壁のぼり運動のポイント

痛みが出たら止める

少しずつ高さを上げていく

毎日の記録をつけると
モチベーションが上がります

姿勢改善も大切

肩甲骨の可動性低下が五十肩を悪化させます

猫背を改善	胸を張る	肩甲骨を寄せる
背中を丸めない 姿勢を意識する	胸を開いて 肩を後ろに引く	肩甲骨を中央に 寄せる運動をする

五十肩の3つの時期

炎症期

3〜6ヶ月

夜間痛が強い

拘縮期

6〜12ヶ月

肩が動かない

回復期

12ヶ月〜

徐々に改善

時期に合わせた運動を

時期	おすすめ運動	注意点
炎症期	振り子運動のみ	無理な運動は避ける
拘縮期	ストレッチ全般 タオル体操 壁のぼり	痛くない範囲で 積極的に
回復期	筋力訓練を追加	可動域を広げていく

毎日のおすすめ運動 トップ3

1

振り子運動

力を抜いて
腕をぶらぶら

2

壁のぼり

痛くないところまで
指を上へ

3

入浴後ストレッチ

温まった状態で
肩を動かす

今日からできること

五十肩は放っておくと固まる病気です。

痛くない範囲で
毎日少し動かすことが一番大事です。

お風呂上がりの5分で、今日から始めましょう！