外来でそのまま使える食事指導シリーズ

第3回 / 全10回

脂質異常症の食事指導
― LDLと中性脂肪で戦略が違う

油を全部悪者にしない外来の実践

脂質異常症で食事指導が重要な理由

脂質異常症 → 動脈硬化 → 心筋梗塞・脳梗塞の重要な危険因子

薬物療法との関係

・スタチンが必要な場面は多い
・しかし薬を始めても食事は重要
・食事が乱れたままだと体重増加・糖尿病・脂肪肝が進みやすい

食事指導の意義

・コレステロールの数値だけでなく動脈硬化全体のリスクを下げる
・生活調整としての位置づけ
・他の合併症の予防にもつながる

LDLと中性脂肪で戦略が違う

脂質異常症といっても中身はひとつではない — まず何が高いかを確認する

LDLコレステロール高値

見直すべきもの:

・飽和脂肪酸(肉の脂身・バター)
・揚げ物の頻度
・加工肉
・菓子パン・スナック菓子
・洋菓子

中性脂肪高値

見直すべきもの:

・アルコール(量と頻度)
・甘い飲み物
・間食・菓子パン
・夜遅い食事
・糖質の過剰摂取

LDL高値でまず見直したい食品

飽和脂肪酸
肉の脂身・バター・生クリーム・ラード

最重要

揚げ物
唐揚げ・とんかつ・天ぷら・フライの頻度

高

加工肉
ハム・ソーセージ・ベーコン(塩分も多い)

高

菓子類
菓子パン・スナック・洋菓子(脂質+糖質)

高

中性脂肪高値で見直したいもの

「油ものを減らせば十分」とは限らない — 糖質・アルコールの影響に注目

🍺 アルコール

種類よりも量。週末まとめ飲みでも影響あり

🥤 甘い飲み物

清涼飲料・加糖缶コーヒー・スポーツドリンク。満腹感なく摂取量が増えやすい

🌙 夜食・菓子パン

夜遅い食事・夕食後の間食。食べる時間帯も重要

むしろ増やしたい食品

減らす話だけでなく「増やすとバランスが良くなるもの」も伝える

魚

肉に偏りがちな食事を整える。焼き魚・煮魚など
調理法が揚げ物ばかりでは意味が薄れるので注意

食物繊維

野菜・海藻・きのこ・豆類・全粒穀物
主食や脂っこいおかずへの偏りを減らしやすくなる

大豆製品

豆腐・納豆・豆乳で主菜の一部を置き換え
肉中心の食事を少し整えたい患者さんに提案しやすい

「卵は週に何個まで？」への対応

患者さんの関心

「卵は何個まで？」
「コレステロールが多い食品は
避けた方がいいですよね？」

見落とされがちな問題

・毎日菓子パンを食べている
・揚げ物が多い
・加工肉が多い
・甘い飲み物がある
・体重が増えている

単一の食品を悪者にするより、食事全体のパターンを見る方が実際的

卵だけ減らしても、他の問題が残っていれば改善は限られる

外食・コンビニでの現実的な選び方

✓ 脂質の質を意識した選び方

- 主菜は揚げ物より焼き・蒸し系
- 菓子パン+甘い飲み物のセットを避ける
- 加工肉より魚や豆腐の惣菜を選ぶ

× 控えたい組み合わせ

- 菓子パン ＋ 甘い飲み物
- カップ麺 ＋ 揚げ物
- パスタ単品 ＋ デザート
- 弁当 ＋ スナック菓子

「脂っこいおかずを減らすだけでなく、菓子や甘い飲み物も一緒に見直しましょう」

よくある誤解

× 油は全部悪い

→ 油を極端に恐れると食事が貧弱に → かえって菓子・間食が増えることも

× サラダ油なら安心

→ 植物油でも量・調理法・他の食品との組み合わせが重要

× 和食なら大丈夫

→ 和食でも揚げ物が多い、甘い味付け、白米過剰なら改善しにくい

外来で伝える行動目標の例

「全部やめる」より「いちばん影響の大きいものから減らす」

- 毎日の菓子パンをやめる
- 甘い飲み物を無糖に変える
- 揚げ物を週の半分以下にする
- 加工肉を減らして魚や豆腐に置き換える

×「油ものを控えてください」だけでは行動変容につながりにくい

まとめ — Key Takeaways

- ✓ 脂質異常症の食事指導は「油を減らす」だけでは不十分
- ✓ LDL高値 → 飽和脂肪酸・揚げ物・加工肉・菓子がターゲット
- ✓ 中性脂肪高値 → アルコール・甘い飲み物・夜食・間食も重要
- ✓ 卵など単一食品に注目しすぎず、食事全体のパターンを見る
- ✓ 最も影響が大きいポイントから現実的に変えていく

次回予告

第4回

糖尿病の食事指導
― 血糖を安定させる3つのルール

チャンネル登録で見逃さないようにしましょう

ご視聴ありがとうございました

👍 高評価・チャンネル登録よろしくお願いします

📋 再生リストから他の回もご覧ください

💬 コメント欄で質問・リクエストお待ちしています

外来でそのまま使える食事指導シリーズ