外来でそのまま使える食事指導シリーズ

第4回 / 全10回

糖尿病の食事指導
― 血糖を安定させる3つのルール

「甘いもの禁止」で終わらせない外来の実践

糖尿病で食事療法が重要な理由

食事は血糖に直結 — 薬物療法を行っていても食事が乱れれば安定しない

血糖だけではない

・体重、脂質、血圧、脂肪肝
・将来の動脈硬化リスク
・「血糖だけを見る食事」ではなく
全身の代謝を整える食事

継続がカギ

・一時的なイベントではない
・完璧だが続かない方法より
不完全でも継続できる方法に
価値がある

血糖を安定させる3つのルール

1 血糖を乱しにくい食事にする

食後高血糖を起こしやすい食べ方を見直し、食事量のぶれを小さくする

最重要

2 必要なら体重を調整する

肥満→減量で血糖改善。高齢者・やせ→減らさないことが重要な場合も

個別判断

3 続けられる方法にする

生活に合わない方法は続かない。一人暮らし・仕事・家族・外食を踏まえる

基本

「甘いもの禁止」だけでは不十分な理由

患者さんの認識

「甘いものは控えています」
「砂糖は使っていません」
「果物は体に良いから…」

見落とされがちな血糖源

・主食の量が多い（大盛り・丼）
・菓子パンが食事代わり
・飲み物に糖分が多い
・食事量が日によって大きくぶれる

血糖に強く影響するのは食事全体の炭水化物量

何をどれだけ、どの時間帯に食べているかを見ることが本質

まず整えたいのは主食の量

ご飯

大盛り・丼もの・おかわりの習慣を見直す

→「ゼロ」ではなく「毎食の量をそろえる」

パン

菓子パンは糖質＋脂質が同時に多い

→ 菓子パン＋甘い飲み物のセットは特に注意

麺類

単品で済ませやすく、主食量が多くなりがち

→ 野菜やたんぱく質を組み合わせる

主食をゼロにする必要はない — 量のぶれを整えるだけでも効果あり

血糖を乱しやすい食品 — 主食以外で確認すべき3つ

🥤 甘い飲み物

最も見逃されやすい。満腹感なく血糖だけ急上昇
食事を見直しても改善しない場合、原因が飲み物のことも

🍪 間食

糖質中心の間食が習慣化すると血糖は不安定に
菓子・せんべい・チョコ・アイスが毎日入っていないか

🥐 菓子パン

糖質も脂質も多く、朝食・昼食代わりに選ばれやすい
血糖管理の面では不利な食品

たんぱく質と野菜を組み合わせる

「何を減らすか」だけでなく「何を組み合わせるか」も大切



× ご飯だけで済ます

→ 魚・肉・卵・大豆製品を加える

× 麺類だけで終わらせる

→ 野菜やたんぱく質を組み合わせる



× 菓子パンだけの朝食

→ 卵・ヨーグルト・サラダを加える

⚠ 腎機能低下がある場合はたんぱく質の勧め方を慎重に

食べる順番より大事なこと

よく聞かれる質問

「野菜から食べると
よいですか？」

→ 一定の意味はあるが
それだけでは不十分

もっと重要なチェックポイント

- ☐ 主食の量が多すぎないか
- ☐ 飲み物に糖分が入っていないか
- ☐ 間食が習慣化していないか
- ☐ 食事量が日によってぶれていないか

食べる順番は補助的な工夫。根本は食事全体の量と内容を整えること

外食・コンビニで気をつけたい3つのポイント

🍚 主食量が多くなりやすい

丼もの・麺類単品・大盛りで炭水化物が増える
→ 定食を選ぶ、大盛りにしない

🍞 単品食いになりやすい

菓子パンだけ、おにぎりだけ → 血糖が急上昇
→ たんぱく質や野菜を組み合わせる

🥤 甘い飲み物をセットにしない

食事に気をつけても飲み物で効果が薄れる
→ 水やお茶を基本にする

全員に同じ制限をかけない — 個別の注意が必要な場面

👴 高齢者

血糖を気にするあまり食事量↓ → 体重減少・筋肉量低下
若年者や肥満患者と同じ制限は危険。食べられているか・体重が落ちていないかを確認

⚖️ やせている患者

「減らす」より「整える」が重要
エネルギー不足にならず血糖を安定させる方法を考える

🫘 腎機能低下

たんぱく質・塩分・カリウムの考え方が関わる
自己流の食事制限は危険 — 栄養士との連携が有用

よくある誤解

× 果物は体によいからいくらでも食べてよい

→ 量を考えずに食べれば血糖に影響する。「健康に良い」と「血糖に無関係」は別

× 砂糖を使っていなければ安心

→ ご飯・パン・麺類も血糖に関わる。「甘くない＝安全」は誤り

× 主食を抜けばよい

→ 極端に減らすと続かず低栄養にも。ゼロより量を整える方が現実的

× 糖尿病用の食品だけ選べばよい

→ 特別な食品より日常の食習慣（飲み物・間食・主食量）を整える方が効果的

外来で伝える行動目標の例

1～2個の具体的な目標に落とし込む

- 主食は毎食同じくらいの量にそろえる
- 甘い飲み物を水かお茶に変える
- 菓子パンを食事の代わりにしない
- おかずにたんぱく質を1品加える

×「甘いものをやめてください」だけでは行動変容につながりにくい

まとめ — Key Takeaways

- ✓ 糖尿病の食事指導は「甘いもの禁止」だけでは不十分
- ✓ まず整えたいのは主食の量 — 毎食のぶれを小さくする
- ✓ 甘い飲み物・間食・菓子パンは見逃されやすい血糖源
- ✓ たんぱく質と野菜を組み合わせ、血糖変動を緩やかに
- ✓ 高齢者では制限しすぎによるフレイル・低栄養に注意

次回予告

第5回

肥満の食事指導
― 食べ方を変える行動療法的アプローチ

チャンネル登録で見逃さないようにしましょう

ご視聴ありがとうございました

👍 高評価・チャンネル登録よろしくお願いします

📋 再生リストから他の回もご覧ください

💬 コメント欄で質問・リクエストお待ちしています

外来でそのまま使える食事指導シリーズ