外来でそのまま使える食事指導シリーズ

第8回 / 全10回

嚥下障害の食事指導
― 食形態選択と誤嚥予防の実際

やわらかい食事が安全とは限らない

食事指導の目的は誤嚥予防だけではない

1. 誤嚥や窒息のリスクを下げる
2. 十分な栄養と水分を保つ
3. できる限り経口摂取を続ける
4. 食べる負担や苦痛を減らす

この複数の目標を同時に考える必要がある

食事指導の前に確認すべき項目

- ☐ 背景疾患は何か
- ☐ むせるのは食べるときか食後か
- ☐ 固形物と液体のどちらが苦手か
- ☐ 体重減少・水分摂取量の低下はあるか
- ☐ 肺炎を繰り返していないか
- ☐ 口腔内の清潔・義歯の状態
- ☐ 食事中の姿勢・一口量
- ☐ 食べる意欲が保てているか

「やわらかい」と「安全」は同じではない

食形態の判断は「噛みやすそうか」だけでは不十分

- まとまるか — 口の中で食塊を作れるか
- ばらけないか — 細かく散らばらないか
- 速く流れ込みすぎないか — 嚥下反射の前に流入しないか
- 咽頭に張り付きすぎないか — 残留の原因にならないか

例: 豆腐＝崩れやすい / パン＝ぱさつく / みそ汁の具＝液体と固形が混在

避けたい食品の「特徴」で覚える

🌅	ぱさつく	食パン、ゆで卵の黄身、焼き魚、いも類
💥	ばらける	そぼろ、ひき肉、炒り卵、クッキー
📎	張り付く	もち、団子、のり、わかめ
💧	液体＋固形が混ざる	みそ汁の具、果物入りゼリー、シリアル入りヨーグルト
🌶️	酸味・刺激	患者によっては咳込みが誘発される

とろみは有用だが万能ではない

✓ メリット

- 流れ込みが速すぎる液体を調整しやすい
- 一口量を管理しやすい
- 患者によってはむせが減る

⚠ デメリット

- 口腔内や咽頭に残りやすい
- 飲みにくさ → 水分摂取量↓
- 作り方で粘度がばらつく
- 嗜好性が低く嫌がる人がいる

「つければ安全」ではなく、適切な濃さでその人に合っているか確認

姿勢・一口量・食事環境の工夫

🪑 **姿勢**	頸部前屈が有効なことも。体幹の傾き、頸部過伸展は避ける
🥄 **一口量**	大きすぎると負担増。介助者が急がせないことも重要
⏱️ **食事ペース**	次の一口の前にきちんと飲み込めているか確認
🧘 **注意集中**	会話が多すぎる、TV視聴、眠気 → 誤嚥リスク↑

口腔ケアと栄養・水分管理も食事指導の一部

🦷 口腔ケア

- 口腔不潔 → 誤嚥時の細菌負荷↑
  → 肺炎リスク↑
- 食前後の口腔ケア
- 義歯の適合確認
- 口腔乾燥への対応
- 歯科・歯科衛生士との連携

⚖️ 栄養・水分管理

- 食形態↓ → 食欲↓ → 摂取量↓
- 常に確認:
  - ☐ 体重が落ちていないか
  - ☐ 水分摂取量は足りているか
- とろみ嫌い → 水分不足 → 脱水
  せん妄・便秘・腎機能悪化

安全性だけに注目して水分不足を見逃さない

よくある誤解

✕ **やわらかい食事なら安全**

→ ばらける・張り付く・液体と固形が混ざるものは安全とは限らない

✕ **とろみをつければ安心**

→ 残留を増やしたり水分摂取量を落としたりすることがある

✕ **むせなければ問題ない**

→ 不顕性誤嚥ではむせがない。湿った声、食後の痰、反復する発熱も手がかり

✕ **誤嚥予防だけ考えればよい**

→ 低栄養、脱水、食べる意欲の低下も大きな問題

外来で伝える行動目標の例

「むせるから食べない」ではなく「どうすれば安全に食べ続けられるか」

- ばらける食品・張り付く食品を避ける
- 一口量を少なくする
- 飲み込んでから次の一口にする
- 食後すぐに横にならない
- 食前後の口腔ケアを行う

まとめ — Key Takeaways

- ✓ やわらかいことと安全なことは同じではない
- ✓ 食形態はまとまり・ばらつき・流れやすさ・張り付きで考える
- ✓ とろみは有用だが万能ではない — 水分不足に注意
- ✓ 姿勢・一口量・口腔ケアまで含めて調整する
- ✓ 誤嚥予防だけでなく栄養・水分確保との両立が最重要

次回予告

第9回

消化管術後の食事指導
― 少量頻回と症状別対応の考え方

チャンネル登録で見逃さないようにしましょう

ご視聴ありがとうございました

👍 高評価・チャンネル登録よろしくお願いします

📋 再生リストから他の回もご覧ください

💬 コメント欄で質問・リクエストお待ちしています

外来でそのまま使える食事指導シリーズ