

女性のホルモン補充療法で、 老化は防げる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

承認された使い道との距離を軸に。

一般向け ／ 脳神経内科医

ホルモン補充療法は、老化を防ぐのか。

閉経後の女性が、老化予防目的で
ホルモン補充療法を使うことの根拠は？

医師の判定

老化予防目的では「勧められない」。
つらい更年期症状の治療とは、分けて考える。

ことば・大規模試験・害と採点の順に見ます。

1 **ことばと承認**
国が認めた使い道を確認する。

2 **大規模試験の読み方**
WHI・開始時期・認知症・皮膚。

3 **害・入手・採点**
向かない人と、手に入れ方。

ことばの説明①

ホルモン補充療法

略してHRT。MHTとも呼ぶ

閉経で減る女性ホルモンを、薬で補う治療。
つらい更年期の症状に使う。

エストロゲンとプロゲステン

子宮がある人は、子宮の内側を守るため、
二つを組み合わせる使う。

ことばの説明②

血管運動症状

けっかんうんどうしょうじょう

急な顔のほてりや、
のぼせ・寝汗のこと。

承認

しょうにん

国が、病気と量と飲み方を
確かめて認めた、薬の使い道。

ことばの説明③

ランダム化比較試験

くじ引きで組を分ける試験

飲む組と偽薬の組に分けて、結果を比べる。
薬の効果を、いちばん確かめやすい。

観察研究と交絡

使う人と使わない人を、後から比べる研究。
薬以外の違いが結果に混ざること＝交絡。

老化予防は、承認された使い道にない。

使い道	内容	承認
更年期の症状	ほてり・発汗	あり
膣の萎縮症状	閉経後の膣の症状	あり
骨粗しょう症	骨がもろくなる病気	あり
老化予防	承認の効能にない	なし

ほてりには効くが、偽薬でも減る。開始は60歳未満か閉経後10年以内が目安。

慢性病の予防には、勧められないと結論。

併用の試験は、平均5.2年で早期中止。害が益を上回った。

冠動脈疾患・乳がん・脳卒中・肺塞栓が増え、骨折が減った。

エストロゲン単独の試験は、平均6.8年。脳卒中が増えた。

ここが大切

18年追跡でも、死亡全体は変わらなかった。
参加者の平均は約63歳。若い人は、別に読む。

併用と単独で、結果は同じ向きではない。

項目	併用	単独
乳がん	増える	増えなかった
脳卒中	増える	増える
冠動脈疾患	増える	差なし
股関節骨折	減る	減る

子宮がある人は併用、子宮がない人は単独を使う。

若く始めれば良い、とはいき切れない。

試験	見たもの	結果
WHIの追加解析	閉経後の年数と冠動脈疾患	短いほど低い傾向
ELITE（6年未満）	頸動脈の壁の厚さ	遅い（CTは差なし）
KEEPS	頸動脈の壁の厚さ	差なし
DOPS	死亡・心不全・心筋梗塞	少ない（非盲検）

検査値の改善は、病気や死亡の減少を示さない。

予防どころか、増える関連も報告されている。

研究	対象	結果
WHIMS（併用）	65歳以上の女性	認知症が約2倍
KEEPS-Cog	閉経後早期	利益なし
ELITE-Cog	早期と遅い群	利益も害もなし
観察研究	登録データ	増える関連もある

10研究のまとめでは有意な関連なし。確実性は中等度～非常に低い。

測定値は良くなる。ホルモン療法のしわは差なし。

15研究のまとめで、弾力・厚み・コラーゲンが増えた。

乾燥は差なし。しわの統合は減少。

ただしホルモン療法の2試験は差なし。

ここが大切

測定値の改善は、見た目や老化の改善とは別。

小さな試験（Sator）の著者は「皮膚の老化は適応ではない」と述べた。

数字は、飲み薬と貼り薬で違った。

項目	飲み薬	貼り薬
静脈の血栓	1.58	0.93
脳卒中	1.28	低用量0.81・高用量1.89
研究の型	観察研究	観察研究
日本人大規模RCT	調べた範囲で無し	調べた範囲で無し

1超で増える側。観察研究で原因とは言えない。

当てはまる人は、自己判断で使わない。

- ✓ 乳がんなど、ホルモンで増える腫瘍がある
- ✓ 血栓性静脈炎・肺塞栓症の既往がある
- ✓ 冠動脈疾患や脳卒中の既往がある
- ✓ 原因不明の性器出血がある

重い肝臓病や、授乳中の人也使えない。

「自費で受けられる」ことは、安全の保証ではない。

入手の道	必要なこと	注意
医療用	医師の処方箋	保険の扱いは未確認
老化予防の処方	自費か保険かは未確認	医療機関で確認
調合ホルモン	薬局の調合	米国の委員会が懸念
個人輸入・ネット	品質の保証がない	国内法の確認なし

薬価は6円台～230円ほど。自費は未確認。

老化予防目的のHRTは、根拠C。

物差し	老化予防目的のHRT	理由
①根拠の強さ	C	予防は確かめられず
②効果の大きさ	なし・不明	確実性は高くない
③安全性	中～低	乳がん・脳卒中・血栓
④費用・手間	一部のみ	自費の価格は未確認

症状の治療は、採点の外。そちらは国が認めた使い道。

始める前に、3つのこと。

1 症状は婦人科へ

ほてりなどは、
承認された使い道。
婦人科で相談。

2 自己判断しない

老化予防に、
自己判断や個人輸入で
使わない。

3 土台から始める

土台は、
第2回の筋トレ、
第7回の地中海食へ。

いま使っている人は、やめる前も続ける前も主治医に。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

症状の治療と、
老化予防は別に読む。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

いま使っている人は、
自己判断でやめない。

個々の治療は担当医と相談。