

ビタミンB6

— 不足と摂りすぎを防ぐ —

食事・サプリ・薬を、ひとつにつなぐ

健康に関心のある方から医療従事者まで

必要な栄養素ほど、量をかめる。

**水溶性ビタミンなら、
たくさん摂っても安全？**

答え

食事を基本にし、サプリは
必要性和総量を確認します。

PLPは、働くための重要な形。

PLP

ピリドキサルリン酸

**B6の主な活性型のひとつ。
多くの酵素反応を助ける補酵素です。**

B6という名前

ピリドキシンなど複数の形を
まとめてビタミンB6と呼びます。

代謝・神経・血液に関わる。

たんぱく質

アミノ酸の代謝を助ける。

神経

神経伝達物質をつくる反応に関与。

血液

ヘモグロビンをつくる反応に関与。

エネルギー

グリコーゲンの利用を助ける。

いろいろな食品に含まれています。

食品・状態	可食部の量・状態	B6量の例
くろまぐろ	赤身・生 80 g	0.68 mg
バナナ・生	90 g	0.34 mg
玄米めし	150 g	0.32 mg
じゃがいも・蒸し	100 g	0.22 mg

換算例です。標準の一食量ではありません。

推奨量は、ふだんの食事の目安。

成人の区分	男性	女性
18～64歳	1.5 mg/日	1.2 mg/日
65歳以上	1.4 mg/日	1.2 mg/日
妊娠中の付加量	—	+0.2 mg/日
授乳中の付加量	—	+0.3 mg/日

2025年版。妊娠・授乳の総推奨量は、それぞれ1.4／1.5 mg/日。

食事・病気・薬を一緒に確認。

食事

摂取不足や
栄養不良。

飲酒

アルコール依存に伴う
栄養の問題。

病気

腎機能の障害や
吸収不良。

薬

B6の働きや量に
影響する薬。

症状だけでは、欠乏と決められない。

- **口角炎・舌炎**

口の端や舌の炎症。

- **皮膚炎**

皮膚の変化が起こる。

- **貧血**

赤血球の異常に関わる。

- **重い欠乏**

混乱やけいれんが起こり得る。

新たなけいれん・意識の変化は、直ちに医療へ。

血中PLPは、背景と一緒に読む。

血中PLPは、B6の状態をみる代表的な指標です。

炎症、アルブミン、ALPなどの影響を受けます。

数値だけで欠乏や症状の原因を決めません。

確認する背景

症状・食事・サプリ・薬歴をそろえ、
採血条件と検査法も確認します。

必要であることと、追加の効果は別。

よくある期待

体に必要だから、
たくさん足せば
もっと健康になる。

根拠に沿った考え方

欠乏の補正と、
健康な人への追加は
分けて考える。

心血管病予防・認知機能改善への根拠は不十分。

不足と過剰を、両方考える。

しびれを「ビタミン不足」と決めつけない。

不足

摂取不足・病気・薬を調べる。

過剰

B6を含むサプリの総量を調べる。

過剰・長期摂取では、感覚を中心とする末梢神経障害が起こり得ます。

B6は、別の名前や製品にも入る。

製品の例	表示を確認	見落としやすい点
マルチビタミン	B6量	他の製品と重複
ビタミンB群	一日量	一粒量と混同
ミネラル製品	配合成分	B6入りの場合あり
B6の別名	ピリドキシン等	名称だけで除外しない

全製品の「一日量」を合算します。処方薬は自己判断で中止しません。

上限は、摂取の目標ではありません。

基準	成人の耐容上限量	注意する条件
日本：男性	50～60 mg/日	年齢で異なる
日本：女性	40～45 mg/日	年齢で異なる
EFSA：成人	12 mg/日	妊娠・授乳を含む
日本：妊娠・授乳	設定なし	安全保証ではない

日本は2025年版・ピリドキシン相当量。国・機関で評価法や根拠が異なります。

個人の安全を、数字だけで保証しない。

上限の違いは、根拠や不確実性の扱いに関係します。

従来想定より低用量のサプリでも、神経障害の報告があります。

全員に安全な最小閾値は確立していません。

数字の読み方

症例報告だけでは、
発症率は計算できません。

症状とサプリを、ひとつにつなぐ。

サプリ確認の整理です。自己診断用ではありません。

B6入りサプリを飲んでいる？

飲んでいる

中止して相談

飲んでいない

他の原因も調べる

製品名・一日量・期間を持参。処方薬は相談。

イソニアジドとB6。

イソニアジド

結核の治療などに用いる薬

**B6不足や末梢神経障害に関係します。
栄養不良などのリスクで、補充を検討します。**

医療者と確認すること

背景にあるリスクに応じて、
補充の必要性和量を決めます。

カルビドパ／レボドパ治療とB6。

B6欠乏と、関連するけいれんが報告されています。
米FDAは、投与前・投与中・症状出現時のB6評価と、
必要に応じた補充を推奨しました。

国内での実践

海外の安全性情報として共有し、
処方医と評価・対応を相談します。

つわり・B6依存性てんかん。

治療の用途を、健康目的へ広げない。

つわり

B6単独や薬との併用を検討。

依存性てんかん

特定の病態に、専門的に投与。

医療者の管理で投与します。

食事・成分・薬・症状を確認。

- ✓ 食事全体と、摂取不足の背景をみる
- ✓ 全製品のB6の一日量を合算する
- ✓ 処方薬と、補充の必要性を確認する
- ✓ しびれなどの症状があれば相談する

製品の写真や現物、薬の一覧を、受診時に持参すると役立ちます。

必要量を満たし、過剰を避ける。

食事

多様な食品から
必要量を満たす。

サプリ

効果の根拠と
総量を確認める。

医療

症状・検査・薬を
合わせて判断する。

不足と過剰を、どちらも忘れないことが大切です。

国内基準と、海外の安全性情報。

[1] 厚生労働省・文部科学省

食事摂取基準2025／食品成分データベース

[2] NIH ODS・EFSA

B6の解説／2023年の耐容上限量評価

[3] FDA・TGA

2026年の薬剤注意／サプリと神経障害

検査・薬剤・特定疾患を含む出典の詳細は、ブログ記事と概要欄にまとめます。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

食事を基本に、
量をかめる。

参考資料

ブログ記事と概要欄で
出典を確認。

次回の動画

どうぞ
お楽しみに。

個々の治療方針は、担当の先生と相談してください。