

ラパマイシンは、 老化を遅らせる薬？

— 医師が4つの物差しで採点 —

マウスの話と、人で確かめられたことは分ける。

一般向け / 脳神経内科医 今村久司

ラパマイシンは、老化を遅らせる薬なのでしょうか。

**「マウスで寿命が延びた」という話。
ヒトの研究では、どうでしょうか。**

医師の判定

まだ分からない。
人で老化を遅らせると確かめた研究は見つからず、
自己判断は危うい。

ことば・採点・研究・個人輸入の順に見ます。

1 ことばと4つの物差し
ラパマイシンは何点か。

2 マウスと人の研究
何を測ったか。

3 個人輸入と自己判断
分かることと、分からないこと。

ことばの説明①

ラパマイシン

別名 シロリムス

イースター島の土の菌が作る物質。
免疫をおさえる薬として使われ始めた。

mTOR(エムトア)

細胞の増殖や生存を調節するたんぱく質。
ラパマイシンは、この働きを止める。

ことばの説明②

ヒトの「試験」

ランダム化比較試験

参加者をくじ引きで2つ以上の組に分け、
結果を比べる研究。

ほかのことば

対照群：比べる相手の組。

偽薬：見た目は同じで、効く成分の入っていないもの。

ことばの説明③

代理の指標

だいのりのしひょう

寿命や病気そのものではなく、
その代わりに測る検査値や測定値。

利益相反

りえきそうはん

研究者や資金を出した会社が、
結果で利益を得る関係のこと。

ことばの説明④

適応外

てきおうがい

国が承認した病気・目的とは別の、
薬の使い方のこと。

個人輸入

こじんゆにゅう

外国の薬を、自分で使うために、
自分で取り寄せること。

AからDの4段階で見ます。

A：ヒトの試験で、病気や死亡が減った。

B：ヒトの試験で、検査値や体の機能が良くなった。

C：観察研究や小規模な試験まで。D：動物・細胞のみ。

ほかの3つ

②効果の大きさ ③安全性 ④費用・手間

根拠が強い順に並べ、同じなら②→③→④で比べます。

判定：まだ分からない

物差し	採点	理由
①根拠の強さ	C (Dに近い)	人では小規模な試験まで
②効果の大きさ	なし・不明	老化への効果は未測定
③安全性	中	免疫をおさえる薬
④費用・手間	高	承認された使い道ではない

採点はこのチャンネルの物差しによるものです。

寿命は延びたが、人の話ではない。

600日齢から与えたマウスで、寿命が延びた。

**別の研究では、調べた老化の指標は
ほとんど改善しなかった。**

ここが大切

マウスの結果は、人に当てはめられない。
採点では、動物だけの根拠はDです。

測ったのは、寿命ではなく検査値。

試験	内容	読み方
PEARL試験	健康な50～85歳・48週	内臓脂肪は変わらず
小さな試験	70～95歳・25人	効果は確認できず
まとめた解析	人の19件の研究	長期の影響は不明
犬の試験	計画のみ公表	結果は未確認

寿命や病気の発症を測った試験は、見つからず。

良い結果は、一部のグループだけ。

10 mgの女性で、除脂肪量と痛みが良くなった。

5 mgの人で、気持ちと健康状態が良くなった。

5 mgの群では、骨密度が下がる側の結果も。

ここが大切

著者に、試験を運営した会社の社員がいる。
調剤した薬は、別の集団で血中濃度が市販品の約3分の1。

「ラパマイシンで免疫が改善」ではない。

誤解

ラパマイシンで
高齢者の免疫が
改善した。

訂正

別の薬の、
ワクチン反応と
感染の報告。

その後の大きな試験では、確かな効果を示せず。

分かったことと、分からないこと。

- ✓ 重い害のおそれがある薬は、処方の確認なしに輸入不可。
- ✓ 代行業者を通じた購入のトラブルは購入者の責任。
- ✓ 確認できず：この案内に、ラパマイシンの名前は出てこない。
- ✓ 国内で流通するのは、品質などを確認された製品だけ。

「違法」とは言えません。分かるのは一般の注意まで。

飲む前に、3つのこと。

① 飲まずに見送る

老化目的なら、
見送る。
個人輸入も同じ。

② 主治医に相談

飲んでいる薬が
あるときは、
勝手に足さない。

③ 広告のは確かめる

何を測ったか。
寿命か検査値か。
どの薬の試験か。

飲んでいる人は医師へ。

判定は「まだ分からない」。

試験の結果

老化への効果は
確認できず。

言えないこと

効くとも、
安全とも。

やること

自己判断で
飲まない。

採点はこのチャンネルの物差しで、診療ガイドラインではありません。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

老化への効果は、
人では未確認。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

飲む前に、
主治医に相談を。

個々の治療は担当医と相談。