

日焼け止めで肌の老化は防げる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

「進みを遅らせる」と「消す」は分けて読む。

一般向け / 脳神経内科医 今村久司

日焼け止めで、肌の老化は防げるのでしょうか。

「毎日塗るとシワやシミを防げる」という話。

ヒトの研究では、どうでしょうか。

医師の判定

効く。

毎日塗れば、老化の進みを遅らせる。

ことば・採点・研究・やることの順に見ます。

1

ことばと4つの物差し

日焼け止めは何点か。

2

肌の老化と皮膚がんの研究

確かめられたことと、その限界。

3

塗り方と安全性

どれだけ、どう塗るか。

ことばの説明①

光老化

ひかりろうか

紫外線を中心とした日光による肌の老化。
シミ・シワ・たるみ・きめの粗さとして現れる。

紫外線A波・B波

地上に届く紫外線のほとんどはA波。
B波は量は少ないが、体への影響が大きい。

ことばの説明②

ヒトの「試験」

ランダム化比較試験

参加者をくじ引きで2つ以上の組に分け、
結果を比べる研究。

ほかのことば

対照群：比べる相手の組。

偽薬：見た目は同じで、効く成分の入っていないもの。

AからDの4段階で見ます。

A：ヒトの試験で、病気や死亡が減った。

B：ヒトの試験で、検査値や体の機能が良くなった。

C：観察研究や小規模な試験まで。D：動物・細胞のみ。

ほかの3つ

②効果の大きさ ③安全性 ④費用・手間

根拠が強い順に並べ、同じなら②→③→④で比べます。

判定：効く

物差し	採点	理由
①根拠の強さ	B	中心の試験は1本
②効果の大きさ	中	消す効果は未確認
③安全性	高	かぶれは起こりうる
④費用・手間	安	高い数値でなくてよい

採点はこのチャンネルの物差しによるものです。

毎日塗った人は、老化の進みが検出されず。

項目	内容	読み方
対象	55歳未満・903人	オーストラリアの住民
比べた組	毎日か、好きなときか	「塗らない」ではない
期間	4年半	1992～1996年
結果	進みが検出されず	進みは24%少ない

測ったのは、手の甲の皮膚のきめです。

「24%若く見える」ではない。

誤解

毎日塗ると、
肌が24%
若く見える。

訂正

きめの進み方を
統計の指標で
比べた差。

根拠の中心は、この1本の試験です。

減る方向だが、結果は割れている。

**同じ試験で、首から上・腕・手に毎日塗った組は、
有棘細胞がんの「できた数」が少なかった。
ただし「がんになった人の数」では差がなかった。**

ここが大切

メラノーマは少ない傾向。統計ではぎりぎり確かめられず。
基底・有棘細胞がんの解析でも、確かさは「低い」。

消えるとは言えない。

顔に1年塗った32人の研究で、シミなどが良くなった報告。
日本の高齢者14人では、よく使う人ほど悪化が少なかった。
どちらも、比べる組（対照群）がない研究。

ここが大切

日焼け止めは、これからの老化の進みを遅らせるもの。
今あるシワを消す効果は、確かめられていない。

SPFはB波、PAはA波を防ぐ力。

SPFは数字が大きいほど強く、上限は「50+」。

PAは「+」から「++++」の4段階。

SPFの値は、たっぷり塗って測った値。

ここが大切

実際に塗る量は、その半分以下のことが多い。
量が少ないと、防ぐ力は表示よりずっと下がる。

毎日、たっぷり、塗り直す。

① 1年を通して毎日

外に出る前に

鼻の頭や肩など、
念入りに塗る。

② たっぷり2回

顔は1円玉1個分

置いて伸ばし、
もう1回重ねる。

③ 塗り直す

2～3時間おき

汗やタオルで
落ちたらすぐに。

ふだんの生活なら、それほど高い数値でなくて十分です。

知っておきたい、4つのこと。

- ✓ かぶれ・刺激は珍しくない。多くは刺激によるもの。
- ✓ 肌が敏感なら、散乱剤（酸化亜鉛・酸化チタン）のもの。
- ✓ 吸収剤が血液に入る試験。著者：やめるべきという意味ではない。
- ✓ ビタミンD：SPF16前後の試験では減らなかった。

赤みやかゆみが続くときは、皮膚科に相談を。

判定は「効く」。

試験の結果

老化の進みが
遅くなる。

言えないこと

今あるシワが
消えること。

やること

毎日、たっぷり、
こまめに塗り直す。

採点はこのチャンネルの物差しで、診療ガイドラインではありません。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

進みは遅らせる、
消す効果は未確認。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

合わないときは、
皮膚科に相談を。

個々の治療は担当医と相談。