

レチノイドの塗り薬で、 老化は防げる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

「処方薬」と「化粧品」を分けて読む。

一般向け ／ 脳神経内科医

レチノイドの塗り薬は、老化を防ぐのか。

日光による肌の老化に、
処方の塗り薬を使う根拠は？

医師の判定

「効く（条件つき）」。

しわ・しみの見た目は、基剤より改善。

ことば・研究・注意と採点の順に見ます。

1 **ことば**
光老化と、レチノイド。

2 **研究の読み方**
しわ・しみと、濃さ。

3 **注意と採点**
副作用・妊娠・国内の事情。

ことばの説明①

光老化

日光の紫外線で早く進む肌の老化

年齢による老化とは別に、外から起こる。

予防の土台は、日光を避けること。

レチノイド

ビタミンAの仲間の成分。

塗り薬に、トレチノインやアダパレンなど。

ことばの説明②

基剤

きざい

有効成分を抜いた、
同じ見た目の塗り薬。

メタ解析

めたかいせき

同じ問いを調べた試験を
集めて、まとめて計算する。

しわ・しみの見た目は、改善がそろう。

研究	内容	結果
8件・1361人	2025年の解析	細かい・粗いしわが改善
204人・最長2年	毎日1回、顔全体に	しわ・しみ・くすみが改善
7件・739人	2022年のまとめ	どの試験も改善を報告
99人・48週	濃さ2種類を比較	効果の差はなし

対象は、トレチノインの塗り薬。

古く、米国中心の試験。

試験は1988～2006年の発表、ほとんど米国。

細かいしわの結果には、出版の偏りの疑い。

期間は最長2年。それより長い効果は分らない。

ここが大切

7件・739人のまとめでは、数字をまとめられず。

見た目の改善は、老化を止める証明ではない。

副作用は、濃さ・回数・塗り方で変わる。

濃さ2種類を比べた、48週間の試験。

濃い・薄い2種類で、効果の差はなし。

刺激（赤み・皮むけ）は、濃い方で多い。

ここが大切

濃ければ良い、ではない。

刺激は、少しずつ慣らす・保湿で和らぐとされる。

使い始めの刺激が多い。

基剤より副作用が多い。

乾燥・赤み・皮むけ・ひりひり感。

1131人の試験：皮膚がんは減らなかった。

ここが大切

高齢の退役軍人の試験で、死亡が多く早期中止。
著者は原因と考えず。別の観察研究で増加なし。

妊娠中・妊娠を考えている人は使わない。

妊娠初期の解析：先天異常の増加は検出されず。

ただし、使ってよい根拠ではない。

国内の添付文書：妊娠中は使わない。

ここが大切

強い紫外線を避ける。

妊娠が分かったら、すぐ医師へ。

しわ用トレチノインは、確認できていない。

トレチノインの国内の薬：白血病の治療のカプセルだけ。

アダパレン：にきびの治療薬（顔のにきびにだけ）。

海外：濃いアダパレンが、劣らない試験が1つ。

ここが大切

調べたのは、国内の医療用・一般用の医薬品。

化粧品・医薬部外品は、調べた範囲の外。

化粧品は「まだ分からない」。

日本人女性57人・26週：細かいしわが改善。

高齢者36人の腕でも、細かいしわが改善。

9件のまとめ：信頼できる根拠はほとんどない。

ここが大切

2017年、医薬部外品に「しわを改善」の効能。

根拠は、企業自身の9週間の試験。

判定は「効く(条件つき)」。

物差し	判定	理由
①根拠の強さ	B	見た目の改善まで
②効果の大きさ	中	しわ・しみが改善
③安全性	中	刺激・妊娠中は使わない
④費用・手間	未確認	公的な資料なし

このチャンネルの物差しで、診療ガイドラインではありません。

迷ったら、3つのこと。

① まず日焼け止め

予防の土台は

日光を避けることと
日焼け止め。

② 処方は皮膚科へ

使いたいときは

皮膚科の医師に
相談する。

③ 妊娠中は避ける

妊娠中・妊娠を

考えている人は
使わない。

見た目の改善は、若返りの証明ではない。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

処方塗り薬は、
効く（条件つき）。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

気になることは、
受診のときに医師へ。

治療方針は、担当の医師の判断によります。