

うつ病は遺伝で決まる？

— 予防と生活習慣 —

変えられることと、言い切れないこと。

一般向け / 脳神経内科医 今村久司

遺伝的な影響があっても、できることは？

家族にうつ病の人がいたら、
自分も必ず発症するのでしょうか。

今回の結論

遺伝だけで発症は決まりません。
生活と支援で変えられる部分があります。

遺伝・できること・相談を順に見ます。

1

遺伝と発症

家族歴だけで発症は決まらない。

2

生活でできること

運動・不眠治療・つながり・食事。

3

症状が出たら

困ったときは、早めに相談を。

必ず発症するわけではありません。

双子を調べた5件の研究では、
なりやすさの個人差の約37%を
遺伝の違いで説明すると推定。

37%の意味

あなたの発症確率ではありません。
環境や周囲の支えも関わります。

「関連あり」と「治療で減った」は違う。

身体活動

人々を追跡

よく動く人ほど、
うつ病・強い落ち込みが少ない。

分かること

運動の効果は試していない。

不眠の治療

治療を割り当てた試験

治療を受けた群で、
うつ病が少ない。

対象

60歳以上の不眠症。

研究の方法で、言えることが変わります。

うつ病や強い落ち込みが少ない傾向。

約19万人を追った15研究。

ほぼ運動しない人と比べ、

週の運動目安の半分ほどで18%少ない傾向。

ここが大切

運動の効果を試した研究ではありません。

18%はあなた個人の予防効果ではありません。

不眠を治療した群で、うつ病が少なかった。

60歳以上の不眠症291人を3年間追跡。

不眠の専門治療：12.2%

睡眠の説明のみ：25.9%

ここが大切

比べたのは「不眠の専門治療」です。
早起きなどの習慣だけの効果ではありません。

悩みを人に話すことが多い人ほど、

**その後、落ち込みなどが強い人が
少ない傾向でした。**

交流を増やして予防できるかは未確認。

忘れたくないこと

貧困や不平等も心の健康に関係。
一人の努力だけの問題にしない。

特定の食事法で、うつ病を防げる？

心臓病などのリスクが高い高齢者で、
うつ病を調べた3923人を比べると、
うつ病になる人の差は、はっきりせず。

実践するとき

食事は規則的に、お酒は控えめに。
食品やサブリ単独の効果は未確認。

全部を一度に始めなくて大丈夫。

- 1 体調に合わせて、少し歩く。
- 2 起きる時刻を大きく乱さない。
- ✓ 話せる相手や相談先を確かめる。
- ✓ 眠るための飲酒を見直す。

体調が悪いときは、セルフケアを課題にせず相談を。

生活習慣だけで抱え込まない。

- **落ち込みが続く**

気分がほぼ毎日つらい。

- **楽しめなくなる**

以前できたことに興味が出ない。

- **生活への支障**

仕事・家事・学業が難しい。

- **死にたい・自傷したい**

すぐに身近な人や相談窓口へ。

今にも自分を傷つけそうなら、救急へ。

遺伝だけで決まらず、生活習慣も万能ではない。

遺伝

遺伝は関わる。
運命ではない。

できること

少し動く。
不眠は相談。

相談

症状が出たら、
早めに相談する。

この食事研究だけでは予防効果は言えません。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

遺伝と生活の両方を、
根拠と限界で考える。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

症状や治療の相談は、
担当医と一緒に。

個々の治療は担当医と相談。