

筋トレで長生きできる？

— 医師が4つの物差しで採点 —

「筋力が伸びる」と「長生きする」は分けて読む。

一般向け / 脳神経内科医 今村久司

筋トレで、長生きできるのでしょうか。

**「筋トレで寿命がのびる」という話。
ヒトの研究では、どうでしょうか。**

医師の判定

効く。

筋力と体の動きは確か。長生きは関連まで。

採点・研究・やることの順に見ます。

1

4つの物差しと採点

筋トレは何点か。

2

長生きと筋力の研究

関連と、確かめられた効果。

3

やり方と始める前の注意

週に何分、どう始めるか。

AからDの4段階で見ます。

A：ヒトの試験で、病気や死亡が減った。

B：ヒトの試験で、検査値や体の機能が良くなった。

C：観察研究や小規模な試験まで。D：動物・細胞のみ。

ほかの3つ

②効果の大きさ ③安全性 ④費用・手間

根拠が強い順に並べ、同じなら②→③→④で比べます。

判定：効く

物差し	採点	理由
①根拠の強さ	B	筋力・体の機能が改善
②効果の大きさ	中	筋力は大・寿命は関連
③安全性	高	重い害はまれ
④費用・手間	安	自分の体重でできる

採点はこのチャンネルの物差しによるものです。

筋トレをする人は、死亡リスクが低い。

16本の観察研究をまとめた解析。

死亡・心臓や血管の病気・がん・糖尿病が
10～17%低いという関連。

ここが大切

両方する人は、どちらもしない人より死亡が40%低い関連。
どれも観察研究。試験で確かめた結果ではない。

目安は、週30～60分。

16本の観察研究をまとめた解析（2022年）。

死亡などのリスクが最も低かったのは、
週30～60分あたり。死亡は週40分で最も低い。

ここが大切

週2～3日なら、1回10～30分ほど。
観察研究の関連で、試験で確かめた量ではない。

多いほど長生き、ではない。

誤解

長くやるほど
長生きに
つながる。

訂正

週130～140分を
超えると、上乘せの
関連は見られない。

害があるとまでは言えません。推定の幅が広いからです。

筋力と体の動きは、良くなる。

見たもの	結果	意味
筋力	大きく改善	はっきり大きな効果
立ち上がり	中～大の改善	日常の動作に直結
歩く速さ	小さな改善	筋力ほどではない
対象	高齢者・121試験	多くは週2～3回

この解析が見たのは、筋力と体の動きです。

「関連」と「効果」を分ける。

長生きの話は、観察研究から。
著者自身、研究数が少なく自己申告と認め、
根拠の確かさは「非常に低い」と評価。

ここが大切

試験で確かめたのは、筋力と体の動き。
長生きとの関係は、有望な関連の段階。

週2～3日、全身を、少しずつ。

1 週2～3日

休む日もとる

WHOも週2日以上を
すすめている。

2 全身の大きな筋肉

自分の体重で

スクワットや
腕立て伏せなど。

3 少しずつ上げる

回数や重さで

楽になったら、
少し負荷を足す。

ウォーキングなどの有酸素運動と組み合わせます。

重い害はまれ。ただし確かめたいこと。

- 1 血圧がかなり高い人は、先に薬で整える。
- 2 糖尿病の合併症がある人は、医師に確認。
- 3 膝や腰が痛む人は、医師に相談して軽く始める。
- 4 関節の痛みや筋肉痛は、起こりうる。

持病で治療中の方は、担当の医師に相談してから。

判定は「効く」。

確かなこと

筋力と体の
動きが伸びる。

関連まで

長生き・病気の
リスク低下。

やること

週2～3日、
合計30～60分。

採点はこのチャンネルの物差しで、診療ガイドラインではありません。

ご視聴ありがとうございました。

チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。

今回の振り返り

筋力は確か、
長生きは関連まで。

参考資料

詳しい出典と限界は、
記事の参考文献へ。

ご相談

持病がある人は、
始める前に担当医と。

個々の治療は担当医と相談。