

Protocolos Urgencias

Anafilaxia

Altamente probable si se cumple 1 de los dos criterios clínicos

1

Inicio agudo de la enfermedad (minutos/horas) que involucra la piel, mucosas o ambos (urticaria generalizada, prurito, flushing (sofoco), edema de labios, úvula o lengua), junto con al menos uno de los siguientes



Y al menos uno de los siguientes



A: Via aérea/Ventilación (compromiso respiratorio): Disnea, broncoespasmo, estridor, hipoxemia



B: Circulación (hipotensión): Síntomas de disfunción orgánica (hipotonía, síncope, incontinencia)



C: Otros (Gastrointestinal severo): Dolor abdominal severo, vómitos repetitivos, especialmente con alérgenos NO alimentarios

2

Aparición aguda de hipotensión o broncoespasmo, o afectación laríngea, tras exposición a un alérgeno conocido o probables alérgenos (minutos/horas) incluso en la ausencia de afectación cutánea.

Lactantes y niños:
Hipotensión (específico para edad) o disminución del 30% de la TAS



Adultos:
TAS < 90 mmHg o disminución del 30% de la TA basal



Ó




Broncoespasmo



Compromiso laríngeo

Anafilaxia

Algoritmo de actuación en paciente consciente



Anafilaxia

Algoritmo de actuación en paciente inconsciente

A

Adrenalina

1 mcg/kg push dose (bolus) o dosis de PCR

M

Relajante NeuroMUSCULAR

El primer intento debe ser el mejor intento

A

Via Aérea

**Tubo endotraqueal grueso con balon para presiones altas
Via aérea quirúrgica si 1er intento de IOT falla**

X

Ventilación Xtrema

Xtra broncodilatadores

Xtra vasopresores

Considera el NeumotoraX


4

4 minutos

Para lesión cerebral hipóxica

Anafilaxia

Algoritmo de actuación en paciente inconsciente



Anafilaxia

Como administrar autoinyectores de adrenalina

Altellus



- Agarre la unidad adultos con la mano dominante, con el pulgar al lado de la tapa azul (Figura A).
- Con la otra mano quite la tapa azul de seguridad
- El extremo naranja debe apuntar hacia la parte externa del muslo.
- Clave la unidad ángulo recto como se muestra en la Figura B (escuche el clic).
- Manténgalo firmemente contra el muslo durante 10 segundos. La inyección ahora es completa y la ventana del autoinyector se oscurece




Prescripción

Altellus 150 mcg: Niños entre 7-20 kg

Altellus 300 mcg: Niños y adultos >20 kg

Jext



- Agarre el inyector con la mano dominante con el pulgar al lado de la tapa amarilla.
- Con la otra mano quite la tapa amarilla.
- Coloque el extremo negro del inyector en la parte externa del muslo, sujetando el inyector en ángulo recto (90° aprox.) al muslo.
- Presione el extremo negro del inyector enérgicamente en la parte externa del muslo hasta que se oiga un "clic", después manténgalo presionado durante 10 segundos y luego retírelo.

Prescripción

Jext 150 mcg: Niños entre 7-20 kg

Jext300 mcg: Niños y adultos >20 kg

Signos de alerta para una reacción anafiláctica

Reacción alérgica Leve - Moderada

Sintomas:

- Inflamación de labios, ojos, cara.
- Ronchas, picor
- Hormigueo boca
- Dolor abdomen, vomitos

Que hacer:

- Quedarse con persona, pedir ayuda
- Ubicar autoinyector adrenalina.
- Llamar contacto de emergencia .
- Retirar alérgeno.

Anafilaxia (Reacción alérgica grave)

Sintomas:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Respiración dificultosa | Dificultad para hablar |
| • Tos persistente | Cambio de voz |
| • Lengua hinchada | Palidez |
| • Pitidos | Perdida de consciencia |

QUE HACER:

• Tumbar al paciente:

- Si inconsciente o embarazada en posición lateral de seguridad.
- Si respiración dificultosa sentado con piernas estiradas.
- Niños pequeños estirados, no elevados.



• Administrar autoinyector de adrenalina

- Llamar al 061.
- Llamar contacto de emergencia.
- Administrar 2da dosis de adrenalina si en 5 minutos no mejora.
- En caso de dudas administra adrenalina.

• Si la persona no responde o respira anormal

- COMIENZA RCP.

Si una persona asmática conocida presenta exposición a alérgeno y reacción, siempre administra autoinyector de adrenalina primero y luego se administran los puff del broncodilatador