

Активне ведення третього періоду пологів

Ви – лікар акушер-гінеколог пологового відділення. Вагітна 32 років, поступила до пологового будинку з доношеною вагітністю 40 тижнів і пологової діяльністю. Пологи другі, перші закінчилися народженням живою доношеною дитиною, без ускладнень. Через 6 годин від моменту надходження, сталися пологи. Народила живу доношену дівчинку масою 3600, зріст 52 см. Роділля перебуває у третьому періоді пологів. Для завершення третього періоду, запропоноване активне ведення. Ви приступаєте до виконання активного ведення третього періоду пологів.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера-гінеколога пологового відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.
6	Модель плаценти з пуповиною	1 шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Затискач для пуповини Кохера	1шт.
2	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
3	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички	2 шт
2	Розчин для в/м введення «Окситоцин»-1амп /5од	2шт
3	Шприц -10 куб	1шт
4	Памперсна пелюшка	1шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор вагітної жінки	1 шт
2	Модель - плаценти з пуповиною.	1 шт



Затискач Кохера для пуповини



**11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів
(ситуаційних завдань)**

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки), встановлення контакту з пацієнткою (привітатись,	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.</i>

	представитися, позначити свою роль).	
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення активного ведення третього періоду пологів (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Набрати в шприц 10 ОД окситоцину. Ввести в ділянку стегна в/м протягом першої хвилини після народження дитини. Змінити рукавиці.	<i>Виконати</i>
2.2	Перетиснути пуповину затискачем ближче до промежини. Перетиснуту пуповину і кінці затискача тримати однією рукою. Іншу руку розташувати безпосередньо на надлобкову ділянку та утримувати матку, відводячи її від лона під час контрольованого потягування за пуповину для попередження вивороту матки. Пуповину тримати у натягнутому стані та очікувати сильні скорочення матки;	<i>Виконати</i>
2.3	При скороченні матки та подовженні пуповини, дуже обережно потягнути на себе і вниз пуповину для народження посліду, одночасно іншою рукою відвести матку у напрямку, протилежному потягу за пуповину.	<i>Виконати</i>
2.4	Тримати плаценту обома руками і обережно повертати, доки не народяться плодові оболонки. Послід	<i>Виконати</i>

	розкласти на памперсну пелюшку	
2.5	Після народження посліду провести оцінку тону матки та провести масаж матки через передню черевну стінку до появи скорочень.	<i>Виконати – Сказати «Матка скоротилася, щільна»</i>
2.6	Оглянути послід, щоб упевнитися в його цілісності, для чого підняти послід за пуповину на затискачу та визначити наявність цілісності оболонок. Послід розкласти на памперсну пелюшку материнською поверхнею вгору, оцінити цілісність плаценти. Зняти рукавиці.	<i>Виконати – Сказати «Плацента та оболонки цілі»</i>
2.7	Зняти рукавиці.	<i>Виконати</i>
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	<i>Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо вважати – добре)</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Вагітність 40 тижнів, III період пологів. Активне ведення третього періоду пологів.	<i>Сказати</i>	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за породіллею у післяпологовій палаті (мінімум 2 години після пологів).	<i>Сказати</i>
4.2	Спостереження за сечовипусканням.	<i>Сказати</i>
4.3	Консультації з питань грудного вигодовування та післяпологового відновлення.	<i>Сказати</i>