

Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

Ви – лікар акушер-гінеколог прийомного відділення. Бригадою швидкої допомоги була доставлена жінка 28 років, зі скаргами на біль в нижньому відділі живота, незначні кров'янисті виділення з піхви. Із анамнезу: затримка менструації три тижні. Тест на визначення хоріонічного гонадотропіну сумнівний. При бімануальному дослідженні – матка та додатки не пальпуються через напруження передньої черевної стінки. Заднє склепіння нависає та болюче при доторканні. Для подальшого визначення діагнозу та тактики лікування треба провести пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви. Ви приступаєте до виконання пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера-гінеколога приймального відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор жінки	1 шт.
6	Модель матки з шийкою (норма) та додатками	1 шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Корнцанг (зажим Гросс-Майера) прямий	1 шт.
2	Кульові щипці	1 шт.
4	Шприц з пункційною голкою 10- 12 см	1 шт.
5	Ложкоподібне дзеркало за (Сімса)	1 шт.
6	Пінцет анатомічний	1 шт.
7	Підйомник (Отто)	1 шт.
8	Антисептик для обробки статевих органів 5 мл.	1 шт.
9	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
10	Контейнер для зборі відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)


№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	1шт
2	Ватні кульки	2шт.
3	Пробірка стерильна	1шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор жінки	1 шт.
2	Пульсові щипці	1 шт.



Дзеркало Симпса



Корцанг



Підйомник
Отта



Пульсові щипці

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

(ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.	
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки), встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.

	представитися, позначити	
	свою роль).	
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви? (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Стерильною ватною кулькою з розчином антисептика, захопленою пінцетом, послідовно обробити лобок, великі статеві губи, внутрішні поверхні стегон, сідниць, промежину і задній прохід	<i>Виконати</i>
2.2	Під загальним знеболюванням, розвести великим та вказівним пальцями лівий руки статеві губи, у піхву ввести ложкоподібне дзеркало і розташувати його на задній стінці піхви, злегка натиснувши на промежину (дзеркало передати асистенту);	<i>Виконати</i>
2.3	Паралельно ложкоподібному дзеркалу ввести підйомник та підійняти передню стінку піхви (передати асистенту); за допомогою корнцангу з ватною кулькою обробити шийку матки та заднє склепіння піхви антисептиком;	<i>Виконати</i>
2.4	Кульовими щипцями зафіксувати шийку матки за задню губу і підійняти догори; прибирати підйомник	<i>Виконати</i>

2.5	Ложкоподібним дзеркалом	<i>Виконати</i>
-----	-------------------------	-----------------

	розтягнути заднє склепіння; по центру розтягнутого склепіння піхви ввести голку зі шприцом в черевну порожнину на 1,5-2 см і відсмоктати рідину.	
2.6	Витягнути голку, зняти кульові щипці, обробити шийку матки та заднє склепіння антисептиком, прибрати ложкоподібне дзеркало.	Виконати
2.7	Рідину яку отримав додати до пробірки та оцінити результат (кров яка не згорнулася, рідина солом'яного кольору, гнойоподібна рідина, або рідина не отримана) та об'єм в мл. Відпрацьовані медичні вироби та рукавички додати до контейнеру дезінфекції та провести гігієнічну антисептику шкіри рук.	Виконати – Сказати «кров яка не згорнулася, 20 мл»
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе почуваете?» (Будемо вважати – добре)
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Позаматкова вагітність що перервалась.	Сказати	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Екстрена лапароскопія	Сказати
4.2	Післяопераційне ведення	Сказати
4.3	Інформування пацієнтки щодо здоров'я репродуктивної системи.	Сказати