

Прийоми зовнішнього акушерського дослідження (прийоми Леопольда).

І позиція передній вид, головне передлежання)

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася вагітна жінка 25 років. Скарг немає, ворухіння плода відчуває добре. З анамнезу: перша вагітність 36 тижнів. Серцебиття плода – зліва, нижче пупка. Ви приступаєте до виконання прийомів зовнішнього акушерського дослідження (прийоми Леопольда).

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера- гінеколога приймального відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор вагітної	1 шт.
6	Манекен-симулятор плоду	1 шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
2	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	2 шт

- симуляційне обладнання


№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор вагітної жінки з можливістю проведення зовнішнього акушерського обстеження (прийоми Леопольда), анатомічні орієнтири, що пальпуються.	1 шт
2	Манекен-симулятор плоду реалістичних розмірів	1 шт



Для виконання прийомів зовнішнього акушерського дослідження (прийоми Леопольда) потрібно використовувати:



Потрібно повести зовнішнє акушерське дослідження (прийоми Леопольда).



11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів (ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки), встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, представитися, позначити свою роль).	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.</i>
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	Сказати <i>Ви даєте свою згоду на проведення зовнішнього</i>

		<i>акушерського дослідження (прийоми Леопольда) (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Коректно розташуватися до манекена (праворуч та обличчям до манекена).	<i>Виконати</i>
2.2	Коректне виконання I прийому (розташувати долонні поверхні рук на дні матки, визначити та назвати розташування дна матки по відношенню до мечоподібного відростка, велику частину плода, що знаходиться в дні матки)	<i>Виконати Сказати «Дно матки розташовано під мечоподібним відростком, у дні матки сидниці</i>
2.3	Коректне виконання II прийому (перемісти руки з дна матки на бічні поверхні живота, пропальпувати та назвати, де розташована спинка плода)	<i>Виконати Сказати «спинка плоду – ліворуч до переду, дрібні частини плоду праворуч, перша позиція передній вид»</i>
2.4	Коректне виконання III прийому, однією рукою охопити передлежачу частину плода. Визначити та назвати частину плода що передлежить.	<i>Виконати – Сказати «Передлежить щільна балотуюча частина - голівка плода»</i>
2.5	Коректно змінює своє розташовування до манекена (стає обличчям до нижніх кінцівок манекена).	<i>Виконати</i>
2.6	Коректне виконання IV прийому обидві руки розташовує долонями вниз на бічні відділи нижнього сегмента матки і пальпує доступні частини плода, намагаючись проникнути кінчиками пальців між	<i>Виконати – Сказати «Голівка плоду над входом в малий таз»</i>

	передлежачою частиною і бічними відділами входу в малий таз.	
2.7	Назвати положення, позицію, вид та передлежання плоду. Зняти рукавиці.	Виконати – Сказати «Перша позиція, передній вид, головне передлежання»
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо вважати – добре)
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Вагітність 36 тижнів, Перша позиція, передній вид, головне передлежання	Сказати	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за вагітною	Сказати
4.2	Визначити метод родорозв'язання (природні пологи/кесарів розтин).	Сказати
4.3	Консультавання з питань грудного вигодовування та післяпологового відновлення.	Сказати

Активне ведення третього періоду пологів

Ви – лікар акушер-гінеколог пологового відділення. Вагітна 32 років, поступила до пологового будинку з доношеною вагітністю 40 тижнів і пологової діяльністю. Пологи другі, перші закінчилися народженням живою доношеною дитиною, без ускладнень. Через 6 годин від моменту надходження, сталися пологи. Народила живу доношену дівчинку масою 3600, зріст 52 см. Роділля перебуває у третьому періоді пологів. Для завершення третього періоду, запропоноване активне ведення. Ви приступаєте до виконання активного ведення третього періоду пологів.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера-гінеколога пологового відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.
6	Модель плаценти з пуповиною	1 шт.
7	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)


№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Затискач для пуповини Кохера	1 шт.
2	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
3	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички	2 шт
2	Розчин для в/м введення «Окситоцин»-1амп /5од	2шт
3	Шприц -10 куб	1шт
4	Памперсна пелюшка	1шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор вагітної жінки	1 шт
2	Модель - плаценти з пуповиною.	1 шт



Затискач Кохера для пуповини



11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

(ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		

1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки), встановлення контакту з пацієнткою (привітатись,	<i>Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.</i>
	представитися, позначити свою роль).	
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення активного ведення третього періоду пологів (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Набрати в шприц 10 ОД окситоцину. Ввести в ділянку стегна в/м протягом першої хвилини після народження дитини. Змінити рукавиці.	<i>Виконати</i>
2.2	Перетиснути пуповину затискачем ближче до промежини. Перетиснуту пуповину і кінці затискача тримати однією рукою. Іншу руку розташувати безпосередньо на надлобкову ділянку та утримувати матку, відводячи її від лона під час контрольованого потягування за пуповину для попередження вивороту матки. Пуповину тримати у натягнутому стані та очікувати сильні скорочення матки;	<i>Виконати</i>
2.3	При скороченні матки та подовженні пуповини, дуже обережно потягнути на себе і вниз пуповину для народження посліду, одночасно іншою рукою відвести матку у напрямку, протилежному потягу за пуповину.	<i>Виконати</i>

2.4	Тримати плаценту обома руками і обережно повертати, доки не народяться плодів оболонки. Послід	<i>Виконати</i>
	розкласти на памперсну пелюшку	
2.5	Після народження посліду провести оцінку тонуусу матки та провести масаж матки через передню черевну стінку до появи скорочень.	<i>Виконати – Сказати «Матка скоротилася, щільна»</i>
2.6	Оглянути послід, щоб упевнитися в його цілісності, для чого підняти послід за пуповину на затискачу та визначити наявність цілісності оболонок. Послід розкласти на памперсну пелюшку материнською поверхнею вгору, оцінити цілісність плаценти. Зняти рукавиці.	<i>Виконати – Сказати «Плацента та оболонки цілі»</i>
2.7	Зняти рукавиці.	<i>Виконати</i>
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	<i>Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо вважати – добре)</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Вагітність 40 тижнів, III період пологів. Активне ведення третього періоду пологів.	<i>Сказати</i>	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за породіллею у післяпологовій палаті (мінімум 2 години після пологів).	<i>Сказати</i>
4.2	Спостереження за сечовипусканням.	<i>Сказати</i>

4.3	Консультування з питань грудного вигодовування та післяпологового відновлення.	<i>Сказати</i>
-----	--	----------------

Вимірювання розмірів нормального тазу та визначення справжньої

кон'югати

Ви лікар акушер - гінеколог. До пологового відділення поступила вагітна в першому періоді пологів, термін вагітності 40 тижнів, головне предлежання. Висота стояння дна матки 36см, окружність живота – 100см. Серцебиття плоду – 146 ударів за хвилину, зліва нижче пупка. Для визначення плану ведення пологів, треба провести пельвіометрію. Ви приступаєте до вимірювання розмірів таза та визначення справжньої кон'югати.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера- гінеколога приймального відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.
6	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Тазомір «Мартина»	1 шт
2	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
3	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.


- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	2 шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор з можливістю проведення вимірювань розмірів таза та визначення справжньої кон'югати, анатомічні орієнтири кісткового таза, що пальпуються. (кістковий таз)	1 шт

	Медичні рукавички
	Тазомір



11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

(ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки),	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.

	встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, представитись, позначити свою роль).	
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення вимірювання розмірів таза та визначення справжньої кон'югати (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Розташувати гудзики тазоміра на передньо-верхні ості клубових кісток та вказати нормативний показник <i>Distantia spinarum</i>	<i>Виконати Сказати Distantia spinarum 25-26 см;</i>
2.2	Перевести гудзики тазоміра на найбільш віддалені місця гребнів клубових кісток та вказати нормативний показник <i>Distantia cristarum</i>	<i>Виконати Сказати Distantia cristarum = 28-29 см;</i>
2.3	Встановити гудзики тазоміра на великі вертіла стегнових кісток та вказати нормативний показник <i>Distantia trochanterica</i>	<i>Виконати Сказати «Distantia trochanterica = 31-32 см»</i>
2.4	Укласти пацієнтку на лівий бік із зігнутою у колінному та тазостегновому суглобі лівою ногою;	<i>Виконати –</i>
2.5	Виміряти відстань від верхнього краю симфізу до надкрижової ямки та вказати нормативний показник <i>Conjugata externa</i>	<i>Виконати – Сказати «Conjugata externa = 20см»</i>
2.6	Вирахувати справжню кон'юганту <i>Conjugata vera</i>	<i>Виконати – Сказати «Conjugata vera = 20-9=11 см»</i>
2.7	Зняти рукавиці.	<i>Виконати</i>
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	<i>Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо</i>

		<i>вважати – добре)</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Вагітність 40 тижнів, Перша позиція, передній вид, головне передлежання. Перший період пологів.	<i>Сказати</i>	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за вагітною	<i>Сказати</i>
4.2	Визначити метод родорозв'язання (природні пологи/кесарів розтин).	<i>Сказати</i>
4.3	Консультування з питань грудного вигодовування та післяпологового відновлення.	<i>Сказати</i>