

Вимірювання розмірів нормального тазу та визначення справжньої кон'югати

Ви лікар акушер - гінеколог. До пологового відділення поступила вагітна в першому періоді пологів, термін вагітності 40 тижнів, головне предлежання. Висота стояння дна матки 36см, окружність живота – 100см. Серцебиття плоду – 146 ударів за хвилину, зліва нижче пупка. Для визначення плану ведення пологів, треба провести пельвіометрію. Ви приступаєте до вимірювання розмірів таза та визначення справжньої кон'югати.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря акушера- гінеколога приймального відділення, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.
6	Медична кушетка (стіл)	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Тазомір «Мартина»	1 шт
2	Антисептик для обробки рук 5 мл.	1 шт.
3	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.


- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Гумові рукавички різних розмірів	2 шт

- симуляційне обладнання

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу
1	Манекен-симулятор з можливістю проведення вимірювань розмірів таза та визначення справжньої кон'югати, анатомічні орієнтири кісткового таза, що пальпуються. (кістковий таз)	1 шт

	Медичні рукавички
	Тазомір



11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

(ситуаційних завдань)

Алгоритм виконання	Форма представлення	
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнтки),	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог.

	встановлення контакту з пацієнткою (привітатись, представитися, позначити свою роль).	
1.2	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції.	<i>Сказати Ви даєте свою згоду на проведення вимірювання розмірів таза та визначення справжньої кон'югати (Будемо вважати що згода отримана)</i>
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	<i>Сказати Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2. Виконання навички		
2.1	Розташувати гудзики тазоміра на передньо-верхні ості клубових кісток та вказати нормативний показник Distantia spinarum	<i>Виконати Сказати Distantia spinarum 25-26 см;</i>
2.2	Перевести гудзики тазоміра на найбільш віддалені місця гребнів клубових кісток та вказати нормативний показник Distantia cristarum	<i>Виконати Сказати Distantia cristarum = 28-29 см;</i>
2.3	Встановити гудзики тазоміра на великі вертіла стегнових кісток та вказати нормативний показник Distantia trochanterica	<i>Виконати Сказати «Distantia trochanterica = 31-32 см»</i>
2.4	Укласти пацієнтку на лівий бік із зігнутою у колінному та тазостегновому суглобі лівою ногою;	<i>Виконати –</i>
2.5	Виміряти відстань від верхнього краю симфізу до надкрижової ямки та вказати нормативний показник Conjugata externa	<i>Виконати – Сказати «Conjugata externa = 20см»</i>
2.6	Вирахувати справжню кон'юганту Conjugata vera	<i>Виконати – Сказати «Conjugata vera = 20-9=11 см»</i>
2.7	Зняти рукавиці.	<i>Виконати</i>
2.8	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	<i>Сказати « Як Ви себе відчуваєте?» (Будемо</i>

		<i>вважати – добре)</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз).		
Вагітність 40 тижнів, Перша позиція, передній вид, головне передлежання. Перший період пологів.	<i>Сказати</i>	
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за вагітною	<i>Сказати</i>
4.2	Визначити метод родорозв'язання (природні пологи/кесарів розтин).	<i>Сказати</i>
4.3	Консультування з питань грудного вигодовування та післяпологового відновлення.	<i>Сказати</i>