

Визначення рівня глікемії, гіпоглікемія»

Сценарій

Ви – лікар з медицини невідкладних станів, в складі бригади екстреної медичної допомоги прибули на виклик. Відомо, що пацієнт страждає на цукровий діабет 2 типу, постійно приймає глібенкламід.

Скарги: на загальну слабкість, запаморочення, тремор рук.

Анамнез захворювання: Пацієнт близько 58 років страждає на цукровий діабет 2 типу.

Анамнез життя: Туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості, у свідомості. Сидить на лавочці. Шкіра блідо-рожева, волога. Ріст 175см, вага 73 кг. Периферичний набряків немає. Екскурсія грудної клітки симетрична. ЧДР 20/хв, Аускультативно над легенями жорстке дихання, проводиться у всі відділи. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=PS=90/хв., АТ - 110/60 мм рт.ст., Живіт м'який, доступний пальпації у всіх відділах, безболісний, приймає участь у акті дихання. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щьоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальника активна. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Ви повинні встановити рівень цукру в крові за допомогою глюкометра.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря з медицини невідкладних станів центру екстреної медичної допомоги, обов'язково повинно включати:

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Подушка	1 шт
4	Медична кушетка	1 шт
5	Манекен-симулятор	1 шт.
6	Глюкометр	1 шт.
7	Хірургічний лоток	2 шт.
8	Контейнер для утилізації	1 шт.

- перелік меблів та іншого обладнання

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кіл-ть на 1	Кількість на 10
-------	------------------------------	-------------	-----------------

		спробу	спроб
1	Марлеві кульки для обробки шкіри	2 шт	20 шт
2	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
3	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
4	Лейкопластир	1 шт	10 шт
5	Захисна медична маска	1 шт	10 шт
6	Ланцет	1 шт	10 шт
7	Тест-смужки	1 шт	10 шт



ГЛЮКОМЕТР

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом, встановлення контакту.	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i>
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати <i>Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)</i> Сказати «Що з Вами трапилось» <i>Очікуваний відповідь « раптово стало зле —коли відчув запаморочення, пітливість, слабкість, тремтіння в руках, страждає на цукровий діабет 2 типу, приймаю метформін 1000 мг на добу. Після погіршення стану було викликано бригаду</i>

		<i>ЕНМ»</i>
2. Виконання навички		
2.1	Підготувати глюкометр, тест-смужку, ланцет, антисептик, серветку	Сказати/ Виконати
2.2	Обробити палець антисептиком, зробити прокол шкіри стерильним ланцетом	Сказати/Виконати
2.3	Витерти першу краплю, взяти другу на тест-смужку	Сказати/Виконати
2.4	Зачекати результат, озвучити: глюкоза 2,6 ммоль/л – гіпоглікемія	Сказати/ Виконати
2.5	Оцінити стан пацієнта, при необхідності – надати допомогу (вуглеводи)	Сказати/Виконати
2.6	Взяти в руки бланк клінічного аналізу крові, визначити результат (гіпохромна анемія)	Сказати/Виконати
2.7	Зняти рукавиці	Сказати/Виконати
2.8	Уточнити самопочуття пацієнта після маніпуляції	Сказати/Виконати
3. Встановити попередній діагноз(визначити стан пацієнта)		
3.1	Гіпоглікемія на тлі цукрового діабету, порушення прийому препаратів	<i>Сказати/ Виконати</i> <i>Сказати: «Сказати :« Гіпоглікемічний стан на фоні цукрового діабету 2 типу»</i> <i>Під час проведення огляду постраждалий став млявим»</i>
4.Визначення тактики ведення та лікування. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
4.1	Перший крок: Рекомендується перша лінія лікування - При збереженій свідомості або при одночасному жувальному і кашльовому рефлексам можливе швидке введення через рот вуглеводів, що легко засвоюються. При тяжкій гіпоглікемії зі втратою свідомості з або без судом (зокрема, з блюванням) встановити внутрішньовенний катетер та ввести глюкагон. У разі відсутності глюкагону, при порушенні свідомості показано в/в введення розчину 40% глюкози 0,2 мл/кг	<i>Сказати : «Допомогаємо пацієнту випити солодкий напій »</i> <i>Виконати: «Після обробки шкіри розчоном антисептика встановлюю периферичний катетер, починаю введення розчину глюкози»</i>

	до виходу з коми, припинення судом.	
--	-------------------------------------	--

Сценарій