

«Постановка ларингеальної маски»

Ви – лікар з медицини невідкладних станів, бригада викликана на місце події перехожими, пацієнт раптово втратив свідомість, на час прибуття у стані без свідомості з порушенням м'язового тону та з частковим порушенням дихання, відчутні дистанційні хрипи, верхні дихальні шляхи перекриті у зв'язку з западінням язика, прохідності дихальних шляхів порушена. Пацієнта треба негайно транспортувати до клініки, реанімаційного відділення. З метою довгострокового надійного забезпечення прохідності дихальних шляхів треба встановити пацієнту ларингеальну маску відповідного розміру.

Об'єктивно: постраждалий лежить на спині, без свідомості. Зіниці реагують на світло. На больові подразники-рухи в кінцівках. Дихання частота дихання зменшена, 12-11 на хвилину, дихання поверхневе, дистанційні хрипи. Тонус м'язів знижений, відмічається западіння язика. Шкіра має ціанотичний відтінок. Сатурація кисню 88-86%.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Ларингеальні маски з коннектором	3 шт.
2	Шприц для роздування манжети ларингеальної маски	1 шт.
3	Гель-анестетик для змащення манжети	1 шт.
4	Фонендоскоп	1 шт.
5	Пластир (або смужки) для фіксації маски	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
5	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар

6	Гель для змащення манжети маски (силіконовий)	5гр.	50гр.
7	Захисна медична маска	1 шт	10 шт




ЛАРИНГЕАЛЬНА МАСКА

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

№п/п	Алгоритм виконання	Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з оточуючими, свідками, родичами	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i> Виконати/Сказати
1.2	Переконайтеся у власній безпеці. Коректне розташування пацієнт-лікар, (позначити свою роль) Обробка рук на гігієнічному рівні, одягти захисні гумові рукавички. Переконайтеся, що пацієнт знаходиться без свідомості та наявна необхідність забезпечення прохідності дихальних шляхів	Виконати/Сказати
2. Виконання навички		
2.1	Оберіть належну за розміром(відповідно до вказаної ваги пацієнта) ларингеальну маску.	Сказати/ Виконати
2.2	Здійсніть обробку тильної поверхні манжети обраної маски гелем з анестетиком.	Сказати/ Виконати
2.3	Коректна позиція пацієнта (на спині, голова розташована чітко у поздовжній осі тіла, потилиця злегка припіднята і покладена на підкладку (плоску подушку), голову трохи запрокинути назад (нижню щелепою підняти доверху).	Сказати/ Виконати
2.4	Ревізія та підготовка порожнини рота (переконайтеся у відсутності у ротовій порожнині пацієнта сторонніх тіл(наприклад зубних протезів, якщо вони є - видалити), відкрийте рот пацієнта пальцями однієї руки: схрещені	Сказати/ Виконати

	великий і вказівний пальці встановіть на зуби (у беззубого пацієнта — на ясна) верхньої і нижньої щелепи, далі розкрийте рот).	
2.5	Ларингеальну маску тримайте в іншій руці, як перо, у місці з'єднання маски з трубкою.	Сказати/ Виконати
2.6	Коректне встановлення ларингеальної маски (Введіть маску до рота пацієнта і, опираючи її на тверде піднебіння, проведіть вниз до глотки, направляючи вказівним пальцем. Проведення маски по твердому піднебінню запобігає згинанню її кінчика, а також певною мірою запобігає зачепленню за язик. Проводьте маску вглиб глотки, доки не відчуєте опір. Належним чином введена маска має повністю знаходитися за язиком).	Сказати/ Виконати
2.7	Заповніть манжету маски відповідною кількістю повітря (ця інформація зазвичай надрукована на ларингеальній масці). Переконайтесь у правильному положенні ларингеальної маски, аускультуючи грудну клітку пацієнта. Прислуховуючись до дихання через маску, переконайтесь у відсутності витоку дихальної суміші навколо маски. Зафіксуйте маску за допомогою фіксаційної смужки.	Сказати/ Виконати
2.8	Уточнити загальний стан пацієнта. Дочекатися приїзду бригади екстреної медичної допомоги та надати їм необхідну інформацію, а саме: час встановлення ларингеальної маски. Зняти рукавиці	Сказати/ Виконати
3. Встановити попередній діагноз		
3.1	Гостре порушення мозкового кровообігу	Сказати
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після відновлення прохідності дихальних шляхів спостерігати за рівнем сатурації кисню, екскурсією грудної клітки, гемодинамічними показниками. За наявності надання кисневої підтримки, штучної вентильції легень	Сказати: <i>Необхідно Забезпечити належний рівень прохідності дихальних шляхів, при необхідності виконати вентиляцію мішком Амбу, термінова госпіталізація до лікарні, відділення інтенсивної терапії</i>



1. Орофарингеальний повітровід
- 4.Назофарингіальний повітровід



1. ЛАРИНГЕАЛЬНА МАСКА
- 2.Мішок Амбу
- 3.Назофарингіальна трубка(повітровід)
- 4.Ларингоскоп
5. Орофарингеальний повітровід
- 6.Ендотрахеальна (інтубаційна) трубка

Оберіть, будь-ласка, вірну відповідь та назвіть номер зображення та опишіть навичку

1 Накладання на 5-7 см вище пошкодження



2 Накладання на 2-3 см вище пошкодження



3 Накладання на 8-10 см вище пошкодження



Накладання на 3-4 см вище пошкодження



4

Відповідь 1 ?



Надглотковий повітропровід