

«Голкова декомпресія»

Ви — лікар невідкладної допомоги. Бригадою екстреної медичної допомоги до приймального відділення доставлено 35-річного чоловіка після ДТП. На момент прибуття бригади ЕМД — скарги на нестачу повітря, зліва дихання відсутнє. На моніторі — тахікардія-ЧСС-128/хвилину. Дихання поверхнєве, значний больовий синдром.

Скарги: Болі в грудній клітці, переважно зліва, нестача повітря. Не може зробити глибокий вдих

Анамнез захворювання: Хронічних захворювань не має, Алергічних реакцій не було.

Анамнез життя: Перенесені хвороби-ГРЗ, дитячі інфекції не уточнює.

Об'єктивно: Стан вкрай важкий. Пацієнт збуджений, намагається сидіти, при положенні лежачі-стан погіршується, зростає задишка. Шкіра ціанотична, суха. Підшкірний крововилив в ділянці 4,5,6 ребер на грудній клітці зліва. В акті дихання відстає ліва половина грудної клітини, дихання утруднене, обмежено больовим синдромом, аускультативно відсутні дихальні звуки зліва. Перкуторно-тимпаніт зліва. Підшкірної емфіземи немає. Розширені яремні вени, тони серця глухі, ритмічні. АТ 80/60ммрт.ст., сатурація кисню 67%., частота дихання 32 на хвилину.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує вулицю, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Декомпресійна голка	1 шт.
2	Хірургічний пінцет	1 шт.
3	Хірургічний лоток	2 шт

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кіл-ть на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
1	Марлеві кульки для обробки шкіри операційного поля	2 шт	20 шт
2	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
3	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
4	Лейкопластир	1 шт	10 шт
5	Захисна медична маска	1 шт	10 шт



ДЕКОМПРЕСІЙНА ГОЛКА

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1. 1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом(оточуючими, свідками, родичами)	Сказати Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я). Виконати/Сказати
1.2	Пояснити необхідність виконання лікувальної маніпуляції-голкової декомпресії, за можливості — отримати усну згоду	Сказати/Виконати
2. Виконання навички		
2.1	Провести швидкий огляд постраждалого. Оцінити показання до голкової декомпресії: підозра на напружений пневмоторакс (ЕМД, асиметрія грудної клітки, відсутність дихальних шумів, гіпотензія, розширені вени шиї)	Сказати/Виконати
2.2	Виконати гігієнічну обробку рук, одягнути	Сказати/Виконати

	рукавички	
2.3	Визначити правильне анатомічне місце введення голки: 2-й міжреберний простір по середньоключичній лінії (або 4–5-й ММП по передньо-пахвовій лінії)	Сказати/Виконати
2.4	Обробити місце введення антисептиком широким колом	Сказати/Виконати
2.5	Взяти голку великого діаметру (не менше 14G), приєднати до шприца (з фізрозчином — опціонально)	Сказати/Виконати
2.6	Ввести голку під прямим кутом до грудної стінки, над верхнім краєм ребра, постійно аспіруючи. Після появи повітря (або характерного «пшшш») — зафіксувати катетер, видалити голку	Сказати/Виконати
2.7	Повідомити про ознаки успішної декомпресії: поява вентиляції, зменшення напруги, покращення гемодинаміки	Сказати/Виконати
2.8	Встановити внутрішньовенний катетер. Розпочати інфузійну терапію, за необхідністю введення симпатоміметиків. Зняти рукавиці.	Сказати/виконати
3. Встановити попередній діагноз		
3.1	Закрита травма грудної клітки. Напружений пневмоторакс	Сказати
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після надання екстренної допомоги(декомпресії) спостерігати за гемодинамічними показниками, показниками сатурації кисню. Доставити пацієнта до лікарні	Сказати