

«Катетеризація периферичної(ліктьової) вени»

Ви працюєте лікарем-інтерном у приймальному відділенні міської клінічної лікарні. До вас доставлений пацієнт зі скаргами на сильний біль у животі. Для знеболення, лабораторних досліджень та підготовки до можливої госпіталізації необхідно встановити периферичний венозний катетер.

Скарги: Пацієнт скаржиться на раптовий сильний біль у нижній частині живота зліва, нудоту, загальну слабкість, відсутність апетиту.

Анамнез захворювання: Біль з'явився раптово приблизно 3 години тому. Почався як тупий, ниючий, локалізований в правій клубовій ділянці. Поступово посилювався, став нападоподібним. Біль не іррадіює. Пацієнт не приймав анальгетиків. Подібне вперше.

Анамнез життя: Хронічні захворювання: артеріальна гіпертензія (близько 7 років, приймає амлодипін). Алергії: не виявлено. Хірургічні втручання: апендектомія у 22 роки. Шкідливі звички: не палить, алкоголь – рідко. Робота: водій.

Об'єктивно: Загальний стан: помірно порушений. Положення: активне, неспокійне через біль. Шкірні покриви: чисті, нормального кольору. Температура: 37.5°C. АТ: 90/50 мм рт. ст.. ЧСС: 104/хв, ЧД: 22/хв. Живіт: злегка здутий, болісний в нижніх відділах, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга в правій клубовій ділянці.

Вени: ліктьові вени візуалізуються, наповнені, доступні для катетеризації

Додатково:

Встановити периферичний венозний катетер. Провести забір крові.

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

Приміщення, що імітує вулицю, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Годинник із секундною стрілкою	1 шт.
4	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
5	Манекен-симулятор	1 шт.

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Джгут	1 шт.

2	Хірургічний лоток	2 шт.
3	Контейнер для утилізації	1 шт.
4	Медичні ножиці	1 шт

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кіл-ть на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
1	Марлеві кульки для обробки шкіри	2 шт	20 шт
2	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
3	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
4	Лейкопластир	1 шт	10 шт
5	Захисна медична маска	1 шт	10 шт
6	Периферичні внутрішньовенні катетери різного розміру	1 шт	10 шт



ВНУТРІШНЬОВЕННИЙ КАТЕТЕР

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітатися з пацієнтом або командою, представитися, назвати свою роль. Провести швидкий огляд постраждалого. Пояснити необхідність встановлення внутрішньовенного катетера, за можливості — отримати згоду	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i> Сказати/Виконати
1.2	Виконати гігієнічну обробку рук, одягнути рукавички	Виконати/ Сказати <i>Будемо вважати, що руки</i>

		<i>оброблені</i>
2.Виконання навички		
2.1	Підготувати джгут та внутрішньовенні катери різного	Сказати/ Виконати
2.2	Накласти джгут вище ліктьового згину	Виконати
2.3	Обробити місце пункції антисептиком	Виконати
2.4	Ввести катетер під кутом 15-30 гр. до шкіри	Виконати
2.5	Отримати зворотній ток крові	Сказати/ Виконати
2.6	Просунути катетер вглиб, витягнути металевий мандрен	Сказати/Виконати
2.7	Зняти джгут.	Сказати/Виконати
2.8	Фіксувати катетер пластиром. Утилізувати використані матеріали, зняти рукавички, обробити руки	Сказати/Виконати
3. Встановити попередній діагноз(визначити стан пацієнта)		
3.1	Гострий апендицит, гіповолемія	<i>Сказати</i>
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після встановлення внутрішньовенного катетера провести забор крові на аналізи. Перевірити функціонування катетера, наявність відтоку крові, відсутність підшкірного введення інфузійного розчину. Налагодити внутрішньовенну інфузію кристалоїдів. Дочекатися бригади екстреної медичної допомоги, спостерігати за гемодинамічними показниками.	<i>Сказати</i>