

Пальпація молочних залоз

Сценарій. В клініку звернулась пацієнтка 56 років зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення в лівій молочній залозі. Треба провести пальпацію молочних залоз.

№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні	Виконати
4	Визначити: - симетричність (симетричні, асиметричні) - форму (наявність/відсутність деформацій) - набряк залоз (локальний, дифузний) - шкірні зміни, якщо є: гіперемія, посилення судинного малюнка, симптом лимонної кірки, симптом умбілікації (втягнення шкіри над пухлиною), екзема навколо соска.	Сказати
5	Коректна пальпація (початок з потенційно здорової залози, подушечками II-IV пальців провідної руки, невеликими круговими рухами, рухаючись концентрично у напрямку соска, фіксуючи залозу вільною рукою.	Виконати
6	Визначити патологічне утворення, якщо наявне - охарактеризувати	Сказати – так/ні
7	Коректна пальпація ареоли і соска (стиснути сосок I і II пальцями).	Виконати
8	Визначити відхилення від норми (так, ні)	Сказати
9	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

Діагностика

3.1. Оцінка патологічних змін при пальпації

Сказати: «При пальпації правої молочної залози визначається локальне ущільнення в нижньо-зовнішньому квадранті, болісне, шкіра над ним

гіперемована, гаряча на дотик. Є ознаки набряку, підвищена чутливість. Це типово для гострого лактаційного маститу.»

Оцінка патологічних виділень з соска

Сказати: «При легкому натисканні на сосок — виділяється молоко без патологічних домішок. Ознак гнійних виділень наразі не виявлено, але необхідно повторно контролювати динаміку.»

Визначення тактики ведення та лікування

3.2. Необхідність додаткових методів дослідження (УЗД молочних залоз, за потреби — мамографія/КТ)

Сказати:«Показано УЗД молочних залоз для уточнення:

- чи є ознаки абсцедування,
- межі інфільтрації,
- наявність рідинних утворень.

Мамографія або КТ можуть бути додані при нетиповій клініці або підозрі на інше захворювання.»

Призначення медикаментозних засобів

Сказати:

«Пацієнтці призначено:

- системну антибактеріальну терапію (наприклад, амоксицилін/клавуланат або цефалоспорины, враховуючи лактацію),
- жарознижувальні препарати,
- знеболювальні засоби (парацетамол),
- часте спорожнення залози (годування або зціджування)