

«Діагностична плевральна пункція»


Сценарій. У хірургічному відділенні знаходиться пацієнт з закритою травмою грудної клітини. За даними ультразвукового дослідження у плевральній порожнині є рідина. Треба провести діагностичну пункцію плевральної порожнини

перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Пункційна голка для плевральної порожнини 2мм - 90 мм	1 шт.
2	Хірургічний пінцет	1 шт.
3	Хірургічний лоток	2 шт

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
1	Марлеві кульки для обробки шкіри операційного поля	2 шт	20 шт
2	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
3	Шприц 10 мл	2 шт	20 шт
4	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
5	Асептична пов'язка	1 шт	10 шт
		1 шт	10 шт



№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль, визначити особливості анамнезу (алергічні реакції на ліки))	Сказати

2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних	Сказати
---	---	---------

	маніпуляцій	
3	Обробити руки хірургічним способом (лікар в рукавичках), надіти стерильний одяг, окуляри	Виконати
4	Коректний вибір місця пункції (6-7 міжребер'я по середній пахвовій лінії)	Сказати,

5	Коректно обробити місце пункції розчином антисептику (широко марлевою серветкою у пінцеті, другою марлевою серветкою у пінцеті)	Виконати
6	Провести анестезію передбачуваного місця пункції	Сказати
7	Коректно виконати пункцію: - приєднати пункційну голку з до шприцу - ввести голку у місце пункції вільною рукою - перпендикулярно поверхні шкіри, по верхньому краю ребра, натягуючи шкіру - повільно просунути голку вглиб по верхньому краю ребра, безперервно потягуючи поршень на себе - при появі рідини в шприці припинити просування голки	Виконати
8	Евакуювати (за наявності) весь об'єм рідини з плевральної порожнини	Виконати
9	Накласти асептичну пов'язку на місце пункції. Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати

Діагностика

3.1. Оцінка кількості плеврального випоту

Сказати: «Під час пункції отримано близько мл рідини з плевральної порожнини. Це вказує на наявність помірного випоту.»

Оцінка характеру плеврального випоту

Сказати: «Отримана рідина має геморагічний характер, що типово для травматичного гемотораксу. Необхідно провести лабораторне дослідження: визначити вміст білка, клітинний склад, гемоглобін, а також мікробіологічне дослідження за показаннями.»

Визначення тактики ведення та лікування

Необхідність додаткових методів дослідження

Сказати:

«Для уточнення об'єму випоту та оцінки уражень грудної клітки доцільно провести комп'ютерну томографію або рентгенографію органів грудної клітки. Це також допоможе виключити пневмоторакс або переломи ребер із зміщенням.»

Призначення лікування

Сказати:

«Пацієнт потребує госпіталізації у хірургічне або торакальне відділення.

Показане:

- дренування плевральної порожнини (за показаннями);
- симптоматична терапія (знеболення, кисень, спокій);
- лабораторне обстеження плевральної рідини;
- спостереження динаміки дихальної функції;
- лікування посттравматичних ускладнень за потреби.»

Завершення маніпуляції

Сказати й зробити:

«Накладаю асептичну пов'язку на місце пункції.

Як ваше самопочуття зараз? Маєте запаморочення, біль або задишку?»

«Умовно утилізую використаний матеріал, знімаю рукавички, обробляю руки антисептиком. Завершив маніпуляцію.»