

Накладання шкірних швів

Сценарій. Ви лікар-хірург. У хірургічному відділенні знаходиться пацієнт із різаною раною лівої гомілки через 2 години після травми. Треба провести накладання шкірних швів.

перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Голка ріжуча №0 або №1	2 шт.
2	Голкоутримувач	1 шт.
3	Хірургічний пінцет	1 шт.
4	Ножиці	1 шт.
5	Хірургічний лоток	
№	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, встановлення контакту з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком хірургічним способом (лікар в рукавичках)	Сказати
4	Коректно захопити голкотримач (домінантною рукою, розташувавши в кільцях голкотримача кінцеві фаланги I та IV пальців та фіксуючи місце поблизу перехрещення рукояток голкотримач кінцевою фалангою II) пальця	Виконати
5	Захопити голкотримачем голку, зарядити нитку в голку (фіксувати кінець нитки великим пальцем субдомінантної руки, доміантною рукою провести нитку під гострим кінцем голки та під губками голкотримача, зверху протягнути нитку через вушко голки)	Виконати
6	Коректно захопити пінцет (субдомінантною рукою за типом письмового пера: кінцеві фаланги II, III пальців з одного боку, кінцева фаланга I пальця з іншого боку)	Виконати
7	Коректна фіксація одного краю рани пінцетом (захопити пінцетом далекий від хірурга край рани, відвести край рани пінцетом назовні та догори)	Виконати

8	Коректне проведення голки та шовного матеріалу за допомогою голкотримача в направленні згідно з типом шва)	Виконати
9	Формування вузла (мануально, за допомогою інструментів). Відсічення країв нитки на відстані 1-1,5 см від вузла	Виконати

Діагностика

3.1. Оцінка досягнутого гемостазу

Сказати: «Оглядаю операційну рану перед накладанням швів — кровотечі немає, тканини сухі, гемостаз досягнутий. Це дозволяє переходити до ушивання шкіри.»

3.2. Оцінка якості сформованого шовного вузла. Відсічення країв нитки на відстані 1–1,5 см від вузла

Сказати: «Шовний вузол сформований щільно, симетрично, без прорізання шкіри. Кінці нитки відсічено на відстані приблизно 1–1,5 см від вузла — це запобігає його розв'язанню. Шви накладено з рівномірними проміжками.»

4. Визначення тактики ведення та лікування

4.1. Призначення медикаментозної терапії

Сказати: «Призначаю антибактеріальну терапію для профілактики інфекційних ускладнень, знеболювальні засоби, контроль температури тіла та загального стану. Рекомендується щоденна обробка рани антисептиком.»

4.2. Призначення фізіотерапії

Сказати: «Фізіотерапевтичне лікування показане з 3–5 доби після операції (за відсутності ознак запалення) — наприклад, УВЧ або лазеротерапія для покращення загоєння післяопераційної рани