

Ви – лікар педіатр-неонатолог. Вас покликали до пологової зали. Щойно народжена доношена дитина неактивна: відсутнє спонтанне дихання, гіпотонія, ціаноз, ЧСС – 90 ударів за хвилину. Немовля потребує реанімаційних заходів.  
Ваша подальша тактика – ШВЛ новонародженому мішком Амбу через маску.  
Ви приступаєте до виконання навички.

## 10.2 Робоче місце здобувача освіти

Перед входом на станцію повинно бути розташоване завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря-педіатра-неонатолога, обов'язково повинно включати:

| № з/п | Перелік медичного обладнання багаторазового використання            | Кількість |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | <b>Мішок Амбу</b>                                                   | 1 шт.     |
| 2     | Маски неонатальні для ШВЛ                                           | 2 шт.     |
| 3     | Стетоскоп неонатальний                                              | 1 шт.     |
| 4     | Годинник із секундною стрілкою                                      | 1 шт.     |
| 5     | Пелюшка бавовняна для складання валика під плечі                    | 1 шт.     |
| 6     | Пелюшка на реанімаційний стіл м'яка, вологопоглинаюча («памперсна») | 1 шт.     |
| 7     | Контейнер для збору відходів (класу А, В)                           | 1 шт.     |



| Алгоритм виконання                                |                                                                                                                                                                                                                               | Форма представлення                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Продемонструвати навички комунікації</b>     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 1.1                                               | Привітатися,представитися                                                                                                                                                                                                     | Сказати<br>«Добри йдень.<br>Я лікар педіатр-неонатолог»                                                                                                                       |
| 1.2                                               | Визначити свої подальші дії                                                                                                                                                                                                   | Сказати<br>«Будемо проводити дитині ШВЛ<br>мішком Амбу через маску»                                                                                                           |
| <b>2.Виконання навички(маніпуляції)</b>           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 2.1                                               | Обробити руки на гігієнічному рівні, вдягнути захисну маску та рукавички                                                                                                                                                      | Виконати/Сказати<br>«Обробляємо руки, вдягаємо маску»                                                                                                                         |
| 2.2                                               | Забезпечити правильне положення дитини,підклавши валик із пелюшки під плечі немовляті                                                                                                                                         | Виконати/Сказати<br>«Дитина лежить на реанімаційному столі. Підкладаємо валик із пелюшки під плечі немовляті, забезпечуючи анатомічну прохідність дихальних шляхів»           |
| 2.3                                               | Приєднати мішок Амбу до маски відповідного розміру                                                                                                                                                                            | Виконати/Сказати<br>«Приєднуємо маску відповідного розміру до мішка Амбу»                                                                                                     |
| 2.4                                               | Щільно прикласти маску до обличчя новонародженого,закривши ніс і рот дитини                                                                                                                                                   | Виконати/Сказати<br>«Щільно прикладаємо маску до обличчя новонародженого, закривши ніс і рот дитини»                                                                          |
| 2.5                                               | Проводити ритмічні натискання на мішок із частотою 30 за хвилину протягом однієї хвилини                                                                                                                                      | Виконати/Сказати<br>«Ритмічно натискаємо на мішок із частотою 30 натискань за хвилину протягом однієї хвилини»                                                                |
| <b>3. Діагностика</b>                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 3.1                                               | Для оцінки ефективності проведення вентиляції звернути увагу на достатню екскурсію грудної клітки немовляти                                                                                                                   | Сказати<br>«Критерієм ефективної ШВЛ є наявність помітних рухів грудної клітки»                                                                                               |
| <b>4. Визначення тактики ведення та лікування</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 4.1                                               | Після однієї хвилини ШВЛ оцінити: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Характер дихання дитини (самостійне, ефективне),</li> <li>• Колір шкіри(зменшення ціанозу),</li> <li>• ЧСС(більше100ударі в за хвилину)</li> </ul> | Сказати<br>«Оцінюємо ефективність дихання,колір шкіри та ЧСС дитини.<br>(Будемо вважати, що дихання самостійне, ефективне,ціаноз зменшився,ЧСС-більше 100 ударів за хвилину)» |

|     |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | Викласти немовля на живіт матері для контакту «шкіра-до-шкіри» протягом двох годин | Сказати<br>«Стан новонародженого після проведення ШВЛ покращився. Можна викласти дитину на живіт матері для проведення контакту «шкіра-до-шкіри» протягом двох годин» |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|