

Ви – лікар-педіатр. Семимісячна дівчинка гралась іграшками. Раптово перестала гратись, почав з'являтися ціаноз шкірних покривів. Дихання відсутнє. Є підозра на повну обтурацію дихальних шляхів частиною іграшки.

Ваша подальша тактика – застосування модифікованого прийому Геймліха для забезпечення прохідності дихальних шляхів дитини.

Ви приступаєте до виконання навички.

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації		
1.1	Привітатися,представитися	Сказати «Добрий день. Я лікар педіатр»
1.2	Визначити свої подальші дії	Сказати «Будемо проводити дитині модифікований прийом Геймліха»
2.Виконання навички(маніпуляції)		
2.1	Переконатися у відсутності дихання у дитини (в т. ч. кашлю або плачу)	Сказати «Переконаємось у відсутності дихання, кашлю або плачу в дитини»
2.2	Покласти дитину обличчям додолу, уздовж свого передпліччя, використовуючи стегно або коліна для підтримки	Виконати/Сказати «Кладемо дитину обличчям додола,уздовж Свого передпліччя,використовуючи стегно або коліна для підтримки»
2.3	Тримати нижню щелепу пальцями та Направляти голову дитини вниз,нижче рівня тіла	Виконати/Сказати «Тримаємо нижню щелепу пальцями та направляємо голову дитини вниз,нижче рівня тіла»
2.4	Нанести п'ять швидких, сильних, ковзаючих ударів між лопатками, використовуючи долоню вільної руки	Виконати/Сказати «Наносимо п'ять швидких,сильних, ковзаючих ударів між лопатками, використовуючи долоню вільної руки»
2.5	Повернути дитину обличчям догори і покласти її на своє стегно	Виконати/Сказати «Повертаємо дитину обличчям догори і кладемо її на своє стегно»

2.6	Розташувати вказівний і середній пальці посередній лінії груднини трохи нижче сосків дитини і зробити п'ять швидких поштовхів у грудну клітку на глибину приблизно одна третина від передньо-заднього розміру грудної клітки малюка	Виконати/Сказати «Розташовуємо вказівний і середній пальці по середній лінії груднини трохи нижче сосків дитини і робимо п'ять швидких поштовхів у грудну клітку на глибину приблизно одна третина від передньо-заднього розміру грудної клітки малюка»
3. Діагностика		
3.1	На будь-якому кроці проведення модифікованого прийому Геймліха Дитині раннього віку звернути увагу на вихід стороннього тіла назовні або в ротову порожнину дитини	Сказати «Звертаємо увагу на вихід стороннього тіла назовні або в ротову порожнину дитини»
4. Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	При успішному виконанні модифікованого прийому Геймліха у дитини відновлюється дихання або з'являється кашель (плач) і зменшується ціаноз	Сказати «Оцінюємо ефективність проведення модифікованого прийому Геймліха (Будемо вважати, що у дитини відновилось дихання і зменшився ціаноз)»
4.2	Надати рекомендації батькам щодо попередження аспірації у дітей раннього віку	Сказати «Надаємо рекомендації батькам щодо попередження аспірації у дітей раннього віку»