

На прийом звернулася мати з дитиною 5 років, у якої встановлено діагноз гломерулонефрит. Скарги на сильний головний біль переважно у скронево-лобній і потиличній ділянках, шум у вухах, запаморочення, нудота. Вам необхідно виміряти АТ.

### 10.2 Робоче місце здобувача освіти

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря-педіатра обов'язково повинно включати:

| № з/п                                                      | Перелік меблів та іншого обладнання            | Кількість |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                          | Стіл                                           | 1 шт.     |
| 2                                                          | Стілець                                        | 1 шт.     |
| 3                                                          | Прилад для обробки рук (можлива імітація)      | 1 шт.     |
| Перелік медичного обладнання (багаторазового використання) |                                                |           |
| 1                                                          | <b>Фонендоскоп/ Стетоскоп педіатричний</b>     | 1 шт.     |
| 2                                                          | <b>Апарат Короткова</b>                        | 1 шт.     |
| 3                                                          | Контейнер для зборі відходів класу А (класу В) | 1 шт.     |

| № з/п                                                 | Перелік медичного обладнання (одноразове використання)              | Кількість на 1 спробу |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                     | Антисептик для обробки рук 50 мл                                    | 1 шт.                 |
| 2                                                     | Гумові рукавички різних розмірів                                    | 2 шт                  |
| 3                                                     | Захисна медична маска                                               | 1 шт                  |
| Перелік медичного обладнання (симуляційне обладнання) |                                                                     |                       |
| 1                                                     | Манекен «Дитина 5-6 років» (Програмування не передбачено сценарієм) | 1 шт.                 |

| Алгоритм виконання                             |                                                                                                                                   | Форма представлення                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Продемонструвати навички комунікації.</b> |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| 1.1                                            | Коректне розташування лікаря щодо дитини (дитина лежить праворуч від лікаря). Встановлення контакту: пояснити свою роль           | Сказати<br><i>Доброго дня. Я лікар педіатр буду проводити вимірювання артеріального тиску методом Короткова.</i> |
| 1.2                                            | Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій                                                               | Сказати <i>Чи даєте Ви згоду на проведення маніпуляції вашій дитині?</i>                                         |
| <b>2. Виконання навички</b>                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| 2.1                                            | Обробити руки та вдягнути захисну маску та рукавички. Коректне (на рівні серця) розташування руки пацієнта та перевірка манометра | Виконати <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i><br>Виконати                                                    |

|                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2                                                         | Накладання манжети на оголене плече. Нижній край манжети розташовується на 2-3 см вище за ліктьовий згин.                                                           | Виконати/Сказати <i>«Накладаю манжету»</i>                                                                |
| 2.3                                                         | Розташування акустичної голівки фонендоскопа в центрі ліктьової ямки                                                                                                | Виконати/Сказати <i>«розташовую акустичну голівку фонендоскопа»</i>                                       |
| 2.4                                                         | Накачати повітря у манжетку.                                                                                                                                        | Виконати/Сказати <i>«Накачую повітря»</i>                                                                 |
| 2.5                                                         | При стравлюванні повітря з манжетки зафіксувати рівень систолічного (поява першого тону Короткова) та діастолічного (зникнення тонів Короткова) артеріального тиску | Виконати/Сказати <i>«фіксую тони Короткова»</i>                                                           |
| 2.6                                                         | Оцінити результати вимірювання АТ                                                                                                                                   | Виконати/Сказати <i>«АТ перевищує нормальні показники»</i>                                                |
| <b>3. Діагностика (встановити попередній діагноз)</b>       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| Вказати вірогідний діагноз дитини, враховуючи отримані дані |                                                                                                                                                                     | Сказати <i>«Підвищений АТ у дитини з гострим гломерулонефритом може свідчити про нефротичний синдром»</i> |
| <b>4.Визначення тактики ведення та лікування</b>            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| 4.1                                                         | Динамічний нагляд за дитиною                                                                                                                                        | Сказати <i>«Після введення гіпотензивних препаратів спостерігаємо за дитиною»</i>                         |
| 4.2                                                         | Визначити подальший маршрут пацієнта                                                                                                                                | Сказати <i>«Дитина госпіталізується у відділення нефрології»</i>                                          |