

В інфекційне відділення госпіталізовано дитину 5 років на першу добу захворювання. Скарги на сильний головний біль, повторну блювоту, підвищення температури до 39.9°C, інтоксикацію. При огляді менінгеальні знаки позитивні. Попередній діагноз - менінгіт. Вам необхідно провести люмбальну пункцію.


2 Робоче місце здобувача освіти

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря-педіатра обов'язково повинно включати:

№ з/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
Перелік медичного обладнання (багаторазового використання)		
1	Ємність для марлевих кульок	1 шт.
2	Контейнер для зборі відходів класу А (класу В)	1 шт.
3	Пінцет	1 шт.
4	Штатив для пробірок	1 шт.

№ з/п	Перелік медичного обладнання (одноразове використання)	Кількість на 1 спробу
1	Марлеві кульки для обробки шкіри рук	1 шт
2	Марлеві кульки для обробки шкіри операційного поля	1 шт
3	Стерильні гумові рукавички	1 шт
4	Стерильна пелюшка для операційного поля	1 шт
5	Голка пункційна з мандреном	1 шт
6	Стерильні пробірки для збору ліквору	4 шт
7	Пакет перев'язувальний (оклюзійна пов'язка)	1 шт



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнта), позначити свою роль.	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар педіатр - буду проводити люмбальну пункцію дитині.</i>
1.2	Інформуємо матір, що дитині буде проведено люмбальну пункцію, отримуємо згоду	Сказати <i>Даєте згоду на цю маніпуляцію?</i>
2. Виконання навички		

2.1	Обробити руки та вдягнути захисну маску та рукавички. Коректне (згинальна позиція на боці) розташування пацієнта на маніпуляційному столі. Дотримання правил септики та антисептики (обробка операційного поля, накладання стерильної пелюшки).	Виконати <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i> Виконати/сказати <i>Дитину вкладаємо в згинальній позиції на боці на маніпуляційному столі. З дотриманням правил септики та антисептики проводжу обробку операційного поля, накладаю стерильну пелюшку.</i>
2.2	Коректне (між L5 - L4 або L4-L3 (на перетині лінії від гребенів здухвинних кісток та хребта) визначення місця проведення пункції.	Виконати/Сказати <i>«На перетині лінії від гребенів здухвинних кісток та хребта визначаю місце проведення пункції»</i>
2.3	Коректне (між L5 - L4 або L4-L3 (на перетині лінії від гребенів здухвинних кісток та хребта) введення пункційної голки.	Виконати/Сказати <i>«На перетині лінії від гребенів здухвинних кісток та хребта між L5 - L4 (або L4-L3) ввожу пункційну голку до проходження голки через жовту зв'язку і тверду мозкову оболонку (відчуття «провалу»».</i>
2.4	Збір ліквору в стерильні пробірки (поступово виймаючи мандрен).	Виконати/Сказати <i>«Поступово виймаючи ман дрен, проводжу збір ліквору в стерильні пробірки.»</i>
2.5	Вийняття пункційної голки і накладання асептичної пов'язки.	Виконати/Сказати <i>«Виймаю пункційну голку і накладаю асептичну пов'язку».</i>
2.6	Уточнити у пацієнта його самопочуття.	Виконати/Сказати <i>«Уточнюю у пацієнта його самопочуття».</i>
3. Діагностика (встановити попередній діагноз)		
Провести інтерпретацію результатів проведеної люмбальної пункції.		Сказати <i>«За попереднім оглядом – ліквор виходить під підвищеним тиском, каламутний, що притаманно для гнійного менінгіту» (Будемо вважати – пункція пройшла без ускладнень)</i>
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за пацієнтом в палаті протягом 2 годин в положенні на животі.	Сказати <i>«Протягом 2 годин пацієнт почувається добре. Ускладнень немає».</i>

4.2	Визначити подальший маршрут пацієнта	Сказати « <i>Дитина потребує лікування в інфекційному стаціонарі</i> »
-----	--------------------------------------	--