

Ви лікар-педіатр на чергуванні. Вас викликали до приймального відділення, де знаходиться дитина 5 років з загостренням бронхіальної астми. Подальша Ваша тактика – аускультация легень. Ви приступаєте до виконання маніпуляції

10.2 Робоче місце здобувача освіти

Перед входом на станцію повинно бути розташоване клінічне завдання (брифінг).

Приміщення, що імітує робоче місце лікаря-педіатра обов'язково повинно включати:

№ з/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Прилад для обробки рук (можлива імітація)	1 шт.
Перелік медичного обладнання (багаторазового використання)		
1	Фонендоскоп	1 шт.
2	Контейнер для збору відходів класу А (класу В)	1 шт.

№ з/п	Перелік медичного обладнання (одноразове використання)	Кількість на 1 спробу
1	Антисептик для обробки рук 50 мл	1 шт.
2	Гумові рукавички різних розмірів	2 шт.
3	Антисептичні серветки для обробки олив та мембрани стетоскопа	3 шт.
4	Захисна медична маска	1 шт.
Перелік медичного обладнання (симуляційне обладнання)		
1	Манекен «Дитина 5-6 років» (Програмування не передбачено сценарієм)	1 шт.



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнта), серед персоналу приймального відділення позначити свою роль.	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр. Вашій дитині буде проведено аускультацию легень.

1.2	Інформуємо батьків про обстеження дитини.	Даєте згоду на цю маніпуляцію?
2. Виконання навички		
2.1	Обробити руки, оливи та мембрану фонендоскопу на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці. Забезпечити правильне розташування дитини. Дитина знаходиться перед лікарем в вертикальному положенні або праворуч від лікаря в горизонтальному положенні.	Сказати Будемо вважати, що руки, фонендоскоп оброблені Виконати
2.2	Проінструктувати пацієнта про правила дихання під час аускультатії легень.	Виконати/Сказати «Аускультатію проводять під час дихання дитини через ніс, після цього просять зробити її декілька глибоких вдихів через рот (глибоко вдихнувши, дитина повинна відразу ж зробити видих»
2.3	Коректне положення дитини під час вислуховування передньої частини грудної клітки (руки дитини опущені донизу). Коректне розташування фонендоскопу та виконання алгоритму аускультатії (фонендоскоп прикладають на ділянки міжребер'я, вислуховують симетричні ділянки грудної клітки спереду від ключиць до 4 ребра по серединно-ключичній лінії, починаючи зверху).	Виконати/сказати «Руки дитини опущені донизу»
2.4	Коректне положення дитини під час вислуховування бокових частин грудної клітки. Коректне виконання алгоритму аускультатії (аускультатію проводять по акселярній середній лінії на симетричних ділянках, починаючи зверху).	Виконати/Сказати «Дитина кладе руки на голову»
2.5	Коректне положення дитини під час вислуховування спини. Коректне виконання алгоритму аускультатії (аускультатію проводять над лопатками, в міжлопатковому просторі та під лопатками на симетричних ділянках, починаючи зверху).	Виконати/Сказати «Дитина складає руки на грудях і нахиляється вперед при вертикальному положенні»
2.6	Уточнити у пацієнта його самопочуття.	Виконати/Сказати «Чи не відчуваєте ви запаморочення, слабкості»
3. Діагностика (встановити попередній діагноз)		
Визначити результати проведеного обстеження		Сказати «Проведена аускультатія виявила наступні патологічні зміни в легенях. Вказати які саме»

4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Динамічний нагляд за дитиною	Сказати «Оцінюємо зміну аускультативних даних в легенях на фоні проведення терапії»
4.2	Визначити подальший маршрут пацієнта	Сказати «Стан дитини середньої тяжкості, необхідна госпіталізація для проведення лікування»