


В інфекційне відділення госпіталізовано дівчинку 9 років. Скарги на підвищення температури до 39.9°C, інтоксикацію, повторну блювоту 3 рази, діарею 3 рази за добу. Після проведення інфузійної терапії сечовиділення відсутнє на протязі 6 годин. При пальпації живота пальпується наповнений сечовий міхур. Ви приступаєте до проведення катетеризації сечового міхура.

№ з/п	Перелік медичного обладнання (одноразове використання)	Кількість на 1 спробу
1	Марлеві кульки для обробки шкіри рук	1 шт
2	Марлеві кульки для обробки шкіри операційного поля	1 шт
3	Стерильні гумові рукавички	2 шт
4	Стерильна пелюшка	1 шт
5	Стерильний катетер Фолею дитячий	1 шт
6	Стерильний хірургічний пінцет	1 шт
7	Антисептичний розчин	1 шт
8	Посудина для збирання сечі	1 шт
9	Водонепроникний мішок для сміття	1 шт
Перелік медичного обладнання (симуляційне обладнання)		
1	Манекен дитини для проведення катетеризації сечового міхура (Програмування не передбачено сценарієм)	1 шт.



Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Коректне розташування пацієнт-лікар (стоячи навпроти пацієнта), позначити свою роль.	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр - буду проводити катетеризацію сечового міхура дитини.
1.2	Інформуємо матір, що дитині буде проведено катетеризацію сечового міхура, отримуємо згоду	Сказати Даєте згоду на цю маніпуляцію?
2. Виконання навички		
2.1	Обробити руки та вдягнути захисну маску та рукавички. Коректне (лежачи на спині)	Виконати Будемо вважати, що

	розташування пацієнта на столі. Гігієнічне оброблення зовнішніх статевих органів, промежини, обкладення стерильними серветками входу у піхву.	руки оброблені Виконати/сказати Дитину вкладаємо на спині на маніпуляційному столі.
2.2	Обробка катетера вазеліновою олією.	Виконати/Сказати «Проводжу обробку катетера вазеліновою олією.»
2.3	Коректне введення катетеру, розсунувши статеві губи і поступово вводячи катетер в отвір сечівника на 4 - 6 см або до появи сечі, звертаючи увагу на самопочуття дитини.	Виконати/Сказати «Вводжу катетер, розсунувши статеві губи і поступово вводячи катетер в отвір сечівника на 4 - 6 см або до появи сечі, звертаючи увагу на самопочуття дитини».
2.4	Збір сечі у ємкість. Коректне закінчення процедури: поступове виймання катетера.	Виконати/Сказати «Проводжу збір сечі у ємкість. Закінчую процедуру, поступово виймаючи катетер»
2.5	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Виконати/Сказати «Уточнюю у пацієнтки її самопочуття».
3. Діагностика (встановити попередній діагноз)		
Провести інтерпретацію проведення катетеризації сечового міхура.		Сказати «За попереднім оглядом – стан дитини стабільний» (Будемо вважати – проведення катетеризації сечового міхура пройшло без ускладнень)
4.Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Визначити подальший маршрут пацієнта	Сказати «При повторній затримці самостійного сечовиділення – повторне зондування для контролю сечовиділення».