

Décisions de LAT en soins critiques

Introduction, méthodologie



Objectif : la SFAR et la SOFMER (Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation) se sont associées pour proposer des recommandations pour la pratique professionnelle sur les décisions de limitation et arrêt de traitements (LAT) en services de soins critiques de l'adulte (les services de soins critiques pédiatriques sont exclus du champ de ces recommandations).

Conception : groupe de 20 experts (SFAR/SOFMER, dont un expert usager HAS et un expert soins palliatifs). Méthode GRADE® — 3 champs, 9 questions au format PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome), recherche bibliographique extensive 2000-2025 (MEDLINE, Tripdatabase, Prospero, ClinicalTrials.gov, EMBASE, SCOPUS, Cochrane).

Résultats (résumé officiel) : 9 recommandations avec accord fort après 1 tour de vote (1 GRADE 1, 2 GRADE 2, 6 avis d'experts) et 2 absences de recommandation.

Contexte épidémiologique (France) : 53 % des décès surviennent en milieu hospitalier, dont 23 % en services de soins critiques (soit environ 12 % de l'ensemble des décès français). 80 à 90 % des décès en soins critiques font suite à une décision de LAT ; 12 à 14 % des patients admis en soins critiques font l'objet d'une telle décision au cours de leur séjour.

Terminologie GRADE® utilisée par la source : GRADE 1 = recommandation « forte » (« il est/n'est pas recommandé de faire... ») • GRADE 2 = recommandation « optionnelle » (« il est/n'est probablement pas recommandé de faire... ») • Avis d'experts = littérature trop faible ou inexistante (« les experts suggèrent... ») • Absence de recommandation = littérature insuffisante pour conclure, à distinguer d'une recommandation négative. **Particularité de cette source :** aucun tag GRADE de ce document ne porte de signe +/- (contrairement à d'autres RFE) ; polarité inférée du verbe de chaque énoncé — les 3 recommandations gradées de ce document sont toutes de sens positif, tagées « 1+ »/« 2+ » ici par cohérence avec le code couleur du reste du corpus.

Champ	Objet	Recommandations
Champ 1 (4 questions)	Prérequis et modalités d'une décision de LAT (réunions pluriprofessionnelles, recherche des volontés du patient, protocole d'aide à la décision, participation des équipes paramédicales)	R1.1 à R1.4
Champ 2 (2 questions)	Modalités de mise en œuvre d'une décision de LAT (protocole de sédation profonde et continue, extubation vs sevrage progressif)	R2.1 + 1 absence de reco.
Champ 3 (3 questions)	Relations avec les proches, communication, désaccords et conflits (stratégie d'accompagnement, formation à la communication, structure d'éthique clinique, médiation)	R3.1 à R3.3.2 + 1 absence de reco.

Repères terminologiques (définitions de la source) :

- **Obstination déraisonnable :** actes de prévention, d'investigation ou de soins poursuivis alors qu'ils sont inutiles, disproportionnés, ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
- **Limitation des traitements :** non-majoration d'un traitement de suppléance d'organe, ou non instauration d'un traitement en cas de nouvelle défaillance d'organe. **Arrêt des traitements :** interruption d'un ou plusieurs traitements de suppléance d'organe assurant un maintien artificiel en vie.
- **Niveau d'engagement thérapeutique** (Fiche LAT SFAR) : niveau 1 = engagement maximal ; niveau 2 = limitation d'une ou plusieurs thérapeutiques ; niveau 3 = arrêt des traitements et démarche palliative.
- **Procédure collégiale :** concertation entre l'équipe soignante et au moins un médecin consultant sans lien hiérarchique (« consultant extérieur »). Obligatoire si patient hors d'état d'exprimer sa volonté, avant une sédation profonde et continue, ou en cas de refus d'appliquer des directives anticipées.
- **Sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès (SPCMD) :** suspension de la conscience poursuivie jusqu'au décès, encadrée par la loi du 2 février 2016, titrée sur une échelle (RASS cible -4/-5).
- **Réanimation d'attente (« time-limited trial ») :** prise en charge de quelques heures à quelques jours (usuellement jusqu'à 2 jours, durée pouvant s'étendre jusqu'à 5 j chez le sujet âgé fragile) lorsque l'indication n'est pas claire, pour recueillir les informations nécessaires à une décision éclairée.

Décisions de LAT en soins critiques

Champ 1 — Réunions pluriprofessionnelles & volontés du patient



Champ 1 — Réunions pluriprofessionnelles & volontés du patient		
Réf.	Recommandation	Grade
R1.1	Les experts suggèrent d'organiser des réunions pluriprofessionnelles régulières de réflexion et d'échange autour du projet de soins des patients afin d'améliorer la qualité des soins.	AE
R1.2	Les experts suggèrent de rechercher les volontés du patient hospitalisé en soins critiques précocement et par tout moyen possible afin d'améliorer la qualité des soins.	AE

Figure 1 (source) — Directives anticipées : aspects réglementaires et pratiques

Cadre réglementaire : régies par la loi du 2 février 2016 (Claeys-Leonetti). Expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie (poursuite, limitation, arrêt ou refus de traitement) ; n'ont pas vocation à être utilisées si le patient peut s'exprimer ; droit et non obligation ; datées et signées ; s'imposent au médecin pour toute décision ; validité illimitée ; révisables et révocables à tout moment (le document le plus récent fait foi). Le médecin peut ne pas les appliquer dans 2 situations seulement : urgence vitale (le temps d'une évaluation complète), ou directives manifestement inappropriées/non conformes après procédure collégiale — la décision est alors inscrite au dossier et portée à la connaissance de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille.

En pratique : les DA aident le médecin à percevoir ce que le patient aurait qualifié d'obstination déraisonnable — elles n'ont pas vocation à définir l'indication de techniques précises de suppléance d'organes ; en pratique, elles ont plus d'intérêt lorsqu'elles informent sur les « objectifs de vie » et les valeurs du patient que lorsqu'elles listent des moyens (intubation, trachéotomie, épuration extra-rénale...). Ce ne sont ni un testament, ni un document d'organisation des obsèques.

Figure 2 (source) — Personne de confiance : aspects réglementaires et pratiques

Cadre réglementaire (CSP Art. L1111-6, loi Kouchner 2002, modifiée par la loi n°2024-317) : toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant), consultée si elle-même est hors d'état d'exprimer sa volonté. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Désignation écrite, cosignée, valable sans limitation de durée, révisable à tout moment. Chaque établissement de santé doit proposer cette désignation à l'admission.

En pratique : lorsque le patient ne peut plus s'exprimer, la personne de confiance a une mission de référent — elle rend compte de la volonté du patient sans prendre elle-même la décision médicale ; en l'absence de DA, son témoignage prévaut sur celui de la famille. Une seule personne de confiance peut être désignée par patient adulte ; en présence de plusieurs documents, le plus récent fait foi. **Attention :** à ne pas confondre avec la « personne à prévenir/référente », simplement contactée en cas de dégradation de l'état de santé.

Décisions de LAT en soins critiques

Champ 1 — Protocole d'aide à la décision & équipes paramédicales



Champ 1 — Protocole d'aide à la décision & équipes paramédicales

Réf.	Recommandation	Grade
R1.3	Pour les patients hospitalisés en soins critiques, lors d'une réflexion autour d'une prise de décision de limitation et/ou d'arrêt des traitements, les experts suggèrent d'utiliser un protocole de service d'aide à la décision et de communication avec les proches et au sein de l'équipe soignante pour améliorer la qualité des soins.	AE
R1.4	Pour les patients hospitalisés en service de soins critiques, il est probablement recommandé d'inclure la participation active des équipes paramédicales aux réunions de procédure collégiale de limitation et/ou arrêt des traitements afin d'améliorer la qualité des soins.	2+

Figure 3 (source) — Algorithme décisionnel de LAT en soins critiques

Étape	Patient en mesure de s'exprimer	Patient incapable de s'exprimer
1. Initiation de la réflexion	Patient, médecin, équipe paramédicale, personne de confiance, proches	Patient, médecin, équipe paramédicale, personne de confiance, proches
2. Recueil des éléments	Décision du patient avec le médecin (± personne de confiance)	Information de la personne de confiance et des proches de l'initiation d'une procédure de LAT (consignée au dossier) + consultation des directives anticipées, de la personne de confiance, de la famille et des proches
3. Délibération	Si décision de limitation/arrêt → mise en œuvre directe par l'équipe de soin ; si demande associée de SPCMD → procédure collégiale (équipe de soin + intervenant extérieur)	Procédure collégiale obligatoire (équipe de soin + intervenant extérieur)
4. Décision	Par le médecin en charge du patient ; inscription au dossier de la décision de LAT et de la procédure de SPCMD le cas échéant	Par le médecin en charge du patient ; inscription au dossier + information de la personne de confiance et des proches
5. Mise en œuvre	Mise en œuvre de la décision d'arrêt des traitements par l'équipe de soin → SPCMD si besoin	Délai permettant l'exercice d'un recours en temps utile → mise en œuvre par l'équipe de soin → arrêt ou limitation des traitements (inscription au dossier) → si l'arrêt concerne un traitement nécessaire au maintien en vie → SPCMD

Figure 4 (source) — Procédure collégiale & intervenant extérieur

Cadre réglementaire (CSP, Code de déontologie médicale Art. R4127-37-2) : la décision de limitation/arrêt respecte la volonté antérieurement exprimée par le patient ; si le patient est hors d'état de s'exprimer, la décision ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale, dans le respect des directives anticipées ou, à défaut, du témoignage de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche. Le médecin en charge peut engager la procédure de sa propre initiative ou à la demande de la personne de confiance/famille/proches. La décision est prise par le médecin en charge à l'issue d'une concertation avec l'équipe de soins et l'avis motivé d'au moins un médecin consultant, sans lien hiérarchique avec lui ; un second avis peut être recueilli si l'un des médecins l'estime utile. La décision est motivée et inscrite au dossier.

En pratique : 3 situations imposent la procédure collégiale — patient hors d'état d'exprimer sa volonté avant une limitation/arrêt susceptible d'entraîner le décès ; avant toute SPCMD ; en cas de refus d'appliquer des directives anticipées jugées inappropriées. Le consultant extérieur doit être sans lien hiérarchique avec l'équipe ; pour la SRLF et la SFAR, il doit examiner le patient (le CNOM admet un avis à distance). Les médecins traitant ou spécialiste déjà impliqués ne sont pas considérés comme consultants extérieurs.

Décisions de LAT en soins critiques

Champ 1 — Procédure collégiale : déroulement & check-list



Figure 5 (source) — Déroulement et check-list d'une procédure collégiale

Phase	Contenu
1. Initiation	Par tout soignant (médecin ou non) impliqué dans la prise en charge ; indirectement par le patient via des directives anticipées ; à la demande de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche ; à la demande du patient lui-même pour une demande de SPCMD.
2. Préparation	Recueillir les informations médicales pertinentes (antécédents, traitements, diagnostic, pronostic) ; consulter les directives anticipées ; recueillir le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches ; recueillir l'avis d'un médecin consultant extérieur à l'équipe (un second avis si nécessaire) ; informer la famille et les proches (sauf opposition du patient exprimée dans les DA) ; tracer l'information au dossier.
3. Délibération collégiale	Réunir une équipe participant à la réunion collégiale ; discuter les éléments médicaux (situation clinique, souffrance, traitements en cours, alternatives, pronostic, évolution) et non-médicaux (souhaits du patient, témoignage de la personne de confiance et des proches) ; objectif = recueillir tous les avis, sans viser nécessairement un consensus.
4. Décision	À l'issue de la délibération, décision motivée par le médecin en charge du patient ; consignation au dossier médical avec mention des participants et des arguments discutés.
5. Mise en œuvre et suivi	Informar la famille et les proches de la décision et de sa justification ; en cas d'opposition, solliciter une structure d'éthique clinique, prendre le temps du cheminement (entretiens répétés, interlocuteurs variés) et informer des recours légaux possibles en cas de blocage ; s'assurer du confort du patient.

Check-list des membres à convier

Participation obligatoire (au regard de la loi) : médecin sénior en charge du patient • un médecin extérieur au service, appelé en qualité de consultant • membres présents de l'équipe soignante.

Participation recommandée : au moins un autre médecin du service • interne(s) impliqué(s) dans la prise en charge • médecins et IDE d'autres services directement impliqués (médecin généraliste, chirurgien, spécialistes...).

Participation idéale : cadre du service • kinésithérapeute impliqué • étudiants hospitaliers/IDE/AS/kinésithérapeute • psychologue • assistante sociale.



Champ 2 — Sédation profonde et continue & extubation		
Réf.	Recommandation	Grade
R2.1	Chez les patients hospitalisés en soins critiques, après une décision d'arrêt des traitements, les experts suggèrent d'utiliser un protocole de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès pour améliorer la qualité des soins.	AE

Absence de recommandation — en l'absence de données, il n'est pas possible de formuler une recommandation sur la pratique d'une extubation après une décision d'arrêt de traitements, chez les patients ventilés en soins critiques, pour améliorer la qualité des soins.

Précisions : R2.1, objectif habituel de sédation profonde = RASS -5, avec analgésie associée. En cas d'extubation, une fréquence accrue de gasps/obstruction des voies aériennes est rapportée, non retrouvée si sédation protocolisée avec score de dyspnée.

Figure 6 (source) — Protocole de sédation profonde et continue (SPCMD)

Étape	Contenu
Préparation de la famille	Proposer un recours à un représentant du culte ; demander si la famille souhaite être présente tout au long du processus ; proposer un accompagnement et un soutien aux proches (psychologue...).
Mesures générales	S'assurer d'une voie veineuse efficace ; arrêt de la nutrition et de l'hydratation artificielles ; scopolamine 1 à 3 patchs derrière l'oreille ; en cas de nausées/vomissements : ondansétron 4 mg x3/j IVL ou SC, ou métoclopramide 10 mg IV/SC x3/j (relais 30-60 mg/24h IVSE).
Le jour de l'arrêt	Désactiver les alarmes (pression invasive/non invasive, SpO2), garder la surveillance du pouls et de la fréquence respiratoire ; privilégier les soins de confort ; arrêter les soins inconfortables (prélèvements, aspirations systématiques, injections SC...) ; reconsidérer le maintien des dispositifs invasifs (garder sonde vésicale et voie veineuse centrale pour le confort) ; sédation maintenue jusqu'au décès selon les objectifs RASS et BPS/RDOS, associant obligatoirement un hypnotique et un analgésique de palier 3.

Patient déjà sédaté : maintien ou augmentation de la sédation-analgésie pour l'objectif cible avant l'arrêt des traitements.

Patient non sédaté — posologies proposées :

- **Midazolam** (anxiolytique/sédatif) — 1 mg/mL, IVSE ; bolus initial 1 mg IVD toutes les 3 min jusqu'à l'objectif ; entretien en dose de titration/h ; objectif RASS -4 ou -5 ; posologie maximale 30 mg/h.
- **Sufentanil** (analgésique) — 5 µg/mL, IVSE ; bolus initial 5 µg IVD toutes les 3 min jusqu'à l'objectif ; entretien en dose de titration/h ; objectif BPS ≤5 à la stimulation douloureuse ; posologie maximale 50 µg/h.
- **Morphine** (alternative au sufentanil) — 1 mg/mL, IVSE ; bolus initial 3 mg IVD toutes les 5 min jusqu'à l'objectif ; entretien en dose de titration/h ; objectif BPS ≤5 à la stimulation douloureuse.
- Si les objectifs (RASS/BPS ou RASS/RDOS) ne sont pas atteints aux doses maximales : ajout de propofol par bolus de titration puis administration continue, à l'appréciation du clinicien.

Décisions de LAT en soins critiques

Champ 2 — Échelles d'évaluation RASS, BPS, RDOS



Figure 6 (suite) — Échelles d'évaluation RASS, BPS, RDOS

Cette proposition de protocole est utilisable pour toute décision de SPCMD (qu'il y ait ou non une procédure Maastricht III suite à la décision de LAT). Chez un patient conscient, un arrêt des traitements de maintien en vie nécessite : demande répétée (temps de la réflexion, entretiens multiples tracés), capacité de discernement du patient (évaluation psychiatrique/psychologique avec son accord), demande libre et éclairée (connaissance de la maladie, du traitement, de l'évolution, du pronostic, des conséquences et risques de la sédation).

RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)	Description
+4 Combatif	Danger immédiat envers l'équipe.
+3 Très agité	Tire, arrache tuyaux/cathéters et/ou agressif envers l'équipe.
+2 Agité	Mouvements fréquents sans but précis et/ou désadaptation au respirateur.
+1 Ne tient pas en place	Anxieux ou craintif, mouvements orientés, peu vigoureux, non agressif.
0 Éveillé et calme	—
-1 Somnolent	Pas complètement éveillé, contact visuel à l'appel (>10s).
-2 Diminution légère de la vigilance	Contact visuel bref à l'appel (<10s).
-3 Diminution modérée	N'importe quel mouvement à l'appel, sans contact visuel.
-4 Diminution profonde	Aucun mouvement à l'appel ; mouvement à la stimulation physique (friction non nociceptive épaule/sternum).
-5 Non réveillable	Aucun mouvement, ni à l'appel, ni à la stimulation physique.

Échelle BPS (Behavioural Pain Scale)	1 point	2 points	3 points	4 points
Expression du visage	Détendu	Partiellement crispé	Crispé	Grimace
Tonus des membres supérieurs	Aucun mouvement	Flexion partielle	Flexion complète	Rétraction
Adaptation au respirateur	Adapté	Déclenche ponctuellement	Lutte contre le respirateur	Non ventilable

Échelle RDOS (Respiratory Distress Observation Scale)	0 point	1 point	2 points
Fréquence cardiaque (/min)	< 90	90-109	≥ 110
Fréquence respiratoire (/min)	< 19	19-30	> 30
Agitation, mouvements involontaires	Non	Occasionnels	Fréquents
Respiration abdominale paradoxale	Non	—	Oui
Muscles accessoires inspiratoires	Non	Légère	Prononcée
Râles expiratoires	Non	—	Oui
Battement des ailes du nez	Non	—	Oui
Expression de crainte	Non	—	Oui

Décisions de LAT en soins critiques

Champ 3 — Relations avec les proches, communication, conflits



Champ 3 — Relations avec les proches, communication, conflits

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1	Pour les proches de patients hospitalisés en services de soins critiques, il est recommandé d'utiliser une stratégie d'accompagnement structurée après une décision d'arrêt et/ou limitation de traitements, incluant des interactions proactives avec l'équipe soignante et/ou des supports de communication, pour améliorer la qualité des soins.	1+
R3.2	En service de soins critiques, les experts suggèrent de former l'équipe médico-soignante à la communication pour permettre de prévenir les conflits entre proches et équipes médico-soignantes.	AE
R3.3.1	Pour les proches de patients hospitalisés et l'équipe médico-soignante en service de soins critiques, en cas de désaccords/conflits autour d'une décision de limitation et/ou arrêt des traitements, les experts suggèrent de faire intervenir une structure d'éthique clinique pour améliorer la qualité des soins.	AE
R3.3.2	Pour les proches de patients hospitalisés et l'équipe médico-soignante en service de soins critiques, en prévention d'un désaccord/conflit entre proches et équipes soignantes dans une situation à risque de conflit de valeurs autour d'une décision de limitation et/ou arrêt des traitements, il est probablement recommandé de faire intervenir une structure d'éthique clinique pour améliorer la qualité des soins.	2+

Absence de recommandation — les experts ne sont pas en mesure d'émettre une recommandation concernant l'intervention d'une équipe de médiation pour améliorer la qualité des soins.

Figure 7 (source) — Stratégies d'accompagnement des proches

Étape chronologique	Contenu
Dès l'admission du patient	Supports écrits et numériques pour faciliter la compréhension de la situation par les proches.
Présence et implication des proches	Assouplir les horaires de visite et le nombre de visiteurs ; encourager leur participation aux soins non médicaux s'ils le souhaitent.
Communication continue	Organiser des réunions régulières ; adopter une stratégie de communication structurée.
Soutien psychologique et spirituel	Proposer un soutien psychologique ; faciliter l'accès aux représentants du culte.
Décision de LAT	Expliquer clairement la situation médicale et les décisions de LAT, s'assurer de la compréhension ; proposer une approche individualisée selon les croyances et valeurs du patient et de ses proches.
Préparation au décès	Informar des signes cliniques ; proposer un livret explicatif des démarches ; dédier un espace de recueillement adapté.
Moment du décès	Offrir aux proches la possibilité de rester autant de temps qu'ils le souhaitent ; permettre un rituel d'adieu selon leurs souhaits.
Suivi post-décès	Proposer une réunion entre les proches et les soignants s'ils le souhaitent ; ne pas envoyer systématiquement de lettre de condoléance, qui peut aggraver le deuil.
Gestion des conflits	Préparer un protocole local de gestion des conflits entre famille/proches et équipe soignante ; encourager des temps d'écoute pour favoriser une décision partagée.

Figure 8 (source) — Outils pour la communication d'une LAT

Décisions de LAT en soins critiques

Champ 3 — Relations avec les proches, communication, conflits



Avant la réunion : recueillir les souhaits du patient si non encore fait (DA, personne de confiance, proches) ; informer de la future tenue d'une réunion collégiale.

Environnement : présentation des interlocuteurs ; endroit garantissant l'intimité ; être assis ; établir un contact ; impliquer les proches ; anticiper et gérer les contraintes de temps et interruptions.

Transmettre la décision : reprendre l'histoire du patient (temps imparfait), la décision de la réunion collégiale (temps présent), ce qui va se passer (temps futur — prononcer les mots « fin de vie », « mort » si c'est le cas) ; s'assurer de la compréhension ; reformuler si besoin.

Congruence communication non verbale/verbale : ton adapté, rythme lent sans être traînant ; empathie ; écoute active (émotions et langage) ; reconnaître les émotions et mécanismes de défense (tristesse, colère, choc, sidération, déni) ; adapter la conduite selon que le stress est adapté (poursuivre l'entretien) ou dépassé (soutenir avant de reformuler) ; respecter les silences ; être disponible.

Fin d'entretien et synthèse : demander si besoin de plus d'informations ; accompagner la distribution d'un livret de fin de vie ; proposer une aide psychologique et/ou la visite d'un représentant du culte si besoin ; faire intervenir une structure d'éthique clinique en cas de difficultés ; proposer une prochaine rencontre. Disponibilité d'un médecin et d'un infirmier durant les derniers jours de vie pour témoigner du soutien ; proposer de revoir les proches après le décès.

Décisions de LAT en soins critiques

Synthèse, sources & traçabilité



Synthèse et messages clés

- **Champ 1** : organiser des réunions pluriprofessionnelles régulières autour du projet de soins, rechercher les volontés du patient le plus précocement possible et par tout moyen (DA, personne de confiance, proches, médecins référents), utiliser un protocole de service d'aide à la décision, et inclure activement les équipes paramédicales aux réunions de procédure collégiale (probablement recommandé).
- La procédure collégiale est obligatoire dans 3 situations : patient hors d'état d'exprimer sa volonté avant une limitation/arrêt susceptible d'entraîner le décès ; avant toute sédation profonde et continue ; en cas de refus d'appliquer des directives anticipées jugées inappropriées. Elle associe l'équipe de soins et au moins un médecin consultant extérieur, sans lien hiérarchique.
- **Champ 2** : utiliser un protocole de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès (associant obligatoirement un hypnotique et un analgésique de palier 3, titrés sur les scores RASS/BPS/RDOS) après une décision d'arrêt des traitements. Aucune recommandation ne peut être formulée entre extubation et sevrage progressif, faute de littérature suffisante — si une extubation est choisie, elle doit s'accompagner d'un protocole de sédation adapté pour prévenir les signes d'inconfort.
- **Champ 3** : une stratégie d'accompagnement structurée des proches (interactions proactives, supports de communication) est recommandée après une décision de LAT ; former l'équipe médico-soignante à la communication pour prévenir les conflits ; faire intervenir une structure d'éthique clinique tant en prévention (situation à risque de conflit de valeurs) qu'en cas de désaccord avéré — son bénéfice est mieux établi en prévention que pour la résolution de conflits déjà installés. Aucune recommandation n'a pu être formulée sur le recours à une équipe de médiation, faute de données.

Sources et traçabilité

Document source : « Décisions de limitation et d'arrêt de traitements (LAT) en soins critiques de l'adulte » — Recommandations Formalisées d'Experts de la SFAR, en association avec la SOFMER. 2025, texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques de la SFAR (10/05/2025) et le CA SFAR (15/07/2025). Comité de 20 experts, coordination M. Giabiconi (SFAR).

Couverture : 9 recommandations numérotées (R1.1-R1.4, R2.1, R3.1-R3.3.2) et 2 absences de recommandation (extubation vs sevrage progressif ; équipe de médiation) reproduites intégralement — concordance exacte avec le résumé officiel (9 recommandations : 1 GRADE1, 2 GRADE2, 6 avis d'experts + 2 absences), sans divergence de comptage à signaler. Les 8 figures/annexes de la source (aucune n'étant une simple image non exploitable) sont toutes reproduites : Figures 1, 2 et 4 (encadrés réglementaires), Figure 3 (algorithme décisionnel, transcrit en tableau comparatif), Figure 5 (déroulement en 5 phases + check-list), Figure 6 (protocole de sédation avec posologies + échelles RASS/BPS/RDOS), Figure 7 (stratégie d'accompagnement des proches) et Figure 8 (outils de communication).

Grading : aucun tag GRADE de cette source ne porte de signe +/- (convention propre à ce document, différente des autres RFE du corpus). Polarité inférée du verbe de chacune des 3 recommandations gradées (R1.4, R3.1, R3.3.2) — toutes de sens positif — et tagée « + » ici par cohérence visuelle avec le reste du corpus.

Formulation R1.3 et R2.1 : le texte du « Tableau récapitulatif recommandations » de la source diffère très légèrement de celui imprimé sous l'argumentaire de chaque question (R1.3 : ajout de « et au sein de l'équipe soignante » ; R2.1 : « protocole de sédation » vs « protocole pour l'administration de la sédation »). La méthode de la source précise que ce tableau récapitulatif intègre les « amendements validés par les experts concernés et le coordinateur, ainsi que les groupes de lecture » — c'est donc cette formulation finale amendée qui est reproduite ici pour R1.3 et R2.1.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des recommandations de la RFE mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni édité ni validé par la SFAR/SOFMER. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.