

AOD : chirurgie et hémorragie en urgence

Contexte, pharmacocinétique & chirurgie — dosage disponible



Résumé : propositions du Groupe d'Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP) pour la chirurgie urgente à risque hémorragique et les hémorragies graves chez un patient traité par **dabigatran (Pradaxa®) ou rivaroxaban (Xarelto®)** à dose curative. **Portée limitée par la source elle-même** à ces 2 molécules (apixaban/edoxaban explicitement exclus, données insuffisantes en 2013). **Aucun système de cotation** : ce ne sont pas des recommandations mais des « propositions », amenées à évoluer.

■ **Avertissement majeur — document de 2013, antérieur aux antidotes spécifiques** : ce texte précède la commercialisation de l'idarucizumab (Praxbind®, antidote du dabigatran, autorisé en France en 2016) et de l'andexanet alfa (Ondexxya®, antidote des anti-Xa, autorisé en 2019). Il ne propose donc que des agents procoagulants non spécifiques (CCP, FEIBA) et NE REFLÈTE PAS la prise en charge actuelle de référence. À utiliser uniquement comme repère historique des principes généraux (dosage plasmatique, délais selon fonction rénale) — se référer impérativement aux protocoles actualisés intégrant les antidotes spécifiques avant toute décision thérapeutique.

Méthodologie et contexte

Article publié le 18/03/2013 (accepté 25/04/2013) par le GIHP — ce n'est ni une RFE, ni une RPC, ni une conférence d'experts SFAR : aucun grade A/B/C, aucun « accord fort/faible ». La méthodologie repose sur l'analyse de la littérature pharmacocinétique puis une relecture critique par les membres du GIHP jusqu'à consensus — la source précise elle-même que « le peu de données disponibles ne permet pas d'émettre des recommandations, mais seulement des propositions ». *Note de datation* : la bibliothèque SFAR indexe ce document sous l'année « 2021 » (date de mise en ligne/réindexation probable), mais l'article lui-même est daté et signé 2013 — divergence disclosed, la date d'origine (2013) est retenue dans cette fiche.

Seuil de sécurité hémostatique : une concentration plasmatique ≤ 30 ng/mL, pour le dabigatran comme pour le rivaroxaban, est extrapolée des protocoles des essais cliniques (RE-LY, ROCKET-AF) comme compatible avec une chirurgie à risque hémorragique sans majoration du risque. Dans tous les cas, il faut préciser : âge, poids, nom du médicament, indication, dose, nombre de prises/jour, heure de la dernière prise, clairance de la créatinine (formule de Cockcroft et Gault).

Tableau 1 — Données pharmacocinétiques des AOD (repère) :

	Cmax (ng/mL)	Cmin (ng/mL)
Dabigatran 220 mg/j (1 prise)	183 (5-95 perc : 64-447)	37 (5-95 perc : 10-96) à 24 h
Dabigatran 150 mg $\times$ 2/j	254 ($\pm$ 70,5)	80,3 (18,7) à 12 h
Rivaroxaban 10 mg/j (1 prise)	125 (5-95 perc : 91-195)	9 (5-95 perc : 1-38) à 24 h
Rivaroxaban 20 mg/j (1 prise)	215 (5-95 perc : 22-535)	32 (5-95 perc : 6-239) à 24 h

Chirurgie urgente à risque hémorragique — dosage plasmatique disponible

Fig. 1 — Dabigatran, selon la concentration plasmatique :

Concentration	Conduite à tenir
≤ 30 ng/mL	Opérer sans délai.
30-200 ng/mL	Si un report est possible : attendre jusqu'à 12 h puis nouveau dosage. Si non : opérer ; en cas de saignement anormal, antagoniser (CCP 25-50 UI/kg ou FEIBA 30-50 UI/kg selon disponibilité).
200-400 ng/mL	Retarder au maximum l'intervention. Attendre 12-24 h puis nouveau dosage. Si clairance de Cockcroft < 50 mL/min : discuter la dialyse (35 % du dabigatran est lié à l'albumine ; l'hémodialyse réduit la concentration de 40-60 % en 4 h).
> 400 ng/mL	Surdosage — risque hémorragique majeur. Discuter la dialyse avant chirurgie (délai pour atteindre le seuil de 30 ng/mL long en cas de surdosage, à intégrer dans la décision de report).

Fig. 2 — Rivaroxaban, selon la concentration plasmatique (même structure que le dabigatran) :

Concentration	Conduite à tenir
≤ 30 ng/mL	Opérer sans délai.
30-200 ng/mL	Si un report est possible : attendre jusqu'à 12 h puis nouveau dosage. Si non : opérer ; en cas de saignement anormal, antagoniser (CCP 25-50 UI/kg ou FEIBA 30-50 UI/kg selon disponibilité).

AOD : chirurgie et hémorragie en urgence

Contexte, pharmacocinétique & chirurgie — dosage disponible



Concentration	Conduite à tenir
200-400 ng/mL	Retarder au maximum l'intervention. Attendre 12-24 h puis nouveau dosage.
> 400 ng/mL	Surdosage — risque hémorragique majeur. Contrairement au dabigatran, la dialyse n'est pas envisageable avec le rivaroxaban (forte liaison protéique). Retarder au maximum l'intervention si l'état du patient le permet.

CCP/FEIBA — mises en garde communes aux 2 molécules (notes de la source) : aucune donnée sur le risque thrombotique de fortes doses chez ces patients ; l'antagonisation par CCP ou FEIBA ne corrige pas complètement les anomalies biologiques de l'hémostase ; le rFVIIa n'est pas envisagé en première intention.



Chirurgie urgente à risque hémorragique — dosage spécifique indisponible

Solution **dégradée**, seulement en cas d'indisponibilité immédiate du dosage spécifique — ne garantit pas formellement l'absence de complications hémorragiques. Combinaison TCA + TP (ou TQ) normaux : conclut avec une fiabilité relative à une concentration < 30 ng/mL. Le temps de thrombine (TT, très sensible au dabigatran) peut exclure sa présence s'il est normal, mais retarde inutilement la décision dans la plupart des situations — peu utile en urgence.

Fig. 3 — Dabigatran, selon le ratio TCA/TQ malade-témoin (M/T) :

Ratio TCA/TQ	Conduite à tenir
TCA ≤ 1,2 ET TQ ≤ 1,2 (TP ≥ 70-80 %)	Opérer sans délai.
1,2 < TCA ≤ 1,5, ou TQ > 1,2 (TP < 70-80 %)	Correspond à ≈ 30-200 ng/mL. Si un report est possible : attendre jusqu'à 12 h, obtenir un dosage spécifique + nouveau TP/TCA. Si non : opérer ; en cas de saignement anormal, antagoniser (CCP 25-50 UI/kg ou FEIBA 30-50 UI/kg).
TCA > 1,5	Correspond à > 200 ng/mL (Cmax). Retarder au maximum l'intervention. Attendre 12-24 h, obtenir un dosage spécifique + nouveau TP/TCA. Si Cockcroft < 50 mL/min : discuter la dialyse.

Rivaroxaban — algorithme manquant dans le PDF source, reconstruit à partir du texte (§3.3) : la source affirme explicitement une « approche identique à celle du dabigatran » avec les **mêmes seuils de ratio TCA** (≤ 1,2 / 1,2-1,5 / > 1,5) et les mêmes délais — voir le tableau ci-dessus. Une figure séparée est annoncée par le texte (« Fig. 4 ») mais le PDF publié imprime à cet emplacement, par erreur de mise en page de la source elle-même, une duplication du diagramme « hémorragie grave » (voir page suivante) — défaut de production disclosed ici plutôt que reproduit ou deviné. Seule différence avec le dabigatran : la mesure de l'activité anti-Xa (technique héparine) est très sensible au rivaroxaban — une activité ≤ 0,1 U/mL exclut sa présence, mais ce test est peu utile en urgence (retarde la décision).

Si la chirurgie ne peut être repoussée et les seuils ne sont pas atteints

Opérer **sans** administration préventive de médicaments procoagulants. Recourir à ceux-ci (CCP 25-50 UI/kg, ou FEIBA 30-50 UI/kg — éventuellement renouvelable une fois en cas d'échec) **seulement en cas de saignement anormal** per- ou postopératoire. Privilégier en première ligne la dose la plus faible proposée.

Hémorragie grave spontanée ou chirurgicale

La définition HAS/GEHT 2008 des hémorragies graves sous AVK est reprise par défaut, faute de définition spécifique aux AOD (voir Tableau 2). Deux situations sont distinguées.

1 — Hémorragie dans un organe critique (intracérébrale, sous-durale aiguë, intra-oculaire...) :

Thème	Détail
Conduite immédiate	Neutralisation immédiate de l'effet anticoagulant : FEIBA 30-50 UI/kg ou CPP 50 UI/kg, éventuellement renouvelé une fois à 8 h d'intervalle — quel que soit le résultat des tests, sans attendre. Le suivi de la concentration du médicament sera utile pour la décision opératoire complémentaire.

2 — Autres hémorragies graves (définition HAS, Tableau 2) :

Situation	Conduite à tenir
Geste hémostatique praticable d'emblée (endoscopique, intravasculaire)	À privilégier quel que soit le taux du médicament.
Concentration ≤ 30 ng/mL	L'hémorragie ne peut être imputée au seul médicament — pas d'administration d'agent hémostatique (CCP/FEIBA).
Concentration > 30 ng/mL et aucun geste hémostatique adapté	Tenter d'inhiber l'effet anticoagulant (CCP 25-50 UI/kg, ou FEIBA 30-50 UI/kg, éventuellement renouvelable une fois), optimiser la réanimation ; pour le dabigatran, envisager une épuration par hémodialyse guidée par la concentration.
Dosage spécifique non disponible	Raisonnement sur le TCA et le TP, avec un niveau élevé d'incertitude (même logique que ci-dessus, seuil indicatif : ratio TCA ≤ 1,2 et TQ ≤ 1,2/TP ≥ 70-80 % → pas d'antagonisation ; au-delà → discuter l'antagonisation et obtenir un dosage spécifique).

AOD : chirurgie et hémorragie en urgence

Chirurgie sans dosage, hémorragie grave & sources



Défaut de production du PDF source disclosed : les 2 diagrammes correspondant à ce tableau (l'un guidé par la concentration, l'autre par les tests usuels) sont bien présents dans le PDF, mais leurs légendes sont incohérentes avec leur propre contenu — le diagramme « guidé par concentration » est imprimé deux fois sous les légendes erronées « Fig. 4 » et « Fig. 5 » (au lieu des figures réellement annoncées par le texte à ces emplacements), et le diagramme correctement légendé « Fig. 6 » décrit dans son titre une approche par concentration alors qu'il utilise en réalité des ratios TCA/TQ. Contenu clinique reconstruit ici à partir des diagrammes réels et du texte du corps, sans dépendre des légendes erronées.

Tableau 2 — Définition HAS 2008 d'une hémorragie grave ou potentiellement grave sous AVK (reprise par défaut pour les AOD, au moins un critère) :

Critère	Détail
Hémorragie extériorisée	Non contrôlable par les moyens usuels.
Instabilité hémodynamique	PAS < 90 mmHg ou diminution de 40 mmHg par rapport à la PAS habituelle, ou PAM < 65 mmHg, ou tout signe de choc.
Geste hémostatique urgent nécessaire	Chirurgie, radiologie interventionnelle, endoscopie.
Transfusion	Nécessité de transfusion de culots globulaires.
Localisation menaçant le pronostic vital ou fonctionnel	Hémorragie intracrânienne et intraspinal ; hémorragie intraoculaire et rétro-orbitaire ; hémothorax, hémopéritoine, hémopéricarde ; hématome musculaire profond et/ou syndrome de loge ; hémorragie digestive aiguë ; hémarthrose.

Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge des complications hémorragiques graves et de la chirurgie en urgence chez les patients recevant un anticoagulant oral anti-IIa ou anti-Xa direct » — Propositions du GIHP. Coordinateurs : G. Pernod, P. Albaladejo. Reçu le 18/03/2013, accepté le 25/04/2013.

Version : Ann Fr Anesth Reanim 2013;32:691-700.

Méthodologie : analyse de la littérature + relecture critique du GIHP jusqu'à consensus — aucun système de cotation (pas de grade, pas d'accord fort/faible). Propositions, pas des recommandations (terminologie de la source elle-même).

URL source : <https://sfar.org/download/gestion-perioperatoire-des-aod-en-urgence/?wpdmdl=34804>

Couverture : intégralité du contenu actionnable pour le dabigatran et le rivaroxaban (seules molécules couvertes par la source elle-même). L'algorithme rivaroxaban/TCA manquant du PDF (défaut de production disclosed plus haut) est reconstruit fidèlement à partir du texte du corps. Hors champ, explicitement par la source : apixaban, edoxaban (données insuffisantes en 2013).

Avertissement — document de 2013, propositions non validées comme recommandation officielle : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité du contenu actionnable du texte source, mais ne le remplace pas et n'est ni éditée ni validée par la SFAR ou le GIHP. Ce document est antérieur aux antidotes spécifiques (idarucizumab, andexanet alfa) et ne couvre ni l'apixaban ni l'edoxaban — se référer impérativement aux protocoles actualisés du centre de prise en charge et à un avis spécialisé (hématologie/hémostase) avant toute décision thérapeutique.