



Champ : recommandations du Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM), avec la collaboration de la SFAR et de nombreuses sociétés savantes et syndicats, sur les relations entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens, autres spécialistes ou professionnels de santé (sages-femmes, infirmiers anesthésistes). Texte de mai 1994, actualisé et réédité en décembre 2001.

Méthodologie : ce texte est **déontologique et juridique** — articles du code de déontologie médicale, décrets, articles du code de la santé publique, recommandations de l'ANAES. Il ne comporte **aucun système de cotation scientifique** (pas de GRADE, pas de niveau de preuve) : chaque recommandation est une règle de bonne pratique organisationnelle ou une obligation légale/déontologique, restituée ici en panneaux et tableaux thématiques, jamais en chip de grade inventé.

Préface (2001) & préambule (1994)

Préface (Pr Bernard Hoerni, 17 octobre 2001) : depuis 1994, de nouvelles questions sont apparues (dont l'information du patient) et de nombreux textes réglementaires ont été publiés — le nouveau code de déontologie médicale (**décret n° 95-1000** du 6 septembre 1995), le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 sur la pratique de l'anesthésie, les **décrets n° 98-899 et 98-900** du 9 octobre 1998 sur les activités d'obstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale. Les praticiens, de plus en plus préoccupés par les risques judiciaires, sollicitent l'aide de leur Ordre et de leurs organisations professionnelles ; les initiatives des professionnels (référentiels) et des pouvoirs publics (accréditation) en matière d'assurance qualité se sont multipliées ; le déclin annoncé de la démographie médicale dans certaines spécialités chirurgicales, et surtout chez les anesthésistes-réanimateurs, rend impérieux un relèvement du *numerus clausus*. D'où l'actualisation de ces recommandations.

L'anesthésiste-réanimateur, initialement partenaire du chirurgien, est devenu le collaborateur privilégié d'un grand nombre de spécialistes. Son statut de spécialiste à part entière reste original : son action se confond dans le temps et l'espace avec celle du chirurgien ou du spécialiste avec lequel il collabore, d'où un consensus incontournable, seule garantie pour le patient. Ce texte rappelle les responsabilités des uns et des autres, dans un esprit de respect mutuel et de confraternité.

1 — Les principes déontologiques

1.1 — Généralités : les règles du code de déontologie s'appliquent entre confrères de disciplines différentes mais complémentaires — pas d'injure, d'insulte ou de calomnie, pas de pression matérielle ou morale. Nul médecin ne doit entreprendre d'actes pour lesquels il n'est pas compétent (art. 32 et 70) : recours à un tiers compétent chaque fois que nécessaire.

Chirurgien et anesthésiste-réanimateur forment une équipe de spécialités complémentaires ; le chirurgien, habituellement premier consulté, organise la prise en charge chirurgicale. La réunion de plusieurs compétences implique une décision collective, la responsabilité restant individuelle (art. 64). L'article 64 permet à chaque médecin de refuser librement sa collaboration ou de la retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir ses confrères — faculté à utiliser avec précaution (la juridiction ordinaire a sanctionné des manquements aux devoirs de dévouement et de continuité des soins, en particulier en situation d'urgence, sans gradation prévue par l'article 47). Un refus de collaboration suppose une information préalable argumentée sur des éléments objectifs.

L'échange d'informations réciproques doit être le plus large possible (dialogue et écrit) : le chirurgien informe l'anesthésiste des constatations de son examen, des propositions thérapeutiques et de l'importance de l'intervention ; l'anesthésiste informe l'opérateur de toute contre-indication anesthésique ou difficulté suspectée. L'opérateur doit tenir compte de l'avis de l'anesthésiste et ne peut lui imposer d'agir contre sa conscience (clause de conscience pour l'IVG, art. 18 — de même, selon la loi n° 2001-586 du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception, un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une stérilisation à visée contraceptive, mais doit en informer l'intéressée dès la première consultation). En cas de désaccord, une conciliation doit être recherchée (confrères, hiérarchie médicale, CME/conférence médicale, instances ordinaires) — le patient ne doit jamais être témoin ou otage du différend. Des condamnations ont été prononcées contre des chirurgiens et des anesthésistes-réanimateurs non pas en raison de fautes techniques propres à chaque discipline, mais pour un manque de coopération préjudiciable au patient.

1.2 — L'obligation d'information

Principes fixés par le code de déontologie : **art. 35** (information loyale, claire et appropriée) ; **art. 36** (consentement recherché dans tous les cas, respect du refus après information des conséquences, information des proches si le patient ne peut exprimer sa volonté sauf urgence — les obligations envers un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'**art. 42**) ; **art. 64** (médecins collaborant à un traitement, information mutuelle, chacun veillant à l'information du malade). L'ANAES recommande que chaque médecin informe des éléments relevant de sa discipline, sans supposer que d'autres l'ont déjà fait.



Contenu de l'information selon l'ANAES : état du patient et évolution prévisible ; description des examens/soins/interventions envisagés et de leurs alternatives ; objectif, utilité, bénéfices escomptés ; conséquences et inconvénients ; complications et risques (y compris exceptionnels) ; précautions recommandées.

Répartition : le chirurgien (ou tout opérateur) informe sur la maladie, l'évolution sans traitement, le motif et les modalités de l'intervention, ses avantages/conséquences/inconvénients/risques et alternatives ; l'anesthésiste-réanimateur informe sur la technique anesthésique envisagée, ses avantages/inconvénients/risques/alternatives, et sur le terrain du patient. Chevauchement inévitable entre les deux informations, à gérer avec tact (chacun donne une idée du risque global, sans esquiver les questions ni les « renvoyer » sur le confrère). Le dossier médical doit conserver une trace écrite de l'information donnée, et permettre à tout médecin devant apporter ses soins au patient de comprendre la nature de l'intervention chirurgicale, de la technique anesthésique et de l'éventuelle réanimation envisagées ; si le médecin informant n'est pas celui qui interviendra, il en informe le patient et transmet les renseignements nécessaires.

Cas particulier : une mineure peut consentir seule à une IVG et aux actes liés (loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001) — l'anesthésiste doit s'assurer que ce consentement a bien été obtenu. Disclosure : la source cite ce même texte législatif du 4 juillet 2001 sous deux numéros différents à deux endroits (« n° 2001-586 » en 1.1 à propos de la clause de conscience pour la stérilisation contraceptive, « n° 2001-588 » ici) — incohérence interne reproduite telle quelle, non tranchée par cette fiche.

2 — Principes d'organisation

2.1 — Démarches qualité : l'accréditation des établissements de soins (décret n° 97-311) engage à la validation de procédures écrites ; il est recommandé que anesthésistes-réanimateurs, chirurgiens et autres professionnels rédigent et cosignent des chartes de fonctionnement, prenant en compte les recommandations de bonne pratique des sociétés savantes validées par l'ANAES. Le développement de l'évaluation des pratiques professionnelles, qui a reçu une consécration législative et réglementaire pour les médecins libéraux, participe de la même évolution.

2.2 — Charte de fonctionnement des équipes anesthésiques et chirurgicales : nécessaire, portant sur 5 points — la consultation d'anesthésie, le programme opératoire, le réveil anesthésique, les soins intensifs/réanimation chirurgicale, et l'hospitalisation. Pour chaque point, la répartition des tâches et responsabilités (séparées ou solidaires selon l'organisation publique/privée) doit être explicite.

3 — Les structures

Structure	Points clés
3.1 — Établissement public	L'activité s'exerce dans le cadre d'un service (éventuellement regroupé en structure fédérative en CHU, ou subdivisé en unités fonctionnelles). Affectation des anesthésistes par le chef de service, en tenant compte de leur souhait. Ils relèvent de l'autorité du chef de service d'anesthésie-réanimation, mais participent aux activités du service de chirurgie où ils travaillent, et disposent de locaux propres. Le médecin anesthésiste est responsable du fonctionnement de la SSPI. Rattachement des secteurs de soins intensifs/réanimation chirurgicale selon leur fonctionnement réel : rattaché à l'anesthésie-réanimation si ouvert à plusieurs services de chirurgie ; si rattaché à un service de chirurgie, la responsabilité thérapeutique et l'autorité médicale des anesthésistes y travaillant doivent être reconnues (désignation d'un praticien responsable par accord entre chefs de service).
3.2 — Établissement privé	Relations globalement similaires au public, mais conflits plus spécifiques liés aux intérêts individuels : fixation des honoraires (secteurs conventionnels choisis librement, tact et mesure — art. 53/54 — ; difficulté pour le devis des actes esthétiques, arrêté du 17/10/1996) ; critères de gestion (le statut de propriétaire/actionnaire majoritaire ne peut justifier la privation de moyens indispensables aux patients ni des contraintes abusives — art. 71). Prévention : respect de la déontologie, contrats soumis à l'Ordre, conférences médicales.

4 — Mise en œuvre des principes aux relations anesthésiste-chirurgien

Relations anesthésistes-réanimateurs / chirurgiens

Méthodologie, préambule, principes déontologiques & mise en œuvre



Point	Recommandations
4.1 — Consultation pré-anesthésique	Obligatoire (décret n° 94-1050, codifié aux articles D.712-40 à D.712-51 du code de la santé publique) pour toute anesthésie générale ou locorégionale ; réalisée à distance de l'intervention pour un consentement libre et éclairé. L'opérateur rappelle son intérêt et sa nécessité au patient. Intégrée dans une procédure commune d'évaluation préopératoire. Locaux, moyens et secrétariat adéquats nécessaires (accord explicite public/privé). Il est préférable que l'anesthésiste consultant réalise lui-même la visite pré-anesthésique et l'anesthésie ; sinon, le patient en est informé et le médecin qui opère prend connaissance du dossier avant l'intervention — d'où l'importance d'un dossier médical de qualité, lisible. La multiplication injustifiée des intervenants dilue les responsabilités et augmente les risques de défaut de communication.
4.2 — Consultation de cardiologie (ou autre spécialiste) à l'occasion d'une anesthésie	4 principes : (1) demande précise, réponse en rapport ; le consultant informe le patient si une nouvelle discussion s'impose avant décision définitive ; (2) anesthésiste et opérateur se tiennent mutuellement informés des demandes et résultats ; (3) la décision finale de l'indication et des modalités d'anesthésie relève de l'anesthésiste-réanimateur ; (4) en cas de désaccord, chacun assume ses responsabilités dans son domaine, mais une concertation réelle doit précéder la décision.
4.3 — Le programme opératoire	Établi par les médecins opérateurs, les anesthésistes concernés et le responsable du secteur opératoire (décret n° 94-1050, art. D.712-42), tenant compte des disponibilités de chacun — on ne peut imposer plusieurs anesthésies simultanées à un anesthésiste. Réalisé conjointement (chirurgiens, spécialistes, anesthésistes, responsables du bloc), horaires/ordre d'un commun accord, ponctualité de tous. Recommandé par écrit, signé au plus tard la veille. Gestion des urgences définie à l'avance ; conseils de blocs opératoires encouragés (publics et privés).
4.4 — La surveillance post-interventionnelle	Le réveil, temps périlleux de l'anesthésie : fonctionnement de la SSPI prioritaire (moyens définis au décret n° 94-1050, art. D.712-47/49). Suivi sous surveillance conjointe chirurgien/anesthésiste ; l'anesthésiste précise par écrit nature et rythme des soins, le chirurgien consigne par écrit ses prescriptions post-opératoires immédiates (drains, plaie, aspirations) sur le même document versé au dossier. Le personnel de SSPI documente chaque acte et l'heure d'entrée/sortie. La sortie de SSPI n'est décidée que par l'anesthésiste-réanimateur (examen conscience/fonctions vitales) ; l'orientation ultérieure (hospitalisation/soins intensifs) est une décision commune.
4.5 — Les soins intensifs et la réanimation chirurgicale	Le patient orienté en soins intensifs/réanimation chirurgicale est sous la responsabilité médicale de l'anesthésiste-réanimateur ; certaines décisions restent au chirurgien (mobilisation, ablation sondes/drains). Techniques de réanimation et prescriptions médicamenteuses : anesthésiste-réanimateur, sur protocole écrit précisant les domaines de chacun ; prescriptions écrites, datées et signées (décret n° 93-221 sur les infirmiers), en particulier pour antibiotiques/anticoagulants et pour les examens biologiques/radiologiques (interprétation visée par le prescripteur, jamais anonyme). Entrée/sortie de ces secteurs sur accord conjoint.
4.6 — L'hospitalisation	Le patient retourné en hospitalisation est sous la responsabilité de l'opérateur, qui répond des suites opératoires ; le règlement interne précise les procédures en cas d'événement inopiné/complication tardive. Règles de fonctionnement formalisées après concertation plutôt que des accords tacites, pour limiter les erreurs de transmission. Selon les façons de travailler de l'équipe, les protocoles thérapeutiques préciseront des modalités strictes ou une politique plus générale de prescription, dans le but de préserver un plus large espace de liberté ; les prescriptions devront être consignées par écrit. En urgence, la déontologie exclut qu'un médecin se retranche derrière sa spécialité pour s'exonérer de sa mission d'assistance en cas de complication post-opératoire.
4.7 — Anesthésie/sédation par des spécialistes non anesthésistes-réanimateurs	Une anesthésie générale ou locorégionale ne peut être mise en œuvre sans anesthésiste-réanimateur (déontologie et code de la santé publique, art. D.712-40 et suivants ; art. 40 interdisant un risque injustifié). L'anesthésie locale/sédation par un chirurgien ou autre opérateur requiert formation/expérience particulières et, le cas échéant, le concours de l'anesthésiste — règlement écrit fixant les modalités (consultation pré-anesthésique, prémédication, présence obligatoire ou de recours, passage en SSPI, antalgie post-opératoire). Spécificité notée pour les cardiologues en USIC. En conclusion : soit un acte nécessite un anesthésiste, soit non — les situations intermédiaires sont à éviter.

Relations anesthésistes-réanimateurs / chirurgiens

Méthodologie, préambule, principes déontologiques & mise en œuvre



Point	Recommandations
4.8 — La chirurgie ambulatoire	Chirurgie programmée et organisée (décret n° 92-1102, art. D.712-30 à 34), patient au centre du fonctionnement du fait de la très courte durée de séjour. Contraintes : amplitude d'ouverture ≤ 12 h ; présence minimale permanente d'un médecin qualifié plus, en sus, présence permanente d'un anesthésiste-réanimateur dans la structure. Le patient reçoit à sa sortie un bulletin signé mentionnant les intervenants et les consignes post-opératoires/anesthésiques (art. D.712-33). Règlement intérieur commun (fonctionnement médical, sortie concertée, organisation des présences) fait respecter par un médecin coordonnateur (art. D.712-34).
4.9 — Les transfusions sanguines	Responsabilité au chirurgien, à l'anesthésiste, ou aux deux. Préopératoire : le chirurgien détient l'essentiel de l'information (technique, difficultés prévisibles, risque hémorragique) à porter au dossier ; l'anesthésiste évalue les besoins et organise les moyens. Chacun tient le patient informé de l'éventualité ou de la nécessité de la transfusion. Peropératoire : information mutuelle, le chirurgien vérifie sa transmission ; l'anesthésiste commande qualitativement/quantitativement les produits et réalise la transfusion. Post-opératoire : responsabilité selon l'organisation (anesthésiste si soins intensifs sous sa responsabilité continue ; sinon chirurgien). Documents portant toujours le nom lisible du prescripteur ; motif de la transfusion tracé au dossier ; règlement intérieur recommandé sur ce point.



5 — Sages-femmes, gynécologues-obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs

Les sages-femmes, profession médicale à part entière (Ordre et code de déontologie propres), sont régies par des textes législatifs et réglementaires déterminant leurs règles d'exercice professionnel et fixant le matériel qu'elles peuvent employer et les médicaments qu'elles peuvent prescrire. Elles doivent appeler le gynécologue-obstétricien de garde en cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, et un médecin anesthésiste-réanimateur pour tout acte autorisé susceptible de nécessiter une anesthésie autre que locale. Pour les autres actes, la prescription d'intervention est faite par le gynécologue-obstétricien, le choix de la technique anesthésique revenant à l'anesthésiste.

Analgesie périmédullaire : pour un accouchement présumé normal, la demande peut provenir de la parturiente (déjà vue en consultation pré-anesthésique) — dès accord de principe de l'équipe obstétricale, la sage-femme apprécie le moment et transmet à l'anesthésiste. Pour une cause médicale/obstétricale, la demande est faite par le gynécologue-obstétricien. La décision de réalisation et de technique appartient au médecin anesthésiste-réanimateur. Si la parturiente n'a jamais consulté dans la maternité, la demande vient du gynécologue-obstétricien et la réalisation dépend d'une consultation pré-anesthésique en urgence et des examens de laboratoire disponibles. La sage-femme s'assure de la disponibilité des praticiens de garde/astreinte (charte à préciser). L'anesthésiste, s'il le juge nécessaire, contacte le gynécologue-obstétricien.

La sage-femme peut participer à l'entretien de l'analgesie locorégionale (hors période d'expulsion) si un anesthésiste est à tout moment disponible à proximité — réinjections par le dispositif posé par le médecin (première injection médicale obligatoire), selon prescriptions écrites et signées ou protocoles validés (modalités, temps de sécurité entre injections, posologies/débit des pompes, ablation du cathéter péridural). La surveillance de l'analgesie péridurale par la sage-femme suppose sa disponibilité et sa compétence : elle ne peut être contrainte à d'autres soins pendant cette surveillance ; tout événement particulier est consigné au dossier d'anesthésie. L'anesthésiste et le gynécologue-obstétricien restent disponibles pendant tout le séjour en salle de naissance, avec délais compatibles avec la sécurité. Toute sage-femme qui s'estime ne pas être en mesure d'assurer une technique en sécurité peut légitimement refuser sa prise en charge. De façon générale, la tenue d'un dossier médical rempli par les différents intervenants et comprenant l'ensemble des données intéressant le déroulement de l'accouchement permet d'améliorer la prise en charge de la parturiente. Des réunions de concertation régulières (chartes, protocoles, information sur les nouveaux produits) sont recommandées.

6 — Les infirmier(e)s anesthésistes diplômé(e)s d'État (IADE)

L'anesthésie est un acte médical ne pouvant être pratiqué que par un médecin anesthésiste-réanimateur qualifié. L'IADE aide le médecin mais ne peut entreprendre seul une anesthésie, quel qu'en soit le type, en l'absence d'un médecin qualifié. Il est sous la responsabilité exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur et/ou du chef de service — aucun autre spécialiste ne peut s'y substituer ou l'autoriser à exercer seul.

Le médecin peut confier temporairement à l'IADE, sous sa propre responsabilité, la surveillance d'un patient anesthésié ne présentant pas de risque particulier, à condition d'être immédiatement joignable et disponible à proximité. L'IADE participe à toute ALR et pratique des réinjections dès lors que le dispositif a été posé par un médecin, sur prescription écrite. En cas de protocole écrit de soins d'urgence/actes conservatoires jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'IADE remet un compte rendu écrit, daté et signé.

L'anesthésiste doit pouvoir être assisté par un autre médecin et/ou un IADE si nécessaire (début/fin d'anesthésie, moments délicats, complications, actes à risque spécifique) — la présence d'un médecin anesthésiste auprès d'un IADE est toujours nécessaire. Hors bloc, les IADE interviennent en SSPI, assurent le transport intra-établissement des patients anesthésiés/réanimés, exercent en soins intensifs/réanimation chirurgicale (toujours sous responsabilité médicale). Le décret n° 94-1050 (art. D.712-49) impose la présence permanente d'au moins un IDE formé (si possible IADE) en SSPI, et au moins deux agents dont un IDE formé si la SSPI a ≥ 6 postes occupés — ce personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Les IADE peuvent participer aux transports inter/intra-hospitaliers et pratiquer des gestes sur prescription du médecin de l'équipe ; le SMUR étant un service médicalisé, l'IADE ne peut l'assurer seul.

Responsabilités demeurant du ressort exclusif du médecin anesthésiste-réanimateur :

- la consultation pré-anesthésique, même si l'anesthésiste peut s'entourer d'autres avis spécialisés (cardiologue, pneumologue...) ;
- la prescription de l'anesthésie (type, agents, modalités de surveillance) ;
- le geste technique d'ALR (bloc tronculaire/plexique, rachianesthésie, péridurale/caudale, anesthésie locale IV) ;
- la prescription de médicaments ou transfusions rendus nécessaires en cours d'anesthésie ;
- la mise en œuvre de techniques invasives (voies veineuses profondes, sondes de Swan-Ganz) ;
- la prescription des soins et examens post-opératoires ;
- la décision de sortie de la salle de surveillance post-interventionnelle.

Sources et traçabilité

Document source : « Recommandations concernant les relations entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens, autres spécialistes ou professionnels de santé ». Conseil national de l'Ordre des médecins, en collaboration avec la SFAR et de nombreuses sociétés savantes/syndicats (cardiologie, endoscopie digestive, chirurgie digestive,



gynécologie-obstétrique, radiologie, Ordre des sages-femmes, syndicats d'anesthésistes-réanimateurs).

Version : texte original mai 1994 (Pr Bernard Glorion, préambule) ; édition actualisée décembre 2001 (Pr Bernard Hoerni, préface), réunions de travail des 12 janvier, 23 février, 21 mars, 6 avril et 29 juin 2001.

Méthodologie : texte déontologique/juridique — articles du code de déontologie médicale, décrets et code de la santé publique, recommandations ANAES ; aucun système de cotation scientifique — voir disclosure méthodologique en page 1.

URL source : <https://sfar.org/wp-content/uploads/2014/04/196-reco-anesth-chir-autres-2001.pdf>

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité du texte (préface, préambule, principes déontologiques, principes d'organisation, les structures, mise en œuvre en 9 points, sages-femmes/gynécologues-obstétriciens, IADE).

Remerciements (groupe de travail 2001) : Pr J.-Y. Artigou, Secrétaire de la Société française de cardiologie ; Mme N. Atéchian, Présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ; Mme F. Bicheron, Conseil national de l'Ordre des sages-femmes ; Dr J.-M. Canard, Secrétaire général de la Société française d'endoscopie digestive ; Dr G.-M. Cousin, Secrétaire général du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens français ; Dr J.-M. Dumeix, Président du Syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs français ; Pr J. Escourrou, Société française d'endoscopie digestive ; Pr P.-L. Fagniez, Président de la section de chirurgie digestive au Conseil national des Universités ; Dr J. Garric, ex-Président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ; Pr J.-R. Giraud, Président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens français ; Pr B. Glorion, Mme R. Grente, Dr D. Grunwald, Pr J. Langlois et Dr F.-X. Léandri (Conseil national de l'Ordre des médecins) ; Pr P. Legmann, Société française de radiologie ; Dr M. Lévy, Secrétaire général du Syndicat national des anesthésiologistes-réanimateurs français ; Pr A. Lienhart, Président de la SFAR ; Dr M. Malafosse, Président de l'Association française de chirurgie ; Dr J. Meurette, Président de l'Union des chirurgiens français ; Dr M. Palot, SFAR ; Dr R. Torrielli, Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs français ; et en collaboration avec le Syndicat national des médecins anesthésistes-réanimateurs des hôpitaux non universitaires. Remerciement particulier aux Pr A. Lienhart et Pr P.-L. Fagniez pour la constance de leur collaboration et la pertinence de leurs réflexions.

Avertissement — document de 2001 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par le CNOM, la SFAR ou les sociétés associées. De nombreux textes réglementaires cités (décrets de 1992 à 1998) ont pu être modifiés, abrogés ou recodifiés depuis 2001 (notamment par le code de la santé publique et le code de déontologie actuels) — se référer aux textes en vigueur et à un avis juridique/ordinal actualisé avant toute décision organisationnelle.