

DKA・HHS（高血糖緊急症） — 要約

解説「DKA・HHS」と「正常血糖DKA」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点 詳しく

Kを見てからインスリン

輸液・インスリン・Kを同時に計画する。K 3.5未満なら補充を先にして、インスリンは待つ

血糖が下がっても止めない

250 mg/dL未満でブドウ糖を足して続ける。DKAの解消は血中βOHB 0.6 mmol/L未満で判定

HHSは輸液が主役

浸透圧は毎時3～8 mOsm/kgを超えて下げない。混合型は2つの目標を並べて追う

2 診断 — ケトン血中βOHB、浸透圧は計算する 詳しく

項目	DKA（3項目すべて）	HHS（4項目すべて）
血糖	200 mg/dL以上、または糖尿病の既往	600 mg/dL以上
ケトン	βOHB 3.0 mmol/L以上	βOHB 3.0未満
酸塩基	pH 7.3未満かつ／またはHCO ₃ ⁻ 18未満	pH 7.3以上かつHCO ₃ ⁻ 15以上
浸透圧	—	有効浸透圧300 mOsm/kg超

- 両方を満たせば混合型：3分の1以上を占め、院内死亡が最も高い。血糖600未満でも有効浸透圧（2×Na+血糖、mmol/L）を計算する
- 尿ケトンに頼らない：試験紙はβOHBを拾わず、回復期にはかえって強く見える。SGLT2阻害薬では偽陰性になりうる
- 重症度：βOHB 6.0超・pH 7.0未満・HCO₃⁻ 10未満・昏迷で重症。JIPADのICU入室DKA 866例の院内死亡はpHによらず3～6%で、入室先はpHだけで決めない

3 3本柱を同時に — 輸液・インスリン・K 詳しく

最初の1時間：晶質液を始め、静脈血ガス・βOHB・電解質・心電図を出し、誘因を探す

輸液

- 2～4時間は500～1,000 mL/時
- 高齢・心腎・妊婦は250 mLずつ
- 生食でも平衡液でもよい

インスリン

- 0.1単位/kg/時の固定速度
- ボーラスは原則なし
- 軽症DKA・HHSは0.05

カリウム

- 3.5未満：補充を先に
- 5.0未満：1 Lに20～30 mmol
- 4～5を保ち4時間ごと

血糖250未満：インスリンを0.05に減らしてブドウ糖を足し、DKA 150～200・HHS 200～250を保つ

重炭酸はpH 7.0未満だけ、リンは筋力低下+P 1.0未満だけ。K 2.5以下は院内死亡OR 4.9

4 HHS — 浸透圧を急いで下げない

[詳しく](#)

指標	上限・目安
血糖の低下	毎時90～120 mg/dLを超えない。高血糖の解消には通常8～10時間
血清Naの低下	24時間で10 mmol/Lを超えない（浸透圧性脱髄症候群の予防）
浸透圧の低下	毎時3.0～8.0 mOsm/kg。血清浸透圧は4時間ごとに追う

- 水分欠乏は9～12 L。輸液で意識が戻ることがある。速度は併存症に合わせ、混合型にも同じ上限を使う
- 初期のNa上昇だけで低張液に替えない（血糖100 mg/dL低下でNa 1.6上昇）。0.45%食塩水は輸液とインスリンが十分なのに浸透圧が下がらないときだけ
- 血栓予防：血栓が疑われなければ予防量の低分子ヘパリン。意識が変われば早めに頭部画像

5 解消と皮下インスリンへの切り替え

[詳しく](#)

- ☐ DKA：βOHB 0.6未満かつpH 7.3以上またはHCO₃⁻ 18以上
- ☐ HHS：浸透圧300未満・尿量0.5 mL/kg/時超・意識改善・血糖250未満
- ☐ AGと尿ケトン は 解消の判定に使わない
- ☐ 生食後のHCO₃⁻低値は高Cl⁻性を疑い、βOHBで読む
- ☐ 皮下インスリンは 静注をやめる前に重ねる（重ねずに切らない）
- ☐ 1日総量0.5～0.6単位/kg（高齢・腎不全は約0.3）、40～60%を基礎

6 正常血糖DKA — 血糖で除外しない

[詳しく](#)

AG開大ならβOHB

血糖200未満のDKAで、約10%を占める。SGLT2阻害薬使用者のDKAの43.6%が血糖250未満。最終内服の日時を記録する

最初からブドウ糖

インスリンと同時に5%か10%ブドウ糖（7.5 g/時=D5 150 mL/時が目安）。血糖が下がればインスリンでなくブドウ糖を増やす

48時間以上は止めない

SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上、ケトンが消えるまで静注を続ける。糖を含む維持輸液だけでは足りないことが多い

出典：本編の主要文献（高血糖緊急症の国際コンセンサス Diabetes Care 2024；ADA Standards of Care 2026；Intensive Care Med 2023・2024；Crit Care Med 2019；J Crit Care Med 2026；Curr Diab Rep 2025；Crit Care Explor 2026 ほか）。閾値は文書ごとに少しずつ違うので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。